



3 2.29



4



PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

AUCTORE

ISAACO NEWTONO,
EQUITE, AURATO.

EDITIO ULTIMA

Cui accedit ANALYSIS per Quantitatum SERIES, FLUXIONES ac DIFFERENTIAS cum enumeratione LINEARUM TERTII ORDINIS.



AMSTÆLODAMI,
SUMPTIBUS SOCIETATIS.

M. D. CCXXIII.

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

ILLUSTRISSIMÆ
SOCIETATI REGALI,

A
SERENISSIMO REGE
CAROLO II

AD PHILOSOPHIAM PROMOVENDAM
FUNDATÆ,

ET
AUSPICIIS
AUGUSTISSIMÆ REGINÆ

A N N Æ
FLORENTI,

TRACTATUM HUNC D.D.D.

IS. NEWTONUS.

THE
BIBLICAL ARCHAEOLOGICAL
SOCIETY

OF THE
EMPIRE OF GREAT BRITAIN
AND IRELAND

AND OF THE
NORTH BRITISH PROVINCES

OF THE
NORTH BRITISH PROVINCES

OF THE
NORTH BRITISH PROVINCES

OF THE
NORTH BRITISH PROVINCES

OF THE
NORTH BRITISH PROVINCES

OF THE
NORTH BRITISH PROVINCES

I N
VIRI PRÆSTANTISSIMI
ISAACI NEWTONI

OPUS HOCCE
MATHEMATICO-PHYSICUM

Seculi Gentisque nostræ Decus egregium.

EN tibi norma Poli, & divæ libramina Molis,
Computus en Jovis; & quas, dum primordia rerum
Conderet, omnipotens sibi Leges ipse Creator
Dixerit, atque operum quæ fundamenta locarit.
Intima panduntur victi penetralia Cœli,
Nec latet, extremos quæ Vis circumrotet Orbes.
Sol folio residens ad se jubet omnia pronò
Tendere descensu, nec recto tramite currus
Sidereos patitur vastum per inane moveri;
Sed rapit immotis, se centro, singula gyris.
Hinc patet, horrificis qua sit via flexa Cometis:
Discimus hinc tandem, qua causa argentea Phœbe
Passibus haud æquis eat, & cur subdita nulli
Hactenus Astronomo numerorum fræna recuset:
Cur remeent Nodi, curque Auges progrediantur.
Discimus, & quantis refluxum vaga Cynthia Pontum
Viribus impellat; fessis dum fluctibus ulvam
Deferit, ac nautis suspectas nudat arenas;
Alternisve ruens spumantia littora pulsat.

Quæ

Quæ toties animos veterum torfere Sophorum,
Quæque Scholas hodie rauco certamine vexant,
Obvia conspiciamus; nubem pellente Matheſi:
Quæ ſuperas penetrare domos, atque ardua Cœli,
NEWTONI auſpiciis, jam dat contingere Tempa.

Surgite Mortales, terrenas mittite curas;
Atque hinc cœligenæ vires cognoscite Mentis,
A pecudum vita longe longeque remotæ.
Qui ſcriptis primus Tabulis compeſcere Cædes,
Furta & Adulteria, & perjuræ crimina Fraudis;
Quive vagis populis circumdari mœnibus Urbes
Auctor erat; Cererisve beavit munere gentes;
Vel qui curarum lenimen preſſit ab Uva;
Vel qui Niliaca monſtravit arundine pictos
Conſociare ſonos, oculisque exponere Voces;
Humanam ſortem minus extulit; utpote pauca
In commune ferens miſeræ ſolatia vitæ.
Jam vero Superis convivæ admittimur, alti
Jura poli tractare licet, jamque abdita diæ
Clauſtra patent Naturæ, & rerum immobilis ordo;
Et quæ præteritis latuere incognita ſæclis.

Talia monſtrantem juſtis celebrate Camænis,
Vos qui cœleſti gaudetis neſtare veſci,
NEWTONUM clauſi reſerantem ſcrinia Veri,
NEWTONUM Muſis carum, qui pectore puro
Phœbus adeſt, totoque inceſſit Numine mentem:
Nec fas eſt propius Mortali attingere Divos.

ED. HALLEY.

A U C.

AUCTORIS P R Æ F A T I O

A D
L E C T O R E M.

Cum Veteres Mechanicam (*uti auctor est Pappus*) in rerum Naturalium investigatione maximi fecerint; & Recentiores, in ipsis formis substantialibus & qualitatibus oculis, Phenomena Naturæ ad leges Mathematicas revocare aggressi sint: Visum est in hoc Tractatu Mathesin excolere, quatenus ea ad Philosophiam spectat. Mechanicam vero duplicem Veteres constituerunt: Rationalem quæ per Demonstrationes accurate procedit, & Practicam. Ad Practicam spectant Artes omnes Manuales, a quibus utique Mechanica nomen mutuata est. Cum autem Artifices parum accurate operari soleant, fit ut Mechanica omnis a Geometria ita distinguatur, ut quicquid accuratum sit ad Geometriam referatur, quicquid minus accuratum ad Mechanicam. Attamen errores non sunt Artis sed Artificum. Qui minus accurate operatur, imperfectior est Mechanicus, & si quis accuratissime operari posset, hic foret Mechanicus omnium perfectissimus. Nam & Linearum rectarum & Circulorum descriptiones in quibus Geometria fundatur, ad Mechanicam pertinent. Has lineas describere Geometria non docet sed postulat. Postulat enim ut Tyro easdem accurate describere prius didicerit quam limen attingat Geometriæ; dein, quomodo per has operationes Problemata solvantur, docet. Rectas & Circulos describere Problemata sunt, sed non Geometrica. Ex Mechanica postulatur horum solutio, in Geometria docetur solutorum usus. Ac gloriatur Geometria quod tam paucis principiis aliunde petitis tam multa præstet. Fundatur igitur Geo-

Geometria in praxi Mechanica, & nihil aliud est quam Mechanicæ universalis pars illa quæ artem mensurandi accurate proponit ac demonstrat. Cum autem artes Manuales in corporibus movendis præcipue versentur, fit ut Geometria ad magnitudinem, Mechanica ad motum vulgo referatur. Quo sensu Mechanica rationalis erit Scientia Motuum qui ex viribus quibuscunque resultant, & Virium quæ ad motus quoscunque requiruntur, accurate propozita ac demonstrata. Pars hæc Mechanicæ a Veteribus in Potentiis quinque ad artes manuales spectantibus exculta fuit, qui Gravitatem (cum potentia manualis non sit) vix aliter quam in ponderibus per potentias illas movendis considerarunt. Nos autem non Artibus sed Philosophiæ consulentes, deque potentiis non manualibus sed naturalibus scribes, ea maxime tractamus quæ ad Gravitatem, Levitatem, vim Elasticam, resistantiam Fluidorum & ejusmodi vires seu attractivas seu impulsivas spectant: & ea propter, hæc nostra tanquam Philosophiæ principia Mathematica proponimus. Omnis enim Philosophiæ difficultas in eo versari videtur, ut a Phenomenis motuum investigemus vires Naturæ, deinde ab his viribus demonstremus phenomēna reliqua. Et huc spectant Propositiones generales quas Libro primo & secundo pertractavimus. In Libro autem tertio Exemplum hujus rei proposuimus per explicationem Systematis mundani. Ibi enim, ex Phenomenis cælestibus, per Propositiones in Libris prioribus Mathematicæ demonstratas, derivantur vires Gravitatis quibus corpora ad Solem & Planetas singulos tendunt. Deinde ex his viribus per Propositiones etiam Mathematicas, deducuntur motus Planetarum, Cometarum, Lunæ & Maris. Utinam cetera Naturæ phenomēna ex principiis Mechanicis eodem argumentandi genere derivare liceret. Nam multa me movent ut nonnihil suspicer ea omnia

P R Æ F A T I O.

V

nia ex viribus quibusdam pendere posse, quibus corporum particulae per causas nondum cognitae vel in se mutuo impelluntur & secundum figuras regulares coherent, vel ab invicem fugantur & recedunt: quibus viribus ignotis, Philosophi hactenus Naturam frustra tentarunt. Spero autem quod vel huic Philosophandi modo, vel veriori alicui, Principia hic posita lucem aliquam praebeant.

In his edendis, Vir acutissimus & in omne literarum genere eruditissimus Edmundus Halleius operam navavit, nec solum Typothetarum Sphalmata correxit & Schemata incidit curavit, sed etiam Auctor fuit ut horum editionem aggrederer. Quippe cum demonstratam a me Figuram Orbium caelestium impetraverat, rogare non destitit ut eandem cum Societate Regali communicarem. Quae deinde hortatibus & benignis suis auspiciis effecit ut de eadem in lucem emittenda cogitare inciperem. At postquam Motuum Lunarium inaequalitates aggressus essem, deinde etiam alia tentare coepissem quae ad leges & mensuras Gravitatis & aliarum virium, & Figuras a corporibus secundum datas quascunque leges attractis describendas, ad motus corporum plurium inter se, ad motus corporum in Mediis resistentibus, ad vires, densitates & motus Mediorum, ad Orbes Cometarum, & similia spectant, editionem in aliud tempus differendam esse putavi, ut caetera rimarer & una in publicum darem. Quae ad motus Lunares spectant, (imperfecta cum sint,) in Corollariis Propositionis LXVI. simul complexus sum, ne singula methodo prolixiore quam pro rei dignitate proponere, & sigillatim demonstrare tenerer, & seriem reliquarum Propositionum interrompere. Nonnulla sero inventa locis minus idoneis inserere malui, quam numerum Propositionum & citationes mutare. Ut omnia candide legantur, & defectus, in materia tam difficili non tam reprehendantur, quam novis Lectorum conatibus investigentur, & benigne suppleantur, enixe rogo.

IS. NEWTON.

Dabam Cantabrigiae, e Collegio
S. Trinitatis, Martii 8. 1686.

AUCTORIS PRÆFATIO.

IN hac Secunda Principiorum Editione, multa sparsim emendantur & nonnulla adjiciuntur. In Libri primi Sectione II. Inventio virium quibus corpora in Orbibus datis revolvi possint, facilior redditur & amplior. In Libri secundi Sectione VII, Theoria resistentiæ Fluidorum accuratius investigatur & novis Experimentis confirmatur. In Libro tertio Theoria Lunæ & Præcessio Equinoctiorum ex Principiis suis plenius deducuntur, & Theoria Cometarum pluribus & accuratius computatis Orbium exemplis confirmatur.

Dabam Londini,
Mar. 28. 1713.

IS. NEWTON.

EDI-

EDITORIS PRÆFATIO.

NEWTONIANÆ Philosophiæ novam tibi, Lector benevole, diuque desideratam Editionem, plurimum nunc emendatam atque auctiorem exhibemus. Quæ potissimum contineantur in hoc Opere celeberrimo, intelligere potes ex Iadicibus adjectis: quæ vel addantur vel immutentur, ipsa te fere docebit Auctoris Præfatio. Reliquum est, ut adjiciantur nonnulla de Methodo hujus Philosophiæ.

Qui Physicam tractandam susceperunt, ad tres fere classes revocari possunt. Extiterunt enim, qui singulis rerum speciebus Qualitates específicas & occultas tribuerint; ex quibus deinde corporum singulorum operationes, ignota quadam ratione, pendere voluerunt. In hoc posita est summa doctrinæ Scholasticæ, ab *Aristotele* & Peripateticis derivatæ: Affirmant utique singulos Effectus ex corporum singularibus Naturis oriri; at unde sint illæ Naturæ non docent; nihil itaque docent. Cumque toti sint in rerum nominibus, non in ipsis rebus; Sermonem quendam Philosophicum censendi sunt adinvenisse, Philosophiam tradidisse non sunt censendi.

Alii ergo melioris diligentiae laudem consequi sperarunt, rejecta Vocabulorum inutili farragine. Statuerunt itaque Materiam universam homogeneam esse, omnem vero Formarum varietatem, quæ in corporibus cernitur, ex particularum componentium simplicissimis quibusdam & intellectu facillimis affectionibus oriri. Et recte quidem progressio instituitur a simplicioribus ad magis composita, si particularum primariis illis affectionibus non alios tribuunt modos, quam quos ipsa tribuit Natura. Verum ubi licentiam sibi assument, ponendi quascunque libet ignotas partium figuras & magnitudines, incertosque situs & motus; quin & fingendi Fluida quædam occulta, quæ corporum poros liberrime permeent, omnipotente prædita subtilitate, motibusque occultis agitata; jam ad somnia delabuntur, neglecta rerum constitutione vera: quæ sane frustra petenda est ex fallacibus conjecturis, cum vix etiam per certissimas Observationes investigari possit. Qui speculationum

suarum fundamentum desumunt ab Hypothesibus, etiamsi deinde secundum leges Mechanicas accuratissime procedant; Fabulam quidem elegantem forte & venustam, Fabulam tamen concinnare dicendi sunt.

Relinquitur adeo tertium genus, qui Philosophiam scilicet Experimentalem profitentur. Hi quidem ex simplicissimis quibus possunt principiis rerum omnium causas derivandas esse volunt: nihil autem Principii loco assumunt, quod nondum ex Phænomenis comprobatum fuerit. Hypotheses non comminiscuntur, neque in Physicam recipiunt, nisi ut Quæstiones de quarum veritate disputetur. Duplici itaque Methodo incedunt, Analytica & Synthetica. Naturæ vires legesque virium simpliciores ex selectis quibusdam Phænomenis per Analysin deducunt, ex quibus deinde per Synthesin reliquorum constitutionem tradunt. Hæc illa est Philosophandi ratio longe optima, quam præ ceteris merito amplectendam censuit Celeberrimus Auctor noster. Hanc solam utique dignam iudicavit, in qua excolenda atque adornanda operam suam collocaret. Hujus igitur illustrissimum dedit Exemplum, Mundani nempe Systematis explicationem e Theoria Gravitatis felicissime deductam. Gravitatis virtutem universis corporibus inesse, suspicati sunt vel finxerunt alii: primus Ille & solus ex Apparentiis demonstrare potuit, & speculationibus egregiis firmissimum ponere fundamentum.

Scio equidem nonnullos magni etiam nominis Viros, præjudiciis quibusdam plus æquo occupatos, huic novo Principio ægre assentiri potuisse, & certis incerta identidem prætulisse. Horum famam vellicare non est animus: Tibi potius, Benevole Lector, illa paucis exponere lubet, ex quibus Tute ipse iudicium non iniquum feras.

Igitur ut Argumenti sumatur exordium a simplicissimis & proximis; despiciamus paulisper qualis sit in Terrestribus natura Gravitatis, ut deinde tutius progrediamur ubi ad corpora Cœlestia, longissime a sedibus nostris remota, perventum fuerit. Convenit jam inter omnes Philosophos, corpora universa circumterrestria gravitare in Terram. Nulla dari corpora vere levia, jamdudum confirmavit Experientia multiplex. Quæ dicitur Levitas relativa, non est vera Levitas, sed apparens solummodo: & oritur a præpollente Gravitate corporum contiguorum.

Porro, ut corpora universa gravitant in Terram, ita Terra vicissim in corpora aequaliter gravitat; Gravitatis enim actionem esse mutuam & utrinque æqualem, sic ostenditur. Distinguat^r Terræ
totius

rotius moles in binas quascunque partes, vel æquales vel utcunque inæquales: jam si pondera partium non essent in se mutuo æqualia; cederet pondus minus majori, & partes conjunctæ pergerent recta moveri ad infinitum, versus plagam in quam tendit pondus majus: omnino contra Experimentiam. Itaque dicendum erit, pondera partium in æquilibrio esse constituta: hoc est, Gravitatis actionem esse mutuam & utrinque æqualem.

Pondera corporum, æqualiter a cénтро Terræ distantium, sunt ut quantitates materiæ in corporibus. Hoc utique colligitur ex æquali acceleratione corporum omnium, e quiete per ponderum vires cadentium: nam vires quibus inæqualia corpora æqualiter accelerantur, debent esse proportionales quantitativis materiæ movendæ. Jam vero corpora univérſa cadentiæ æqualiter accelerari, ex eo patet, quod in Vacuo *Boyliano* temporibus æqualibus æqualia spatia cadendo describunt, sublata scilicet Aeris resistentia: accuratius autem comprobatur per Experimenta Pendulorum.

Vires attractivæ corporum, in æqualibus distantis, sunt ut quantitates materiæ in corporibus. Nam cum corpora in Terram & Terra vicissim in corpora momentis æqualibus gravitent; Terræ pondus in unumquodque corpus, seu vis qua corpus Terram attrahit, æquabitur ponderi corporis ejusdem in Terram. Hoc autem pondus erat ut quantitas materiæ in corpore: itaque vis qua corpus unumquodque Terram attrahit, sive corporis vis absoluta, erit ut eadem quantitas materiæ.

Oritur ergo & componitur vis attractiva corporum integrorum ex viribus attractivis partium: siquidem aucta vel diminuta mole materiæ, ostensum est, proportionaliter augeri vel diminui ejus virtutem. Actio itaque Telluris ex conjunctis partium Actionibus consari censenda erit; atque adeo corpora omnia Terrestria se mutuo trahere oportet viribus absolutis, quæ sint in ratione materiæ trahentis. Hæc est natura Gravitatis apud Terram: videamus jam qualis sit in Cœlis.

Corpus omne perseverare in statu suo vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare; Naturæ lex est ab omnibus recepta Philosophis. Inde vero sequitur, corpora quæ in Curvis moventur, atque adeo de lineis rectis Orbitas suas tangentibus jugiter abeunt, Vi aliqua perpetuo agente retineri in itinere curvilineo. Planetis igitur in Orbibus curvis revolvantibus necessario aderit Vis aliqua, per cujus actiones repetitas indefinenter a Tangentibus deflectantur.

Jam illud concedi æquum est, quod Mathematicis rationibus colligitur & certissime demonstratur; Corpora nempe omnia, quæ moventur in linea aliqua curva in plano descripta, quæque radio ducto ad punctum vel quiescens vel utcumque motum describunt areas circa punctum illud temporibus proportionales, urgeri a Viribus quæ ad idem punctum tendunt. Cum igitur in confesso sit apud Astronomos, Planetas primarios circum Solem, secundarios vero circum suos primarios, areas describere temporibus proportionales; consequens est ut Vis illa, qua perpetuò detorquentur a Tangentibus rectilineis, & in Orbitis curvilineis revolvi coguntur, versus corpora dirigatur quæ sita sunt in Orbitalium centris. Hæc itaque Vis non inepte vocari potest, respectu quidem corporis revolvantis, Centripeta; respectu autem corporis centralis, Attractiva; a quacunque demum causa oriri fingatur.

Quin & hæc quoque concedenda sunt, & Mathematicæ demonstrantur: Si corpora plura motu æquabili revolvantur in Circulis concentricis, & quadrata temporum periodicorum sint ut cubi distantiarum a centro communi; Vires centripetæ revolvantium fore reciproce ut quadrata distantiarum. Vel, si corpora revolvantur in Orbitis quæ sunt Circulis finitimæ, & quiescant Orbitalium Apfides; Vires centripetæ revolvantium fore reciproce ut quadrata distantiarum. Obtinere casum alterutrum in Planetis universis consentiunt Astronomi. Itaque Vires centripetæ Planetarum omnium sunt reciproce ut quadrata distantiarum ab Orbium centris. Si quis objiciat Planetarum & Lunæ præsertim, Apfides non penitus quiescere; sed motu quodam lento ferri in consequentia: responderi potest, etiamsi concedamus hunc motum tardissimum exinde profectum esse quod Vis centripetæ proportio aberret aliquantum a duplicata, aberrationem illam per computum Mathematicum inveniri posse & plane insensibilem esse. Ipsa enim ratio Vis centripetæ Lunaræ, quæ omnium maxime turbari debet, paululum quidem duplicatam superabit; ad hanc vero sexaginta fere vicibus propius accedet quam ad triplicatam. Sed verior erit responsio, si dicamus hanc Apfidum progressionem, non ex aberratione a duplicata proportionem, sed ex alia prorsus diversa causa oriri, quemadmodum egregie demonstratur in hac Philosophia. Restat ergo ut Vires centripetæ, quibus Planetæ primarii tendunt versus Solem & secundarii versus primarios suos, sint accurate ut quadrata distantiarum reciproce.

Ex

P R Æ F A T I O.

Ex iis quæ hæcenus dicta sunt, constat Planetas in Orbitis suis retineri per Vim aliquam in ipsos perpetuo agentem : constat Vim illam dirigi semper versus Orbitalium centra : constat hujus efficaciam augeri in accessu ad centrum, diminui in recessu ab eodem : & augeri quidem in eadem proportionem qua diminuitur quadratum distantiae, diminui in eadem proportionem qua distantiae quadratum augetur. Videamus jam, comparatione instituta inter Planetarum Vires centripetas & Vim Gravitatis, annon ejusdem forte sint generis. Ejusdem vero generis erunt, si deprehendantur hinc & inde leges eadem eademque affectiones. Primo itaque Lunæ, quæ nobis proxima est, vim centripetam expendamus.

Spacia rectilinea, quæ a corporibus e quiete demissis dato tempore sub ipso motus initio describuntur, ubi a viribus quibuscunque urgentur, proportionalia sunt ipsis viribus : Hoc utique consequitur ex ratiociniis Mathematicis. Erit igitur Vis centripeta Lunæ in Orbita sua revolventis, ad Vim Gravitatis in superficie Terræ, ut spatium quod tempore quam minimo describeret Luna descendendo per Vim centripetam versus Terram, si circulari omni motu privari fingeretur, ad spatium quod eodem tempore quam minimo describit grave corpus in vicinia Terræ, per Vim gravitatis suæ cadendo. Horum spatiorum prius æquale est arcus a Luna per idem tempus descripti lineæ verso, quippe qui Lunæ translationem de Tangente, factam a Vi centripeta, metitur, atque adeo computari potest ex datis tum Lunæ tempore periodico tum distantia ejus a centro Terræ. Spatium posterius invenitur per Experimenta Pendulorum, quemadmodum docuit *Hugenius*. Initio itaque calculo, spatium prius ad spatium posterius, seu vis centripeta Lunæ in Orbita sua revolventis ad vim Gravitatis in superficie Terræ, erit ut quadratum semidiametri Terræ ad Orbitæ semidiametri quadratum. Eandem habet rationem, per ea quæ superius ostenduntur, vis centripeta Lunæ in Orbita sua revolventis ad vim Lunæ centripetam prope Terræ superficiem. Vis itaque centripeta prope Terræ superficiem æqualis est vi Gravitatis. Non ergo diversæ sunt vires, sed una atque eadem : si enim diversæ essent, corpora viribus conjunctis duplo celerius in Terram caderent quam ex vi sola Gravitatis. Constat igitur Vim illam centripetam, qua Luna perpetuo de Tangente vel trahitur vel impellitur & in Orbita retinetur, ipsam esse vim Gravitatis terrestris ad Lunam usque pertingentem. Et rationi quidem consentaneum est ut ad ingentes distantias illa sese Virtus extendat, cum.

E D I T O R I S.

cum nullam ejus sensibilem imminutionem, vel in altissimis montium cacuminibus, observare licet. Gravitat. itaque Luna, in Terram: quin & actione mutua, Terra vicissim in Lunam æqualiter gravitat: id quod abunde quidem confirmatur in hac Philolophia, ubi agitur de Maris æstu & Æquinoctiorum præcessionem, ab actione tum Lunæ tum Solis in Terram oriundis. Hinc & illud tandem edocemur, qua nimirum lege vis Gravitatis decrescat in majoribus a Tellure distantibus. Nam cum Gravitatio non diversa sit a Vi centripeta Lunari, hæc vero sit reciproce proportionalis quadrato distantiae; diminuetur & Gravitatio in eadem ratione.

Progrediamur jam ad Planetas reliquos. Quoniam revolutiones primariorum circa Solem & secundariorum circa Jovem & Saturnum sunt Phænomena generis ejusdem ac revolutio Lunæ circa Terram, quoniam porro demonstratum est vires centripetas primariorum dirigi versus centrum Solis, secundariorum versus centra Jovis & Saturni, quemadmodum Lunæ vis centripeta versus Terræ centrum dirigitur; adhæc, quoniam omnes illæ vires sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centrīs, quemadmodum vis Lunæ est ut quadratum distantiae a Terra: concludendum erit eandem esse naturam universis. Itaque ut Luna gravitat in Terram, & Terra vicissim in Lunam; sic etiam gravitabunt omnes secundarii in primarios suos, & primarii vicissim in secundarios; sic & omnes primarii in Solem, & Sol vicissim in primarios.

Igitur Sol in Planetas universos gravitat & universi in Solem. Nam secundarii dum primarios suos comitantur, revolvuntur interea circum Solem una cum primariis. Eodem itaque argumento, utriusque generis Planetæ gravitant in Solem, & Sol in ipsos. Secundarios vero Planetas in Solem gravitare abunde insuper constat ex inæqualitatibus Lunaribus; quarum accuratissimam Theoriam, admiranda sagacitate patefactam, in tertio hujus Operis libro expositam habemus.

Solis virtutem attractivam quoquoersum propagari ad ingentes usque distantias, & sese diffundere ad singulas circumjecti spatii partes, apertissime colligi potest ex motu Cometarum; qui ab immensis intervallis profecti feruntur in viciniam Solis, & nunquam adeo ad ipsum proxime accedunt ut Globum ejus, in Periheliis suis versantes, tantum non contingere videantur. Horum Theoriam ab Astronomis antehac frustra quæsitam, nostro tandem sæculo feliciter inventam & per Observationes certissime demonstratam, Præstantissimo nostro Auctori debemus. Patet igitur

P R Æ F A T I O.

igitur Cometas in Sectionibus Conicis umbilicos in centro Solis habentibus moveri, & radiis ad Solem ductis areas temporibus proportionales describere. Ex hisce vero Phænomenis manifestum est & Mathematicè comprobatur, vires illas, quibus Cometæ retinentur in orbitis suis, respicere Solem & esse reciproce ut quadrata distantiarum ab ipsius centro. Gravitant itaque Cometæ in Solem: atque adeo Solis vis attractiva non tantum ad corpora Planetarum in datis distantis & in eodem fere plano collocata, sed etiam ad Cometas in diversissimis Cælorum regionibus & in diversissimis distantis positos pertingit. Hæc igitur est natura corporum gravitantium, ut vires suas edant ad omnes distantias in omnia corpora gravitantia. Inde vero sequitur, Planetas & Cometas universos se mutuo trahere, & in se mutuo graves esse: quod etiam confirmatur ex perturbatione Jovis & Saturni, Astronomis non incognita; & ab actionibus horum Planetarum in se invicem oriunda; quin & ex motu illo lentissimo Apfidum, qui supra memoratus est, quique a causa consimili proficiscitur.

Eo demum pervenimus ut dicendum sit, & Terram & Solem & corpora omnia cœlestia, quæ Solem comitantur, se mutuo attrahere. Singulorum ergo particulæ quæque minimæ vires suas attractivas habebunt, pro quantitate materiæ pollentes; quemadmodum supra de Terrestribus ostensum est. In diversis autem distantis, erunt & harum vires in duplicata ratione distantiarum reciproce: nam ex particulis hac lege trahentibus componi debere Globos eadem lege trahentes, Mathematicè demonstratur.

Conclusiones præcedentes huic innituntur Axiomati, quod a nullis non recipitur Philosophis; Effectuum scilicet ejusdem generis, quorum nempe quæ cognoscuntur proprietates eadem sunt, easdem esse causas & easdem esse proprietates quæ nondum cognoscuntur. Quis enim dubitat, si Gravitatio sit causa descensus Lapidis in *Europa*, quin eadem sit causa descensus in *America*? Si Gravitatio mutua fuerit inter Lapidem & Terram in *Europa*; quis negabit mutuam esse in *America*? Si vis attractiva Lapidis & Terræ componatur, in *Europa*, ex viribus attractivis partium; quis negabit similem esse compositionem in *America*? Si attractio Terræ ad omnia corporum genera & ad omnes distantias propagetur in *Europa*; quidni pariter propagari dicamus in *America*? In hac Regula fundatur omnis Philosophia: quippe qua sublata nihil affirmare possumus de Universis. Constitutio rerum singularum innotescit per Observationes & Experimenta: inde vero non

EDITORIS

nisi per hanc Regulam de rerum universarum natura judicamus.

Jam cum Gravia sint omnia corpora, quæ apud Terram vel in Cœlis reperiuntur, de quibus Experimenta vel Observationes institui licet; omnino dicendum erit, Gravitatem corporibus universis competere. Et quemadmodum nulla concipi debent corpora, quæ non sint Extensa, Mobilia, & Impenetrabilia; ita nulla concipi debere, quæ non sint Gravia. Corporum Extensio, Mobilitas, & Impenetrabilitas non nisi per Experimenta innotescunt: eodem plane modo Gravitatis innotescit. Corpora omnia de quibus Observationes habemus, Extensa sunt & Mobilia & Impenetrabilia; & inde concludimus corpora universa, etiam illa de quibus Observationes non habemus, Extensa esse & Mobilia & Impenetrabilia. Ita corpora omnia sunt Gravia, de quibus Observationes habemus: & inde concludimus corpora universa, etiam illa de quibus Observationes non habemus, Gravia esse. Si quis dicat corpora Stellarum inerrantium non esse Gravia, quandoquidem eorum Gravitatis nondum est observata; eodem argumento dicere licebit neque Extensa esse, nec Mobilia, nec Impenetrabilia, cum hæ Fixarum affectiones nondum sint observatæ. Quid opus est verbis? Inter primarias qualitates corporum universorum vel Gravitatis habebit locum; vel Extensio, Mobilitas, & Impenetrabilitas non habebunt. Et natura rerum vel recte explicabitur per corporum Gravitatem, vel non recte explicabitur per corporum Extensionem, Mobilitatem, & Impenetrabilitatem.

Audire nonnullos hanc improbare conclusionem, & de occultis qualitatibus nescio quid mulitare. Gravitatem scilicet Occultum esse quid, perpetuo arguari solent, occultas vero causas procul esse ablegandas a Philosophia. His autem facile respondetur; occultas esse causas, non illas quidem quarum existentia per Observationes clarissime demonstratur, sed has solum quarum occulta est & ficta existentia nondum vero comprobata. Gravitatis ergo non erit occulta causa motuum cœlestium; siquidem ex Phænomenis ostensum est, hanc virtutem revera existere. Hi potius ad occultas confugiunt causas; qui nescio quos Vortices, materiæ cujusdam prorsus fictitiæ & sensibus omnino ignotæ, motibus iisdem regendis præficiunt.

Ideone autem Gravitatis occulta causa dicetur, eoque nomine rejicietur e Philosophia, quod causa ipsius Gravitatis occulta est & nondum inventa? Qui sic statuunt, videant nequid statuunt absurdum,

P R Æ F A T I O.

furdi, unde totius tandem Philosophiæ fundamenta convellantur. Etenim causæ continuo nexu procedere solent a compositis ad simpliciora: ubi ad causam simplicissimam perveneris, jam non licebit ulterius progredi. Causæ igitur simplicissimæ nulla dari potest mechanica explicatio: si daretur enim, causa nondum esset simplicissima. Has tu proinde causas simplicissimas appellabis occultas, & exulare jubebis? simul vero exulabunt & ab his proximè pendentes & quæ ab illis porro pendent, usque dum a causis omnibus vacua fuerit & probe purgata Philosophia.

Sunt qui Gravitatem præter naturam esse dicunt, & Miraculum perpetuum vocant. Itaque rejiciendam esse volunt, cum in Physica præternaturales causæ locum non habeant. Huic ineptæ prorsus objectioni diluendæ, quæ & ipsa Philosophiam subruit univ ersam, vix operæ pretium est immorari. Vel enim Gravitatem corporibus omnibus inditam esse negabunt, quod tamen dici non potest: vel eo nomine præter naturam esse affirmabunt, quod ex aliis corporum affectionibus atque adeo ex causis Mechanicis originem non habeat. Dantur certe primariæ corporum affectiones, quæ, quoniam sunt primariæ, non pendent ab aliis. Viderint igitur annon & hæ omnes sint pariter præter naturam, eoque pariter rejiciendæ: viderint vero qualis sit deinde futura Philosophia.

Nonnulli sunt quibus hæc tota Physica cœlestis vel ideo minus placet, quod cum *Cartesii* dogmatibus pugnare & vix conciliari posse videatur. His sua licebit opinione frui; ex aquo autem agant oportet: non ergo denegabunt aliis eandem libertatem quam sibi concedi postulant. *NEWTONIANAM* itaque Philosophiam, quæ nobis verior habetur, retinere & amplecti licebit, & causas sequi per Phænomena comprobatas, potius quam fictas & nondum comprobatas. Ad veram Philosophiam pertinet, rerum naturas ex causis vere existentibus derivare: eas vero leges quærere, quibus voluit Summus Opifex hunc Mundi pulcherrimum ordinem stabilire; non eas quibus potuit, si ita visum fuisset. Rationi enim consonum est, ut a pluribus causis, ab invicem nonnihil diversis, idem possit Effectus proficisci: hæc autem vera erit causa, ex qua vere atque actu proficiscitur; reliquæ locum non habent in Philosophia vera. In Horologiis automatis idem Indicis horarii motus vel ab appenso Pondere vel ab intus concluso Elatere oriri potest. Quod si oblatum Horologium revera sit instructum Pondere;

EDITORIS

ridebitur qui finget Elaterem, & ex Hypothefi sic præpropere conficta motum Indicis explicare fufcipiet: oportuit enim internam Machinæ fabricam penitus perfcutari, ut ita motus propofiti principium verum exploratum habere poffet. Idem vel non abfimile feretur iudicium de Philofophis illis, qui materia quadam fubtiliffima Cœlos effe repletos, hanc autem in Vortices indefinenter agi voluerunt. Nam fi Phænomenis vel accuratiffime fatisfacere poffent ex Hypothefibus fuis; veram tamen Philofophiam tradidiffe, & veras caufas motuum cœleftium inveniffè nondum dicendi funt; nifi vel has revera exiftere, vel faltem alias non exiftere demonftraverint. Igitur fi oftensum fuerit, univerforum corporum Attraétionem habere verum locum in rerum natura; quin etiam oftensum fuerit, qua ratione motus omnes cœleftes abinde folutionem recipiant; vana fuerit & merito deridenda obiectio, fi quis dixerit eodém motus per Vortices explicari debere, etiamfi id fieri poffe vel maxime concefferimus. Non autem concedimus: Nequeunt enim ullo pacto Phænomena per Vortices explicari; quod ab Auctore noftro abunde quidem & clariffimis rationibus evincitur; ut fomniis plus æquo indulgant oporteat, qui ineptiffimo figmento refarciendo, novisque porro commentis ornando infelicem operam addicunt.

Si corpora Planetarum & Cometarum circa Solem deferantur a Vorticibus; oportet corpora delata & Vorticum partes proxime ambientes eadem velocitate eademque curfus determinatione moveri, & eandem habere denfitatem vel eandem Vim inertiae promole materiae. Conftat vero Planetas & Cometas, dum verfantur in iisdem regionibus Cœlorum, velocitatibus variis varieque curfus determinatione moveri. Neceffario itaque fequitur, ut Fluidi cœleftis partes illæ, quæ funt ad eafdem diftantias a Sole revolvantur eodem tempore in plagas diverfas cum diverfis velocitatibus: etenim alia opus erit directione & velocitate, ut transire poffint Planetæ, alia, ut transire poffint Cometæ. Quod cum explicari nequeat; vel fatendum erit, univerfa corpora cœleftia non deferri a materia Vorticis; vel dicendum erit, eorundem motus repetendos effe non ab uno eodemque Vortice, fed a pluribus qui ab invicem diverfi funt, idemque fpatium Soli circumjectum perradant.

Si plures Vortices in eodem fpatio contineri, & fe fe mutuo penetrare, motibusque diverfis revolvi ponantur; quoniam hi motus debent effe conformes delatorum corporum motibus, qui
fun

sunt summe regulares, & peraguntur in Sectionibus Conicis, nunc valde eccentricis, nunc ad Circulorum proxime formam accedentibus; jure quærendum erit, qui fieri possit, ut iidem integri conserventur, nec ab actionibus materiæ occurrentis per tot sæcula quicquam perturbentur. Sane si motus hi fictitii sunt magis compositi & difficilior explicantur, quam veri illi motus Planetarum & Cometarum; frustra mihi videntur in Philosophiam recipi: omnis enim causa debet esse Effectu suo simplicior. Concessa Fabularum licentia, affirmaverit aliquis Planetas omnes & Cometas circumcingi Atmosphæris, adinstar Telluris nostræ; quæ quidem Hypothesis rationi magis consentanea videbitur quam Hypothesis Vorticum: Affirmaverit deinde has Atmosphæras, ex natura sua, circa Solem moveri & Sectiones Conicas describere; qui sane motus multo facilius concipi potest, quam consimilis motus Vorticum se invicem permeantium. Denique Planetas ipsos & Cometas circa Solem deferri ab Atmosphæris suis credendum esse statuatur, & ob repertas motuum cœlestium causas triumphum agat. Quisquis autem hanc Fabulam rejiciendam esse putet, idem & alteram Fabulam rejiciet: nam ovum non est ovo similis, quam Hypothesis Atmosphærarum Hypothesi Vorticum.

Docuit *Galileus*, lapidis projecti & in parabola moti deflexionem a cursu rectilineo oriri a Gravitate lapidis in Terram, ab occulta scilicet qualitate. Fieri tamen potest ut alius aliquis, nasci acutioris, Philosophus causam aliquam comminiscatur: Finget igitur ille materiam quandam subtilem, quæ nec visu, nec tactu, neque ullo sensu percipitur, versari in regionibus quæ proxime contingunt Telluris superficiem. Hanc autem materiam, in diversas plagas, variis & plerumque contrariis motibus ferri, & lineas Parabolicas describere contendet. Deinde vero lapidis deflexionem pulchre sic expediet, & vulgi plausum merebitur. Lapis, inquit, in Fluido illo subtili natat; & cursui ejus obsequendo, non potest non eandem una semitam describere. Fluidum vero movetur in lineis Parabolicis; ergo lapidem in Parabola moveri necesse est. Quis nunc non mirabitur acutissimum hujusce Philosophi ingenium, ex causis Mechanicis, materia scilicet & motu, Phænomena Naturæ ad vulgi etiam captum præclare deducit? Quis vero non subfannabit bonum illum *Galileum*, qui magno molimine Mathematico qualitates occultas, e Philosophia feliciter exclusas, denuo revocare sustinuerit? sed pudet nugis diutius immorari.

E D I T O R I S

Summa rei huc tandem redit: Cometarum ingens est numerus; motus eorum sunt summe regulares, & easdem leges cum Planetarum motibus observant. Moventur in Orbibus Conicis; hi orbes sunt valde admodum eccentrici. Feruntur undique in omnes Cœlorum partes, & Planetarum regiones liberrime pertranscunt, & sæpe contra Signorum ordinem incedunt. Hæc Phænomena certissime confirmantur ex Observationibus Astronomicis: & per Vortices nequeunt explicari: Imo, ne quidem cum Vorticibus Planetarum consistere possunt. Cometarum motibus omnino locus non erit; nisi materia illa fictitia penitus e Cœlis amoveatur.

Si enim Planetæ circum Solem a Vorticibus devehuntur; Vorticum partes, quæ proxime ambiunt unumquemque Planetam, ejusdem densitatis erunt ac Planeta; uti supra dictum est. Itaque materia illa omnis quæ contigua est Orbis magni perimetro, parem habebit ac Tellus densitatem: quæ vero jacet intra Orbem magnum atque Orbem Saturni, vel parem vel majorem habebit. Nam ut constitutio Vorticis permanere possit, debent partes minus densæ centrum occupare, magis densæ longius a centro abire. Cum enim Planetarum tempora periodica sint in ratione sesquuplicata distantiarum a Sole, oportet partium Vorticis periodos eandem rationem fervare. Inde vero sequitur, vires centrifugas harum partium fore reciproce ut quadrata distantiarum. Quæ igitur majore intervallo distant a centro, nituntur ab eodem recedere minore vi: unde si minus densæ fuerint, necesse est ut cedant vi majori, qua partes centro propiores ascendere conantur. Ascendent ergo densiores, descendent minus densæ, & locorum fiet invicem permutatio; donec ita fuerit disposita atque ordinata materia fluida totius Vorticis, ut conquiescere jam possit in æquilibrio constituta. Si bina Fluida, quorum diversa est densitas, in eodem vase continentur; utique futurum est ut Fluidum, cujus major est densitas, majore vi Gravitatis infimum petat locum: & ratione non absimili omnino dicendum est, densiores Vorticis partes majore vi centrifuga petere supremum locum. Tota igitur illa & multo maxima pars Vorticis, quæ jacet extra Telluris orbem, densitatem habebit atque adeo vim inertię pro mole materiæ, quæ non minor erit quam densitas & vis inertię Telluris: inde vero Cometis trajectis orietur ingens resistentia, & valde admodum sensibilis; ne dicam, quæ motum eorundem penitus sistere atque absorbere posse merito videatur. Constat autem ex motu Cometarum

P R Æ F A T I O.

A 1

metarum prorsus regulari, nullam ipsos resistentiam pati quæ vel minimum sentiri potest; atque adeo neutiquam in materiam ullam incurfare, cujus aliqua sit vis resistendi, vel proinde cujus aliqua sit densitas seu vis Inertiæ. Nam resistentia Mediorum oritur vel ab inertia materiæ fluidæ, vel a defectu lubricitatis. Quæ oritur a defectu lubricitatis, admodum exigua est; & sane vix observari potest in Fluidis vulgo notis, nisi valde tenacia fuerint adinstar Olei & Mellis. Resistentia quæ sentitur in Aere, Aqua, Hydrargyro, & hujusmodi Fluidis non tenacibus fere tota est prioris generis; & minui non potest per ulteriorem quemcunque gradum subtilitatis, manente Fluidi densitate vel vi inertiae, cui semper proportionalis est hæc resistentia: quemadmodum clarissime demonstratum est ab Auctore nostro in peregre Regia Resistentiarum Theoria, quæ paulo nunc accuratius exponitur, hac secunda vice, & per Experimenta corporum cadentium plenius confirmatur.

Corpora progrediendo motum suum Fluido ambienti paulatim communicant, & communicando amittunt, amittendo autem retardantur. Est itaque retardatio motui communicato proportionalis; motus vero communicatus, ubi datur corporis progredientis velocitas, est ut Fluidi densitas; ergo retardatio seu resistentia erit ut eadem Fluidi densitas; neque ullo pacto tolli potest, nisi a Fluido ad partes corporis posticas recurrente restituatur motus amissus. Hoc autem dici non poterit, nisi impressio Fluidi in corpus ad partes posticas æqualis fuerit impressioni corporis in Fluidum ad partes anticas, hoc est, nisi velocitas relativa qua Fluidum irruit in corpus a tergo, æqualis fuerit velocitati qua corpus irruit in Fluidum, id est, nisi velocitas absoluta Fluidi recurrentis duplo major fuerit quam velocitas absoluta Fluidi propulsi; quod fieri nequit. Nullo igitur modo tolli potest Fluidorum resistentia, quæ oritur ab eorundem densitate & vi inertiae. Itaque concludendum erit; Fluidi coelestis nullam esse vim inertiae, cum nulla sit vis resistendi: nullam esse vim qua motus communicetur, cum nulla sit vis inertiae: nullam esse vim qua mutatio quælibet vel corporibus singulis vel pluribus inducatur, cum nulla sit vis qua motus communicetur: nullam esse omnino efficaciam, cum nulla sit facultas mutationem quamlibet inducendi. Quidni ergo hanc Hypothesin, quæ fundamento plane desinitur, quæque naturæ rerum explicandæ ne minimum quidem infervit, ineptissimam vocare liceat & Philosopho prorsus.

E D I T O R I S

sus indignam. Qui cœlos materia fluida repletos esse volunt; hanc vero non inertem esse statuunt; Hi verbis tollunt Vacuum, re ponunt. Nam cum hujusmodi materia fluida ratione nulla fecerni possit ab inani Spatio; disputatio tota sit de rerum nominibus, non de naturis. Quod si aliqui sint adeo usque dediti Materiæ, ut Spatium a corporibus vacuum nullo pacto admittendum credere velint; videamus quo tandem oporteat illos pervenire.

Vel enim dicent hanc, quam confingunt, Mundi per omnia pleni constitutionem ex voluntate Dei profectam esse, propter cum finem, ut operationibus Naturæ subsidium præsens haberi posset ab Æthere subtilissimo cuncta permeante & implente; quod tamen dici non potest, siquidem jam ostensum est ex Cometary phenomenonis, nullam esse hujus Ætheris efficaciam: vel dicent ex voluntate Dei profectam esse, propter finem aliquem ignotum; quod neque dici debet, siquidem diversa Mundi constitutio eodem argumento pariter stabiliri posset: vel denique non dicent ex voluntate Dei profectam esse, sed ex necessitate quadam Naturæ. Tandem igitur delabi oportet in sæces sordidas Gregis impurissimi. Hi sunt qui somniant Fato univerſa regi, non Providentia; Materiam ex necessitate sua semper & ubique extitisse, infinitam esse & æternam. Quibus positis, erit etiam undiquaque uniformis: nam varietas formarum cum necessitate omnino pugnat. Erit etiam immota; nam si necessario moveatur in plagam aliquam determinatam, cum determinata aliqua velocitate; pari necessitate movebitur in plagam diversam cum diversa velocitate; in plagas autem diversas, cum diversis velocitatibus, moveri non potest; oportet igitur immotam esse. Neutiquam profecto potuit oriri Mundus, pulcherrima formarum & motuum varietate distinctus, nisi ex liberrima voluntate cuncta providentis & gubernantis Dei.

Ex hoc igitur fonte promanarunt illæ omnes quæ dicuntur Naturæ leges: in quibus multa sane sapientissimi consilii, nulla necessitatis apparent vestigia. Has proinde non ab incertis conjecturis petere, sed Observando atque Experiendo addiscere debemus. Qui veræ Physicæ principia Legesque rerum, sola mentis vi & interno Rationis lumine fretum, invenire se posse confidit; hunc oportet, vel statuere Mundum ex necessitate fuisse, Legesque propositas ex eadem necessitate sequi; vel si per voluntatem Dei constitutus sit ordo Naturæ, se tamen, homunitionem
miscellum

P R Æ F A T I O.

misellum, quid optimum factu sit perspectum habere. Sana omnis & vera Philosophia fundatur in Phænomenis rerum: quæ si nos vel invitos & reluctantes ad hujusmodi principia deducunt, in quibus clarissime cernuntur Consilium optimum & Dominium summum sapientissimi & potentissimi Entis; non erunt hæc ideo non admittenda principia, quod quibusdam forsan hominibus minus grata sint futura. His vel Miracula vel Qualitates occultæ dicantur, quæ displicent; verum nomina malitiose indita non sunt ipsi rebus vitio vertenda; nisi illud fateri tandem velint, utique debere Philosophiam in Atheismo fundari. Horum hominum gratia non erit labefactanda Philosophia, siquidem rerum ordo non vult immutari.

Obtinebit igitur apud probos & æquos Judices præstantissima Philosophandi ratio, quæ fundatur in Experimentis & Observationibus. Huic vero, dici vix poterit, quanta lux accedat, quantæ dignitas, ab hoc Opere præclaro Illustrissimi nostri Auctoris; cujus eximiam ingenii felicitatem, difficillima quæque Problemata enodantis, & ad ea porro pertinentis ad quæ nec spes erat humanam mentem assurgere potuisse, merito admirantur & suspiciunt quicunque paulo profundius in hisce rebus versati sunt. Clausuris ergo referatis, aditum Nobis aperuit ad pulcherrima rerum mysteria. Systematis Mundani compagem elegantissimam ita tandem patefecit & penitus perspectandam dedit; ut nec ipse, si nunc revivisceret, Rex *Alphonsus* vel simplicitatem vel harmoniæ gratiam in ea desideraret. Itaque Naturæ majestatem propius jam licet intueri, & dulcissima contemplatione frui, Conditorem vero ac Dominum Univerforum impensius colere & venerari, qui fructus est Philosophiæ multo uberrimus. Cæcum esse oportet, qui ex optimis & sapientissimis rerum structuris non statim videat Fabricatoris Omnipotentis infinitam sapientiam & bonitatem: insanum, qui profiteri nolit.

Exabit igitur Eximium NEWTONI Opus adversus Atheorum impetus munitissimum præsidium: neque enim alicunde felicius, quam ex hac pharetra, contra impiam Catervam tela depromperis. Hoc sensit pridem, & in pereruditis Concionibus Anglice Latineque editis, primus egregie demonstravit Vir in omni Literarum genere præclarus idemque bonarum Artium fautor eximius RICHARDUS BENTLEYUS, Sæculi sui & Academiæ nostræ magnum Ornamentum, Collegii nostri *S. Trinitatis* Magister dignissimus & integerrimus. Huic ego me pluribus nominibus obstrictum fateri debeo:

EDITORIS PRÆFATIO.

debeo: Huic & Tuas quæ debentur gratias, Lector benevole, non denegabis. Is enim, cum a longo tempore Celeberrimi Auctoris amicitia intima frueretur, (qua etiam apud Posteros censei non minoris æstimat, quam propriis Scriptis quæ literato orbi in deliciis sunt inclarescere) Amici simul famæ & scientiarum incremento consuluit. Itaque cum Exemplaria prioris Editionis rarissima admodum & immani pretio coemenda superessent; suavit Ille crebris efflagitationibus & tantum non objurgando perpulit denique Virum Præstantissimum, nec modestia minus quam eruditione summa Insignem, ut novam hanc Operis Editionem, per omnia elimatam denuo & egregiis insuper accessionibus ditatam, suis sumptibus & auspiciis prodire pateretur: Mihi vero, pro jure suo, pensum non ingratum demandavit, ut quam posset emendate id fieri curarem.

Canabrigiæ,
Majj 12. 1713.

ROGERUS COTES Collegii *S. Trinitatis* Socius;
Astronomiæ & Philosophiæ Experimentalis
Professor *Plumianus*.

I N D E X

INDEX CAPITUM. TOTIUS OPERIS.

2 IV

PAG.

DEFINITIONES.

I

AXIOMATA, SIVE LEGES MOTUS.

12

DE MOTU CORPORUM LIBER PRIMUS.

SECT. I. **D**E Methodo rationum primarum & ultimarum. 24

SECT. II. De inventione Virium centripetarum. 34

SECT. III. De motu corporum in Conicis sectionibus eccentricis. 48

SECT. IV. De inventione Orbium Ellipticorum, Parabolicorum & Hyperbolicorum ex Umbilico dato. 59

SECT. V. De inventione Orbium ubi Umbilicus neuter datur. 66

SECT. VI. De inventione Motuum in Orbibus datis. 97

SECT. VII. De corporum Ascensu & Descensu rectilineo. 109

SECT. VIII. De inventione Orbium in quibus corpora Viribus quibuscunque centripetis agitata revolvuntur. 114

SECT. IX. De Motu corporum in Orbibus mobilibus, deque Motu Apfidum. 121

SECT. X. De Motu corporum in Superficiebus datis, deque Funependulorum Motu reciproco. 132

SECT. XI. De Motu corporum Viribus centripetis seu mutuo petentium. 147

SECT. XII. De corporum Sphaericorum Viribus attractivis. 173

SECT.

SECT. XIII. <i>De corporum non Spharicorum Viribus attracti-</i> <i>vis.</i>	192
SECT. XIV. <i>De Motu corporum Minimorum, qua Viribus</i> <i>centripetis ad singulas Magni alicujus corporis partes</i> <i>tendentibus agitantur.</i>	203

DE MOTU CORPORUM LIBER SECUNDUS.

SECT. I. D E Motu corporum quibus resistitur in ratione <i>Velocitatis.</i>	211
SECT. II. <i>De Motu corporum quibus resistitur in duplicata ra-</i> <i>tione Velocitatis.</i>	220
SECT. III. <i>De Motu corporum quibus resistitur partim in ratio-</i> <i>ne Velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata.</i>	245
SECT. IV. <i>De corporum Circulari motu in Mediis resistenti-</i> <i>bus.</i>	253
SECT. V. <i>De densitate & compressione Fluidorum, deque</i> <i>Hydrostatica.</i>	260
SECT. VI. <i>De Motu & Resistentia corporum Funependulo-</i> <i>rum.</i>	272
SECT. VII. <i>De Motu Fluidorum & resistentia Projectilium.</i>	294
SECT. VIII. <i>De Motu per Fluida propagato.</i>	329
SECT. IX. <i>De Motu Circulari Fluidorum.</i>	345

DE MUNDI SYSTEMATE LIBER TERTIUS.

R EGULÆ PHILOSOPHANDI,	357
PHÆNOMENA,	359
PROPOSITIONES,	362
SCHOLIUM,	481

PHILO-

x v i

PHILOSOPHIÆ NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA.

DEFINITIONES.

DEFINITIO I.

Quantitas Materiæ est mensura ejusdem orta ex illius Densitate & Magnitudine conjunctim.

AER, densitate duplicata, in spatio etiam duplicato fit quadruplus; in triplicato sextuplus. Idem intellige de Nive & Pulveribus per compressionem vel liquefactionem condensatis. Et par est ratio corporum omnium, quæ per causas quacunque diversimode condensantur. Medii interea, si quod fuerit, interstitia partium libere pervadentis, hic nullam rationem habeo. Hanc autem Quantitatem sub nomine Corporis vel Massæ in sequentibus passim intelligo. Innoscit ea per corporis cujusque Pondus. Nam Ponderi proportionalem esse reperi per experimenta Pendulorum accuratissime instituta, uti posthac docebitur.

DEFINITIO II.

Quantitas Motus est mensura ejusdem orta ex Velocitate & Quantitate Materiæ conjunctim.

Motus totius est summa motuum in partibus singulis; adeoque in corpore duplo majore æquali cum velocitate duplus est, & dupla cum velocitate quadruplus.

A

DEFI-

DEFINITIO III.

Materie vis insita est potentia resistendi, qua corpus unumquodque, quantum in se est, perseverat in statu suo vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum.

Hæc semper proportionalis est suo corpori, neque differt quicquam ab inertia massæ, nisi in modo concipiendi. Per inertiam materiæ, fit ut corpus omne de statu suo vel quiescendi vel movendi difficulter deturbetur. Unde etiam vis insita nomine significantissimo Vis Inertiæ dici possit. Exercet vero corpus hanc vim solummodo in mutatione status sui per vim aliam in se impressam facta; estque exercitium ejus sub diverso respectu & Resistentia & Impetus: resistentia, quatenus corpus ad conservandum statum suum reluctatur vi impressæ; impetus, quatenus corpus idem, vi resistentis obstaculi difficulter cedendo, conatur statum ejus mutare. Vulgus resistentiam quiescentibus & impetum moventibus tribuit: sed motus & quies, uti vulgo concipiuntur, respectu solo distinguuntur ab invicem; neque semper vere quiescunt quæ vulgo tanquam quiescentia spectantur.

DEFINITIO IV.

Vis impressa est actio in corpus exercita, ad mutandum ejus statum vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum.

Consistit hæc vis in actione sola, neque post actionem permanet in corpore. Perseverat enim corpus in statu omni novo per solam vim inertię. Est autem vis impressa diversarum originum, ut ex Ictu, ex Pressione, ex vi Centripeta.

DEFINITIO V.

Vis Centripeta est, qua corpora versus punctum aliquod tanquam ad Centrum undique trahuntur, impelluntur, vel utcumque tendunt.

Hujus generis est Gravitās, qua corpora tendunt ad centrum terræ; Vis Magnetica, qua ferrum petit magnetem; & Vis illa, quæcumque sit, qua Planetæ perpetuo retrahuntur a motibus rectiliniis, & in lineis curvis revolvi coguntur. Lapis, in funda circumactus,

actus, a circumagente manu abire conatur; & conatu suo fundam distendit, eoque fortius quo celerius revolvitur; & quamprimum dimittitur, avolat. Vim conatui illi contrariam, qua funda lapidem in manum perpetuo retrahit & in orbe retinet, quoniam in manum seu orbis centrum dirigitur, Centripetam appello. Et par est ratio corporum omnium, quæ in gyrum aguntur. Conantur ea omnia a centrīs orbium recedere; & nisi adsit vis aliqua conatui isti contraria, qua cohibeantur & in orbibus retineantur, quamque ideo Centripetam appello, abibunt in rectis lineis uniformi cum motu. Projectile, si vi Gravitatis destitueretur, non deflesteretur in terram, sed in linea recta abiret in cœlos; idque uniformi cum motu, si modo aeris resistentia tolleretur. Per gravitatem suam retrahitur a cursu rectilineo & in terram perpetuo flectitur, idque magis vel minus pro gravitate sua & velocitate motus. Quo minor erit ejus gravitas pro quantitate materiæ vel major velocitas quacum projicitur, eo minus deviaabit a cursu rectilineo & longius perget. Si Globus plumbeus, data cum velocitate secundum lineam horizontalem a montis alicujus vertice vi pulveris tormentarii projectus, pergeret in linea curva ad distantiam duorum milliarum, priusquam in terram decideret: hic dupla cum velocitate quasi duplo longius pergeret, & decupla cum velocitate quasi decuplo longius: si modo aeris resistentia tolleretur. Et augendo velocitatem augeri posset pro lubitu distantia in quam projiceretur, & minui curvatura lineæ quam describeret, ita ut tandem caderet ad distantiam graduum decem vel triginta vel nonaginta; vel etiam ut terram totam circuiret priusquam caderet; vel denique ut in terram nunquam caderet, sed in cœlos abiret & motu abeundi pergeret in infinitum. Et eadem ratione, qua Projectile vi gravitatis in orbem flecti posset & terram totam circuire, potest & Luna vel vi gravitatis, si modo gravis sit, vel alia quacunque vi, qua in terram urgeatur, retrahi semper a cursu rectilineo terram versus, & in orbem suum flecti: & absque tali vi Luna in orbe suo retineri non potest. Hæc vis, si justo minor esset, non satis flecteret Lunam de cursu rectilineo: si justo major, plus satis flecteret, ac de orbe terram versus deduceret. Requiritur quippe, ut sit justæ magnitudinis: & Mathematicorum est invenire Vim, qua corpus in dato quovis orbe data cum velocitate accurate retineri possit; & vicissim invenire Vim curvilineam, in quam corpus e dato quovis loco data cum velocitate egressum a data vi flectatur. Est autem vis hujus centripetæ Quantitas trium generum, Absoluta, Acceleratrix, & Motrix.

DEFINITIO VI.

Vis centripetæ Quantitas Absoluta est mensura ejusdem major vel minor pro Efficacia causæ eam propagantis a centro per regiones in circuitu.

Ut Vis Magnetica pro mole magnetis vel intensione virtutis major in uno magnete, minor in alio.

DEFINITIO VII.

Vis centripetæ Quantitas Acceleratrix est ipsius mensura Velocitati proportionalis, quam dato tempore generat.

Uti Virtus magnetis ejusdem major in minori distantia, minor in majori: vel vis Gravitans major in vallibus, minor in cacuminibus præaltorum montium, atque adhuc minor (ut posthac patebit) in majoribus distantis a globo terræ; in æqualibus autem distantis eadem undique, propterea quod corpora omnia cadentia (gravia an levia, magna an parva) sublata Aeris resistentia, æqualiter accelerat.

DEFINITIO VIII.

Vis centripetæ Quantitas Motrix est ipsius mensura proportionalis Motui, quem dato tempore generat.

Uti Pondus majus in majore corpore, minus in minore; inque corpore eodem majus prope terram, minus in cœlis. Hæc Quantitas est corporis totius centripetentia seu propensio in centrum. & (ut ita dicam) Pondus; & innotescit semper per vim ipsi contrariam & æqualem, qua descensus corporis impediti potest.

Hæc virium quantitates brevitatis gratia nominare licet vires motrices, acceleratrices, & absolutas; & distinctionis gratia referre ad Corpora, centrum petentia, ad corporum Loca, & ad Centrum virium: nimirum vim motricem ad Corpus, tanquam conatum & propensionem totius in centrum ex propensionibus omnium partium compositam; & vim acceleratricem ad Locum corporis, tanquam efficaciam quandam, de centro per loca singula in circuitu diffusam, ad movenda corpora quæ in ipsis sunt; vim autem absolutam ad Centrum, tanquam causam aliquam præditam, sine qua vires motrices non propagantur per regiones in circuitu; sive causa illa sit corpus aliquod centrale (quale est Magnes in centro vis magneticæ, vel Terra in centro

centro vis gravitantis) sive alia aliqua quæ non apparet. Mathematicus duntaxat est hic conceptus. Nam virium causas & fedes Physicas jam non expendo. DEFINITIONES.

Est igitur vis acceleratrix ad vim motricem ut celeritas ad motum. Oritur enim quantitas motus ex celeritate ducta in quantitatem materiæ, & vis motrix ex vi acceleratrice ducta in quantitatem ejusdem materiæ. Nam summa actionum vis acceleratricis in singulas corporis particulas est vis motrix totius. Unde juxta superficiem Terræ, ubi gravitas acceleratrix seu vis gravitans in corporibus universis eadem est, gravitas motrix seu pondus est ut corpus: at si in regiones ascendatur ubi gravitas acceleratrix fit minor, pondus pariter minuetur, eritque semper ut corpus in gravitatem acceleratricem ductum. Sic in regionibus ubi gravitas acceleratrix duplo minor est, pondus corporis duplo vel triplo minoris erit quadruplo vel sextuplo minus.

Porro attractiones & impulsus eodem sensu acceleratrices & motrices nomino. Voces autem Attractionis, Impulsus, vel Propensionis cujusunque in centrum, indifferenter & pro se mutuo promiscue usurpo; has vires non physice sed mathematice tantum considerando. Unde caveat lector, ne per hujusmodi voces cogitet me speciem vel modum actionis causamve aut rationem physicam alicubi definire, vel centris (quæ sunt puncta Mathematica) vires vere & physice tribuere; si forte aut centra trahere, aut vires centrorum esse dixerò.

Scholium.

Hactenus voces minus notas, quo sensu in sequentibus accipiendæ sint, explicare visum est. Nam Tempus, Spatium, Locum & Motum, ut omnibus notissima, non definio. Notandum tamen, quod vulgus quantitates hasce non aliter quam ex relatione ad sensibilia concipiat. Et inde oriuntur præjudicia quædam, quibus tollendis convenit easdem in absolutas & relativas, veras & apparentes, mathematicas & vulgares distingui.

I. Tempus Absolutum, verum, & mathematicum, in se & natura sua absque relatione ad externum quodvis, æquabiliter fluit, alioque nomine dicitur Duratio: Relativum, apparens, & vulgare est sensibilis & externa quavis Durationis per motum mensura (seu accurata seu inæquabilis) qua vulgus vice veri temporis utitur, ut Hora, Dies, Mensis, Annus.

DEFINITIONES.

II. Spatium Absolutum, natura sua absque relatione ad externum quodvis, semper manet simile & immobile: Relativum est spatii hujus mensura seu dimensio qualibet mobilis, quæ a sensibus nostris per situm suum ad corpora definitur, & a vulgo pro spatio immobili usurpatur: uti dimensio spatii subterranei, aerei vel cœlestis definita per situm suum ad Terram. Idem sunt spatium absolutum & relativum, specie & magnitudine; sed non permanent idem semper numero. Nam si Terra, verbi gratia, movetur; spatium Aeris nostri, quod relative & respectu Terræ semper manet idem, nunc erit una pars spatii absoluti in quam Aer transit, nunc alia pars ejus; & sic absolute mutabitur perpetuo.

III. Locus est pars spatii quam corpus occupat, estque pro ratione spatii vel Absolutus vel Relativus. Pars, inquam, spatii; non Situs corporis, vel Superficies ambiens. Nam solidorum æqualium æquales semper sunt loci; Superficies autem ob dissimilitudinem figurarum ut plurimum inæquales sunt; Situs vero proprie loquendo quantitatem non habent, neque tam sunt loca quam affectiones locorum. Motus totius idem est cum summa motuum partium, hoc est, translatio totius de suo loco eadem est cum summa translationum partium de locis suis; adeoque locus totius idem cum summa locorum partium, & propterea internus & in corpore toto.

IV. Motus Absolutus est translatio corporis de loco absoluto in locum absolutum, Relativus de relativo in relativum. Sic in navi quæ velis passis fertur, relativus corporis Locus est navigii regio illa in qua corpus versatur, seu cavitatis totius pars illa quam corpus implet, quæque adeo movetur una cum navi: & Quies relativa est permanens corporis in eadem illa navis regione vel parte cavitatis. At quies vera est permanens corporis in eadem parte spatii illius immoti in qua navis ipsa una cum cavitare sua & contentis universis movetur. Unde si Terra vere quiescit, corpus quod relative quiescit in navi, movebitur vere & absolute ea cum velocitate qua navis movetur in Terra. Sin Terra etiam movetur; oriatur verus & absolutus corporis motus, partim ex Terræ motu vero in spatio immoto, partim ex navis motu relativo in Terra: & si corpus etiam movetur relative in navi, oriatur verus ejus motus, partim ex vero motu Terræ in spatio immoto, partim ex relativis motibus tum navis in Terra, tum corporis in navi; & ex his motibus relativis oriatur corporis motus relativus in Terra. Ut si Terræ pars illa, ubi navis versatur, moveatur vere in orientem cum velocitate partium 10010; & velis ventoque feratur navis in occidentem cum velocitate partium decem; Nauta autem ambulet in navi orientem

tem versus cum velocitatis parte una: movebitur Nauta vere & absolute in spatio immoto cum velocitatis partibus 10001 in orientem, & relative in terra occidentem versus cum velocitatis partibus novem.

DEFINITIONES.

Tempus Absolutum a relativo distinguitur in Astronomia per *Æquationem* temporis vulgi. Inæquales enim sunt dies Naturales, qui vulgo tanquam æquales pro mensura temporis habentur. Hanc inæqualitatem corrigunt Astronomi, ut ex veriore tempore mensurent motus cœlestes. Possibile est, ut nullus sit motus æquabilis quo Tempus accurate mensuretur. Accelerari & retardari possunt motus omnes, sed fluxus temporis absoluti mutari nequit. Eadem est duratio seu perseverantia existentiae rerum; five motus sint celeres, five tardi, five nulli: proinde hæc a mensuris suis sensibilibus merito distinguitur, & ex iisdem colligitur per *Æquationem* Astronomicam. Hujus autem æquationis in determinandis Phænomenis necessitas, tum per experimentum Horologii Oscillatorii, tum etiam per eclipses Satellitum Jovis evincitur.

Ut partium Temporis ordo est immutabilis, sic etiam ordo partium Spatii. Moveantur hæc de locis suis, & movebuntur (ut ita dicam) de seipsis. Nam tempora & spatia sunt sui ipsorum & rerum omnium quasi Loca. In Tempore quoad ordinem successioneis; in Spatio quoad ordinem situs locantur universa. De illorum essentia est ut sint Loca: & loca primaria moveri absurdum est. Hæc sunt igitur absoluta Loca; & solæ translationes de his locis sunt absoluti Motus.

Verum quoniam hæc Spatii partes videri nequeunt, & ab invicem per sensus nostros distingui; earum vice adhibemus mensuras sensibiles. Ex positionibus enim & distantiiis rerum a corpore aliquo, quod spectamus ut immobile, definimus loca universa: deinde etiam & omnes motus æstimamus cum respectu ad prædicta loca, quatenus corpora ab iisdem transferri concipimus. Sic vice locorum & motuum absolutorum relativis utimur, nec incommode in rebus humanis: in Philosophicis autem abstrahendum est a sensibus. Fieri etenim potest, ut nullum revera quiescat corpus, ad quod loca motusque referantur.

Distinguantur autem Quies & Motus absoluti & relativi ab invicem per Proprietates suas & Causas & Effectus. Quietis proprietas est, quod corpora vere quiescentia quiescunt inter se. Ideoque cum possibile sit, ut corpus aliquod in regionibus Fixarum, aut longe ultra, quiescat absolute; sciri autem non possit ex situ corporum ad invicem in regionibus nostris, horumne aliquod ad longinquum

DEFINITIONIS. quum illud datam positionem servet necne; quies vera ex horum situ inter se definiri nequit.

Motus proprietas est, quod partes, quæ datas servant positiones ad tota, participant motus eorundem totorum. Nam Gyrrantium partes omnes conantur recedere ab axe motus, & Progredientium impetus oritur ex conjunctio impetu partium singularum. Motis igitur corporibus ambientibus, moventur quæ in ambientibus relative quiescunt. Et propterea motus verus & absolutus definiri nequit per translationem e vicinia corporum, quæ tanquam quiescentia spectantur. Debent enim corpora externa non solum tanquam quiescentia spectari, sed etiam vere quiescere. Alioquin inclusa omnia, præter translationem e vicinia ambientium, participabunt etiam ambientium motus veros; & sublata illa translatione non vere quiescent, sed tanquam quiescentia solummodo spectabuntur. Sunt enim ambientia ad inclusa, ut totius pars exterior ad partem interiorem, vel ut cortex ad nucleum. Moto autem cortice, nucleus etiam, absque translatione de vicinia corticis, ceu pars totius movetur.

Præcedenti proprietati affinis est, quod moto Loco movetur una Locatum: adeoque corpus, quod de loco moto movetur, participat etiam loci sui motum. Motus igitur omnes, qui de locis motis fiunt, sunt partes solummodo motuum integrorum & absolutorum: & motus omnis integer componitur ex motu corporis de loco suo primo, & motu loci hujus de loco suo, & sic deinceps; usque dum perveniatur ad locum immotum, ut in exemplo Nautæ supra memorato. Unde motus integri & absoluti non nisi per loca immota definiri possunt: & propterea hos ad loca immota, relativos ad mobilia supra retuli. Loca autem immota non sunt, nisi quæ omnia ab infinito in infinitum datas servant positiones ad invicem; atque adeo semper manent immota, spatiumque constituunt quod Immobile appello.

Causæ, quibus motus veri & relativi distinguuntur ab invicem, sunt Vires in corpora impressæ ad motum generandum. Motus verus nec generatur nec mutatur; nisi per vires in ipsum corpus motum impressas: at motus relativus generari & mutari potest absque viribus impressis in hoc corpus. Sufficit enim ut imprimantur in alia solum corpora ad quæ fit relatio, ut iis cedentibus mutetur relatio illa in qua hujus quies vel motus relativus consistit. Rursum motus verus a viribus in corpus motum impressis semper mutatur; at motus relativus ab his viribus non mutatur necessario. Nam si eadem vires in alia etiam corpora, ad quæ fit relatio, sic imprimantur

mantur ut situs relativus conservetur, conservabitur relatio in qua DEFINITIONES motus relativus consistit. Mutari igitur potest motus omnis relativus ubi verus conservatur, & conservari ubi verus mutatur; & propterea motus verus in ejusmodi relationibus minime consistit.

Effectus quibus motus absoluti & relativi distinguuntur ab invicem, sunt vires recedendi ab axe motus circularis. Nam in motu circulari nude relativo hæ vires nullæ sunt, in vero autem & absoluto majores vel minores pro quantitate motus. Si pendeat situla a filo prælongo, agaturque perpetuo in orbem, donec filum a contorsione admodum rigescat, dein impleatur aqua, & una cum aqua quiescat; tum vi aliqua subitanea agatur motu contrario in orbem, & filo se relaxante, diutius perseveret in hoc motu; superficies aquæ sub initio plana erit, quemadmodum ante motum vasis: at postquam, vi in aquam paulatim impressa, efficit vas, ut hæc quoque sensibilib; revolvi incipiat; recedet ipsa paulatim a medio, ascendetque in latera vasis, figuram concavam induens, (ut ipse expertus sum) & incitatore semper motu ascendet magis & magis, donec revolutiones in aequalibus cum vase temporibus peragendo, quiescat in eodem relative. Indicat hic ascensus conatum recedendi ab axe motus, & per talem conatum innotescit & mensuratur motus aquæ circularis verus & absolutus, motuique relativo hic omnino contrarius. Initio, ubi maximus erat aquæ motus relativus in vase, motus ille nullum excitabat conatum recedendi ab axe: aqua non petebat circumferentiam ascendendo ad latera vasis, sed plana manebat, & propterea motus illius circularis verus nondum inceperat. Postea vero, ubi aquæ motus relativus decrevit, ascensus ejus ad latera vasis indicabat conatum recedendi ab axe; atque hic conatus monstrabat motum illius circulearem verum perpetuo crescentem, ac tandem maximum factum ubi aqua quiescebat in vase relative. Igitur conatus iste non pendet a translatione aquæ respectu corporum ambientium, & propterea motus circularis verus per tales translationes definiri nequit. Unicus est corporis cujusque revolvantis motus vere circularis, conatui unico tantum proprio & adæquato effectui respondens: motus autem relativi pro variis relationibus ad externa innumeri sunt; & relationum instar, effectibus veris omnino desiliuntur, nisi quatenus verum illum & unicum motum participant. Unde & in Systemate eorum qui Cælos nostros infra Cælos Fixarum in orbem revolvi volunt, & Planetas secum deferre; singulæ Cælorum partes, & Planetæ qui relative quidem in Cælis suis proximis quiescunt, moventur

DEFINITIONES. tur vere. Mutant enim positiones suas ad invicem (secus quam fit in vere quiescentibus) unaque cum cœlis delati participant eorum motus, & ut partes revolventium totorum, ab eorum axibus recedere conantur.

Igitur quantitates relativæ non sunt eæ ipsæ quantitates; quarum nomina præ se ferunt, sed earum mensuræ illæ sensibiles (veræ an errantes) quibus vulgus loco quantitatum mensuratarum utitur. At si ex usu definiendæ sunt verborum significationes; per nomina illa Temporis, Spatii, Loci & Motus proprie intelligendæ erunt hæ mensuræ; & sermo erit insolens & pure Mathematicus, si quantitates mensuratæ hic intelligantur. Proinde vim inferunt Sacris Literis, qui voces hæc de quantitibus mensuratis ibi interpretantur. Neque minus contaminant Mathesin & Philosophiam, qui quantitates veras cum ipsarum relationibus & vulgaribus mensuris confundunt.

Motus quidem veros corporum singulorum cognoscere, & ab apparentibus actu discriminare, difficillimum est: propterea quod partes spatii illius immobilis, in quo corpora vere moventur, non incurrunt in sensus. Causa tamen non est prorsus desperata. Nam suppetunt argumenta, partim ex motibus apparentibus qui sunt motuum verorum differentia, partim ex viribus quæ sunt motuum verorum causæ & effectus. Ut si globi duo, ad datam ab invicem distantiam filo intercedente connexi, revolverentur circa commune gravitatis centrum; innotesceret ex tensione fili conatus globorum recedendi ab axe motus, & inde quantitas motus circularis computari posset. Deinde si vires quælibet æquales in alternas globorum facies ad motum circularem augendum vel minuendum simul imprimerentur, innotesceret ex aucta vel diminuta fili tensione augmentum vel decrementum motus, & inde tandem inveniri possent facies globorum in quas vires imprimi deberent, ut motus maxime augeretur; id est, facies posticæ, sive quæ in motu circulari sequuntur. Cognitis autem faciebus quæ sequuntur, & faciebus oppositis quæ præcedunt, cognosceretur determinatio motus. In hunc modum inveniri posset & quantitas & determinatio motus hujus circularis in vacuo quovis immenso, ubi nihil extaret externum & sensibile quocum globi conferri possent. Si jam constituerentur in spatio illo corpora aliqua longinqua datam inter se positionem servantia, qualia sunt Stellæ Fixæ in regionibus nostris: sciri quidem non posset ex relativa globorum translatione inter corpora, utrum his an illis tribuendus esset motus. At si atten-

attenderetur ad filum, & deprenderetur tensionem ejus illam ipsam DEFINITIONES
 esse quam motus globorum requireret; concludere liceret motum esse globorum, & corpora quiescere; & tum demum ex translatione globorum inter corpora, determinationem hujus motus colligere. Motus autem veros ex eorum causis, effectibus, & apparentibus differentiis colligere; & contra ex motibus seu veris seu apparentibus eorum causas & effectus, docebitur fusius in sequentibus. Hunc enim in finem Tractatum sequentem composui.

AXIOMATA,

SIVE

LEGES MOTUS.

LEX I.

Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Projectilia perseverant in motibus suis, nisi quatenus a resistentia aeris retardantur, & vi gravitatis impelluntur deorsum. Trochus, cujus partes cohaerendo perpetuo retrahunt sese a motibus rectilineis, non cessat rotari, nisi quatenus ab acre retardatur. Majora autem Planetarum & Cometarum corpora motus suos & progressivos & circulares in spatiis minus resistentibus factos conservant diutius.

LEX II.

Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, & fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

Si vis aliqua motum quemvis generet; dupla duplum, tripla triplum generabit, sive simul & semel, sive gradatim & successive impressa fuerit. Et hic motus (quoniam in eandem semper plagam cum vi generatrice determinatur) si corpus antea movebatur, motui ejus vel conspiranti additur, vel contrario subducitur, vel obliquo oblique adjicitur, & cum eo secundum utriusque determinationem componitur.

LEX

LEX III.

LEGES
MOTUS.

Actioni contrariam semper & æqualem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse æquales & in partes contrarias dirigi.

Quicquid premit vel trahit alterum, tantundem ab eo premitur vel trahitur. Si quis lapidem digito premit, premitur & hujus digitus a lapide. Si equus lapidem funi alligatum trahit, retrahetur etiam & equus (ut ita dicam) æqualiter in lapidem: nam funis utrinque distensus eodem relaxandi se conatu urgebit equum versus lapidem, ac lapidem versus equum; tantumque impediet progressum unius quantum promovet progressum alterius. Si corpus aliquod in corpus aliud impingens, motum ejus vi sua quomodo-cunque mutaverit, idem quoque vicissim in motu proprio eandem mutationem in partem contrariam vi alterius (ob æqualitatem pressionis mutuae) subibit. His actionibus æquales fiunt mutationes, non velocitatum, sed motuum; scilicet in corporibus non aliunde impeditis. Mutationes enim velocitatum, in contrarias itidem partes factæ, quia motus æqualiter mutantur, sunt corporibus reciproce proportionales. Obtinet etiam hæc Lex in Attractionibus, ut in Scholio proximo probabitur.


COROLLARIUM I.

Corpus viribus conjunctis diagonalem parallelogrammi eodem tempore describere, quo latera separat.

Si corpus dato tempore, vi sola M in loco A impressa, ferretur uniformi cum motu ab A ad B ; & vi sola N in eodem loco impressa, ferretur ab A ad C : compleatur parallelogrammum $ABDC$, & vi utraque feretur id eodem tempore in diagonali ab A ad D . Nam quoniam vis N agit secundum lineam AC ipsi BD parallelam, hæc vis per Legem 11 nihil mutabit velocitatem accedendi ad lineam illam BD a vi altera genitam. Accedet igitur corpus eodem tempore ad lineam BD , sive vis N imprimatur, sive non; atque adeo in fine illius temporis reperietur alicubi in linea illa BD . Eodem argumento in fine temporis ejusdem reperietur alicubi in linea CD , & idcirco in utriusque lineæ concursu D reperiri necesse est. Perget autem motu rectilineo ab A ad D per Legem 1.

B 3

COROL-



EXTONATA,
SIVE

COROLLARIUM II.

Et hinc patet compositio vis directæ AD ex viribus quibusvis obliquis AB & BD, & vicissim resolutio vis cujusvis directæ AD in obliquas quascunque AB & BD. Quæ quidem compositio & resolutio abunde confirmatur ex Mechanica.

Ut si de rotæ alicujus centro O exeuntes radii inæquales OM , ON filis MA , NP sustineant pondera A & P , & quærantur vires ponderum ad movendam rotam: Per centrum O agatur recta KOL filis perpendiculariter occurrens in K & L , centroque O & intervallorum OK , OL majore OL describatur circulus occurrens filo MA in D : & actæ rectæ OD parallela sit AC , & perpendicularis DC . Quoniam nihil refert, utrum filorum puncta, K , L , affixa sint an non affixa ad planum rotæ: pondera idem valebunt, ac si suspenderentur a punctis K & L vel D & L . Ponderis autem A exponatur vis tota per lineam AD , & hæc resolvetur in vires AC , CD , quarum AC trahendo radium OD directe a centro nihil valet ad movendam rotam; vis autem altera DC , trahendo radium DO perpendiculariter, idem valet ac si perpendiculariter traheret radium OL ipsi OD æqualem; hoc est, idem atque pondus P , si modo pondus illud sit ad pondus A ut vis DC ad vim DA , id est (ob similia triangula ADC , DOK ,) ut OK ad OD seu OL . Pondera igitur A & P , quæ sunt reciproce ut radii in directum positi OK & OL , idem pollebunt, & sic consistent in æquilibrio: quæ est proprietas notissima Libræ, Vectis, & Axis in Peritrochio. Sin pondus alterutrum sit majus quam in hac ratione, erit vis ejus ad movendam rotam tanto major.

Quod si pondus p ponderi P æquale partim suspendatur filo Np ; partim incumbat plano obliquo pG : agantur pH , NH , prior horizonti, posterior plano pG perpendicularis; & si vis ponderis p deorsum tendens, exponatur per lineam pH , resolvi potest hæc in vires pN , HN . Si filo pN perpendicularare esset planum aliquod pQ , secans planum alterum pG in linea ad horizontem parallela; & pondus p his planis pQ , pG solummodo incumberet; urgeret

geret illud hæc plana viribus $p N$, HN perpendiculariter, nimirum $Leges$ planum $p Q$ vi $p N$, & planum $p G$ vi HN . Ideoque si tollatur pla-
 num $p Q$, ut pondus tendat filum; quoniam filum sustinendo pon-
 dus jam vicem præstat plani sublati, tendetur illud eadem vi $p N$,
 qua planum antea urgebatur. Unde tensio fili hujus obliqui erit
 ad tensionem fili alterius perpendicularis $P N$, ut $p N$ ad $p H$. Ide-
 oque si pondus p sit ad pondus A in ratione quæ componitur ex
 ratione reciproca minimarum distantiarum filorum suorum $p N$,
 AM a centro rotæ, & ratione directæ $p H$ ad $p N$; pondera idem
 valebunt ad rotam movendam, atque adeo se mutuo sustinebunt,
 ut quilibet experiri potest.

Pondus autem p , planis illis duobus obliquis incumbens, rationem
 habet cunei inter corporis fissi facies internas: & inde vires cunei
 & mallei innotescunt: utpote cum vis qua pondus p urget planum
 $p Q$ sit ad vim, qua idem vel gravitate sua vel ictu mallei impellitur
 secundum lineam $p H$ in plana, ut $p N$ ad $p H$; atque ad vim,
 qua urget planum alterum $p G$, ut $p N$ ad NH . Sed & vis Cochleæ
 per similem virium divisionem colligitur; quippe quæ cuneus est a
 veste impulsus. Usus igitur Corollarii hujus latissime patet, & late-
 patendo veritatem suam evincit; cum pendeat ex jam dictis Mecha-
 nica tota ab Auctoribus diversimode demonstrata. Ex hisce enim
 facile derivantur vires Machinarum, quæ ex Rotis, Tympanis,
 Trochleis, Vestibus, nervis tensis & ponderibus directæ vel obli-
 que ascendentibus, cæterisque potentiis Mechanicis componi so-
 lent, ut & vires Tendinum ad animalium ossa movenda.

COROLLARIUM III.

*Quantitas motus quæ colligitur capiendo summam motuum
 factorum ad eandem partem, & differentiam factorum
 ad contrarias; non mutatur ab actione corporum inter se.*

Etenim actio eique contraria reactio æquales sunt per Legem III ,
 adeoque per Legem II æquales in motibus efficiunt mutationes ver-
 fus contrarias partes. Ergo si motus fiunt ad eandem partem; quic-
 quid additur motui corporis fugientis, subducetur motui corporis
 insequentis sic, ut summa maneat eadem quæ prius. Sin corpora
 obviam eant; æqualis erit subductio de motu utriusque, adeoque
 differentia motuum factorum in contrarias partes manebit eadem.

Ut si corpus sphaericum A sit triplo majus corpore sphaerico B , ha-
 beatque duas velocitatis partes; & B sequatur in eadem recta cum ve-
 locitatis

AXIOMATA,
§ I V §

locitatis partibus decem, adeoque motus ipsius *A* sit ad motum ipsius *B*, ut sex ad decem: ponantur motus illis esse partium sex & partium decem, & summa erit partium sexdecim. In corporum igitur concursu, si corpus *A* lucretur motus partes tres vel quatuor vel quinque, corpus *B* amittet partes totidem adeoque perget corpus *A* post reflexionem cum partibus novem vel decem vel undecim, & *B* cum partibus septem vel sex vel quinque, existente semper summa partium sexdecim ut prius. Si corpus *A* lucretur partes novem vel decem vel undecim vel duodecim, adeoque progrediatur post concursum cum partibus quindecim vel sexdecim vel septendecim vel octodecim, corpus *B*, amittendo tot partes quot *A* lucratur, vel cum una parte progrediatur amissis partibus novem, vel quiescet amisso motu suo progressivo partium decem, vel cum una parte regrediatur amisso motu suo & (ut ita dicam) una parte progrediatur cum partibus duabus ob detractum motum progressivum partium duodecim. Atque ita summa motuum conspirantium $15 + 1$ vel $16 + 0$, & differentia contrariorum $17 - 1$ & $18 - 2$ semper erunt partium sexdecim, ut ante concursum & reflexionem. Cognitis autem motibus quibuscumque corpora post reflexionem pergent, inveniatur cuiusque velocitas, ponendo eam esse ad velocitatem ante reflexionem, ut motus post est ad motum ante. Ut in casu ultimo, ubi corporis *A* motus erat partium sex ante reflexionem & partium octodecim postea, & velocitas partium duarum ante reflexionem; inveniatur ejus velocitas partium sex post reflexionem, dicendo, ut motus partes sex ante reflexionem ad motus partes octodecim postea, ita velocitatis partes duae ante reflexionem ad velocitatis partes sex postea.

Quod si corpora vel non Sphærica vel diversis in rectis moventia incidant in se mutuo oblique, & requirantur eorum motus post reflexionem; cognoscendus est situs plani a quo corpora concurrentia tanguntur in puncto concursus: dein corporis utriusque motus (per Corol. 11.) distinguendus est in duos, unum huic plano perpendicularem, alterum eidem parallelum: motus autem paralleli, propterea quod corpora agant in se invicem secundum lineam huic plano perpendicularem, retinendi sunt iidem post reflexionem atque antea; & motibus perpendicularibus mutationes aequales in partes contrariastribuendae sunt sic, ut summa conspirantium & differentia contrariorum maneat eadem quae prius. Ex hujusmodi reflexionibus oriri etiam solent motus circulares corporum circa centra propria. Sed hos casus in sequentibus non considero, & nimis longum esset omnia huc spectantia demonstrare.

COROL.

COROLLARIUM IV.

LEGES
MOTUS.

Commune gravitatis Centrum, corporum duorum vel plurium, ab actionibus corporum inter se non mutat statum suum vel motus vel quietis; & propterea corporum omnium in se mutuo agentium (exclusis actionibus & impedimentis externis) commune Centrum gravitatis vel quiescit vel movetur uniformiter in directum.

Nam si puncta duo progrediantur uniformi cum motu in lineis rectis, & distantia eorum dividatur in ratione data, punctum dividens vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta. Hoc postea in Lemmate xxiii demonstratur, si punctorum motus fiant in eodem plano; & eadem ratione demonstrari potest, si motus illi non fiant in eodem plano. Ergo si corpora quocunque moventur uniformiter in lineis rectis, commune centrum gravitatis duorum quorumvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod linea, horum corporum centra in rectis uniformiter progredientia jungens, dividitur ab hoc centro communi in ratione data. Similiter & commune centrum horum duorum & tertii cujusvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod ab eo dividitur distantia centri communis corporum duorum & centri corporis tertii in data ratione. Eodem modo & commune centrum horum trium & quarti cujusvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod ab eo dividitur distantia inter centrum commune trium & centrum quarti in data ratione, & sic in infinitum. Igitur in systemate corporum quæ actionibus in se invicem aliisque omnibus in se extrinsecus impressis omnino vacant, adeoque moventur singula uniformiter in rectis singulis, commune omnium centrum gravitatis vel quiescit vel movetur uniformiter in directum.

Porro in systemate duorum corporum in se invicem agentium, cum distantia centrorum utriusque a communi gravitatis centro sint reciproce ut corpora; erunt motus relativi corporum eorundem, vel accedendi ad centrum illud vel ab eodem recedendi, æquales inter se. Proinde centrum illud a motuum æqualibus mutationibus in partes contrarias factis, atque adeo ab actionibus horum corporum inter se, nec promovetur nec retardatur nec mutationem patitur in statu suo quoad motum vel quietem. In systemate autem corporum plurium, quoniam duorum quorumvis in se mutuo agentium commune gravitatis centrum ob actionem illam nullatenus

C

mutat

AXIOMATA,
SIVE

mutat statum suum; & reliquorum, quibuscum actio illa non intercedit, commune gravitatis centrum nihil inde patitur; distantia autem horum duorum centrorum dividitur a communi corporum omnium centro in partes summis totalibus corporum quorum sunt centra reciproce proportionales, adeoque centris illis duobus statum suum movendi vel quiescendi servantibus, commune omnium centrum servat etiam statum suum: manifestum est quod commune illud omnium centrum ob actiones binorum corporum inter se nunquam mutat statum suum quoad motum & quietem. In tali autem systemate actiones omnes corporum inter se vel inter bina sunt corpora, vel ab actionibus inter bina compositæ; & propterea communi omnium centro mutationem in statu motus ejus vel quietis nunquam inducunt. Quare cum centrum illud ubi corpora non agunt in se invicem, vel quiescit, vel in recta aliqua progreditur uniformiter; perget idem non obstantibus corporum actionibus inter se, vel semper quiescere, vel semper progredi uniformiter in directum; nisi a viribus in systema extrinsecus impressis deturbetur de hoc statu. Est igitur systematis corporum plurium Lex eadem quæ corporis solitarii, quoad perseverantiam in statu motus vel quietis. Motus enim progressivus seu corporis solitarii seu systematis corporum ex motu centri gravitatis æstimari semper debet.

COROLLARIUM V.

Corporum dato spatio inclusorum iidem sunt motus inter se, sive spatium illud quiescat, sive moveatur idem uniformiter in directum absque motu circulari.

Nam differentiarum motuum tendentium ad eandem partem, & summarum tendentium ad contrarias, eadem sunt sub initio in utroque casu (ex hypothesi) & ex his summis vel differentis oriuntur congressus & impetus quibus corpora se mutuo feriunt. Ergo per Legem II. æquales erunt congressuum effectus in utroque casu; & propterea manebunt motus inter se in uno casu æquales motibus inter se in altero. Idem comprobatur experimento luculento. Motus omnes eodem modo se habent in Navi, sive ea quiescat, sive moveatur uniformiter in directum.

COROLLARIUM VI.


Si corpora moveantur quomodocunque inter se, & a viribus acceleratricibus æqualibus secundum lineas parallelas urgeantur; pergent omnia eodem modo moveri inter se, ac si viribus illis non essent incitata.

Nam vires illæ æqualiter (pro quantitativis movendorum corporum)

rum) & secundum lineas parallelas agendo, corpora omnia æqualiter (quoad velocitatem) movebunt per Legem II. adæoque nunquam mutabunt positiones & motus eorum inter se. LEGES
MOTUS.


Scholium.

Hactenus principia tradidi a Mathematicis recepta & experientia multiplici confirmata. Per Leges duas primas & Corollaria duo prima *Galileus* invenit descensum Gravium esse in duplicata ratione temporis, & motum Projectilium fieri in Parabola; conspirante experientia, nisi quatenus motus illi per aeris resistentiam aliquantulum retardantur. Ab iisdem Legibus & Corollariis pendet demonstrata de temporibus oscillantium Pendulorum, suffragante Horologiorum experientia quotidiana. Ex his iisdem & Lege tertia *Christophorus Wrennus* Eques Auratus, *Johannes Wallisius* S. T. D. & *Christianus Hugenius*, hujus ætatis Geometrarum facile principes, regulas congressuum & reflexionum duorum corporum seorsum invenerunt, & eodem fere tempore cum *Societate Regia* communicarunt, inter se (quoad has leges) omnino conspirantes: & primus quidem *Wallisius*, deinde *Wrennus* & *Hugenius* inventum prodiderunt. Sed & veritas comprobata est a *Wrenno* coram *Regia Societate* per experimentum Pendulorum: quod etiam *Clarissimus Mariottus* libro integro exponere mox dignatus est. Verum, ut hoc experimentum cum Theoriis ad amissum congruat, habenda est ratio cum resistentiæ aeris, tum etiam vis Elasticæ concurrentium corporum. Pendeant corpora *A, B* filis parallelis & æqualibus *AC, BD*, a centris *C, D*. His centris & intervallis describantur semicirculi *EAF, GBH* radiis *CA, DB* bisectione. Trahatur corpus *A* ad arcus *EAF* punctum quodvis *R*, & (subducto corpore *B*) demittatur inde, redeatque post unam oscillationem ad punctum *V*. Est *RV* retardatio ex resistentia aeris. Hujus *RV* fiat *ST* pars quarta sita in medio, ita scilicet ut *RS* & *TV* æquantur, sitque *RS* ad *ST* ut 3 ad 2. Et ista *ST* exhibebit retardationem in descensu ab *S* ad *A* quam proxime. Restituatur corpus *B* in locum suum. Cadat corpus *A* de puncto *S*, & velocitas ejus in loco reflexionis *A*, absque errore sensibili, tanta erit ac



AXIOMATA,
SIVE

si in vacuo cecidisset de loco *T*. Exponatur igitur hæc velocitas per chordam arcus *TA*. Nam velocitatem Penduli in puncto infimo esse ut chordam arcus quem cadendo descripsit, Propositio est Geometris notissima. Post reflexionem perveniat corpus *A* ad locum *s*, & corpus *B* ad locum *k*. Tollatur corpus *B* & inveniantur locus *v*; a quo si corpus *A* demittatur & post unam oscillationem redeat ad locum *r*, sit *st* pars quarta ipsius *rv* sita in medio, ita videlicet ut *rs* & *tv* æquantur; & per chordam arcus *tA* exponatur velocitas quam corpus *A* proxime post reflexionem habuit in loco *A*. Nam *t* erit locus ille verus & correctus, ad quem corpus *A*, sublata aeris resistentia, ascendere debuisset. Simili methodo corrigendus erit locus *k*, ad quem corpus *B* ascendere debuisset, & inveniendus locus *l*, ad quem corpus illud ascendere debuisset in vacuo. Hoc pacto experiri licet omnia perinde ac si in vacuo constituti essemus. Tandem ducendum erit corpus *A* in chordam arcus *TA* (quæ velocitatem ejus exhibet) ut habeatur motus *tA* in loco *A* proxime ante reflexionem; deinde in chordam arcus *tA*, ut habeatur motus ejus in loco *A* proxime post reflexionem. Et sic corpus *B* ducendum erit in chordam arcus *Bl*, ut habeatur motus ejus proxime post reflexionem. Et simili methodo, ubi corpora duo simul demittuntur de locis diversis, inveniendi sunt motus utriusque tam ante, quam post reflexionem; & tum demum conferendi sunt motus inter se & colligendi effectus reflexionis. Hoc modo in Pendulis pedum decem rem tentando, idque in corporibus tam inæqualibus quam æqualibus, & faciendo ut corpora de intervallis amplissimis, puta pedum octo vel duodecim vel sexdecim, concurrerent; reperi semper sine errore trium digitorum in mensuris, ubi corpora sibi mutuo directe occurrerant, quod æquales erant mutationes motuum corporibus in partes contrarias illatæ, atque adeo quod actio & reactio semper erant æquales. Ut si corpus *A* incidbat in corpus *B* cum novem partibus motus, & amissis septem partibus pergebat post reflexionem cum duabus; corpus *B* resiliobat cum partibus istis septem. Si corpora obviam ibant *A* cum duodecim partibus & *B* cum sex, & redibat *A* cum duabus; redibat *B* cum octo, facta detractioe partium quatuordecim utriusque. De motu ipsius *A* subducantur partes duodecim, & restabit nihil:



nihil: subducantur aliæ partes duæ, & fiet motus duarum partium in plagam contrariam: & sic de motu corporis *B* partium sex subducendo partes quatuordecim, fient partes octo in plagam contrariam. Quod si corpora ibant ad eandem plagam, *A* velocius cum partibus quatuordecim, & *B* tardius cum partibus quinque, & post reflexionem pergebat *A* cum quinque partibus; pergebat *B* cum quatuordecim, facta translatione partium novem de *A* in *B*. Et sic in reliquis. A congressu & collisione corporum nunquam mutabatur quantitas motus, quæ ex summa motuum conspirantium & differentia contrariorum colligebatur. Nam errorem digiti unius & alterius in mensuris tribuerim difficultati peragendi singula satis accurate. Difficile erat, tum pendula simul demittere sic, ut corpora in se mutuo impingerent in loco infimo *AB*; tum loca, *s*, & notare, ad quæ corpora ascendebant post concursum. Sed & in ipsis pilis inæqualis partium densitas, & textura alijs de causis irregularis, errores inducebant.


Porro nequis objiciat Regulam, ad quam probandam inventum est hoc experimentum, præsupponere corpora vel absolute dura esse, vel saltem perfecte elastica, cujusmodi nulla reperiuntur in compositionibus naturalibus; addo quod Experimenta jam descripta succedunt in corporibus mollibus æque ac in duris, nimirum a conditione duritiei neutiquam pendentia. Nam si Regula illa in corporibus non perfecte duris tentanda est, debet solummodo reflexio minui in certa proportionem pro quantitate vis Elasticæ. In Theoria *Wrenni* & *Hugenii* corpora absolute dura redeunt ab invicem cum velocitate congressus. Certius id affirmabitur de perfecte Elasticis. In imperfecte Elasticis velocitas reditus minuenda est simul cum vi Elasticæ; propterea quod vis illa, (nisi ubi partes corporum ex congressu læduntur, vel extensionem aliqualem quasi sub malleo patiuntur,) certa ac determinata sit (quantum sentio) faciatque corpora redire ab invicem cum velocitate relativa, quæ sit ad relativam velocitatem concursus in data ratione. Id in pilis ex lana arte conglomerata & fortiter restricta sic tentavi. Primum demittendo Pendula & mensurando reflexionem, inveni quantitatem vis Elasticæ; deinde per hanc vim determinavi reflexiones in alijs casibus concursuum, & respondebant Experimenta. Redibant semper pilæ ab invicem cum velocitate relativa, quæ esset ad velocitatem relativam concursus ut 5 ad 9 circiter. Eadem fere cum velocitate redibant pilæ ex chalybe: aliæ ex subere cum paulo minore: in vitreis autem proportio erat 15 ad 16 circiter. Atque hoc pacto Lex tertia quoad ictus & reflexiones per Theoriam comprobata est, quæ cum experientia plane congruit.

AXIOMATA,
SIVE

In Attractionibus rem sic breviter ostendo. Corporibus duobus quibuscumvis A, B se mutuo trahentibus, concipe obstaculum quodvis interponi quo congressus eorum impediatur. Si corpus alterutrum A magis trahitur versus corpus alterum B , quam illud alterum B in prius A , obstaculum magis urgebitur pressione corporis A quam pressione corporis B ; proindeque non manebit in æquilibrio. Prævalet pressio fortior, facietque ut systema corporum duorum & obstaculi moveatur in directum in partes versus B , motuque in spatiis liberis semper accelerato abeat in infinitum. Quod est absurdum & Legi primæ contrarium. Nam per Legem primam debeat systema perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, proindeque corpora æqualiter urgebunt obstaculum, & idcirco æqualiter trahentur in invicem. Tentavi hoc in Magnete & Ferro. Si hæc in vasculis propriis sese contingentibus seorsim posita, in aqua stagnante juxta fluitant; neutrum propellet alterum, sed æqualitate attractionis utrinque sustinebunt conatus in se mutuos, ac tandem in æquilibrio constituta quiescent.

Sic etiam gravitas inter Terram & ejus partes, mutua est. Secetur Terra FI plano quovis EG in partes duas EGF & EGI ; & æqualia erunt harum pondera in se mutuo. Nam si plano alio HK quod priori EG parallelum sit, pars major EGI secetur in partes duas $EGKH$ & HKI , quarum HKI æqualis sit parti prius abscissæ EGF : manifestum est quod pars media $EGKH$ pondere proprio in neutram partium extremarum propendebit, sed inter utramque in æquilibrio, ut ita dicam, suspendetur, & quiescet. Pars autem extrema HKI toto suo pondere incumbet in partem mediam, & urgebit illam in partem alteram extremam EGF ; ideoque vis qua partium HKI & $EGKH$ summa EGI tendit versus partem tertiam EGF , æqualis est ponderi partis HKI , id est ponderi partis tertiæ EGF . Et propterea pondera partium duarum EGI , EGF in se mutuo sunt æqualia, uti volui ostendere. Et nisi pondera illa æqualia essent, Terra tota in libero æthere fluitans ponderi majori cederet, & ab eo fugiendo abiret in infinitum.

Ut corpora in concursu & reflexione idem pollent, quorum velocitates sunt reciproce ut vires insitæ: sic in movendis Instrumentis mechanicis agentia idem pollent & conatibus contrariis se mutuo sustinent, quorum velocitates secundum determinationem virium



virium æstimatæ, sunt reciproce ut vires. Sic pondera æquipollent ad movenda brachia Libræ, quæ oscillante Libra sunt reciproce ut eorum velocitates sursum & deorsum: hoc est pondera, si recta ascendunt & descendunt, æquipollent, quæ sunt reciproce ut punctorum a quibus suspenduntur distantia ab axe Libræ; sin planis obliquis aliisve admotis obstaculis impedita ascendunt vel descendunt oblique, æquipollent quæ sunt reciproce ut ascensus & descensus, quatenus facti secundum perpendicularum: id adeo ob determinationem gravitatis deorsum. Similiter in Trochlea seu Polyspasto vis manus funem directe trahentis, quæ sit ad pondus vel directe vel oblique ascendens ut velocitas ascensus perpendicularis ad velocitatem manus funem trahentis, sustinebit pondus. In Horologiis & similibus instrumentis, quæ ex rotulis commissis constructa sunt, vires contrariæ ad motum rotularum promovendum & impediendum, si sint reciproce ut velocitates partium rotularum in quas imprimuntur, sustinebunt se mutuo. Vis Cochleæ ad premendum corpus est ad vim manus manubrium circumagentis, ut circularis velocitas manubrii ea in parte ubi a manu urgetur, ad velocitatem progressivam cochleæ versus corpus pressum. Vires quibus Cuneus urget partes duas ligni fissi sunt ad vim mallei in cuneum, ut progressus cunei secundum determinationem vis a malleo in ipsum impressæ, ad velocitatem qua partes ligni cedunt cuneo, secundum lineas faciebus cunei perpendiculares. Et par est ratio Machinarum omnium.

Harum efficacia & usus in eo solo consistit, ut diminuendo velocitatem augeamus vim, & contra: unde solvitur in omni aptorum instrumentorum genere Problema, *Datum pondus data vi movendi*, aliamve datam resistantiam vi data superandi. Nam si Machinæ ita formentur, ut velocitates Agentis & Resistentis sint reciproce ut vires; Agens resistantiam sustinebit: & majori cum velocitatum disparitate eandem vincet. Certe si tanta sit velocitatum disparitas, ut vincatur etiam resistantia omnis, quæ tam ex contiguorum & inter se labentium corporum attritione, quam ex continuorum & ab invicem separandorum cohæione & elevandorum ponderibus oriri solet; superata omni ea resistantia, vis redundans accelerationem motus sibi proportionalem, partim in partibus machinæ, partim in corpore resistente producet. Ceterum Mechanicam tractare non est hujus instituti. Hisce volui tantum ostendere, quam late pateat quamque certa sit Lex tertia Motus. Nam si æstimetur Agentis actio ex ejus vi & velocitate

AXIOMATA,
SIVE

tate conjunctim; & similiter Resistentis reactio æstimetur conjunctim ex ejus partium singularum velocitatibus & viribus resistendi ab earum attritione, cohæsione, pondere, & acceleratione oriundis; erunt actio & reactio, in omni instrumentorum usu, sibi invicem semper æquales. Et quatenus actio propagatur per instrumentum & ultimo imprimitur in corpus omne resistens, ejus ultima determinatio determinationi reactionis semper erit contraria.

D E

MOTU CORPORUM

LIBER PRIMUS.

SECTIO I.

De Methodo Rationum primarum & ultimarum, cujus ope sequentia demonstrantur.

LEMMA I.

Quantitates, ut & quantitatum rationes, quæ ad æqualitatem tempore quovis finito constanter tendunt, & ante finem temporis illius propius ad invicem accedunt quam pro data quavis differentia, sunt ultimo æquales.


Si negas; fiant ultimo inæquales, & sit earum ultima differentia \mathcal{D} . Ergo nequeunt propius ad æqualitatem accedere quam pro data differentia \mathcal{D} : contra hypothefin.

LEMMA

L E M M A II.

 LIBER
PRIMUS.

Si in Figura quavis $AacE$, rectis Aa , AE & curva acE comprehensa, inscribantur parallelogramma quocunque Ab , Bc , Cd , &c. sub basibus AB , BC , CD , &c. æqualibus, & lateribus Bb , Cc , Dd , &c. Figure lateri Aa parallelis contenta; & compleantur parallelogramma $aKbl$, $bLcm$, $cMdn$, &c. Dein horum parallelogrammorum latitudo minuatur, & numerus augeatur in infinitum: dico quod ultimæ rationes, quas habent ad se invicem Figura inscripta $AKbLcMdD$, circumscripta $AalbmcndoE$, & curvilinea $AabcdE$, sunt rationes æqualitatis.



Nam Figure inscriptæ & circumscriptæ differentia est summa parallelogrammorum Kl , Lm , Mn , Do , hoc est (ob æquales omnium bases) rectangulum sub unius basi Kb & altitudinum summa Aa , id est, rectangulum $ABla$. Sed hoc rectangulum, eo quod latitudo ejus AB in infinitum minuitur, fit minus quovis dato. Ergo (per Lemma 1.) Figura inscripta & circumscripta & multo magis Figura curvilinea intermedia fiunt ultimo æquales. Q. E. D.

L E M M A III.

Eadem rationes ultimæ sunt etiam rationes æqualitatis, ubi parallelogrammorum latitudines &c. AB , BC , CD , sunt inæquales, & omnes minuuntur in infinitum.

Sit enim AF æqualis latitudini maximæ, & compleatur parallelogrammum $FAaf$. Hoc erit majus quam differentia Figure inscriptæ & Figure circumscriptæ; at latitudine sua AF in infinitum diminuta, minus fiet quam datum quodvis rectangulum. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc summa ultima parallelogrammorum evanescentium coincidit omni ex parte cum Figura curvilinea.

Corol. 2. Et multo magis Figura rectilinea, quæ chordis evanescentium

D

centium


Da Motu centium arcuum $ab, bc, cd, &c.$ comprehenditur, coincidit ultimo cum Figura curvilinea.

Corol. 3. Ut & Figura rectilinea circumscripta quæ tangentibus eorundem arcuum comprehenditur.

Corol. 4. Et propterea hæ Figuræ ultimæ (quoad perimetros acE .) non sunt rectilineæ, sed rectilinearum limites curvilinei.

LEMMA IV.

Si in duabus Figuris $AacE$, $PprT$, inscribantur (ut supra) duæ parallelogrammorum series, sitque idem amborum numerus, & ubi latitudines in infinitum diminuuntur, rationes ultimæ parallelogrammorum in una Figura ad parallelogramma in altera, singulorum ad singula, sint eadem; dico quod Figuræ duæ $AacE$, $PprT$, sunt ad invicem in eadem illa ratione.



Etenim ut sunt parallelogramma singula ad singula, ita (componendo) fit summa omnium ad summam omnium, & ita Figura ad Figuram; existente nimirum Figura priore (per Lemma III) ad summam priorem, & Figura posteriore ad summam posteriorem in ratione æqualitatis. *Q. E. D.*

Corol. Hinc si duæ cujuscunque generis quantitates in eundem partium numerum utcunque dividantur; & partes illæ, ubi numerus earum augetur & magnitudo diminuitur in infinitum, datam obtineant rationem ad invicem, prima ad primam, secunda ad secundam, cæteræque suo ordine ad cæteras: erunt tota ad invicem in eadem illa data ratione. Nam si in Lemmatis hujus Figuris sumantur parallelo-


rallelogramma inter se ut partes, summæ partium semper erunt L I B E R
 ut summæ parallelogrammorum; atque adeo, ubi partium & paral- P R I M U S.
 leogrammorum numerus augetur & magnitudo diminuitur in infi-
 nitum in ultima ratione parallelogrammi ad parallelogrammum, id
 est (per hypothesin) in ultima ratione partis ad partem.

L E M M A V.

*Similium Figurarum latera omnia, quæ sibi mutuo respon-
 dent, sunt proportionalia, tam curvilinea quam rectili-
 nea; & areae sunt in duplicata ratione laterum.*

L E M M A V I.

*Si arcus quilibet positione datus AB sub-
 tendatur chorda AB, & in puncto
 aliquo A, in medio curvaturæ conti-
 nuæ, tangatur a recta utrinque pro-
 ducta AD; dein puncta A, B ad invi-
 cem accedant & coeant; dico quod an-
 gulus BAD, sub chorda & tangente
 contentus, minuetur in infinitum &
 ultimo evanescet.*



Nam si angulus ille non evanescit, continebit arcus *AB* cum tan-
 gente *AD* angulum rectilineo æqualem, & propterea curvatura ad
 punctum *A* non erit continua, contra hypothesin.

L E M M A V I I.

*Isdem positis; dico quod ultima ratio arcus, chordæ, &
 tangentis ad invicem est ratio æqualitatis.*

Nam dum punctum *B* ad punctum *A* accedit, intelligantur sem-
 per *A* & *AD* ad puncta longinqua *b* ac *d* produci, & secanti *BD*
 parallela agatur *bd*. Sitque arcus *Ab* semper similis arcui *AB*.
 Et punctis *A*, *B* coeuntibus, angulus *dAb*, per Lemma superius,
 evanescet; adeoque rectæ semper finitæ *Ab*, *Ad* & arcus interme-
 dius *Ab* coincident, & propterea æquales erunt. Unde & hisce
 semper proportionales rectæ *AB*, *A'D*, & arcus intermedius *AB*


D 2

eva-

DE MOTU
CORPORUM

evanescent, & rationem ultimam habebunt æqualitatis. *Q. E. D.*

Corol. 1. Unde si per B ducatur tangenti parallela BF , rectam quamvis AF per A transeuntem perpetuo secans in F , hæc BF ultimo ad arcum evanescentem AB rationem habebit æqualitatis, eo quod completo parallelogrammo $AFBD$ rationem semper habet æqualitatis ad AD .




Corol. 2. Et si per B & A ducantur plures rectæ BE , BD , AF , AG , secantes tangentem AD & ipsius parallelam BF ; ratio ultima abscissarum omnium AD , AE , BF , BG , chordæque & arcus AB ad invicem erit ratio æqualitatis.

Corol. 3. Et propterea hæc omnes lineæ, in omni de rationibus ultimis argumentatione, pro se invicem usurpari possunt.

LEMMA VIII.

Si rectæ datæ AR, BR cum arcu AB, chorda AB & tangente AD, triangula tria ARB, ARD constituant, dein puncta A, B accedunt ad invicem: dico quod ultima forma triangulorum evanescentium est similitudinis, & ultima ratio æqualitatis.

Nam dum punctum B ad punctum A accedit, intelligantur semper AB , AD , AR ad puncta longinqua b , d & r producti, ipsique RD parallela agi rb , & arcui AB similis semper sit arcus Ab . Et coeuntibus punctis A, B , angulus bAd evanescet, & propterea triangula tria ARB semper finita rAb , rAb , rAd coincident, suntque eo nomine similia & æqualia. Unde & hisce semper similia & proportionalia RAB , RAB , RAD fient ultimo sibi invicem similia & æqualia. *Q. E. D.*




Corol. Et hinc triangula illa, in omni de rationibus ultimis argumentatione, pro se invicem usurpari possunt.

LEMMA

L E M M A IX.

Si recta AE & curva ABC positione data se mutuo secent in angulo dato A , & ad rectam illam in alio dato angulo ordinatim applicentur BD, CE curvæ occurrentes in B, C ; dein puncta B, C simul accedant ad punctum A : dico quod areae triangulorum ABD, ACE erunt ultimo ad invicem in duplicata ratione laterum.

Etenim dum puncta B, C accedunt ad punctum A , intelligatur semper AD produci ad puncta longinqua d & e , ut sint Ad, Ae ipsis AD, AE proportionales, & erigantur ordinatæ db, ec ordinatis DB, EC parallelæ quæ occurrant ipsis AB, AC productis in b & c . Duci intelligatur, tum curva Abc ipsi ABC similis, tum recta Ag , quæ tangat curvam utramque in A , & secet ordinatim applicatas DB, EC, db, ec in F, G, f, g . Tum manente longitudine Ae coeant puncta B, C cum puncto A ; & angulo $e Ag$ evanescente, coincident areae curvilineæ Abd, Ace cum rectilineis Afd, Age : adeoque (per Lemma v.) erunt in duplicata ratione laterum Ad, Ae : Sed his areae proportionales semper sunt areae ABD, ACE , & his lateribus latera AD, AE . Ergo & areae ABD, ACE sunt ultimo in duplicata ratione laterum AD, AE . Q. E. D.



L E M M A X.

Spatia quæ corpus urgente quacunque Vi finita describit, siue Vis illa determinata & immutabilis sit, siue eadem continuo augeatur vel continuo diminuatur, sunt ipso motus initio in duplicata ratione Temporum.

Exponentur tempora per lineas AD, AE , & velocitates genitæ per ordinatas DB, EC ; & spatia his velocitatibus descripta, erunt ut areae ABD, ACE his ordinatis descriptæ, hoc est, ipso motus initio (per Lemma ix.) in duplicata ratione temporum AD, AE . Q. E. D.

D 3.

Corol.

De Motu
Corporum

Corol. 1. Et hinc facile colligitur, quod corporum similes similibus Figurarum partes temporibus proportionalibus describentium Errores, qui viribus quibuscumque æqualibus ad corpora similiter applicatis generantur, & mensurantur per distantias corporum a Figurarum similibus locis illis ad quæ corpora eadem temporibus iisdem proportionalibus absque viribus illis pervenirent, sunt ut quadrata temporum in quibus generantur quam proxime.

Corol. 2. Errores autem qui viribus proportionalibus ad similes Figurarum similibus partes similiter applicatis generantur, sunt ut vires & quadrata temporum conjunctim.

Corol. 3. Idem intelligendum est de spatiis quibuscumque quæ corpora urgentibus diversis viribus describunt. Hæc sunt, ipso motus initio, ut vires & quadrata temporum conjunctim.

Corol. 4. Ideoque vires sunt ut spatia, ipso motus initio, descripta directe & quadrata temporum inverse.

Corol. 5. Et quadrata temporum sunt ut descripta spatia directe & vires inverse.

Scholium.

Si quantitates indeterminatæ diversorum generum conferantur inter se, & earum aliqua dicatur esse ut est alia quævis directe vel inverse: sensus est, quod prior augetur vel diminuitur in eadem ratione cum posteriore, vel cum ejus reciproca. Et si earum aliqua dicatur esse ut sunt aliæ duæ vel plures directe vel inverse; sensus est, quod prima augetur vel minuitur in ratione quæ componitur ex rationibus in quibus aliæ vel aliarum reciprocae augentur vel diminuuntur. Ut si A dicatur esse ut B directe & C directe & D inverse: sensus est, quod A augetur vel diminuitur

in eadem ratione cum $B \times C \times \frac{1}{D}$, hoc est, quod A & $\frac{BC}{D}$ sunt ad invicem in ratione data.

LEMMA XI.

Subtensa evanescens anguli contactus, in curvis omnibus curvaturam finitam ad punctum contactus habentibus, est ultimo in ratione duplicata subtensæ arcus contermini.

Caf. 1. Si arcus ille AB, tangens ejus AD, subtensa anguli contactus ad tangentem perpendicularis BD, subtensa arcus AB. Huic subtensæ AB & tangenti AD perpendiculares erigantur AG, BG, concur-

DE MOTU
CORPORUM.

Corol. 5. Et quoniam DB , Ab sunt ultimo parallelæ & in duplicata ratione ipsarum AD , Ad : erunt areae ultimæ curvilineæ ADB , Adb (ex natura Parabolæ) duæ tertiæ partes triangulorum rectilineorum ADB , Adb ; & segmenta AB , Ab partes tertiæ eorundem triangulorum. Et inde hæ areae & hæc segmenta erunt in triplicata ratione tum tangentium AD , Ad ; tum chordarum & arcuum AB , Ab .

Scholium.

Cæterum in his omnibus supponimus angulum contactus nec infinite majorem esse angulis contactuum, quos Circuli continent cum tangentibus suis, nec iisdem infinite minorem; hoc est curvaturam ad punctum A , nec infinite parvam esse nec infinite magnam, seu intervallum AJ finitæ esse magnitudinis. Capi enim potest DB ut AD' : quo in casu Circulus nullus per punctum A inter tangentem AD & curvam AB duci potest, proindeque angulus contactus erit infinite minor Circularibus. Et simili argumento si fiat DB successive ut AD' , AD'' , AD''' , AD'''' , &c. habebitur series angulorum contactus pergens in infinitum, quorum quilibet posterior est infinite minor priore. Et si fiat AB successive ut AD' , AD'' , AD''' , AD'''' , &c. habebitur alia series infinita angulorum contactus, quorum primus est ejusdem generis cum Circularibus, secundus infinite major, & quilibet posterior infinite major priore. Sed & inter duos quosvis ex his angulis potest series utrinque in infinitum pergens angulorum intermediarum inseri, quorum quilibet posterior erit infinite major minorque priore. Ut si inter terminos AD' & AD'' inferatur series AD''' , AD'''' , AD''''' , AD'''''' , AD''''''' , BD'' , AD'''' , AD''''' , &c. Et rursus inter binos quosvis angulos hujus seriei inferi potest series nova angulorum intermediarum ab invicem infinitis intervallis differentium. Neque novit natura limitem.

Quæ de curvis lineis deque superficiebus comprehensis demonstrata sunt, facile applicantur ad solidorum superficies curvas & contenta. Præmissi vero hæc Lemmata, ut esugerem tædium deducendi perplexas demonstrationes, more veterum Geometrarum, ad absurdum. Contractiores enim redduntur demonstrationes per methodum Indivisibilium. Sed quoniam durior est Indivisibilium hypothesis, & propterea methodus illa minus Geometrica censetur; analui demonstrationes rerum sequentium ad ultimas quantitatum

eva-

evanescentium summas & rationes, primasque nascentium, id est, LIBER
PRIMUS. ad limites summarum & rationum deducere; & propterea limitum illorum demonstrationes qua potui brevitate præmittere. His enim idem præstatur quod per methodum Indivisibilem; & principiis demonstratis jam tutius utemur. Proinde in sequentibus, si quando quantitates tanquam ex particulis constantes consideravero, vel si pro rectis usurpavero lineolas curvas; nolim indivisibilia, sed evanescentia divisibilia, non summas & rationes partium determinatarum, sed summarum & rationum limites semper intelligi; vimque talium demonstrationum ad methodum præcedentium Lemma- tum semper revocari.

Obiectio est, quod quantitatum evanescentium nulla sit ultima proportio; quippe quæ, antequam evanuerunt, non est ultima, ubi evanuerunt, nulla est. Sed & eodem argumento aque contendì posset nullam esse corporis ad certum locum pervenientis velocitatem ultimam: hanc enim, antequam corpus attingit locum, non esse ultimam, ubi attingit, nullam esse. Et responso facilis est: Per velocitatem ultimam intelligi eam, qua corpus movetur neque antequam attingit locum ultimum & motus cessat, neque postea, sed tunc cum attingit; id est, illam ipsam velocitatem quacum corpus attingit locum ultimum & quacum motus cessat. Et similiter per ultimam rationem quantitatum evanescentium, intelligendam esse rationem quantitatum non antequam evanescent, non postea, sed quacum evanescent. Pariter & ratio prima nascentium est ratio quacum nascuntur. Et summa prima & ultima est quacum esse (vel augeri & minui) incipiunt & cessant. Extat limes quem velocitas in fine motus attingere potest, non autem transgredi. Hæc est velocitas ultima. Et par est ratio limitis quantitatum & proportionum omnium incipientium & cessantium. Cumque hic limes sit certus & definitus, Problema est vere Geometricum eundem determinare. Geometrica vero omnia in aliis Geometricis determinandis ac demonstrandis legitime usurpantur.

Contendi etiam potest, quod si dentur ultimæ quantitatum evanescentium rationes, dabuntur & ultimæ magnitudines: & sic quantitas omnis constabit ex Indivisibilibus, contra quam *Euclides* de Incommensurabilibus, in libro decimo Elementorum, demonstravit. Verum hæc Obiectio falsæ innititur hypothesi. Ultimæ rationes illæ quibuscum quantitates evanescent, revera non sunt rationes quantitatum ultimarum, sed limites ad quos quantitatum sine limite decreascentium rationes semper appropinquant; & quas propius assequi possunt quam pro data quavis differentia, nunquam vero

E

trans-

DE MOTU transgredi, neque prius attingere quam quantitates diminuuntur in
CORPORUM. infinitum. Res clarius intelligetur in infinite magnis. Si quantitates duæ quarum data est differentia augeantur in infinitum, dabitur harum ultima ratio, nimirum ratio æqualitatis, nec tamen ideo dabuntur quantitates ultimæ seu maximæ quarum ista est ratio. Igitur in sequentibus, siquando facili rerum conceptui consulens dixerò quantitates quam minimas, vel evanescentes, vel ultimas; cave intelligas quantitates magnitudine determinatas, sed cogita semper diminuendas sine limite.


SECTIO II.

De Inventione Virium Centripetarum.

PROPOSITIO I. THEOREMA I.

Areas, quas corpora in gyros acta radiis ad immobile centrum virium ductis describunt, & in planis immobilibus consistere, & esse temporibus proportionales.

Dividatur tempus in partes æquales, & prima temporis parte describat corpus vi insita rectam AB . Idem secunda temporis parte, si nil impediret, recta pergeret ad c , (per Leg. 1.) describens lineam Bc æqualem ipsi AB ; adeo ut radii AS, BS, cS ad centrum actis, confectæ forent æquales areæ ASB, BSc . Verum ubi corpus venit ad B , agat vis centripeta impulsu unico sed magno, efficiatque ut corpus de recta Bc declinet & pergat in recta BC . Ipsi BS parallela agatur cC , occurrens BC in C ; & completa secunda temporis parte, corpus (per Legum Corol. 1.) reperietur in C , in eodem



eodem plano cum triangulo ASB . Junge SC & triangulum SEC , ob parallelas SB , Cc , æquale erit triangulo SBC , atque adeo etiam triangulo SAB . Simili argumento si vis centripeta successive agat in C , D , E , &c. faciens ut corpus singulis temporis particulis singulas describat rectas CD , DE , EF , &c. jacebunt hæ omnes in eodem plano; & triangulum SCD triangulo SBC , & SDE ipsi SCD , & SEF ipsi SDE æquale erit. Aequalibus igitur temporibus æquales areae in plano immoto describuntur: & componendo, sunt arearum summæ quævis $SADS$, $SAFS$ inter se, ut sunt tempora descriptionum. Augeatur jam numerus & minuatur latitudo triangulorum in infinitum; & eorum ultima perimeter ADF , (per Corollarium quartum Lemmatis tertii) erit linea curva: adeoque vis centripeta, qua corpus a tangente hujus curvæ perpetuo retrahitur, aget indefinenter; arcæ vero quævis descriptæ $SADS$, $SAFS$ temporibus descriptionum semper proportionales, erunt iisdem temporibus in hoc casu proportionales. *Q. E. D.*

Corol. 1. Velocitas corporis in centrum immobile attracti est in spatiis non resistentibus reciproce ut perpendicularum, a centro illo in Orbis tangentem rectilineam demissum. Est enim velocitas in locis illis A , B , C , D , E , ut sunt bases æqualium triangulorum AB , BC , CD , DE , EF ; & hæ bases sunt reciproce ut perpendiculara in ipsas demissa.

Corol. 2. Si arcum duorum æqualibus temporibus in spatiis non resistentibus ab eodem corpore successive descriptorum chordæ AB , BC compleantur in parallelogrammum $ABCV$, & hujus diagonalis BV in ea positione quam ultimo habet ubi arcus illi in infinitum diminuuntur, producat utrinque; transibit eadem per centrum virium.

Corol. 3. Si arcum æqualibus temporibus in spatiis non resistentibus descriptorum chordæ AB , BC ac DE , EF compleantur in parallelogramma $ABCV$, $DEFZ$, vires in B & E sunt ad invicem in ultima ratione diagonalium BV , EZ , ubi arcus illi in infinitum diminuuntur. Nam corporis motus BC & EF componuntur (per Legum Corol. 1.) ex motibus Bc , BU & Ef , EZ : atqui BU & EZ ipsi Cc & Ff æquales, in Demonstratione Propositionis hujus generabantur ab impulsibus vis centripetæ in B & E , ideoque sunt his impulsibus proportionales.

Corol. 4. Vires quibus corpora quælibet in spatiis non resistentibus a motibus rectilineis retrahuntur ac detorquentur in orbem curvos sunt inter se ut arcum æqualibus temporibus descriptorum sagittæ illæ quæ convergunt ad centrum virium, & chordas bifecant

DE MOTU
CORPORUM.

ubi arcus illi in infinitum diminuuntur. Nam hæ sagittæ sunt semisses diagonalium de quibus egimus in Corollario tertio.

Corol. 5. Ideoque vires eadem sunt ad vim gravitatis, ut hæ sagittæ ad sagittas horizonti perpendiculares arcuum Parabolicorum quos projectilia eodem tempore describunt.

Corol. 6. Eadem omnia obtinent per Legum Corol. iv. ubi plana in quibus corpora moventur, una cum centris virium quæ in ipsis sita sunt, non quiescunt, sed moventur uniformiter in directum.

PROPOSITIO II. THEOREMA II.

Corpus omne, quod movetur in linea aliqua curva in plano descripta, & radio ducto ad punctum vel immobile, vel motu rectilineo uniformiter progrediens, describit areas circa punctum illud temporibus proportionales, urgetur a vi centripeta tendente ad idem punctum.

Cas. 1. Nam corpus omne quod movetur in linea curva, detorqueatur de cursu rectilineo per vim aliquam in ipsum agentem (per Leg. 1.) Et vis illa qua corpus de cursu rectilineo detorqueatur, & cogitur triangula quam minima SAB , SBC , SBD , &c. circa punctum immobile S temporibus æqualibus æqualia describere, agit in loco B secundum lineam parallelam ipsi SC (per Prop. xl. Lib. r. Elem. & Leg. 11.) hoc est, secundum lineam BS ; & in loco C secundum lineam ipsi SD parallelam, hoc est, secundum lineam SC , &c. Agit ergo semper secundum lineas tendentes ad punctum illud immobile S . *Q. E. D.*

Cas. 2. Et, per Legum Corollarium quintum, perinde est si ve quiescat superficies in qua Corpus describit figuram rectilineam, si ve moveatur eadem una cum corpore, figura descripta, & puncto suo S uniformiter in directum.

Corol. 1. In Spatiis vel Mediis non resistentibus, si arcæ non sunt temporibus proportionales, vires non tendunt ad concursum radiorum; sed inde declinant in consequentia seu versus plagam in quam fit motus, si modo arearum descriptio acceleratur: sin retardatur, declinant in antecedentia.

Corol. 2. In Mediis etiam resistentibus, si arearum descriptio acceleratur, virium directiones declinant a concursu radiorum versus plagam in quam fit motus.

Scholium.

Scholium.

LIBER
PRIMUS.

Urgeri potest corpus a vi centripeta composita ex pluribus viribus. In hoc casu sensus Propositionis est, quod vis illa quæ ex omnibus componitur, tendit ad punctum *S*. Porro si vis aliqua agat perpetuo secundum lineam superficiæ descriptæ perpendiculariter; hæc faciet ut corpus deflectatur a plano sui motus; sed quantitatem superficiæ descriptæ nec augebit nec minuet, & propterea in compositione virium negligenda est.

PROPOSITIO III. THEOREMA III.

Corpus omne, quod radio ad centrum corporis alterius utcumque moti ducto describit areas circa centrum illud temporibus proportionales, urgetur vi composita ex vi centripeta tendente ad corpus illud alterum, & ex vi omni acceleratrice qua corpus illud alterum urgetur.

Sit corpus primum *L* & corpus alterum *T*: & (per Legum Corol. vi.) si vi nova, quæ æqualis & contraria sit illi qua corpus alterum *T* urgetur, urgeatur corpus utrumque secundum lineas parallelas; perget corpus primum *L* describere circa corpus alterum *T* areas easdem ac prius: vis autem, qua corpus alterum *T* urgebatur, jam destruetur per vim sibi æqualem & contrariam, & propterea (per Leg. i.) corpus illud alterum *T* sibi met ipsi jam relictum vel quiescet vel movebitur uniformiter in directum: & corpus primum *L* urgente differentia virium, id est, urgente vi reliqua perget areas temporibus proportionales circa corpus alterum *T* describere. Tendit igitur (per Theor. ii.) differentia virium ad corpus illud alterum *T* ut centrum. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si corpus unum *L* radio ad alterum *T* ducto describit areas temporibus proportionales; atque de vi tota (sive simpliciter, sive ex viribus pluribus, juxta Legum Corollarium secundum, composita,) qua corpus prius *L* urgetur, subducatur (per idem Legum Corollarium) vis tota acceleratrix qua corpus alterum urgetur: vis omnis reliqua qua corpus prius urgetur tendet ad corpus alterum *T* ut centrum.

Corol. 2. Et, si area illæ sunt temporibus quamproxime proportionales, vis reliqua tendet ad corpus alterum *T* quamproxime.

Corol. 3. Et vice versa, si vis reliqua tendit quamproxime ad corpus alterum *T* ut centrum, area illæ sunt temporibus quamproxime proportionales.

E 3

corpus

DE MOTU
CORPORUM. corpus alterum T , erunt areae illae temporibus quamproxime proportionales.

Corol. 4. Si corpus L radio ad alterum corpus T ducto describit areas quæ, cum temporibus collatæ, sunt valde inæquales; & corpus illud alterum T vel quiescit vel movetur uniformiter in directum: actio vis centripetæ ad corpus illud alterum T tendentis, vel nulla est, vel miscetur & componitur cum actionibus admodum potentibus aliarum virium: Visque tota ex omnibus, si plures sunt vires, composita, ad aliud (sive immobile sive mobile) centrum dirigitur. Idem obtinet, ubi corpus alterum motu quocunque movetur; si modo vis centripeta sumatur, quæ retiat post subductionem vis totius in corpus illud alterum T agentis.

Scholium.

Quoniam æquabilis arearum descriptio Index est Centri, quod vis illa respicit qua corpus maxime afficitur, quaque retrahitur a motu rectilineo & in orbita sua retinetur: quidni usurpemus in sequentibus æquabilem arearum descriptionem, ut Indicem Centri circum quod motus omnis circularis in spatiis liberis peragitur?

PROPOSITIO IV. THEOREMA IV.

Corporum, quæ diversos circulos æquali motu describunt, vires centripetas ad centra eorundem circulorum tendere; & esse inter se, ut sunt arcuum simul descriptorum quadrata applicata ad circulorum radios.

Tendunt hæ vires ad centra circulorum per Prop. II. & Corol. II. Prop. I; & sunt inter se ut arcuum æqualibus temporibus quam minimis descriptorum sinus versi per Corol. IV. Prop. I; hoc est, ut quadrata arcuum eorundem ad diametros circulorum applicata per Lem. VII: & propterea, cum hi arcus sint ut arcus temporibus quibuscunque æqualibus descripti, & diametri sint ut eorum radii, vires erunt ut arcuum quorumvis simul descriptorum quadrata applicata ad radios circulorum. *Q. E. D.*

Corol. 1. Igitur, cum arcus illi sint ut velocitates corporum, vires centripetæ sunt ut velocitatum quadrata applicata ad radios circulorum: hoc est, ut cum Geometris loquar, vires sunt in ratione composita ex duplicata ratione velocitatum directæ & ratione simplici radiorum inver se

Corol.

Corol. 2. Et, cum tempora periodica sint in ratione composita ex ratione radiorum directe & ratione velocitatum inverse, vires centripetæ sunt reciproce ut quadrata temporum periodicorum applicata ad circulorum radios; hoc est, in ratione composita ex ratione radiorum directe & ratione duplicata temporum periodicorum inverse.

Corol. 3. Unde, si tempora periodica æquantur & propterea velocitates sint ut radii; erunt etiam vires centripetæ ut radii: & contra.

Corol. 4. Si & tempora periodica & velocitates sint in ratione subduplicata radiorum; æquales erunt vires centripetæ inter se: & contra.

Corol. 5. Si tempora periodica sint ut radii & propterea velocitates æquales; vires centripetæ erunt reciproce ut radii: & contra.

Corol. 6. Si tempora periodica sint in ratione sesquuplicata radiorum & propterea velocitates reciproce in radiorum ratione subduplicata; vires centripetæ erunt reciproce ut quadrata radiorum; & contra.

Corol. 7. Et universaliter, si tempus periodicum sit ut Radii R potestas quælibet R^n , & propterea velocitates reciproce ut Radii potestas R^{n-1} ; erit vis centripeta reciproce ut Radii potestas R^{n-2} ; & contra.

Corol. 8. Eadem omnia de temporibus, velocitatibus, & viribus, quibus corpora similes figurarum quarumcunque similium, centraque in figuris illis similiter posita habentium, partes describunt, consequuntur ex Demonstratione præcedentium ad hosce casus applicata. Applicatur autem substituendo æquabilem arearum descriptionem pro æquabili motu, & distantias corporum a centrīs pro radii usurpando.

Corol. 9. Ex eadem demonstratione consequitur etiam; quod arcum, quem corpus in circulo data vi centripeta uniformiter revolvens tempore quovis describit, medius est proportionalis inter diametrum circuli, & descensum corporis eadem data vi eodemque tempore cadendo confectum.

Scholium.

Casus Corollarii sexti obtinet in corporibus cœlestibus (ut seorsum collegerunt etiam nostrates *Wrennus*, *Hookius* & *Halleus*) & propterea quæ spectant ad vim centripetam decrescentem in duplicata ratione distantiarum a centrīs, decrevi fufius in sequentibus exponere.

Porro

DE MOTU
CORPORUM.

Porro præcedentis propositionis. & corollariorum ejus beneficio, colligitur etiam proportio vis centripetæ ad vim quamlibet notam, qualis est ea Gravitatis. Nam si corpus in circulo Terræ concentrico vi gravitatis suæ revolvatur, hæc gravitas est ipsius vis centripeta. Datur autem, ex descensu gravium, & tempus revolutionis unius, & arcus dato quovis tempore descriptus, per huius Corol. ix. Et hujusmodi propositionibus *Hugenius*, in eximio suo Tractatu de *Horologio Oscillatorio*, vim gravitatis cum revolvantium viribus centrifugis contulit.

Demonstrari etiam possunt præcedentia in hunc modum. In circulo quovis describi intelligatur Polygonum laterum quotcunque. Et si corpus, in polygoni lateribus data cum velocitate movendo, ad ejus angulos singulos a circulo reflectatur, vis qua singulis reflexionibus impingit in circulum erit ut ejus velocitas: adeoque summa virium in dato tempore erit ut velocitas illa & numerus reflexionum conjunctim; hoc est (si polygonum detur specie) ut longitudo dato illo tempore descripta & longitudo eadem applicata ad Radium circuli; id est, ut quadratum longitudinis illius applicatum ad Radium: adeoque, si polygonum lateribus infinite diminutis coincidat cum circulo, ut quadratum arcus dato tempore descripti applicatum ad radium. Hæc est vis centrifuga, qua corpus urget circulum: & huic æqualis est vis contraria, qua circulus continuo repellit corpus centrum versus.


PROPOSITIO IV. PROBLEMA I.

Data quibuscunque in locis velocitate, qua corpus figuram datam viribus ad commune aliquod centrum tendentibus describit, centrum illud invenire.

Figuram descriptam tangant rectæ tres PT , TQV , VR , in punctis totidem P , Q , R , concurrentes in T & V . Ad tangentes erigantur perpendiculara PA , QB , RC , velocitatibus corporis in punctis illis P , Q , R , a quibus eriguntur reciproce proportionalia; id est, ita ut sit PA ad QB , ut velocitas in Q ad velocitatem in P , & QB ad RC ut velocitas in R ad velocitatem in Q . Per perpendicularorum terminos A , B , C ad angulos rectos ducantur AD , DBE , EC concurrentes in D & E : Et actæ TD , VE concurrent in centro quæsito S .

Nam

Nam perpendiculara a centro S in tangentes PT , QT demissa (per Corol. 1. Prop. 1.) sunt reciproce ut velocitates corporis in punctis P & Q ; adeoque per constructionem ut perpendiculara AP , BQ directe, id est ut perpendiculara a puncto D in tangentes demissa. Unde facile colligitur quod puncta S , D , T , sunt in una recta. Et simili argumento puncta S , E , V sunt etiam in una recta; & propterea centrum S in concursu rectarum TD , VE versatur. $Q. E. D.$




PROPOSITIO VI. THEOREMA V.

Si corpus in spatio non resistente circa centrum immobile in Orbe quocunque revolvatur, & arcum quemvis jamjam nascentem tempore quam minimo describat, & sagitta arcus duci intelligatur quæ chordam bisecet, & producta transeat per centrum virium: erit vis centripeta in medio arcus, ut sagitta directe & tempus bis inverse.

Nam sagitta dato tempore est ut vis (per Corol. 4. Prop. 1.) & augendo tempus in ratione quavis, ob auctum arcum in eadem ratione sagitta augetur in ratione illa duplicata (per Corol. 2. & 3. Lem. XI.) adeoque est ut vis semel & tempus bis. Subducatur duplicata ratio temporis utrinque, & fiet vis ut sagitta directe & tempus bis inverse. $Q. E. D.$

Idem facile demonstratur etiam per Corol. 4. Lem. X.

Corol. 1. Si corpus P revolvendo circa centrum S describat lineam curvam APQ , tangat vero recta ZPR curvam illam in puncto quovis P , & ad tangentem ab alio quovis Curvæ puncto Q agatur QR distantia SP parallela, ac demittatur QT perpendicularis ad distantiam illam SP : vis centripeta erit reciproce ut solidum SP quod $\times QT$ quod.



$\frac{QR}{SP^2}$ si modo solidi illius ea semper sumatur quintitas, quæ ultimo fit ubi coeunt puncta P & Q . Nam QR æqualis est

F

est

DE MOTU
CORPORUM

est sagittæ dupli arcus QP , in cujus medio est P , & duplum trianguli SQP sive $SP \times QT$, tempori quo arcus iste duplus describitur proportionale est, ideoque pro temporis exponente scribi potest.

Corol. 2. Eodem argumento vis centripeta est reciproce ut solidum $STq \times \frac{QPq}{QR}$, si modo ST perpendicularum sit a centro virium in Orbis tangentem PR demissum. Nam rectangula $ST \times QP$ & $SP \times QT$ æquantur.

Corol. 3. Si Orbis vel circulus est, vel angulum contactus cum circulo quam minimum continet, eandem habens curvaturam eundemque radium curvaturæ ad punctum contactus P , & si PV chorda sit circuli hujus a corpore per centrum virium acta: erit vis centripeta reciproce ut solidum $STq \times PV$. Nam PV est $\frac{QPq}{QR}$.


Corol. 4. Iisdem positis, est vis centripeta ut velocitas bis directe, & chorda illa inverse. Nam velocitas est reciproce ut perpendicularum ST per *Corol. 1 Prop. 1.*

Corol. 5. Hinc si detur figura quævis curvilinea APQ , & in ea detur etiam punctum S ad quod vis centripeta perpetuo dirigitur, inveniri potest lex vis centripetæ, qua corpus quodvis P a cursu rectilineti perpetuo retractum in figuræ illius perimetro detinebitur eamque revolvendo describet. Nimirum computandum est vel solidum $\frac{SPq \times QTq}{QR}$ vel solidum $STq \times PV$ huic vi reciproce proportionale. Ejus rei dabimus exempla in Problematis sequentibus.

PROPOSITIO VII. PROBLEMA II.

Gyretur corpus in circumferentia Circuli, requiritur Lex vis centripetæ tendentis ad punctum quodcunque datum.

Esto Circuli circumferentia $VQP A$, punctum datum ad quod vis seu ad centrum suum tendit S , corpus in circumferentia latum P , locus proximus in quem movebitur Q , & circuli tangens ad locum priorem PRZ . Per punctum S ducatur chorda PV , & acta circuli diametro VA jungatur AP , & ad SP demittatur perpendicularum QT , quod productum occurrat tangenti PR in Z ,



ac

ac denique per punctum Q agatur LR quæ ipsi SP parallela sit & occurrat tum circulo in L tum tangenti PZ in R . Et ob similia triangula ZQR , ZTP , VPA ; erit RP quad. hoc est QRL ad QT quad. ut AV quad. ad PV quad. Ideoque $QRL \times PV$ quad.

AV quad. æquatur QT quad. Ducantur hæc æqualia in SP quad. & punctis P & Q coeuntibus, scribatur PV pro RL .

Sic fiet $\frac{SP \text{ quad.} \times PV \text{ cub.}}{AV \text{ quad.}}$ æquale $\frac{SP \text{ quad.} \times QT \text{ quad.}}{QR}$. Ergo (per


Corol. 1 & 5 Prop. vi.) vis centripeta est reciproce ut $\frac{SPq \times PV \text{ cub.}}{AV \text{ quad.}}$ id est (ob datum AV quad.) reciproce ut quadratum distantiae seu altitudinis SP & cubus chordæ PV conjunctim. $Q. E. I.$

Idem aliter.

Ad tangentem PR productam demittatur perpendicularum ST , & ob similia triangula STP , VPA ; erit AV ad PV ut SP ad ST , ideoque $\frac{SP \times PV}{AV}$ æquale ST , & $\frac{SP \text{ quad.} \times PV \text{ cub.}}{AV \text{ quad.}}$ æquale $ST \text{ quad.} \times PV$. Et propterea (per Corol. 3 & 5 Prop. vi.) vis centripeta est reciproce ut $\frac{SPq \times PV \text{ cub.}}{AVq}$ hoc est, ob datam AV , reciproce ut $SPq \times PV \text{ cub.}$ $Q. E. I.$

Corol. 1. Hinc si punctum datum S ad quod vis centripeta semper tendit, locetur in circumferentia hujus circuli, puta ad V ; erit vis centripeta reciproce ut quadrato-cubus altitudinis SP .

Corol. 2. Vis qua corpus P in circulo $APTV$ circum virium centrum S revolvitur, est ad vim qua corpus idem P in eodem circulo & eodem tempore periodico circum aliud quodvis virium centrum R revolvitur potest ut $RP \text{ quad.} \times SP$ ad cubum rectæ SG quæ a primo virium centro S ad orbis tangentem PG ducitur, & distantiae corporis a secundo virium centro parallela est. Nam, per constructionem hujus Propositionis, vis prior est ad vim posteriorem, ut $RPq \times PT \text{ cub.}$ ad $SPq \times PV \text{ cub.}$ id



Scholium.


 LIBER
PRIMUS.

Et simili argumento corpus movebitur in Ellipsi vel etiam in Hyperbola vel Parabola, vi centripeta quæ sit reciproce ut cubus ordinatim applicatæ ad centrum virium maxime longinquum tendentis.

PROPOSITIO IX. PROBLEMA IV.

Gyretur corpus in Spirali PQS secante radios omnes SP, SQ, &c. in angulo dato: requiritur Lex vis centripetæ tendentis ad centrum Spiralis.

Detur angulus indefinite parvus PSQ , & ob datos omnes angu-



los dabitur specie figura $SPQRT$. Ergo datur ratio $\frac{QT}{QR}$, estque

$\frac{QT \text{ quad.}}{QR}$ ut QT , hoc est ut SP . Mutetur jam utcumque angulus PSQ ,

& recta QR angulum contactus QPR subtendens mutabitur (per Lemma xi.) in duplicata ratione ipsius PR vel QT . Ergo manebit

$\frac{QT \text{ quad.}}{QR}$ eadem quæ prius, hoc est ut SP . Quare $\frac{QT \times SP}{QR}$

est ut $SP \text{ cub.}$ adeoque (per Corol. 1 & 5. Prop. vi.) vis centripeta est reciproce ut cubus distantia SP . $Q.E.D.$

Idem aliter.

Perpendiculum ST in tangentem demissum, & circuli Spiralem tangentis chorda PV sunt ad altitudinem SP in datis rationibus; ideoque $SP \text{ cub.}$ est ut $ST \times PV$, hoc est (per Corol. 3 & 5 Prop. vi.) reciproce ut vis centripeta.

L E M M A XII.

Parallelogramma omnia, circa datæ Ellipseos vel Hyperbolæ diametros quasvis conjugatas descripta, esse inter se equalia.

Constat ex Conicis.

F 2

PRO-

PROPOSITIO X. PROBLEMA V.

Gyretur corpus in Ellipsi: requiritur Lex vis centripetæ tendentis ad centrum Ellipseos.

ad $\frac{CDq \times PFq}{PCq}$. Scribe $\mathcal{Q}R$ pro Pv & (per Lēmmā xii.) $BC \times CA$
pro $CD \times PF$, nec non, punctis P & \mathcal{Q} coeuntibus, $\mathcal{Q}PC$ pro
 vG , & ductis extremis & mediis in se mutuō, fiet $\frac{\mathcal{Q}tquad. \times PCq}{\mathcal{Q}R}$
æquale $\frac{2BCq \times CAq}{PC}$. Est ergo (per Corol. 5. Prop. v. i.) vis centri-
peta reciproce ut $\frac{2BCq \times CAq}{PC}$; id est (ob datum $2BCq \times CAq$)
reciproce ut $\frac{1}{PC}$; hoc est, directe ut distantia PC . $\mathcal{Q}E.I.$

Idem aliter.

In PG ab altera parte puncti t posita intelligatur tu æqualis ipsi tv ; deinde cape uv quæ sit ad vg ut est DC quad. ad PC quad. Et quoniam ex Conicis est Qv quad. ad PvG , ut DC quad. ad PC quad. crit Qv quad. æquale $Pv \times uv$. Unde quadratum chor-

dæ. arcus PQ erit æquale rectangulo VPV ; adeoque Circulus qui tangit Sectionem Conicam in P & transit per punctum Q , transibit etiam per punctum V . Coeant puncta P & Q , & hic circulus ejusdem erit curvaturæ cum sectione conica in P , & PV æqualis erit

$\frac{2DCq}{PC}$. Proinde vis qua corpus P in Ellipsi revolvitur erit reci-

proce ut $\frac{2DCq}{PC}$ in PFq (per Corol. 3. Prop. vi.) hoc est (ob datum

$2DCq$ in PFq) directe ut PC . *Q. E. I.*

Corol. 1. Est igitur vis ut distantia corporis a centro Ellipseos: & vicissim, si vis sit ut distantia, movebitur corpus in Ellipsi centrum habente in centro virium, aut forte in circulo, in quem utique Ellipsis migrare potest.

Corol. 2. Et æqualia erunt revolutionum in Ellipsis universis circum centrum idem factarum periodica tempora. Nam tempora illa in Ellipsis similibus æqualia sunt per Corol. 3. & 8. Prop. iv: in Ellipsis autem communem habentibus axem majorem, sunt ad invicem ut Ellipseon areæ totæ directe & arearum particula simul descriptæ inverse: id est, ut axes minores directe & corporum velocitates in verticibus principalibus inverse; hoc est, ut axes illi minores directe & ordinatim applicatæ ad axes alteros inverse; & propterea (ob æqualitatem rationum directarum & inversarum) in ratione æqualitatis.

Scholium.

Si Ellipsis centro in infinitum abeunte vertatur in Parabolam, corpus movebitur in hac Parabola, & vis ad centrum infinite distans jam tendens evadet æquabilis. Hoc est Theorema *Galilei*. Et si conic sectio Parabolica, inclinatione plani ad conum sectum mutata, vertatur in Hyperbolam, movebitur corpus in hujus perimetro, vi centripeta in centrifugam versa. Et quemadmodum in Circulo vel Ellipsi, si vires tendunt ad centrum figuræ in Abscissa positum, hæ vires augendo vel diminuendo Ordinatæ in ratione quacunque data, vel etiam mutando angulum inclinationis Ordinarum ad Abscissam, semper augentur vel diminuuntur in ratione distantiarum a centro, si modo tempora periodica manent æqualia: sic etiam in figuris universis, si Ordinatæ augeantur vel diminuuntur in ratione quacunque data, vel angulus ordinationis utcunque mutetur, manente tempore periodico; vires ad centrum quodcunque in Abscissa positum tendentes a binis quibusvis figurarum locis, ad quæ terminantur Ordinatæ correspondentibus Abscissarum punctis insistentes, augentur vel diminuuntur in ratione distantiarum a centro.

SECTIO


S E C T I O III.

De motu Corporum in Conicis Sectionibus excentricis.

PROPOSITIO XI. PROBLEMA VI.

Revolvatur corpus in Ellipsi: requiritur Lex vis centripetae tendentis ad umbilicum Ellipseos.

Esto Ellipseos umbilicus S . Agatur SP secans Ellipseos tum diametrum DK in E , tum ordinatim applicatam Qv in x , & compleatur parallelogrammum $QxPR$. Patet EP æqualem esse semiaxi majori AC , eo quod acta ab altero Ellipseos umbilico H linea HI ipsi EC parallela. (ob æquales CS , CH) æquantur ES , EI , adeo ut EP semisumma sit ipsarum PS , PI , id est (ob parallelas HI , PR & angulos æquales IPR , HPZ) ipsarum PS , PH , quæ conjunctim axem totum $2AC$ adæquant. Ad SP demittatur perpendicularis



ris QT , & Ellipseos latere recto principali (seu $\frac{2BCquad.}{AC}$) dicto L , erit $L \times QR$ ad $L \times Pv$ ut QR ad Pv , id est ut PE seu AC ad PC ; & $L \times Pv$ ad GvP ut L ad Gv ; & GvP ad Qv quad. ut PC quad. ad CD quad.; & (per Corol. 2 Lem. VII.) Qv quad. ad Qx quad. punctis Q & P coeuntibus, est ratio aequalitatis; & Qx quad. seu Qv quad. est ad QT quad. ut EP quad. ad PF quad. id est ut CA quad. ad PF quad. live (per Lem. XII.) ut CD quad. ad CB quad. Et conjunctis his omnibus rationibus, $L \times QR$ sit ad QT quad. ut $AC \times L \times PCq. \times CDq.$ seu $2CBq. \times PCq.$ ad $PC \times Gv \times CDq. \times CBq.$ live ut $2PC$ ad Gv . Sed,

Sed, punctis Q & P coeuntibus, æquantur $2PC$ & Gv . Ergo & his proportionalia $L \times QR$ & $2T$ quad. æquantur. Ducantur hæc æqualia in $\frac{SPq}{QR}$ & fiet $L \times SPq$. æquale $\frac{SPq \times QTq}{QR}$. Ergo (per Corol. 1. & 5. Prop. vi.) vis centripeta reciproce est ut $L \times SPq$. id est, reciproce in ratione duplicata distantie SP . $Q.E.I.$

Idem aliter.

Cum vis ad centrum Ellipseos tendens qua corpus P in Ellipsi illa revolvi potest, sit (per Corol. 1. Prop. x.) ut CP distantia corporis ab Ellipseos centro C ; ducatur CE parallela Ellipseos tangenti PR : & vis qua corpus idem P , circum aliud quodvis Ellipseos punctum S revolvi potest, si CE & PS concurrant in E , erit ut $\frac{PE \text{ cub.}}{SPq}$ (per Corol. 3. Prop. vii.) hoc est, si punctum S sit umbilicus Ellipseos, adeoque PE detur, ut SPq reciproce. $Q.E.I.$

Eadem brevitate qua traduximus Problema quintum ad Parabolam, & Hyperbolam, liceret idem hic facere: verum ob dignitatem Problematis & usum ejus in sequentibus, non pigebit casus ceteros demonstratione confirmare.

PROPOSITIO XII. PROBLEMA VII.

Moveatur corpus in Hyperbola: requiritur Lex vis centripetæ tendentis ad umbilicum figuræ.

Sunto CA , CB semi-axes Hyperbolæ; PG , KD diametri conjugatæ; PF , Qf perpendicularia ad diametros; & Qv ordinatim applicata ad diametrum GP . Agatur SP secans cum diametrum DK in E , tum ordinatim applicatam Qv in x , & compleatur parallelogrammum $QRPx$. Patet EP æqualem esse semiaxi transverso AC , eo quod, acta ab altero Hyperbolæ umbilico H linea HI ipsi EC parallela, ob æquales CS , CH , æquantur ES , EI ; adeo ut EP semidifferentia sit ipsarum PS , PI , id est (ob parallelas IH , PR & angulos æquales IPR , HPZ) ipsarum PS , PH , quarum differentia axem totum $2AC$ adæquat. Ad SP demittatur perpendicularis QT . Et Hyperbolæ latere recto principali (seu $\frac{2BCq}{AC}$) dicto L , erit $L \times QR$ ad $L \times Pv$ ut QR ad Pv , id est, ut PE seu AC ad PC ; Et $L \times Pv$ ad Gvp ut L ad Gv ;

Corol. 1. Ex tribus novissimis Propositionibus consequens est, ^{LIBER PRIMUS.} quod si corpus quodvis P , secundum lineam quamvis rectam PR , quacunque cum velocitate exeat de loco P , & vi centripeta quæ sit reciproce proportionalis quadrato distantiae locorum a centro, simul agitur; movebitur hoc corpus in aliqua sectionum Conicarum umbilicum habente in centro virium; & contra. Nam datis umbilico & puncto contactus & positione tangentis, describi potest sectio Conica quæ curvaturam datam ad punctum illud habebit. Datur autem curvatura ex data vi centripeta: & Orbis duo se mutuo tangentes, eadem vi centripeta describi non possunt.

Corol. 2. Si velocitas, quacum corpus exit de loco suo P , ea sit, qua lineola PR in minima aliqua temporis particula describi possit, & vis centripeta potis sit eodem tempore corpus idem movere per spatium QR : movebitur hoc corpus in Conica aliqua sectione, cujus latus rectum principale est quantitas illa $\frac{QTq}{QR}$ quæ ultimo fit ubi lineolæ PR , QR in infinitum diminuuntur. Circulum in his Corollariis refero ad Ellipsin, & casum excipio ubi corpus recta descendit ad centrum.

PROPOSITIO XIV. THEOREMA VI.

Si corpora plura revolvantur circa centrum commune, & vis centripeta sit reciproce in duplicata ratione distantiae locorum a centro; dico quod Orbium Latera recta principalia sunt in duplicata ratione arearum quas corpora, radiis ad centrum ductis, eodem tempore describunt.

Nam, per Corol. 2. Prop. XIII. Latus rectum L æquale est quantitati $\frac{QTq}{QR}$ quæ ultimo fit ubi coeunt puncta P & Q . Sed linea minima QR , dato tempore, est ut vis centripeta generans, hoc est (per Hypothesin) reciproce ut SPq . Ergo $\frac{QTq}{QR}$ est ut $QTq \times SPq$. hoc est, latus rectum L in duplicata ratione areæ $QT \times SP$. Q.E.D.

G 3

Corol.

DE MOTU
CORPORUM.

Corol. Hinc ellipseos area tota, eique proportionale rectangulum sub axibus, est in ratione composita ex subduplicata ratione lateris recti & ratione temporis periodici. Namque area tota est ut area $\mathcal{Q}T \times SP$, quæ dato tempore describitur, ducta in tempus periodicum.

PROPOSITIO XV. THEOREMA VII.

Iisdem positis, dico quod Tempora periodica in Ellipsis sunt in ratione sesquuplicata majorum axium.

Namque axis minor est medius proportionalis inter axem majorem & latus rectum, atque adeo rectangulum sub axibus est in ratione composita ex subduplicata ratione lateris recti & sesquuplicata ratione axis majoris. Sed hoc rectangulum, per Corollarium Prop. XIV. est in ratione composita ex subduplicata ratione lateris recti & ratione periodici temporis. Dematur utrobique subduplicata ratio lateris recti, & manebit sesquuplicata ratio majoris axis æqualis rationi periodici temporis. *Q. E. D.*

Corol. Sunt igitur tempora periodica in Ellipsis eadem ac in Circulis, quorum diametri æquantur majoribus axibus Ellipseon.


PROPOSITIO XVI. THEOREMA VIII.

Iisdem positis, & actis ad corpora lineis rectis, quæ ibidem tangant Orbitas, demissisque ab umbilico communi ad has tangentes perpendicularibus: dico quod Velocitates corporum sunt in ratione composita ex ratione perpendicularorum inverse & subduplicata ratione laterum rectorum principalium directe.

Ab umbilico S ad tangentem PR demitte perpendicularum ST & velocitas corporis P erit reciproce in subduplicata ratione quantitatis $\frac{STq}{L}$. Nam velocitas illa est ut arcus quam minimus PQ in data temporis particula descriptus, hoc est (per Lem. VII.) ut tangens PR , id est (ob proportionales PR ad $\mathcal{Q}T$ & SP ad ST) ut $\frac{SP \times \mathcal{Q}T}{ST}$, five ut ST reciproce & $SP \times \mathcal{Q}T$ directe; esque

SP

$SP \times QT$ ut area dato tempore descripta, id est, per Prop. xiv. LIBER PRIMUS.
 in subduplicata ratione lateris recti. $Q. E. D.$



Corol. 1. Latera recta principalia sunt in ratione composita ex duplicata ratione perpendicularorum & duplicata ratione velocitatum.

Corol. 2. Velocitates corporum in maximis & minimis ab umbilico communi distantis, sunt in ratione composita ex ratione distantiarum inverſe & ſubduplicata ratione laterum rectorum principalium directe. Nam perpendiculara jam ſunt ipſæ diſtantiæ.

Corol. 3. Ideoque velocitas in Conica ſeſtione, in maxima vel minima ab umbilico diſtantiâ, eſt ad velocitatem in Circulo in eadem à centro diſtantiâ, in ſubduplicata ratione lateris recti principalis ad duplam illam diſtantiâ.

Corol. 4. Corporum in Ellipſibus gyantium velocitates in mediocribus diſtantiis ab umbilico communi ſunt eadem quæ corporum gyantium in Circulis ad eaſdem diſtantiâs; hoc eſt (per Corol. 6. Prop. iv.) reciproce in ſubduplicata ratione diſtantiarum. Nam perpendiculara jam ſunt ſemi-axes minores; & hi ſunt ut mediæ proportionales inter diſtantiâs & latera recta. Componatur hæc ratio inverſe cum ſubduplicata ratione laterum rectorum directe, & fiet ratio ſubduplicata diſtantiarum inverſe.

Corol. 5. In eadem figura, vel etiam in figuris diverſis, quarum latera

DE MOTU latera recta principalia sunt æqualia, velocitas corporis est reciproce
CORPORVM. ut perpendicularum demissum ab umbilico ad tangentem.

Corol. 6. In Parabola, velocitas est reciproce in subduplicata ratione distantiae corporis ab umbilico figuræ; in Ellipsi magis variatur, in Hyperbola minus, quam in hac ratione. Nam (per *Corol. 2. Lem. xiv.*) perpendicularum demissum ab umbilico ad tangentem Parabolæ est in subduplicata ratione distantiae. In Hyperbola perpendicularum minus variatur, in Ellipsi magis.

Corol. 7. In Parabola velocitas corporis ad quamvis ab umbilico distantiam, est ad velocitatem corporis revolventis in Circulo ad eandem a centro distantiam, in subduplicata ratione numeri binarii ad unitatem; in Ellipsi minor est, in Hyperbola major quam in hac ratione. Nam per hujus Corollarium secundum, velocitas in vertice Parabolæ est in hac ratione, & per Corollaria sexta hujus & Propositionis quartæ, servatur eadem proportio in omnibus distantiiis. Hinc etiam in Parabola velocitas ubique æqualis est velocitati corporis revolventis in Circulo ad dimidiam distantiam, in Ellipsi minor est, in Hyperbola major.

Corol. 8. Velocitas gyrantis in Sectione quavis Conica est ad velocitatem gyrantis in Circulo in distantia dimidii lateris recti principalis Sectionis, ut distantia illa ad perpendicularum ab umbilico in tangentem Sectionis demissum. Patet per Corollarium quintum.

Corol. 9. Unde cum (per *Corol. 6. Prop. iv.*) velocitas gyrantis in hoc Circulo sit ad velocitatem gyrantis in Circulo quovis alio, reciproce in subduplicata ratione distantiarum; fiet ex æquo velocitas gyrantis in Conica sectione ad velocitatem gyrantis in Circulo in eadem distantia, ut media proportionalis inter distantiam illam communem & semissem principalis lateris recti sectionis, ad perpendicularum ab umbilico communi in tangentem sectionis demissum.

PROPOSITIO XVII. PROBLEMA IX.

Posito quod vis centripeta sit reciproce proportionalis quadrato distantiae locorum a centro, & quod vis illius quantitas absoluta sit cognita; requiritur Linea quam corpus describit, de loco dato, cum data velocitate, secundum datam rectam egrediens.

Vis centripeta tendens ad punctum *S* ea sit qua corpus *p* in orbita quavis data *pq* gyretur, & cognoscatur hujus velocitas in loco *p*.
De

De Motu
Corporum in casu hujus Corollarii, fit $\mathcal{DS} + \mathcal{DH}$ ad \mathcal{DH} ut 4 \mathcal{DS} ad L & divisim \mathcal{DS} ad \mathcal{DH} ut 4 $\mathcal{DS} - L$ ad L .


Corol. 2. Unde si datur corporis velocitas in vertice principali \mathcal{D} , invenietur Orbita expedite, capiendò scilicet latus rectum ejus, ad duplam distantiam \mathcal{DS} , in duplicata ratione velocitatis hujus datæ ad velocitatem corporis in Circulo, ad distantiam \mathcal{DS} , gyrantis (per *Corol. 3. Prop. xvi.*) dein \mathcal{DH} ad \mathcal{DS} ut latus rectum ad differentiam inter latus rectum & 4 \mathcal{DS} .

Corol. 3. Hinc etiam si corpus moveatur in Sectione quacunque Conica, & ex Orbe suo impulsu quocunque exturbetur; cognosci potest Orbis in quo postea cursum suum peraget. Nam componendo proprium corporis motum cum motu illo quem impulsus solus generaret, habebitur motus quocum corpus de dato impulsu loco, secundum rectam positione datam, exhibet.

Corol. 4. Et si corpus illud vi aliqua extrinsecus impressa continuo periturbetur, innosceat cursus quam proxime, colligendo mutationes quas vis illa in punctis quibusdam inducit, & ex seriei analogia mutationes continuas in locis intermediis aestimando.

Scholium.

Si corpus P vi centripeta ad punctum quodcunque datum R tendente moveatur in perimetro datæ cujuscunque Sectionis conicæ cujus centrum sit C , & requiratur Lex vis centripetæ: ducatur CG radio RP parallela, & Orbis tangenti PG occurrens in G ; & vis illa (per *Corol. 1* & *Schol. Prop. x*, & *Corol. 3. Prop. vii.*) erit ut $\frac{CG}{RP}$ quad.




S E C T I O I V .

LIBER
PRIMUS.

De Inventione Orbium Ellipticorum, Parabolicorum & Hyperbolicorum ex umbilico dato.

L E M M A X V .

Si ab Ellipseos vel Hyperbolæ cujusvis umbilicis duobus S, H, ad punctum quodvis tertium V instentur rectæ duæ SV, HV, quarum una HV æqualis sit axi principali figuræ, altera SV a perpendicularo TR in se demisso bisecetur in T; perpendicularum illud TR sectionem Conicam alicubi tanget: & contra, si tangit, erit HV æqualis axi principali figuræ.



Secet enim perpendicularum TR rectam HV productam, si opus fuerit, in R , & jungatur SR . Ob æquales TS , TV , æquales erunt & rectæ SR , VR & anguli TRS , TRV . Unde punctum R erit ad Sectionem Conicam, & perpendicularum TR tanget eandem: & contra. *Q. E. D.*


PROPOSITIO XVIII. PROBLEMA X.

Datis umbilico & axibus principalibus describere Trajectorias Ellipticas & Hyperbolicas, quæ transibunt per puncta data, & rectas positione datas contingent.

Sit S communis umbilicus figurarum; AB longitudo axis principalis Trajectoriæ cujusvis; P punctum per quod Trajectoria debet transire; & TR recta quam debet tangere. Centro P intervallo $AB - SP$, si orbita sit ellipsis, vel $AB + SP$, si ea sit Hyperbola, describatur circulus HG . Ad tangentem TR demittatur perpendicularum ST , & producatur idem ad V , ut sit TV æqualis ST ; centroque V & intervallo AB describatur circulus FH . Hac
H 2
methodo

DE MOTU
CORPORUM


methodo sive dentur duo puncta P, p , sive duæ tangentes TR, tr , sive punctum P & tangens TR , describendi sunt circuli duo. Sit *Heorum* interseccio communis, & umbilicis S, H , axe illo dato describatur Trajectoria. Dico factum. Nam Trajectoria descripta (eo quod $PH + SP$ in Ellipsi, & $PH - SP$ in Hyperbola æquatur axi) transibit per punctum P , & (per Lemma superius) tanget rectam TR . Et eodem argumento vel transibit eadem per puncta duo P, p , vel tanget rectas duas TR, tr . Q.E.D.



PROPOSITIO XIX. PROBLEMA XI.

Circa datum umbilicum Trajectoriam Parabolicam describere, quæ transibit per puncta data, & rectas positione datas continget.


Sit S umbilicus, P punctum & TR tangens Trajectoriæ describendæ. Centro P , intervallo PS describe circumulum FG . Ab umbilico ad tangentem demitte perpendicularem ST , & produce eam ad V , ut sit TV æqualis ST . Eodem modo describendus est alter circumulus fg , si datur alterum punctum p , vel inveniendum alterum punctum v , si datur altera tangens tr ; dein ducenda recta IF quæ tangat duos circulos FG, fg , si dantur duo puncta P, p , vel transeat per duo puncta V, v , si dantur duæ tangentes TR, tr , vel tangat circumulum FG & transeat per punctum V , si datur punctum P & tangens TR . Ad FI demitte perpendicularem SI , eamque bifeca in K ; & axe SK , vertice principali K describatur Parabola. Dico factum. Nam Parabola, ob æquales SK & IK , SP & FP , transibit per punctum P ; & (per Lemmatis xiv Corol. 3.) ob æquales ST & TV & angulum rectum STR , tanget rectam TR . Q.E.D.



PRO.

DE MOTU CONFORMUM $Vk - VK$ ad $kS - KS$, id est ut $2 VX$ ad $2 KX$ & $2 KX$ ad $2 SX$, adeoque ut VX ad HX & HX ad SX , familia erunt tri-angula VXH , HXS , & propterea VH erit ad SH ut VX ad XH , adeoque ut VK ad KS . Habet igitur Trajectoriæ descriptæ axis principalis VH eam rationem ad ipsius umbilicorum distantiam SH , quam habet Trajectoriæ describendæ axis principalis ad ipsius umbilicorum distantiam, & propterea ejusdem est speciei. Insuper cum VH, vH , æquantur axi principali, & VS, vS a rectis TR, tr perpendiculariter bisecentur, liquet, ex Lemmate xv, rectas illas Trajectoriam descriptam tangere. *Q. E. F.*


Cas. 3. Dato umbilico S describenda sit Trajectoria quæ rectam TR tangit in puncto dato R . In rectam TR demitte perpendicularem ST , & produc eandem ad V , ut sit TV æqualis ST . Junge VR , & rectam VS infinite productam seca in K & k , ita ut sit VK ad SK & Vk ad Sk ut Ellipseos describendæ axis principalis ad distantiam umbilicorum; circuloque super diametro Kk descripto, secetur producta recta VR in H , & umbilicis S, H , axe principali rectam VH æquante, describatur Trajectoria. Dico factum. Namque VH esse ad SH ut VK ad SK , atque adeo ut axis principalis Trajectoriæ describendæ ad distantiam umbilicorum ejus, patet ex demonstratis in Casu secundo, & propterea Trajectoriam descriptam ejusdem esse speciei cum describenda; rectam vero TR qua angulus $VR S$ bisecatur, tangere Trajectoriam in puncto R , patet ex Conicis. *Q. E. F.*



Cas. 4. Circa umbilicum S describenda jam sit Trajectoria APB , quæ tangat rectam TR , transeatque per punctum quodvis P extra tangentem datum, quæque similis sit Figuræ apb , axe principali ab & umbilicis s, b descriptæ. In tangentem TR demitte perpendicularum ST , & produc idem ad V , ut sit TV æqualis ST . Angulis autem VSP , SVP fac angulos bsq , sbq æquales; centroque q & intervallo quod sit ad ab ut SP ad VS describe circulum secantem Figuram apb in p . Junge sp & age SH quæ sit ad sb ut est SP ad sp , quæque angulum PSH angulo psb & angulum VSH angulo psq æquales constituat. Denique umbilicis S, H , & axe principali AB distantiam VH æquante, describatur scilicet Conica. Dico factum. Nam si agatur sv quæ sit ad sp ut est sb ad

ad

ad sq , quæque constituat angulum vsp angulo bsq & angulum vsb angulo psq æquales, triangula svb , spq erunt similia & pro-
 pterea vb erit ad pq ut est sb ad sq , id est (ob similia triangula



VSP , bsq) ut est VS ad SP seu ab ad pq . Aequantur ergo vb & ab . Porro ob similia triangula VSH , vsb , est VH ad SH ut vb ad sb , id est, axis Conicæ sectionis jam descriptæ ad illius umbilicorum intervallum, ut axis ab ad umbilicorum intervallum sh ; & propterea Figura jam decripta similis est Figuræ apb . Transít autem hæc Figura per punctum P , eo quod triangulum PSH simile sit triangulo psb ; & quia VH æquatur ipsius axi & VS bifecatur perpendiculariter a recta TR , tangit eadem rectam TR .
 Q. E. F.


L E M M A XVI.

A datis tribus punctis ad quartum non datum inflectere tres rectas quarum differentiæ vel dantur vel nullæ sunt.

Cas. 1. Sunto puncta illa data A , B , C & punctum quartum Z , quod invenire oportet; Ob datam differentiam linearum AZ , BZ , locabitur punctum Z in Hyperbola cujus umbilici sunt A & B , & principalis axis differentia illa data. Sit axis ille MN . Cape P M.
 ad

DE MOTU
CORPORUM

ad MA ut est MN ad AB , & erecta PR perpendiculari ad AB , demissaque ZR perpendiculari ad PR ; erit, ex natura hujus Hyperbolæ, ZR ad AZ ut est MN ad AB . Simili discursu punctum Z locabitur in alia Hyperbola, cujus umbilici sunt A, C & principalis axis differentia inter AZ & CZ , ducique potest QS ipsi AC perpendicularis, ad quam si ab Hyperbolæ hujus puncto quovis Z demittatur normalis ZS , hæc fuerit ad AZ ut est differentia inter AZ & CZ ad AC . Dantur ergo rationes ipsarum ZR & ZS ad AZ & idcirco datur earundem ZR & ZS ratio ad invicem; ideoque si rectæ RP , SQ concurrant in T , & agatur TZ , figura $TRZS$, dabitur speciei, & rectæ TZ in qua punctum Z alicubi locatur, dabitur positio. Eadem methodo per Hyperbolam tertiam, cujus umbilici sunt B & C & axis principalis differentia rectarum BZ , CZ , inveniri potest alia recta in qua punctum Z locatur. Habitis autem duobus Locis rectilineis, habetur punctum quaesitum Z in eorum intersectione. *Q.E.I.*



Caf. 2. Si duæ ex tribus lineis, puta AZ & BZ æquantur, punctum Z locabitur in perpendicularo bifecante distantiam AB , & locus alius rectilineus invenietur ut supra. *Q.E.I.*

Caf. 3. Si omnes tres æquantur, locabitur punctum Z in centro Circuli per puncta A, B, C transeuntis. *Q.E.I.*

Solvitur etiam hoc Lemma problematicum per Librum Tactionum *Apollonii a Vieta* restitutum.


PROPOSITIO XXI. PROBLEMA XIII.

Trajectoriam circa datum umbilicum describere, quæ transibit per puncta data & rectas positione datas continget.

Detur umbilicus S , punctum P , & tangens TR , & invenendus sit umbilicus alter H . Ad tangentem demitte perpendicularum ST , & produci idem ad T , ut sit TT , æqualis ST , & erit TH æqualis axi principali. Junge SP , HP , & erit SP differentia inter HP & axem principalem. Hoc modo si dentur plures tangen-


tes

tes TR vel plura puncta P , devenietur semper ad lineas totidem TH , vel PH , a dictis punctis T vel P ad umbilicum H ductas, quæ vel æquantur axibus, vel datis longitudinibus SP differunt ab iisdem, atque adeo quæ vel æquantur sibi invicem, vel datas habent differentias; & inde, per Lemma superius, datur umbilicus ille alter H . Habitis autem umbilicis una cum axis longitudine (quæ vel TH ; vel, si Trajectoria Ellipsis est, $PH + SP$; sin Hyperbola, $PH - SP$) habetur Trajectoria. *Q. E. I.*



Scholium.

Casus ubi dantur tria puncta sic solvitur expeditius. Dentur puncta B, C, D . Junctas BC, CD produc ad E, F , ut sit EB ad EC ut SB ad SC , & FC ad FD ut SC ad SD . Ad EF ductam & productam demitte normales SG, BH , inque GS infinite producta cape GA ad AS & Ga ad aS ut est HB ad BS ; & erit A vertex, & Aa axis principalis Trajectoriæ: quæ, perinde ut GA major, æqualis, vel minor fuerit quam AS , erit Ellipsis, Parabola vel Hyperbola; puncto a in primo casu cadente ad eandem partem lineæ GF cum puncto A ; in secundo casu abeunte in infinitum; in tertio cadente ad contrariam partem lineæ GF . Nam si demittantur ad GF perpendiculara



CI, DK , erit IC ad HB ut EC ad EB , hoc est, ut SC ad SB ; & vicissim IC ad SC ut HB ad SB sive ut GA ad SA . Et simili argumento probabitur esse KD ad SD in eadem ratione. Jacent ergo puncta B, C, D in Coni sectione circa umbilicum S ita descripta, ut rectæ omnes ab umbilico S ad singula Sectionis puncta ductæ, sint ad perpendiculara a punctis iisdem ad rectam GF demissa in data illa ratione.

Methodo haud multum dissimili hujus problematis solutionem tradit Clarissimus Geometra *de la Hire*, Copicorum suorum Lib. VIII. Prop. XXV.


S E C T I O V.

Inventio Orbium ubi umbilicus neuter datur.

L E M M A XVII.

Si a data Conicæ Sectionis puncto quovis P, ad Trapezii alicujus ABCD, in Conica illa sectione inscripti, latera quatuor infinite producta AB, CD, AC, DB, totidem rectæ PQ, PR, PS, PT in datis angulis ducantur, singule ad singula: rectangulum ductarum ad opposita duo latera $PQ \times PR$, erit ad rectangulum ductarum ad alia duo latera $PS \times PT$ in data ratione.

Cas. i. Ponamus primo lineas ad opposita latera ductas parallelas esse alterutri reliquorum laterum, puta PQ & PR lateri AC , & PS ac PT lateri AB . Sintque insuper latera duo ex oppositis, puta AC & BD , sibi invicem parallela. Et recta quæ bisecat parallela illa latera erit una ex diametris Conicæ sectionis & bisecabit etiam RQ . Sit O punctum in quo RQ bisecatur, & erit PO ordinatim applicata ad diametrum illam. Producat PO ad K ut sit OK æqualis PO , & erit OK ordinatim applicata ad contrarias partes diametri. Cum igitur puncta A, B , & K sint ad Conicam sectionem, & PK secet AB in dato angulo, erit (per Prop. 17. & 18. Lib. III. Conicorum Apollonii) rectangulum PQK ad rectangulum AQB in data ratione. Sed QK & PR æquales sunt, utpote æqualium OK, OP , & OQ, OR differentiarum, & inde etiam rectangula PQK & $PQ \times PR$ æqualia sunt; atque adeo rectangulum $PQ \times PR$ est ad rectangulum AQB , hoc est ad rectangulum $PS \times PT$ in data ratione. *Q.E.D.*

*Cas.*

CURVARUM PIA COMPARARI POSSUNT.







Sit jam aGD vel PGD sitq; ejus Centrum A. Axis Ka. Vertex a. Semiaxis conjugatus ordinata rectangula BD. v. et Area ABDF vel aBDG vel aBDG occurrens abscissæ AB in T. & compleatur parallelogrammum ABDQ. Cum Conicarum dicatur posteriori Abscissa z Ordinata x, et Area σ Priori an prior de posteriori subduci debeat. Et in Forma sexta scribi

CURVARUM FORMÆ AREÆ

I	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$		
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$		
	3	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$		
II	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$	x, y	
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$		
	3	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$	x, y	
III	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$	EDT vel in APDB + TDB Fig. 3. 4.	
		vel	$t = \frac{dx^2}{\sqrt{x}}$ in aGDA + $\frac{dx^2}{\sqrt{x}}$ Fig. 3. 4.	
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$	GDB. Fig. 3. 4.	
		vel	aAGDK. Fig. 3. 4.	
	3	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$	BDFK. Fig. 3. 4.	
IV	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$	AD vel in aGDA Fig. 3. 4.	
		vel	$\frac{dx^2}{\sqrt{x}}$ in aGDA Fig. 3. 4.	
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$	OD vel in AODGa Fig. 3. 4.	
		vel	OGa Fig. 3. 4.	
	3	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$	aDGa + Δ aDB Fig. 3. 4.	
	4	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x}} = y$		


RESIDUUM TERBOLA COMPARARI POSSUNT.

CURVARUM FORMAE AREAE


V	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
VI	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
VII	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} = t$	
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	3	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	4	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
VIII	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} = t$	
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	3	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	4	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
IX	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
X	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
XI	1	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	2	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		
	3	$\frac{dx^{n+1}}{x + \sqrt{x^2 + y^2} + y^2} =$		

Caf. 2. Ponamus jam Trapezii latera opposita AC & BD non esse parallela. Age Bd parallelam AC & occurrentem tum rectæ ST in t , tum Conicæ sectioni in d . Junge Cd secantem PQ in r , & ipsi PQ parallelam age DM secantem Cd in M & AB in N .

Jam ob similia triangula BTt , DBN ; est Bt seu PQ ad Tt ut DN ad NB . Sic & Rr est ad AQ seu PS ut DM ad AN . Ergo, ducendo antecedentes in antecedentes & consequentes in consequentes, ut rectangulum PQ in Rr est ad rectangulum PS in Tt , ita rectangulum NDM est ad rectangulum ANB , & (per *Caf. 1.*) ita rectangulum PQ in Pr est ad rectangulum PS in Pt , ac divisim ita rectangulum $PQ \times PR$ est ad rectangulum $PS \times PT$. *Q.E.D.*



Caf. 3. Ponamus denique lineas quatuor PQ , PR , PS , PT non esse parallelas lateribus AC , AB , sed ad ea utcumque inclinatas. Earum vice age Pq , Pr parallelas ipsi AC ; & Ps , Pt parallelas ipsi AB ; & propter datos angulos triangulorum PQq , PRr , PSs , PTt , dabuntur rationes PQ ad Pq , PR ad Pr , PS ad Ps , & PT ad Pt ; atque adeo rationes compolitæ $PQ \times PR$ ad $Pq \times Pr$, & $PS \times PT$ ad $Ps \times Pt$. Sed, per superius demonstrata, ratio $Pq \times Pr$ ad $Ps \times Pt$ data est: Ergo & ratio $PQ \times PR$ ad $PS \times PT$. *Q.E.D.*



L E M M A XVIII.


Iisdem positis, si rectangulum ductarum ad opposita duo latera Trapezii $PQ \times PR$ sit ad rectangulum ductarum ad reliqua duo latera $PS \times PT$ in data ratione; punctum P, a quo lineæ ducuntur, tanget Conicam sectionem circa Trapezium descriptam.

I. 2

Per

DE MOTU
CORPORUM.

Per puncta A, B, C, D & aliquod infinitorum punctorum P , puta p , concipe Conicam sectionem describi: dico punctum P hanc semper tangere. Si negas, junge AP secantem hanc Conicam sectionem alibi quam in P , si fieri potest, puta in b . Ergo si ab his punctis p & b ducantur in datis angulis ad latera Trapezii rectæ pq, pr, ps, pt , & bk, br, bs, bd ; erit ut $bk \times br$ ad $bs \times bd$ ita (per Lem. xvii) $pq \times pr$ ad $ps \times pt$, & ita (per Hypoth.) $PQ \times PR$ ad $PS \times PT$.



Est & propter similitudinem Trapeziorum $bkAs$, $PQAS$, ut bk ad bs ita PQ ad PS . Quare, applicando terminos prioris proportionis ad terminos correspondentes hujus, erit br ad bd ut PR ad PT . Ergo Trapezia æquiangula $Drbd$, $DRPT$ similia sunt, & eorum diagonales Db , DP propterea coincidunt. Incidit itaque b in intersectionem rectarum AP , DP adeoque coincidit cum puncto P . Quare punctum P , ubicunque sumatur, incidit in assignatam Conicam sectionem. *Q.E.D.*

Corol. Hinc si rectæ tres PQ, PR, PS a puncto communi P ad alias toridem positione datas rectas AB, CD, AC , singulæ ad singulas, in datis angulis ducantur, fitque rectangulum sub duabus ductis $PQ \times PR$ ad quadratum tertiæ PS quad. in data ratione; punctum P , a quibus rectæ ducuntur, locabitur in sectione Conica quæ tangit lineas AB, CD in A & C ; & contra. Nam coeat linea BD cum linea AC manente positione trium AB, CD, AC ; deim coeat etiam linea PT cum linea PS : & rectangulum $PS \times PT$ evadet PS quad. rectæque AB, CD quæ curvam in punctis A & B, C & D secabant, jam Curvam in punctis illis coeuntibus non amplius secare possunt sed tantum tangere.


Scholium.

Nomen Conicæ sectionis in hoc Lemmate late sumitur, ita ut sectio tam Rectilinea per verticem Coni transiens, quam Circularis basi parallela includatur. Nam si punctum p incidit in rectam, quæ quævis ex punctis quatuor A, B, C, D junguntur, Conica sectio verte-

vertetur in geminas Rectas, quarum una est recta illa in quam punctum p incidit, & altera est recta qua alia duo ex punctis quatuor junguntur. Si Trapezii anguli duo oppositi simul sumpti aequentur duobus rectis, & lineæ quatuor PQ, PR, PS, PT ducantur ad latera ejus vel perpendiculariter vel in angulis quibuscvis æqualibus, sitque rectangulum sub duabus ductis $PQ \times PR$ æquale rectangulo sub duabus aliis $PS \times PT$, Sectio conica evadet Circulus. Idem fiet si lineæ quatuor ducantur in angulis quibuscvis & rectangulum sub duabus ductis $PQ \times PR$ sit ad rectangulum sub aliis duabus $PS \times PT$ ut rectangulum sub sinubus angulorum S, T , in quibus duæ ultimæ PS, PT ducuntur, ad rectangulum sub sinubus angulorum Q, R in quibus duæ primæ PQ, PR ducuntur. Cæteris in casibus Locus puncti P erit aliqua trium figurarum quæ vulgo nominantur Sectiones Conicæ. Vice autem Trapezii $ABCD$ substitui potest Quadrilaterum cujus latera duo opposita se mutuo instar diagonalium decussant. Sed & e punctis quatuor A, B, C, D , possunt unum vel duo abire ad infinitum, eoque pacto latera figuræ quæ ad puncta illa convergunt, evadere parallela: quo in casu Sectio Conica transibit per cætera puncta, & in plagas parallelarum abibit in infinitum.

L E M M A XIX.

Invenire punctum P , a quo si rectæ quatuor PQ, PR, PS, PT , ad alias totidem positione datas rectas AB, CD, AC, BD , singulæ ad singulas in datis angulis ducantur, rectangulum sub duabus ductis, $PQ \times PR$, sit ad rectangulum sub aliis duabus $PS \times PT$ in data ratione.



Lineæ AB, CD , ad quas rectæ duæ PQ, PR , unum rectangulorum continentes ducuntur, convenient cum aliis duabus positione datis lineis in punctis A, B, C, D . Ab eorum aliquo A age rectam quamlibet AH , in qua velis punctum P reperiri. Secet ea lineas oppositas BD, CD , nimirum BD in H , & CD in I , & ob datos omnes angulos figuræ, dabuntur rationes PQ ad PA & PA

DE MOTU
CORPORUM.

ad PS , adeoque ratio PQ ad
 PS . Auferendo hanc a data ra-
tione $PQ \times PR$ ad $PS \times PT$,
dabitur ratio PR ad PT , &
addendo datas rationes PI ad
 PR , & PT ad PH dabitur
ratio PI ad PH atque adeo
punctum P . *Q.E.I.*



Corol. 1. Hinc etiam ad Loci
punctorum infinitorum P punctum
quodvis D tangens duci
potest. Nam chorda PD ubi
puncta P ac D conveniunt,
hoc est, ubi AH ducitur per punctum D , tangens evadit. Quo
in casu ultima ratio evanescens IP & PH invenietur. ut supra.
Ipsi igitur AD duc parallelam CF , occurrentem BD in F , & in ea
ultima ratione sectam in E , & DE tangens erit, propterea quod
 CF & evanescens IH parallelæ sunt, & in E & P similiter sectæ.

Corol. 2. Hinc etiam Locus punctorum omnium P definiri potest.
Per quodvis punctum A, B, C, D , puta A , duc Loci tangentem
 AE & per aliud quodvis punctum B duc tangenti parallelam BF
occurrentem Loco in F . Invenietur autem punctum F per Lem. XIX.
Biseca BF in G , & æcta indefinita
 AG erit positio diametri ad quam
 BG & FG ordinatim applicantur.
Hæc AG occurrat Loco in H , &
erit AH diameter sive latus trans-
versum, ad quod latus rectum erit
ut BG ad AGH . Si AG nullibi
occurrit Loco, linea AH existente
indefinita, Locus erit Parabola & la-
tus rectum ejus ad diametrum AG

pertinens erit $\frac{BG^2}{AG}$. Sin ea alicubi occurrit, Locus Hyperbola erit
ubi puncta A & H sita sunt ad easdem partes ipsius G : & Ellipsis,
ubi G intermedium est, nisi forte angulus AGB rectus sit & insuper
 BG quad. æquale rectangulo AGH , quo in casu Circulus habebitur.

Atque ita Problematis Veterum de quatuor lineis ab *Euclide* in-
cepti & ab *Apollonio* continuati non calculus, sed compositio Geome-
trica, qualem Veteres quærebant, in hoc Corollario exhibetur.

LEM.



L E M M A XX.


 LIBER
PRIMUS.

Si Parallelogrammum quodvis ASPQ angulis duobus oppositis A & P tangit sectionem quamvis Conicam in punctis A & P; & lateribus unius angulorum illorum infinite productis AQ, AS, occurrit eidem sectioni Conicæ in B & C; a punctis autem occursum B & C ad quintum quodvis sectionis Conicæ punctum D agantur rectæ duæ BD, CD occurrentes alteris duobus infinite productis parallelogrammi lateribus PS, PQ in T & R; erunt semper abscissæ laterum partes PR & PT ad invicem in data ratione. Et contra, si partes illæ abscissæ sunt ad invicem in data ratione, punctum D tanget Sectionem Conicam per puncta quatuor A, B, C, P transeuntem.

Caf. 1. Jungantur BP, CP & a puncto D agantur rectæ duæ DG, DE, quarum prior DG ipsi AB parallela sit & occurrat PB, PQ, CA in H, I, G; altera DE parallela sit ipsi AC & occurrat PC, PS, AB in F, K, E: & erit (per Lemma xvii.) rectangulum $DE \times DF$ ad rectangulum $DG \times DH$ in ratione data. Sed est PQ, ad DE (seu IQ) ut PB ad HB, adeoque ut PT ad DH; & vicissim PQ, ad PT ut DE ad DH. Est & PR ad DF ut RC ad DC, adeoque ut (IG vel) PS ad DG, & vicissim PR ad PS ut DF ad DG; & conjunctis rationibus fit rectangulum $PQ \times PR$ ad rectangulum $PS \times PT$ ut rectangulum $DE \times DF$ ad rectangulum $DG \times DH$, atque adeo in data ratione. Sed dantur PQ & PS & propterea ratio PR ad PT datur. Q. E. D.


Caf. 2. Quod si PR & PT ponatur in data ratione ad invicem, tum simili ratiocinio regrediendo, sequetur esse rectangulum $DE \times DF$ ad rectangulum $DG \times DH$, in ratione data, adeoque punctum D (per Lemma xviii.) contingere Conicam sectionem transeuntem per puncta A, B, C, P. Q. E. D.

Corol.



Nam si in recta MN detur punctum N , & ubi punctum mobile M incidit, in immotum N , incidat punctum mobile D in immotum P . PRIMUS.

Junge CN , BN , CP , BP , & a puncto P age rectas PT , PR occurrentes ipsis BD , CD in T & R , & facientes angulum BPT æqualem angulo dato BNM , & angulum CPR æqualem angulo dato CNM . Cum ergo (ex Hypothefi) æquales sint anguli MBD , NBP , ut & anguli MCD , NCP ; aufer communes NBD & PCD , & restabunt æquales NBM & PBT ,




NCM & PCR : adeoque triangula NBM , BPT similia sunt, ut & triangula NCM , PCR . Quare PT est ad NM ut PB ad NB , & PR ad NM ut PC ad NC . Sunt autem puncta B , C , N , P immobilia. Ergo PT & PR datam habent rationem ad NM , proindeque datam rationem inter se; atque adeo, per Lemma xx, punctum D (perpetuus rectarum mobilium BT & CR concursus) contingit sectionem Conicam, per puncta B , C , P transeuntem. Q. E. D.

Et contra, si punctum mobile D contingat sectionem Conicam transeuntem per data puncta B , C , A , & sit angulus DBM semper æqualis angulo dato ABC , & angulus DCM semper æqualis angulo dato ACB , & ubi punctum D incidit successively in duo quavis sectionis puncta immobilia p , P , punctum mobile M incidat successively in puncta duo immobilia n , N : per eadem n , N agatur recta nN , & hæc erit Locus perpetuus puncti illius mobilis M . Nam, si fieri potest, versetur punctum M in linea aliqua Curva. Tanget ergo punctum D sectionem Conicam per puncta quinque B , C , A , p , P , transeuntem, ubi punctum M perpetuo tangit lineam Curvam. Sed & ex jam demonstratis tanget etiam punctum D sectionem Conicam per eadem quinque puncta B , C , A , p , P transeuntem, ubi punctum

*Idem aliter. **

LIBER
PRIMUS.

E punctis datis junge tria quævis A, B, C ; & circum duo eorum B, C ceu polos, rotando angulos magnitudine datos ABC, ACB , applicentur crura BA, CA primo ad punctum D , deinde ad punctum P , & notentur puncta M, N in quibus altera crura BL, CL casu utroque se decussant. Agatur recta infinita MN , & rotentur anguli illi mobiles circum polos suos B, C , ea lege ut crurum BL, CL vel BM, CM intersectio quæ jam sit m , incidat semper in rectam illam infinitam MN & crurum BA, CA , vel BD, CD intersectio, quæ jam sit d , Trajectoriam quæsitam $PADdB$ delineabit. Nam punctum d , per Lem. xxi , continget sectionem Conicam per puncta B, C transeuntem; & ubi punctum m accedit ad puncta L, M, N , punctum d (per constructionem) accedet ad puncta A, D, P . Describetur itaque sectio Conica transiens per puncta quinque A, B, C, P, D . Q. E. F.



Corol. 1. Hinc recta expedite duci potest, quæ Trajectoriam quæsitam, in puncto quovis dato B , continget. Accedat punctum d ad punctum B , & recta Bd evadet tangens quæsitæ.

Corol. 2. Unde etiam Trajectoriarum Centra, Diametri & Latera recta inveniri possunt, ut in Corollario secundo Lemmatis xix .

Scholium.


Constructio prior evadet paulo simplicior jungendo BP , & in ea, si opus est, producta capiendo Bp ad BP ut est PR ad PT ; & per p agendo rectam infinitam pd ipsi SPT parallelam, inque ea capiendo semper pd æqualem Pr ; & agendo rectas Bd, Cr concurrentes in d . Nam cum sint Pr ad Pt , PR ad PT , pB ad PB , pd ad Pt in eadem ratione; erunt pd & Pr semper æqua-

K 2

les.

Idem aliter.

Revolvatur tum angulus magnitudine datus CBH circa po'um B , tum radius quilibet rectilineus & utrinque productus DC circa polum C . Notentur puncta M, N in quibus anguli crus BC secat radium illum ubi crus alterum BH concurrit cum eodem radio in punctis P & D . Deinde ad actam infinitam MN concu-



rant perpetuo radius ille CP vel CD & anguli crus BC , & cruris alterius BH concursus cum radio delineabit Trajectoriam quaesitam.

Nam si in constructionibus Problematis superioris accedat punctum A ad punctum B , lineae CA & CB coincident, & linea AB in ultimo suo situ fiet tangens BH , atque adeo constructiones ibi positae evadent eadem cum constructionibus hic descriptis. Delineabit igitur cruris BH concursus cum radio sectionem Conicam per puncta C, D, P transeuntem, & rectam BH tangentem in puncto B . *Q.E.F.*

Caf. 2. Dentur puncta quatuor B, C, D, P extra tangentem HI sita. Junge bina lineis BD, CP concurrentibus in G , tangentibusque
K 3.

Dico præterea quod si recta aliqua tangat lineam curvam in figura prima, hæc recta eodem modo cum curva in figuram novam translata tanget lineam illam curvam in figura nova: & contra. Nam si Curvæ puncta quævis duo accedunt ad invicem & coeunt in figura prima, puncta eadem translata accedent ad invicem & coibunt in figura nova, atque adeo rectæ, quibus hæc puncta junguntur, simul evadent curvarum tangentes in figura utraque. Componi possent harum assertionum Demonstrationes more magis Geometrico. Sed brevitati consulo.

Igitur si figura rectilinea in aliam transmutanda est, sufficit rectarum a quibus conflatur intersectiones transferre, & per easdem in figura nova lineas rectas ducere. Sin curvilineam transmutare oportet, transferenda sunt puncta, tangentes & aliæ rectæ quarum ope curva linea definitur. Intervit autem hoc Lemma solutioni difficultiorum Problematum, transmutando figuras propositas in simpliciores. Nam rectæ quævis convergentes transmutantur in parallelas, adhibendo pro radio ordinato primo, lineam quamvis rectam quæ per concursum convergentium transit: id adeo quia concursus ille hoc pacto abit in infinitum, lineæ autem parallelæ sunt quæ ad punctum infinite distans tendunt. Postquam autem Problema solvitur in figura nova, si per inversas operationes transmutetur hæc figura in figuram primam, habebitur solutio quæsitæ.

Utile est etiam hoc Lemma in solutione Solidorum Problematum. Nam quoties duæ sectiones Conicæ obvenerint, quarum intersectione Problema solvi potest, transmutare licet earum alterutram, si Hyperbola sit vel Parabola, in Ellipsin: deinde Ellipsis facile mutatur in Circulum. Recta item & sectio Conica, in constructione Planorum Problematum, vertuntur in Rectam & Circulum.

PROPOSITIO XXV. PROBLEMA XVII.

*Trajectoriam describere quæ per data duo puncta transibit
& rectas tres continget positione datas.*


Per concursum tangentium quarumvis duarum cum se invicem, & concursum tangentis tertiæ cum recta illa, quæ per puncta duo data transit, age rectam infinitam; eaque adhibita pro radio ordinato primo, transmutetur figura, per Lemma superius, in figuram novam. In

L

hac

DE MOTU
CORPORUM.

hac figura tangentes illæ duæ evadent sibi invicem parallelæ, & tangens tertia fiet parallelâ recta per puncta duo data transeunti. Sunto hi, kl tangentes illæ duæ parallelæ, ik tangens tertia, & hl recta huic parallelâ transiens per puncta illa a, b , per quæ Conica sectio in hac figura nova transire debet; & parallelogrammum $bikl$ complens. Secentur rectæ hi, ik, kl in c, d, e , ita ut sit bc ad latus quadratum rectanguli abb , ic ad id , & ke ad kd ut est summa rectarum bi & kl ad summam trium linearum quarum prima est recta ik , & alteræ duæ sunt latera quadrata rectangulorum abb & alb : & erunt c, d, e puncta contactuum. Etenim, ex Conicis, sunt hc quadratum ad rectangulum abb , & ic quadratum ad id quadratum, & ke quadratum ad kd quadratum, & el quadratum ad rectangulum alb in eadem ratione; & propterea bc ad latus quadratum ipsius abb , ic ad id , ke ad kd , & el ad latus quadratum ipsius alb sunt in subduplicata illa ratione, & compositæ, in data ratione omnium antecedentium bi & kl ad omnes consequentes, quæ sunt latus quadratum rectanguli abb & recta ik & latus quadratum rectanguli alb . Habentur igitur ex data illa ratione puncta contactuum c, d, e , in figura nova. Per inversas operationes Lemmatis novissimi transferantur hæc puncta in figuram primam & ibi, per Probl. XIV., describetur Trajectoria. Q. E. F. Ceterum perinde ut puncta a, b jacent vel inter puncta h, l , vel extra, debent puncta c, d, e vel inter puncta h, i, k, l capi, vel extra. Si punctorum a, b alterutrum cadit inter puncta h, l , & alterum extra, Problema impossibile est.



PROPOSITIO XXVI. PROBLEMA XVIII.

*Trajectoriam describere quæ transibit per punctum datum
& rectas quatuor positione datas continget.*


Ab intersectione communi duarum quarumlibet tangentium ad intersectionem communem reliquarum duarum agatur recta infinita,

ta, & eadem pro radio ordinato primo adhibita, transmutetur figura (per Lem. xxii.) in figuram novam, & tangentes binæ, quæ ad radium ordinatum primum concurrebant, jam evadent parallelæ. Sunt illæ bi & kl , ik & bl continentes parallelogrammum $bikl$. Sitque p punctum in hac nova figura, puncto in figura prima dato respondens. Per figuræ centrum O agatur pq ; & existente Oq æquali Op , erit q punctum alterum per quod sectio Conica in hac figura nova transire debet. Per Lemmatis xxii operationem inversam transferatur hoc punctum in figuram primam, & ibi habebuntur puncta duo per quæ Trajectoria describenda est. Per eadem vero describi potest Trajectoria illa per Probl. xvii. *Q.E.F.*

L E M M A XXIII.

Si rectæ duæ positione datæ AC , BD , ad data puncta A , B , terminentur, datamque habeant rationem ad invicem, & recta CD , qua puncta indeterminata C , D junguntur, secetur in ratione data in K : dico quod punctum K locabitur in recta positione data.

Concurrent enim rectæ AC , BD in E , & in BE capiatur BG ad AE ut est BD ad AC , sitque FD semper æqualis datæ EG ; & erit ex constructione EC ad GD , hoc est, ad EF ut AC ad BD , adeoque in ratione data, & propterea dabitur specie triangulum EFC . Secetur CF in L ut sit CL ad CF in ratione CK ad CD ; &, ob datam illam rationem, dabitur etiam specie triangulum EFL ; proindeque punctum L locabitur in recta EL positione data. Iunge LK , & similia erunt triangula CLK , CFD ; &, ob datam FD & datam rationem LK ad FD , dabitur LK . Huic æqualis capiatur EH , & erit semper $ELKH$ parallelogrammum. Locatur igitur punctum K in parallelogrammi illius latere positione dato HK . *Q.E.D.*




L 2

LEM.

L E M M A XXIV.

Si rectæ tres tangant quamcunque Conifectionem, quarum duæ parallelæ sint ac dentur positione; dico quod Sectionis semidiameter hisce duabus parallelæ, sit media proportionalis inter harum segmenta, punctis contactuum & tangenti tertiæ interjecta.

Sunto AF , GB parallelæ duæ Conifectionem $A DB$ tangentes in A & B ; EF recta tertia Conifectionem tangens in I , & occurrens prioribus tangentibus in F & G ; sitque CD semidiameter Figuræ tangentibus parallelæ: Dico quod AF , CD , BG sunt continue proportionales.



Nam si diametri conjugatæ AB , DM tangenti FG occurrant in E & H , seque mutuo secant in C , & compleatur parallelogrammum $IKCL$; erit, ex natura Sectionum Conicarum, ut EC ad CA ita CA ad CL , & ita divisim $EC - CA$ ad $CA - CL$, seu EA ad AL , & composite EA ac $EA + AL$ seu EL ut EC ad $EC + CA$ seu EB ; adeoque (ob similitudinem triangulorum EAF , ELI , ECH , EBG) AF ad LI ut CH ad BG . Est itidem, ex natura Sectionum Conicarum, LI (seu CK) ad CD ut CD ad CH ; atque, adeo ex æquo perturbate, AF ad CD ut CD ad BG . *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si tangentes duæ FG , PQ tangentibus parallelis AF , BG occurrant in F & G , P & Q , seque mutuo secant in O ; erit (ex æquo perturbate) AF ad BQ ut AP ad BG , & divisim ut FP ad GQ , atque adeo ut FO ad OG .

Corol. 2. Unde etiam rectæ duæ PG , FQ per puncta P & G , F & Q ductæ, concurrent ad rectam ACB per centrum Figuræ & puncta contactuum A , B transeuntem.

LEM-


L E M M A XXV.

 LIBER
PRIMUS.

Si parallelogrammi latera quatuor infinite producta tangant Sectionem quamcunque Conicam, & abscindantur ad tangentem quamvis quintam; sumantur autem laterum quorumvis duorum conterminorum abscissæ terminatæ ad angulos oppositos parallelogrammi: dico quod abscissa alterutra sit ad latus illud a quo est abscissa, ut pars lateris alterius contermini inter punctum contactus & latus tertium, est ad abscissarum alteram.

Tangant parallelogrammi $MLIK$ latera quatuor ML , IK , KL , MI sectionem Conicam in A , B , C , D & secet tangens quinta FQ hæc latera in F , Q , H

& E ; sumantur autem laterum MI , KI abscissæ ME , KQ , vel laterum KL , ML abscissæ KH , MF : dico quod sit ME ad MI ut BK ad KQ & KH ad KL ut AM ad MF . Nam per Corollarium secundum



Lemmatum superioris, est ME ad EI ut $(AM$ feu) BK ad BQ , & componendo ME ad MI ut BK ad KQ , $Q.E.D.$ Item KH ad HL ut $(BK$ feu) AM ad AF , & dividendo KH ad KL ut AM ad MF . $Q.E.D.$

Corol. 1. Hinc si datur parallelogrammum $IKLM$, circa datam Sectionem Conicam descriptum, dabitur rectangulum $KQ \times ME$, ut & huic æquale rectangulum $KH \times MF$.

Corol. 2. Et si sexta ducatur tangens eq tangentibus KI , MI occurrens in q & e ; rectangulum $KQ \times ME$ æquabitur rectangulo $Kq \times Me$; eritque KQ ad Me ut Kq ad ME , & divisim ut Qq ad Ee .


Corol. 3. Unde etiam si Eq , eQ jungantur & bisecentur, & recta per puncta bisectionum agatur, transibit hæc per centrum Sectionis Conicæ. Nam cum sit Qq ad Ee ut KQ ad Me , transibit ea-

DE MOTU dem recta per medium omnium Eg , eQ , MK ; (per Lem. xxiii)
 CORPUSCULUM. & medium rectæ MK est centrum Sectionis.

PROPOSITIO XXVII. PROBLEMA XIX.

*Trajectoriam describere quæ rectas quinque positione datas
 continget.*

Dentur positione tangentes ABG , BCF , GCD , FDE , EA .
 Figuræ quadrilateræ sub quatuor quibuscvis contentæ $ABFE$ diagonales AF , BE biseca in M & N , & (per Corol. 3. Lem. xxv) recta MN per puncta bisectionum acta transibit per centrum Trajectoriæ.
 Rursus Figuræ quadrilateræ $BGDF$, sub aliis quibuscvis quatuor



tangentibus contentæ, diagonales (ut ita dicam) BD , GF biseca in P & Q ; & recta PQ per puncta bisectionum acta transibit per centrum Trajectoriæ. Dabitur ergo centrum in concursu bifecantium. Sit illud O . Tangenti cuivis BC parallelam age KL , ad eam distantiam ut centrum O in medio inter parallelas locetur, & acta KL tanget Trajectoriam describendam. Secet hæc tangentes



L E M M A · XXVI.

 LIBER
PRIMUS.

Trianguli specie & magnitudine dati tres angulos ad rectas totidem positione datas, quæ non sunt omnes parallele, singulos ad singulas ponere.

Dantur positione tres rectæ infinitæ AB , AC , BC , & oportet triangulum DEF ita locare, ut angulus ejus D lineam AB , an-

gulus E lineam AC , & angulus F lineam BC tangat. Super DE , DF & EF describe tria circularum segmenta DRE , DGF , EMF , quæ capiant angulos angulis BAC , ABC , ACB æquales respective. Describantur autem hæc segmenta ad eas partes linearum $DEDF$, EF utiliter $DRED$ eodem ordine cum literis $BACB$, literæ $DGFD$ eodem cum literis $ABCA$, & literæ $EMFE$ eodem cum literis $ACBA$ in orbem redeant; deinde compleantur hæc segmenta in circulos integros. Secent circuli duo priores se mutuo in G , sintque centra eorum P & Q . Junctis GP , PQ , cape Ga ad AB ut est GP ad PQ , & centro G , intervallo Ga



describere circulum, qui secet circulum primum DGE in a . Jungatur tum aD secans circulum secundum DFG in b , tum aE secans circulum


M

Corol. Hinc recta duci potest cujus partes longitudine datæ rectis tribus positione datis interjacebunt. Concepe triangulum DEF , puncto D ad latus EF accedente, & lateribus DE , DF in directum positis, mutari in lineam rectam, cujus pars data DE rectis positione datis AB , AC , & pars data DF rectis positione datis AB , BC interponi debet; & applicando constructionem præcedentem ad hunc casum solvetur Problema.

PROPOSITIO XXVIII. PROBLEMA XX

Trajectoriam specie & magnitudine datam describere, cujus partes datæ rectis tribus positione datis interjacebunt.

Describenda sit Trajectoria quæ sit similis & æqualis Linæ curvæ DEF , quæque a rectis tribus AB , AC , BC positione datis,





in partes datis hujus partibus DE & EF similes & æquales secabitur.

Age rectas DE , EF , DF , & trianguli hujus DEF pone angulos D , E , F ad rectas illas positione datas (per Lem. xxvi.) Dein circa triangulum describe Trajectoriam Curvæ DEF similem & æqualem. $Q.E.F.$

Trapezium specie datum describere cujus anguli ad rectas quatuor positione datas, quæ neque omnes parallele sunt, neque ad commune punctum convergunt, singuli ad singulas consistent.

Dentur positione rectæ quatuor ABC , AD , BD , CE , quarum prima secet secundam in A , tertiam in B , & quartam in C ; & describendum sit Trapezium $fgbi$ quod sit Trapezio $FGHI$



simile, & cujus angulus f . angulo dato F æqualis, tangat rectam ABC , cæterique anguli g , b , i . cæteris angulis datis G , H , I æquales, tangant cæteras lineas AD , BD , CE respective. Jungatur FH & super FG , FH , FI describantur totidem circularum segmenta FSG , FTH , FVI , quorum primum FSG capiat angulum

lum æqualem angulo BAD , secundum FTH capiat angulum æ-
qualem angulo CBD , ac tertium FVI capiat angulum æqualem LIBER
PRIMUS
angulo ACE . Describi autem debent segmenta ad eas partes li-
nearum FG, FH, FI , ut literarum $FSGF$ idem sit ordo circu-
laris qui literarum $BADB$, utque literæ $FTHF$ eodem ordine cum
literis $CBDC$, & literæ $FVIF$ eodem cum literis $ACEA$ in
orbem redeant. Compleantur segmenta in circulos integros, sit-
que P centrum circuli primi FSG , & Q centrum secundi FTH .
Jungatur & utrinque producat PQ , & in ea capiatur QR in ea
ratione ad PQ quam habet BC ad AB . Capiatur autem QR ad
eas partes puncti Q ut literarum P, Q, R idem sit ordo atque lite-
rarum A, B, C : centroque R & intervallo RF describatur circulus
quartus FNC secans circumulum tertium FVI in c . Jungatur Fc se-
cans circumulum primum in a & secundum in b . Agantur $aG, bH,$
 cI , & Figuræ $abcFGHI$ similis constituatur Figura $ABCfghi$:
Eritque Trapezium $fghi$ illud ipsum quod constituere oportebat.


Secent enim circuli duo primi FSG, FTH se mutuo in K .
Jungantur PK, QA, RK, aK, bK, cK , & producat QP ad L .
Anguli ad circumferentias FaK, FbK, FcK sunt semiles angu-
lorum FPK, FQK, FRK ad centra, adeoque angulorum illo-
rum dimidiis LPK, LQK, LRK æquales. Est ergo Figura
 $PQRK$ Figuræ $abcK$ æquiangula & similis, & propterea ab est
ad bc ut PQ ad QR ; id est, ut AB ad BC . Angulis insuper $FaG,$
 FbH, FcI æquantur fAg, fBb, fCi per constructionem. Er-
go Figuræ $abcFGHI$ Figura similis $ABCfghi$ compleri potest.
Quo facto Trapezium $fghi$ constituetur simile Trapezio $FGHI$
& angulis suis f, g, b, i tanget rectas $ABC, AD, BD, CE,$
 Q, E, F .

Corol. Hinc recta duci potest cujus partes, rectis quatuor posi-
tione datis dato ordine interjectæ, datam habebunt proportionem
ad invicem. Augeantur anguli FGH, GHI usque eo, ut rectæ
 FG, GH, HI in directum jaceant; & in hoc casu construendo
Problema, ducetur recta $fghi$ cujus partes fg, gb, bi , rectis qua-
tuor positione datis $AB & AD, AD & BD, BD & CE$ inter-
jectæ, erunt ad invicem ut lineæ FG, GH, HI , eundemque ser-
vabunt ordinem inter se. Idem vero sic fit expeditius.

DE MOTU
CORPORUM

Producantur AB ad K , & BD ad L , ut fit BK ad AB ut HI ad GH ; & DL ad bD ut GI ad FG ; & jungatur KL occurrens rectæ CE in i . Producat iL ad M , ut fit LM ad iL ut GH ad HI , & agatur tum MQ ipsi LB parallela rectæque AD occurrens in g , tum gi secans AB , BD in f , b . Dico factum.

Secet enim Mg rectam AB in Q , & AD rectam KL in S , & agatur AP quæ sit ipsi BD parallela & occurrat iL in P , & erunt gM ad Lb (gi ad bi , Mi ad Li , GI ad HI , AK ad BK) & AP ad BL in eadem ratione. Secetur DL in R



ut fit DL ad RL in eadem illa ratione, & ob proportionales gS ad gM , AS ad AP , & DS ad DL ; erit, ex æquo, ut gS ad Lb ita AS ad BL & DS ad RL ; & mixtim, $BL - RL$ ad $Lb - BL$ ut $AS - DS$ ad $gS - AS$. Id est BR ad Bb ut AD ad Ag , adeoque ut BD ad gQ . Et vicissim BR ad BD ut Bb ad gQ , seu fb ad fg . Sed ex constructione linea BL eadem ratione secta fuit in D & R atque linea FI in G & H ; ideoque est BR ad BD ut FH ad FG . Ergo fb est ad fg ut FH ad FG . Cum igitur sit etiam gi ad bi ut Mi ad Li , id est, ut GI ad HI , valet lineas FI , fi in g & b , G & H similiter sectas esse. $Q.E.F.$

It

In constructione Corollarii huius postquam ducitur LK secans CE in i , producere licet iE ad V , ut sit EV ad Ei ut FH ad HI , & agere Vf parallelam ipsi BD . Eodem recidit si centro i , intervallo IH , describatur circulus secans BD in X , & producat iX ad T , ut sit iT æqualis IF , & agatur Tf ipsi BD parallela.


Problematis hujus solutiones alias *Wrennus* & *Wallisus* olim excogitarunt.

PROPOSITIO XXIX. PROBLEMA XXI.

Trajectoriam specie datam describere, quæ a rectis quatuor positione datis in partes secabitur, ordine, specie & proportionem datas.



Describenda sit Trajectoria $fgbi$, quæ similis sit Lineæ curvæ $FGHI$, & cujus partes fg, gb, bi illius partibus FG, GH, HI similes & proportionales, rectis AB & AD , AD & BD , BD & CE positione datis, prima primis, secunda secundis, tertia tertiis interjaceant. Actis rectis FG, GH, HI, FI , describatur (per Lem. xxvii.) Trapezium $fgbi$ quod sit Trapezio $FGHI$ simile & cujus anguli f, g, b, i tangant rectas illas positione datas AB, AD, BD, CE , singuli singulas dicto ordine. Dein circa hoc Trapezium describatur Trajectoria curvæ Lineæ $FGHI$ confimilis.




Scholium

De Motu
CORPORUM.

Scholium.

Construi etiam potest hoc Problema ut sequitur. Junctis FG , GH , HI , FI produc GF ad V , jungeque FH , IG , & angulis FGH , VFH fac angulos CAK , DAL æquales. Concurrent AK , AL cum recta BD in K & L , & inde agantur KM , LN , quarum KM constituat angulum AKM æqualem angulo GHI , sitque ad AK ut est HI ad GH ; & LN constituat angulum ALN æqualem angulo FHI , sitque ad AL ut HI ad FH . Ducantur autem AK , KM , AL , LN ad eas partes linearum AD , AK , AL , ut literæ $CAKMC$, $ALKA$, $DALND$ eodem ordine cum literis $FGHIF$ in orbem fideant; & acta MN occurrat rectæ CE in i . Fac angulum iEP æqua-



lem angulo IGF , sitque PE ad Ei ut FG ad GI ; & per P agatur PQf , quæ cum recta ADE contineat angulum PQE æqualem angulo FIG , rectæque AB occurrat in f , & jungatur fi . Agantur autem PE & PQ ad eas partes linearum CE , PE , ut literarum $PEiP$ & $PEQP$ idem sit ordo circularis qui literarum $FGHIF$, & si super linea fi eodem quoque literarum ordine constitutur Trapezium $fgbi$ Trapezio $FGHI$ simile, & circumscribatur Trajectoria specie data solvetur Problema.

Hactenus de Orbibus inveniendis. Superest ut Motus corporum in Orbibus inventis determinemus.

SECTIO


S E C T I O VI.

De Inventionē Motuum in Orbibus datis.

PROPOSITIO XXX. PROBLEMA XXII.

*Corporis in data Trajectoria Parabolica moti invenire locum
ad tempus assignatum.*

Sit S umbilicus & A vertex principalis Parabolæ, sitque $4 AS \times M$ æquale aræ Parabolice abscindendæ APS , quæ radio SP , vel post excessum corporis de vertice descripta fuit, vel ante appulsum ejus ad verticem describenda est. Innotescit quantitas aræ illius abscindendæ ex tempore ipsi proportionali. Biseca AS in G , erigeque perpendicularum GH æquale $3 M$, & Circulus centro H , intervallo HS descriptus secabit Parabolam in loco quaesito P . Nam, demissa ad axem perpendiculari PO & ducta PH , est



$AGq + GHq (= HPq = AO - AG: quad. + PO - GH: quad.)$
 $= AOq + POq - 2GAO - 2GH \times PO + AGq + GHq$. Unde
 $2GH \times PO (= AOq + POq - 2GAO) = AOq + POq$.

Pro AOq scribe $AO \times \frac{POq}{4AS}$; &, applicatis terminis omnibus ad

$3PO$ ductisque in $2AS$ fiet $GH \times AS (= \frac{1}{2}AO \times PO + \frac{1}{2}AS \times PO)$
 $= \frac{AO + 3AS}{6} \times PO = \frac{4AO - 3SO}{6} \times PO = \text{aræ } APO - SPO$

$= \text{aræ } APS$. Sed GH erat $3M$, & inde $GH \times AS$ est $4AS \times M$.
 Ergo area abscissa APS æqualis est abscindendæ $4AS \times M$. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc GH est ad AS , ut tempus quo corpus descripsit arcum AP ad tempus quo corpus descripsit arcum inter verticem A & perpendicularum ad axem ab umbilico S erectum.

Corol. 2. Et Circulo $HS P$ per corpus motum P perpetuo transiente, velocitas puncti H est ad velocitatem quam corpus habuit

N

in

DE MOTU
CORPORUM

in vertice A , ut 3 ad 8; adeoque in ea etiam ratione est linea GH ad lineam rectam quam corpus tempore motus sui ab A ad P , ea cum velocitate quam habuit in vertice A , describere posset.

Corol. 3. Hinc etiam vice versa inveniri potest tempus quo corpus descripsit arcum quemvis assignatum AP . Junge AP & ad medium ejus punctum erige perpendicularum rectæ GH occurrens in H .

L E M M A XXVIII.

Nulla extat Figura Ovalis cujus area, rectis pro lubitu abscissa, possit per æquationes numero terminorum ac dimensionum finitas generaliter inveniri.

Intra Ovalem detur punctum quodvis, circa quod ceu polum revolvatur perpetuo linea recta, uniformi cum motu, & interea in recta illa exeat punctum mobile de polo, pergatque semper ea cum velocitate, quæ sit ut rectæ illius intra Ovalem quadratum. Hoc motu punctum illud describet Spiralem gyris infinitis. Jam si arcus Ovalis a recta illa abscissæ incrementum per finitam æquationem inveniri potest, invenietur etiam per eandem æquationem distantia puncti a polo, quæ huic arcus proportionalis est, adeoque omnia Spiralis puncta per æquationem finitam inveniri possunt: & propterea rectæ cujusvis positione datæ intersectio cum Spirali inveniri etiam potest per æquationem finitam. Atqui recta omnis infinite producta Spiralem secat in punctis numero infinitis, & æquatio, quæ intersectio aliqua duarum linearum invenitur, exhibet earum intersectiones omnes radicibus totidem, adeoque ascendit ad tot dimensiones quot sunt intersectiones. Quoniam Circuli duo se mutuo secant in punctis duobus, intersectio una non invenietur nisi per æquationem duarum dimensionum, quæ intersectio altera etiam inveniat. Quoniam duarum sectionum Conicarum quatuor esse possunt intersectiones, non potest aliqua earum generaliter inveniri nisi per æquationem quatuor dimensionum, quæ omnes simul inveniantur. Nam si intersectiones illæ seorsim quarantur, quoniam eadem est omnium lex & conditio, idem erit calculus in casu unoquoque & propterea eadem semper conclusio, quæ igitur debet omnes intersectiones simul complecti & indifferenter exhibere.

Unde

Unde etiam intersectiones Sectionum Conicarum & Curvarum tertiæ potestatis, eo quod sex esse possunt, simul prodeunt per æquationes sex dimensionum, & intersectiones duarum Curvarum tertiæ potestatis, quia novem esse possunt, simul prodeunt per æquationes dimensionum novem. Id nisi necessario fieret, reducere liceret Problemata omnia Solida ad Plana, & plusquam Solida ad Solida. Loquor hic de Curvis potestate irreducibilibus. Nam si æquatio per quam Curva definitur, ad inferiorem potestatem reduci possit, Curva non erit unica, sed ex duabus vel pluribus composita, quarum intersectiones per calculos diversos seorsim inveniri possunt. Ad eundem modum intersectiones binæ rectarum & sectionum Conicarum prodeunt semper per æquationes duarum dimensionum; ternæ rectarum & Curvarum irreducibilium tertiæ potestatis per æquationes trium, quaternæ rectarum & Curvarum irreducibilium quartæ potestatis per æquationes dimensionum quatuor, & sic in infinitum. Ergo rectæ & Spiralis intersectiones numero infinitæ, cum Curva hæc sit simplex & in Curvas plures irreducibilis, requirunt æquationes numero dimensionum & radicum infinitas, quibus intersectiones omnes possunt simul exhiberi. Est enim eadem omnium lex & idem calculus. Nam si a polo in rectam illam secantem demittatur perpendicularum, & perpendicularum illud una cum secante revolvatur circa polum, intersectiones Spiralis transibunt in se mutuo, quæque prima erat seu proxima, post unam revolutionem secunda erit, post duas tertia, & sic deinceps: nec interea mutabitur æquatio nisi pro mutata magnitudine quantitatum per quas positio secantis determinatur. Unde cum quantitates illæ post singulas revolutiones redeunt ad magnitudines primas, æquatio redibit ad formam primam, adeoque una eademque exhibebit intersectiones omnes, & propterea radices habebit numero infinitas, quibus omnes exhiberi possunt. Nequit ergo intersectio rectæ & Spiralis per æquationem finitam generaliter inveniri, & idcirco nulla extat Ovalis cujus area, rectis imperatis abscissis, possit per talem æquationem generaliter exhiberi.


Eodem argumento, si intervallum poli & puncti, quo Spiralis describitur, capiatur Ovalis perimetro abscissæ proportionale, probari potest quod longitudo perimetri nequit per finitam æquationem generaliter exhiberi. De Ovalibus autem hic loquor quæ non tanguntur a figuris conjugatis in infinitum pergentibus.

Hinc area Ellipseos, quæ radio ab umbilico ad corpus mobile ducto describitur, non prodit ex dato tempore, per æquationem finitam; & propterea per descriptionem Curvarum Geometricæ rationalium determinari nequit. Curvas Geometricæ rationales appello quarum puncta omnia per longitudines æquationibus definitas, id est, per longitudinum rationes complicatas, determinari possunt; cæterasque (ut Spirales, Quadratrices, Trochoides) Geometricæ irrationales. Nam longitudines quæ sunt vel non sunt ut numerus ad numerum (quemadmodum in decimo Elementorum) sunt Arithmetice rationales vel irrationales. Aream igitur Ellipseos tempori proportionalem abscindo per Curvam Geometricæ irrationalem ut sequitur.

PROPOSITIO XXXI. PROBLEMA XXIII.

Corporis in data Trajectoria Elliptica moti invenire locum ad tempus assignatum.


Ellipseos APB sit A vertex principalis, S umbilicus, & O centrum, sitque P corporis locus inveniendus. Produc OA ad G , ut sit OG ad OA ut OA ad OS . Erige perpendicularum GH , cen-



troque O & intervallo OG describe circulum EFG , & super regula GH , ceu fundo, progrediatur Rota GEF revolvendo circa axem suum, & interea puncto suo A describendo Trochoidem ALI . Quo

DE MOTU
CORPORUM.

tionalis, id est, qui sit ad quatuor rectos, ut est tempus quo corpus descripsit arcum Ap , ad tempus revolutionis unius in Ellipsi. Sit angulus iste N . Tum capiatur & angulus D ad angulum B , ut est sinus iste anguli AOQ ad radium, & angulus E ad angulum $N - AOQ + D$, ut est longitudo L ad longitudinem eandem L cosinu anguli AOQ diminutam, ubi angulus iste recto minor est, auctam ubi major. Postea capiatur tum angulus F ad angulum B , ut est sinus anguli $AOQ + E$ ad radium, tum angulus G ad angulum $N - AOQ - E + F$ ut est longitudo L ad longitudinem eandem cosinu anguli $AOQ + E$ diminutam ubi angulus iste recto minor est, auctam ubi major. Tertia vice capiatur angulus H ad angulum B , ut est sinus anguli $AOQ + E + G$ ad radium; & angulus I ad angulum $N - AOQ - E - G + H$, ut est longitudo L ad eandem longitudinem cosinu anguli $AOQ + E + G$ diminutam, ubi angulus iste recto minor est, auctam ubi major. Et sic pergere licet in infinitum. Denique capiatur angulus AOQ æqualis angulo $AOQ + E + G + I + \&c.$ & ex cosinu ejus Or & ordinata pr , quæ est ad sinum ejus




qr ut Ellipseos axis minor ad axem majorem, habebitur corporis locus correctus p . Si quando angulus $N - AOQ + D$ negativus est, debet signum $+$ ipsius E ubique mutari in $-$, & signum $-$ in $+$. Idem intelligendum est de signis ipsorum G & I , ubi anguli $N - AOQ - E + F$, & $N - AOQ - E - G + H$ negativi prodeunt. Convergit autem series infinita $AOQ + E + G + I + \&c.$ quam celerrime, adeo ut vix unquam opus fuerit ultra progredi quam ad terminum secundum E . Et fundatur calculus in hoc Theoremate, quod area APs sit differentia inter arcum AQ & rectam ab umbilico S in Radium OQ perpendiculariter demissam.

Non dissimili calculo conficitur Problema in Hyperbola. Sit ejus Centrum O , Vertex A , Umbilicus S & Asymptotos OK . Cognoscatur

DE MOTU
CORPORUM.

atque angulum X (æquationem secundam) ad angulum Z (æquationem maximam secundam) ut est cubus sinus anguli T ad cubum Radii. Angulorum T , V , X vel summæ $T + X + V$, si angulus T recto minor est, vel differentiæ $T + X - V$, si is recto major est rectisque duobus minor, æqualem cape angulum BHP (motum medium æquatum) &, si HP occurrat Ellipsi in P , acta SP abscindet aream BSP tempore proportionalem quamproxime. Hæc Praxis satis expedita videtur, propterea quod angulorum perexiguorum V & X (in minutis secundis, si placet, positorum) figuras duastrefve primas invenire sufficit. Sed & factis accurata est ad Theoriam Planetarum. Nam in Orbe vel Martis ipsius, cujus Æquatio centri maximæ est graduum decem, error vix superabit minutum unum secundum. Invento autem angulo motus medii æquati BHP , angulus veri motus BSP & distantia SP in promptu sunt per *Wardi* methodum notissimam.



Hactenus de motu corporum in lineis Curvis. Fieri autem potest ut mobile recta descendat vel recta ascendat, & quæ ad istiusmodi Motus spectant, pergo jam exponere.


SECTIO

DE MOTU
CORPORUM

Caf. 2. Si Figura illa RPB Hyperbola est, describatur ad eandem diametrum principalem AB Hyperbola rectangula BED ; & quoniam areae CSP , $CBfP$, $SPfB$ sunt ad areas CSD , $CBED$, $SDEB$, singulae ad singulas, in data ratione altitudinum CP , CD ; & area $SPfB$ proportionalis est tempori quo corpus P movebitur per arcum PfB ; erit etiam area $SDEB$ eidem tempori proportionalis. Minuatur latus rectum Hyperbolae RPB in infinitum manente latere transverso, & coibit arcus PB cum recta CB & umbilicus S cum vertice B & recta SD cum recta BD . Proinde area $BDEB$ proportionalis erit tempori quo corpus C recto descensu describit lineam CB .

Q. E. I.

Caf. 3. Et simili argumento si Figura RPB Parabola est, & eodem vertice principali B describatur alia Parabola BED , quae semper maneat data interea dum Parabola prior in cuius perimetro corpus P movetur, diminuto & in nihilum redacto ejus latere recto, conveniat cum linea CB ; fiet segmentum Parabolicum $BDEB$ proportionale tempori quo corpus illud P vel C descendet ad centrum S vel B . Q. E. I.



PROPOSITIO XXXIII. THEOREMA IX.


Positis jam inventis, dico quod corporis cadentis Velocitas in loco quovis C est ad velocitatem corporis centro B intervallo BC Circulum describentis, in subduplicata ratione quam AC, distantia corporis a Circuli vel Hyperbolae rectangulae vertice ulteriore A, habet ad Figuræ semidiametrum principalem $\frac{1}{2}$ AB.

Bifecetur AB , communis utriusque Figuræ RPB , DEB diametrum, in O ; & agatur recta PT quæ tangat Figuram RPB in P , atque
etiam

PROPOSITIO XXXIV. THEOREMA X.

Si Figura BED Parabola est, dico quod corporis cadentis Velocitas in loco quovis C æqualis est velocitati qua corpus centro B dimidio intervalli sui BC Circulum uniformiter describere potest.

Nam corporis Parabolam RPB circa centrum S describentis velocitas in loco quovis P (per Corol. 7. Prop. XVI) æqualis est velocitati corporis dimidio intervalli SP Circulum circa idem centrum S uniformiter describentis. Minuatur Parabolæ latitudo CP in infinitum eo, ut arcus Parabolicus PfB cum recta CB , centrum S cum vertice B , & intervallum SP cum intervallo BC coincidat, & constabit Propositio. Q.E.D.



PROPOSITIO XXXV. THEOREMA XI.

Isdem positis, dico quod area Figuræ DES, radio indefinito SD descripta, æqualis sit area quam corpus, radio dimidium lateris recti Figuræ DES æquante, circa centrum S uniformiter gyrando, eodem tempore describere potest.

Nam concipe corpus C. quam minima temporis particula lineam Cc cadendo describere, & interea corpus aliud K uniformiter in Circulo OKk circa centrum S gyrando, arcum Kk describere. Erigantur perpendiculara CD , cd occurrentia Figuræ DES in D , d . Jungantur SD , Sd , SK , Sk & ducatur Dd axi AS occurrens in T , & ad eam demittatur perpendicularum ST .

Cas.

PROPOSITIO XXXVI. PROBLEMA XXV.

*Corporis de loco dato A cadentis determinare
Tempora descensus.*


Super diametro AS (distantia corporis a centro sub initio) describe Semicirculum ADS , ut & huic æqualem Semicirculum OKH circa centrum S . De corporis loco quovis C erige ordinatim applicatam CD . Junge SD , & arcæ ASD æqualem constitue sectorem OSK . Patet per Prop xxxv, quod corpus cadendo describet spatium AC eodem Tempore quo corpus aliud uniformiter circa centrum S gyrando, describere potest arcum OK . *Q.E.F.*



PROPOSITIO XXXVII. PROBLEMA XXVI.

*Corporis de loco dato sursum vel deorsum projecti definire
Tempora ascensus vel descensus.*

Exeat corpus de loco dato G secundum lineam ASG cum velocitate quacunque. In duplicatâ ratione hujus velocitatis ad uniformem in Circulo velocitatem, qua corpus ad intervallum datum SG circa centrum S revolvi posset, cape GA ad $\frac{1}{2} AS$. Si ratio illa est numeri binarii ad unitatem, punctum A infinite distat, quo casu parabola vertice S , axe SC , latere quovis recto describenda est. Patet hoc per Prop. xxxiv. Sin ratio illa minor vel major est quam 2 ad 1, priore casu Circulus, posteriore Hyperbola rectangula super diametro SA describi debet. Patet per Prop xxxiii. Tum centro S , intervallo æquante dimidium lateris recti, describatur Circulus HKk , & ad corporis ascendentis vel descendentis loca duo quævis G , C , erigantur perpendiculara GI , CD occurrentia Conicæ Sectioni vel Circulo in I ac D .




Dein

Dein junctis SI , SD , fiant segmentis $SEIS$, $SEDS$, sectores HSK , HSk æquales, & per Prop. xxxv. corpus G describet spatium GC eodem Tempore quo corpus K describere potest arcum Kk . *Q. E. F.*

PROPOSITIO XXXVIII. THEOREMA XII.

Posito quod Vis centripeta proportionalis sit altitudini seu distantie locorum a centro, dico quod cadentium Tempora, Velocitates & Spatia descripta sunt arcubus, arcuumque sinibus rectis & sinibus versis respective proportionalia.

Cadat corpus de loco quovis A secundum rectam AS ; & centro virium S , intervallo AS , describatur Circuli quadrans AE , sitque CD sinus rectus arcus cujusvis AD ; & corpus A , Tempore AD , cadendo describet Spatium AC , inque loco C acquirat Velocitatem CD .



Demonstratur eodem modo ex Propositione x, quo Propositio xxxii, ex Propositione xi demonstrata fuit.

Corol. 1. Hinc æqualia sunt Tempora quibus corpus unum de loco A cadendo pervenit ad centrum S , & corpus aliud revolvendo describit arcum quadrantalem ADE .

Corol. 2. Proinde æqualia sunt Tempora omnia quibus corpora de locis quibuscumque ad usque centrum cadunt. Nam revolvantium tempora omnia periodica (per Corol. 3, Prop. iv.) æquantur.

PROPO-

corpus cadendo describit lineolam DE , ut lineola illa directe & velocitas V inverse, estque vis ut velocitatis incrementum I directe & tempus inverse, adeoque si primæ nascentium rationes sumantur, ut $\frac{1 \times V}{DE}$, hoc est, ut longitudo DF . Ergo vis ipsi DF vel EG proportionalis facit ut corpus ea cum Velocitate descendat, quæ sit ut area $ABGE$ latus quadratum. $Q.E.D.$

Porro cum tempus, quo quælibet longitudinis datæ lineola DE describitur, sit ut velocitas inverse adeoque ut area $ABFD$ latus quadratum inverse; sitque DL , atque adeo area nascent $DLME$, ut idem latus quadratum inverse: erit tempus ut area $DLME$, & summa omnium temporum ut summa omnium arearum, hoc est (per Corol. Lem. iv.) Tempus totum quo linea AE describitur ut area tota AME . $Q.E.D.$

Corol. 1. Si P sit locus de quo corpus cadere debet, ut, urgente aliqua uniformi vi centripeta nota (qualis vulgo supponitur Gravitatis) velocitatem acquirat in loco D æqualem velocitati quam corpus aliud vi quacunque cadens acquisivit eodem loco D , & in perpendiculari DF capiatur DR , quæ sit ad DF ut vis illa uniformis ad vim alteram in loco D , & compleatur rectangulum $PDRQ$, eique æqualis abscindatur area $ABFD$; erit A locus de quo corpus alterum cecidit. Namque completo rectangulo $DRSE$, cum sit area $ABFD$ ad aream $DFGE$ ut VV ad $2VI$, adeoque ut $\frac{1}{2}V$ ad I , id est, ut semissis velocitatis totius ad incrementum velocitatis corporis vi inæquabili cadentis; & similiter area $PQRD$ ad aream $DRSE$, ut semissis velocitatis totius ad incrementum velocitatis corporis uniformi vi cadentis; sintque incrementa illa (ob æqualitatem temporum nascentium) ut vires generatrices, id est, ut ordinatim applicatæ DF , DR , adeoque ut area nascentes $DFGE$, $DRSE$; erunt (ex æquo) area totæ $ABFD$, $PQRD$ ad invicem ut semisses totarum velocitatum, & propterea (ob æqualitatem velocitatum) æquantur.

Corol. 2. Unde si corpus quodlibet de loco quocunque D data cum velocitate vel sursum vel deorsum projiciatur, & detur lex vis centripetæ, invenietur velocitas ejus in alio quovis loco e , erigendo ordinatam eg , & capiendo velocitatem illam ad velocitatem in loco D ut est latus quadratum rectanguli $PQRD$ area curvilinea $DFge$ vel aucti, si locus e est loco D inferior, vel diminuti, si iis superior est, ad latus quadratum rectanguli solius $PQRD$, id est, ut $\sqrt{PQRD} + \text{vel} - \frac{DFge}{P}$ ad \sqrt{PQRD} .

Corol.

De Motu
Corporum.

Corol. 3. Tempus quoque innotescet erigendo ordinatam *em* reciproce proportionalem lateri quadrato ex $PQRD + \text{vel} - D F g e$, & capiendo tempus quo corpus descripsit lineam *De* ad tempus quo corpus alterum vi uniformi cecidit a *P* & cadendo pervenit ad *D*, ut area curvilinea $DLme$ ad rectangulum $2PD \times DL$. Namque tempus quo corpus vi uniformi descendens descripsit lineam PD est ad tempus quo corpus idem descripsit lineam PE in subduplicata ratione PD ad PE , id est (lineola DE jamjam nascente) in ratione PD ad $PD + \frac{1}{2}DE$ seu $2PD$ ad $2PD + DE$ & divisim, ad tempus quo corpus idem descripsit lineolam DE ut $2PD$ ad DE , adeoque ut rectangulum $2PD \times DL$ ad aream $DLME$; estque tempus quo corpus utrumque descripsit lineolam DE ad tempus quo corpus alterum inæquabili motu descripsit lineam *De* ut area $DLME$ ad aream $DLme$, & ex æquo tempus primum ad tempus ultimum ut rectangulum $2PD \times DL$ ad aream $DLme$.

S E C T I O VIII.


De inventione Orbium in quibus corpora Viribus quibuscunque centripetis agitata revolvuntur

PROPOSITIO XL. THEOREMA XIII.

Si corpus, cogente V quacunque centripeta, moveatur utcunque, & corpus aliud recta ascendat vel descendat, sintque eorum Velocitates in aliquo æqualium altitudinum casu æquales, Velocitates eorum in omnibus æqualibus altitudinibus erunt æquales.

Descendat corpus aliquod ab *A* per *D, E*, ad centrum *C*, & moveatur corpus aliud a *V* in linea curva $VIKk$, Centro *C* intervallis quibuscunque describantur circuli concentrici DI , EK rectæ AC in *D* & *E*, curvæque VIK in *I* & *K* occurrentes. Jungatur IC occurrens ipsi KE in *N*; & in IK demittatur perpendiculum NT ; sitque circumferentiarum circulorum intervallum DE vel IN quam minimum, & habeant corpora in *D* & *I* velocitates

tes æquales. Quoniam distantia CD , CI æquantur, erunt vires centripetæ in D & I æquales. Exponentur hæ vires per æquales lineas DE , IN ; & si vis una IN (per Legum Corol. 2.) resolvatur in duas NT & IT , vis NT , agendo secundum lineam NT corporis cursui ITK perpendicularem, nil mutabit velocitatem corporis in cursu illo, sed retrahet solummodo corpus a cursu rectilineo, facietque ipsum de Orbis tangente perpetuo defletere, inque via curvilinea ITK progredi. In hoc effectu producendo vis illa tota consumetur: vis autem altera IT , secundum corporis cursum agendo, tota accelerabit illud, ac dato tempore quam minimo accelerationem generabit sibi ipsi proportionalem. Proinde corporum in D & I accelerationes æqualibus temporibus factæ (si sumantur linearum nascentium DE , IN , IK , IT , NT rationes primæ) sunt ut lineæ DE , IT : temporibus autem inæqualibus ut lineæ illæ & tempora conjunctim. Tempora autem quibus DE & IK describuntur, ob æqualitatem velocita-



tum sunt ut viæ descriptæ DE & IK , adeoque accelerationes, in cursu corporum per lineas DE & IK , sunt ut DE & IT , DE & IK conjunctim, id est ut DE quad. & $IT \times IK$ rectangulum. Sed rectangulum $IT \times IK$ æquale est IN quadrato, hoc est, æquale DE quadrato; & propterea accelerationes in transitu corporum a D & I ad E & K æquales generantur. Æquales igitur sunt cor-

P 2

porum

PROPOSITIO XLI. PROBLEMA XXVIII.

 LIBER
PRIMUS.

Posita cujuscunque generis Vi centripeta & concessis Figurarum curvilinearum quadraturis, requiruntur tum Trajectorie in quibus corpora movebuntur, tum Tempora motuum in Trajectoriis inventis.

Tendat vis quælibet ad centrum C & invenienda sit Trajectoria $VITKk$. Detur Circulus VXT centro C intervallo quovis CV descriptus, centroque eodem describantur alii quivis circuli ID , KE Trajectoriam secantes in I & K rectamque CV in D & E . Age tum rectam $CNIX$ secantem circulos KE , VT in N & X , tum rectam CKT occurrentem circulo VXT in T . Sint autem puncta I & K sibi invicem vicinissima, & pergat corpus ab V per I , T & K ad k ; sitque punctum A locus ille de quo corpus aliud cadere debet ut in loco D velocitatem acquirat æqualem velocitati corporis prioris in I ; & stantibus quæ in Propositione xxxix, lineola IK , dato tempore quam minimo descripta, erit ut velocitas atque adeo ut latus quadratum arcæ $ABFD$, & triangulum ICK tempori proportionale dabitur, adeoque KN erit reciproce ut altitudo IC , id est, si detur quantitas aliqua Q , & altitudo IC nominetur A , ut $\frac{Q}{A}$. Hanc quantitatem $\frac{Q}{A}$ nominemus Z ,

& ponamus eam esse magnitudinem ipsius Q , ut sit in aliquo casu \sqrt{ABFD} ad Z ut est IK ad KN , & erit in omni casu \sqrt{ABFD} ad Z ut IK ad KN , & $ABFD$ ad ZZ ut IK q. ad KN q. & divisim $ABFD - ZZ$ ad ZZ ut IN quad. ad KN quad; adeoque $\sqrt{ABFD - ZZ}$ ad $(Z$ seu) $\frac{Q}{A}$ ut IN ad KN , & propterea

$A \times KN$ æquale $\frac{Q \times IN}{\sqrt{ABFD - ZZ}}$. Unde cum $TX \times XC$ sit ad $A \times KN$ ut CX q. ad AA , erit rectangulum $TX \times XC$ æquale $\frac{Q \times IN \times CX \text{ quad.}}{AA \sqrt{ABFD - ZZ}}$. Igitur si in perpendiculo DF capiuntur

semper Db , Dc ipsis $\frac{Q}{2\sqrt{ABFD - ZZ}}$ & $\frac{Q \times CX \text{ quad.}}{2AA\sqrt{ABFD - ZZ}}$ æquales respective, & describantur curvæ lineæ ab , cd , quas puncta

DE MOTU
CURVORUM


puncta b , c perpetuo tangunt; deque puncto V ad lineam AC , erigatur perpendicularum Vad abscindens areas curvilineas $VDba$, $VDcd$, & erigantur etiam ordinatæ Ez , Ex : quoniam rectangulum $Db \times IN$ seu $DbzE$ æquale est dimidio rectanguli $A \times KN$, seu triangulo ICK ; & rectangulum $Dc \times IN$ seu $DcxE$ æquale est dimidio rectanguli $TX \times XC$, seu triangulo XCT ; hoc est, quoniam arearum $VDba$, VIC æquales semper sunt nascentes particulæ $DbzE$, ICK , & arearum $VDcd$, VCX æquales semper sunt nascentes particulæ $DcxE$, XCT , erit area genita $VDba$ æqualis areae genitæ VIC , adeoque temporis proportionalis, & area genita $VDcd$ æqualis Sectori genito VCX . Dato igitur tempore quovis ex quo corpus discessit de loco V , dabitur area ipsi proportionalis $VDba$, & inde dabitur corporis altitudo CD vel CI , & area $VDcd$, eique æqualis Sector VCX una cum ejus angulo VCI . Datis autem angulo VCI & altitudine CI datur locus I , in quo corpus completo illo tempore reperietur. *Q.E.I.*

Corol. 1. Hinc maximæ minimæque corporum altitudines, id est Apfides Trajectoriarum expedite inveniri possunt. Sunt enim Apfides puncta illa in quibus recta IC per centrum ducta incidit perpendiculariter in Trajectoriam VIK : id quod fit ubi rectæ IK & NK æquantur, adeoque ubi area $ABFD$ æqualis est ZZ .

Corol. 2. Sed & angulus KIN , in quo Trajectoria alibi secat lineam illam IC , ex data corporis altitudine IC expedite invenitur; nimirum capiendo sinum ejus ad radium ut KN ad IK , id est, ut Z ad latus quadratum areae $ABFD$.

Corol. 3. Si centro C & vertice principali V describatur Sectio quælibet Conica VRS , & a quovis ejus puncto R agatur Tangens RT occurrens axi infinite productio CV in puncto T ; dein juncta CR ducatur recta CP , quæ æqualis sit abscissæ CT , angulumque VCP Sectori VCR proportionalem constituat; tendat autem ad centrum C Vis centripeta Cubo distantiae locorum a centro reciproce proportionalis, & exeat corpus de loco V jussa cum Velocitate secundum lineam rectæ CV perpendiculararem: progredietur corpus illud in Trajectoria quam punctum P perpetuo tangit; adeoque si Conica sectio VRS Hyperbolæ sit, descendet idem ad centrum: Sin ea Ellipsis sit, ascendet illud perpetuo & abibit in infinitum. Et contra, si corpus quacunque cum Velocitate exeat de loco V , & perinde ut inceperit vel oblique descendere ad centrum, vel ab eo oblique

lique ascendere. Figura $CVRS$ vel Hyperbola sit vel Ellipsis, in- LIBER PRIMUS.
 veniri potest Trajectoria augendo vel minuendo angulum VCP
 ia data aliqua ratione. Sed & Vi centripeta in centrifugam versa.



ascendet corpus oblique in Trajectoria VPQ , quæ invenitur capi-
 endo angulum VCP Sectori Elliptico $CVRC$ proportionalem, &
 longitudinem CP longitudini CT æqualem ut supra. Consequun-
 tur hæc omnia ex Propositione præcedente, per Curvæ cujusdam
 quadraturam, cujus inventionem, ut satis facilem, brevitatis gra-
 tia miſſam facio.

PROPOSITIO XLII. PROBLEMA XXIX.

*Data lege Vis centripetæ, requiritur motus corporis de loco
 dato cum Velocitate secundum datam rectam egressi.*

Stantibus quæ in tribus Propositionibus præcedentibus: exeat
 corpus de loco I secundum lineolam IT , ea cum Velocitate quam
 corpus aliud, vi aliqua uniformi centripeta, de loco P cadendo ac-
 quirere posset in D : sitque hæc vis uniformis ad vim qua corpus
 primum.

PROPOSITIO XLIII. PROBLEMA XXX.

hoc est, ut angulus VCp ad angulum VCP , adeoque in data ratione, & propterea tempori proportionalis. Cum area tempori proportionalis sit quam linea Cp in plano immobili describit; manifestum est quod corpus, cogente justæ quantitatis Vi centripetæ, revoli possit una cum puncto p in Curva illa linea quam punctum idem p ratione jam exposita describit in plano immobili. Fiat angulus VCu angulo PCp , & linea Cu lineæ CV , atque Figura uCp Figuræ VCP æqualis, & corpus in p semper existens movebitur in peri-

DE MOTU
CORPORUM.


perimetro Figuræ revolvētis $*Cp$, eodemque tempore describet arcum ejus $*p$ quo corpus aliud P arcum ipsi similem & æqualem VP in Figura quiescente VPK describere potest. Quærat̃ur igitur, per Corollarium quintum propositionis VI, Vis centripeta qua corpus revolvi possit in Curva illa linea quam punctum p describit in plano immobili, & solvetur Problema. Q.E.F.

PROPOSITIO XLIV. THEOREMA XIV.

Differentia Virium, quibus corpus in Orbe quiescente, & corpus aliud in eodem Orbe revolvente æqualiter moveri possunt, est in triplicata ratione communis altitudinis inverse.

Partibus Orbis quiescentis VP , PK sunt similes & æquales Orbis revolvētis partes $*p$, pk ; & punctorum P , K distantia intelligatur esse quam minima. A puncto k in rectam pC demitte perpendicularum kr , idemque produc ad m , ut sit mr ad kr ut angulus VCp ad angulum VCP .

Quoniam corporum altitudines PC & pC , KC & kC semper æquantur, manifestum est quod linearum PC & pC incrementa vel decrementa semper sint æqualia, ideoque si corporum in locis P & p existentium distinguantur motus singuli (per Legum Corol. 2.) in binos, quorum hi versus centrum, sive secundum lineas PC , pC determinentur, & alteri prioribus transversi sint, & secundum lineas ipsas PC , pC , perpendiculares directionem habeant; motus versus centrum erunt æquales, & motus transversus corporis p erit ad motum transversum corporis P , ut motus angularis lineæ pC , ad motum angularem lineæ PC , id est,



ut

ut angulus VCP ad angulum VCP . Igitur eodem tempore quo corpus P motu suo utroque pervenit ad punctum K , corpus p æquali in centrum motu æqualiter movebitur a p versus C , adeoque completo illo tempore reperietur alicubi in linea mkr , quæ per punctum k in lineam pC perpendicularis est; & motu transverso acquirat distantiam a linea pC , quæ sit ad distantiam quam corpus alterum P acquirit a linea PC , ut est motus transversus corporis p ad motum transversum corporis alterius P . Quare cum kr æqualis sit distantia quam corpus P acquirit a linea PC , sitque mr ad kr ut angulus VCP ad angulum VCP , hoc est, ut motus transversus corporis p ad motum transversum corporis P , manifestum est quod corpus p completo illo tempore reperietur in loco m . Hæc ita se habebunt ubi corpora p & P æqualiter secundum lineas pC & PC moventur, adeoque æqualibus Viribus secundum lineas illas urgentur. Capiatur autem angulus pCn ad angulum pCk ut est angulus VCP ad angulum VCP , sitque nc æqualis kC , & corpus p completo illo tempore revera reperietur in n ; adeoque Vi majore urgetur quam corpus P , si modo angulus mCp angulo kCp major est, id est si Orbis upk vel movetur in consequentia, vel movetur in antecedentia majore celeritate quam sit dupla ejus qua linea CP in consequentia fertur; & Vi minore si Orbis tardius movetur in antecedentia. Estque Virium differentia ut locorum intervallum mn , per quod corpus illud p ipsius actione, dato illo temporis spatio, transferri debet. Centro C intervallo Cn vel Ck describi intelligatur Circulus secans lineas mr , mn productas in s & t , & erit rectangulum $mn \times mt$ æquale rectangulo $mk \times ms$, adeoque mn æquale $\frac{mk \times ms}{mt}$. Cum autem tri-

angula pCk , pCn dentur magnitudine, sunt kr & mr , earumque differentia mk & summa ms reciproce ut altitudo pC , adeoque rectangulum $mk \times ms$ est reciproce ut quadratum altitudinis pC . Est & mt directe ut mt , id est, ut altitudo pC . Hæc sunt primæ rationes linearum nascentium; & hinc fit $\frac{mk \times ms}{mt}$, id est lineo-

la nascens mn , eique proportionalis Virium differentia reciproce ut cubus altitudinis pC . Q. E. D.

Corol. 1. Hinc differentia virium in locis P & p vel K & k , est ad vim qua corpus motu Circulari revolvitur possit ab R ad K eodem tempore quo corpus P in Orbe immobili describit arcum PK , ut lineola nascens mn ad sinum versum arcus nascentis KK , id est

Q 2

ut

DE MOTU ut $\frac{mk \times ms}{mt}$ ad $\frac{rkq}{zkC}$, vel ut $mk \times ms$ ad rk quadratum; hoc est,

CORPORUM
 si capiantur datæ quantitates F , G in ea ratione ad invicem quam habet angulus VCP ad angulum VCP , ut $GG - FF$ ad FF . Et propterea, si centro C intervallo quovis CP vel Cp describatur Sector circularis æqualis areæ toti VPC , quam corpus P tempore quovis in Orbe immobili revolvens radio ad centrum ducto descripsit: differentia virium, quibus corpus P in Orbe immobili & corpus p in Orbe mobili revolvuntur, erit ad vim centripetam qua corpus aliquod radio ad centrum ducto Sectorem illum, eodem tempore quo descripta sit area VPC uniformiter describere potuisset, ut $GG - FF$ ad FF . Namque Sector ille, & area pCk sunt ad invicem ut tempora quibus describuntur.

Corol. 2. Si Orbis VPK Ellipsis sit umbilicum habens C & Apfidem summam V ; eique similis & æqualis ponatur Ellipsis upk , ita ut sit semper pC æqualis PC , & angulus VCP sit ad angulum VCP in data ratione G ad F ; pro altitudine autem PC vel pC scribatur A , & pro Ellipseos latere recto ponatur $2R$: erit vis qua corpus in Ellipsi mobili revolvi potest, ut $\frac{FF}{AA} + \frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$ &

contra. Exponatur enim vis qua corpus revolvatur in immota Ellipsi per quantitatem $\frac{FF}{AA}$, & vis in V erit $\frac{FF}{CV \text{ quad.}}$. Vis autem

qua corpus in Circulo ad distantiam CV ea cum velocitate revolvi posset quam corpus in Ellipsi revolvens habet in V , est ad vim qua corpus in Ellipsi revolvens urgetur in Apfide V , ut dimidium lateris recti Ellipseos ad Circuli semidiametrum CV , adeoque valet $\frac{RFF}{CV \text{ cub.}}$: & vis quæ sit ad hanc ut $GG - FF$ ad

FF , valet $\frac{RGG - RFF}{CV \text{ cub.}}$: estque hæc vis (per hujus Corol. 1.)

differentia virium in V quibus corpus P in Ellipsi immota VPK , & corpus p in Ellipsi mobili upk revolvuntur. Unde cum (per hanc Prop.) differentia illa in alia quavis altitudine A sit ad ipsam in altitudine CV ut $\frac{1}{A \text{ cub.}}$ ad $\frac{1}{CV \text{ cub.}}$, eadem differentia

in omni altitudine A valebit $\frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$. Igitur ad vim $\frac{FF}{AA}$

qua corpus revolvi potest in Ellipsi immobili VPK , addatur excessus $\frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$ & componetur vis tota $\frac{FF}{AA} + \frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$

qua

qua corpus in Ellipsi mobili upk iisdem temporibus revolvi possit.


Corol. 3. Ad eundem modum colligetur quod, si Orbis immobilis VPK Ellipsis sit centrum habens in virium centro C ; eique similis, æqualis & concentrica ponatur Ellipsis mobilis upk ; sitque $2R$ Ellipseos hujus latus rectum principale, & $2T$ latus transversum sive axis major, atque angulus VCP semper sit ad angulum VCP ut G ad F ; vires quibus corpora in Ellipsi immobili & mobili temporibus æqualibus revolvi possunt, erunt ut $\frac{FFA}{T cub.}$ & $\frac{FFA}{T cub.}$

+ $\frac{RGG - RFF}{A cub.}$ respective.

Corol. 4. Et universaliter, si corporis altitudo maxima CV nominetur T , & radius curvaturæ quam Orbis VPK habet in V , id est radius Circuli æqualiter curvi, nominetur R , & vis centripeta qua corpus in Trajectoria quacunque immobili VPK revolvi potest, in loco V dicatur $\frac{VFF}{TT}$ atque aliis in locis P indefinite dicatur X , altitudine CP nominata A , & capiatur G ad F in data ratione anguli VCP ad angulum VCP : erit vis centripeta qua corpus idem eisdem motus in eadem Trajectoria upk circulariter mota temporibus iisdem peragere potest, ut summa virium $X + \frac{VRGG - VRFF}{A cub.}$

Corol. 5. Dato igitur motu corporis in Orbe quocunque immobili, augeri vel minui potest ejus motus angularis circa centrum virium in ratione data, & inde inveniri novi Orbes immobiles in quibus corpora novis viribus centripetis gyrentur.

Corol. 6. Igitur si ad rectam CV positione datam erigatur perpendicularum VP longitudinis indeterminatæ, jungaturque CP , & ipsi æqualis agatur Cp , constituens angulum VCP , qui fit ad angulum VCP in data ratione; vis qua corpus gyri potest in Curva illa Vpk quam punctum p perpetuo tangit, erit reciproce ut cubus altitudinis CP . Nam corpus P , per vim inertiae, nulla alia vi urgente, uniformiter progredi potest in recta VP . Adclatur vis in centrum C , cubo altitudinis CP vel Cp reciproce proportionalis, & (per jam demonstrata) detorquebitur motus ille rectilineus in lineam $Q 3$ curvam



curvam Vpk . Est autem hæc Curvâ Vpk eadem cum Curvâ illâ VpQ in Corol. 3. Prop. xli inventa, in qua ibi diximus corpora hujusmodi viribus attracta oblique ascendere.

PROPOSITIO XLV..PROBLEMA XXXI

Orbium qui sunt Circulis maxime finitimi requiruntur motus Apfidum.

Problema solvitur Arithmetice faciendo ut Orbis, quem corpus in Ellipsi mobili (ut in Propositionis superioris Corol. 2. vel 3.) revolvens describit in plano immobili, accedat ad formam Orbis cuius Apfides requiruntur, & quærendo Apfides Orbis quem corpus illud in plano immobili describit. Orbes autem eandem acquirerent formam, si vires centripetæ quibus describuntur, inter se collatæ, in æqualibus altitudinibus reddantur proportionales. Sit punctum V Apfis summa, & scribantur T pro altitudine maxima CV , A pro altitudine quavis alia CP vel Cp , & X pro altitudinum differentia $CV - CP$, & vis qua corpus in Ellipsi circa umbilicum suum C (ut in Corollario 2.) revolvente moveatur, quæque in Corollario 2. erat ut $\frac{FF}{AA} + \frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$, id est

ut $\frac{FFA + RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$, substituendo $T - X$ pro A , erit ut $\frac{RGG - RFF + TFF - FFX}{A \text{ cub.}}$. Reducenda similiter est vis alia

quævis centripeta ad fractionem cujus denominator sit $A \text{ cub.}$, & numeratores, facta homologorum terminorum collatione, statuendi sunt analogi. Res Exemplis patebit.

Exempl. 1. Ponamus vim centripetam uniformem esse, adeoque ut $\frac{A \text{ cub.}}{A \text{ cub.}}$, five (scribendo $T - X$ pro A in Numeratore) ut $\frac{T \text{ cub.} - 3TTX + 3TXX - X \text{ cub.}}{A \text{ cub.}}$; & collatis Numeratorum ter-

minis correspondentibus, nimirum datis cum datis & non datis cum non datis, fiet $RGG - RFF + TFF$ ad $T \text{ cub.}$ ut $-FFX$ ad $-3TTX + 3TXX - X \text{ cub.}$ five ut $-FF$ ad $-3TT + 3TX - XX$. Jam cum Orbis ponatur Circulo quam maxime finitimus, coeat Orbis cum Circulo; & ob factas R , T æquales, atque X in infinitum

infinitum diminutam, rationes ultimæ erunt RGG ad T cub. ut — FF ad — 3 TT, seu GG ad TT ut FF ad 3 TT & vicissim GG ad FF ut TT ad 3 TT id est, ut 1 ad 3; adeoque G ad F, hoc est angulus VCP ad angulum VCP, ut 1 ad $\sqrt{3}$. Ergo cum corpus in Ellipsi immobili,* ab Apside summa ad Apsidem imam descendendo conficiat angulum VCP (ut ita dicam) graduum 180; corpus aliud in Ellipsi mobili, atque adeo in Orbe immobili de quo agimus, ab Apside summa ad Apsidem imam descendendo conficiet angulum VCP graduum $\frac{180}{\sqrt{3}}$: id adeo ob simili-

tudinem Orbis hujus, quem corpus agente uniformi vi centripeta describit, & Orbis illius quem corpus in Ellipsi revolvente gyros peragens describit in plano quiescente. Per superiorem terminorum collationem similes redduntur hi Orbes, non universaliter, sed tunc cum ad formam circularem quam maxime appropinquant. Corpus igitur uniformi ovm vi centripeta in Orbe propemodum circulari revolvens, inter Apsidem summam & Apfidem imam conficiet semper angulum $\frac{180}{\sqrt{3}}$ graduum, seu 103 gr.

55 m. 23. sec. ad centrum; perveniens ab Apside summa ad Apsidem imam ubi semel confecit hunc angulum, & inde ad Apsidem summam rediens ubi iterum confecit eundem angulum; & sic deinceps in infinitum.

Exempl. 2. Ponamus vim centripetam esse ut altitudinis A dignitas quælibet A^{n-3} seu $\frac{A^n}{A^3}$: ubi $n-3$ & n significant dignita-

tum indices quoscunque integros vel fractos, rationales vel irracionales, affirmativos vel negativos. Numerator ille A^n seu $T-X^n$ in seriem indeterminatam per Methodum nostram Serierum convergentium reducta, evadit $T^n - nXT^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}XXT^{n-2}$ &c.

Et collatis hujus terminis cum terminis Numeratoris alterius RGG—RFF+TFF—FFX, fit RGG—RFF+TFF ad T^n ut —FF ad $-nT^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}XT^{n-2}$ &c. Et sumendo ratio-

nes ultimas ubi Orbes ad formam circularem accedunt, fit RGG ad T^n ut —FF ad $-nT^{n-1}$, seu GG ad T^{n-1} ut FF ad nT^{n-1} & vicissim GG ad FF ut T^{n-1} ad nT^{n-1} , id est ut 1 ad n ; adeoque G ad F, id est angulus VCP ad angulum VCP; ut

DE MOTU
CORPORUM

ut 1 ad \sqrt{n} . Quare cum angulus $\angle VCP$, in descensu corporis ab Apfide summa ad Apfidem imam, in Ellipsi confectus, sit graduum 180; conficietur angulus $\angle VCP$, in descensu corporis ab Apfide summa ad Apfidem imam, in Orbe propemodum Circulari quem corpus quodvis vi centripeta dignitati A^{n-3} proportionali describit, æqualis angulo graduum $\frac{180}{\sqrt{n}}$; & hoc angulo reposito corpus redibit ab Apfide ima ad Apfidem summam, & sic deinceps in infinitum. Ut si vis centripeta sit ut distantia corporis a centro, id est, ut A seu $\frac{A^1}{A^1}$, erit n æqualis 4 & \sqrt{n} æqualis 2;

adeoque angulus inter Apfidem summam & Apfidem imam æqualis $\frac{180}{2}$ gr. seu 90. gr. Completa igitur quarta parte revolutionis unius, corpus perveniet ad Apfidem imam, & completa alia quarta parte ad Apfidem summam, & sic deinceps per vices in infinitum. Id quod etiam ex Propositione x. manifestum est. Nam corpus urgente hac vi centripeta revolvetur in Ellipsi immobili, cujus centrum est in centro virium. Quod si vis centripeta sit reciproce ut distantia, id est directe ut $\frac{1}{A}$ seu $\frac{A^1}{A^1}$, erit n æqualis 2. adeoque inter Apfidem summam & imam angulus erit graduum $\frac{180}{\sqrt{2}}$

seu 127 gr. 16. m. 45. sec. & propterea corpustali vi revolvens, perpetua anguli hujus repetitione, vicibus alternis ab Apfide summa ad imam & ab ima ad summam perveniet in æternum. Porro si vis centripeta sit reciproce ut latus quadrato-quadratum undecimæ dignitatis altitudinis, id est reciproce ut A^{11} , adeoque directe ut $\frac{1}{A^{11}}$ seu ut $\frac{A^1}{A^{11}}$, erit n æqualis $\frac{1}{11}$, & $\frac{180}{\sqrt{n}}$ gr. æqualis 360 gr. & propterea corpus de Apfide summa discedens & subinde perpetuo descendens, perveniet ad Apfidem imam ubi complevit revolutionem integram, dein perpetuo ascensu complendo aliam revolutionem integram redibit ad Apfidem summam: & sic per vices in æternum.

Exempl. 3. Assumentes m & n pro quibuscvis indicibus dignitatum. Altitudinis, & b , c pro quibuscvis datis, ponamus vim centripetam esse ut

$$\frac{bA^m + cA^n}{A^{cub.}}, \text{ id est, ut } \frac{b \text{ in } T - X^m + c \text{ in } T - X^n}{A^{cub.}}$$

seu (per eandem Methodum nostram Serierum convergentium) ut

$$\frac{bT^m + cT^n - mbXT^{m-1} - ncXT^{n-1} + \frac{mm-1}{2}bXXT^{m-2} + \frac{nn-1}{2}cXXT^{n-2} \&c.}{A^{cub.}} \&c.$$

& collatis numeratorum terminis, fiet $RGG - RFF + TFF$ ab $bT^m + cT^n$, ut $-FF$ ad $-mbT^{m-1} - ncT^{n-1}$ ALTERN.
 $+ \frac{mm-m}{2} bXT^{m-2} + \frac{nn-n}{2} cXT^{n-2}$, &c. Et fumendo rationes ul- PRINCIP.
 timas quæ prodeunt ubi Orbes ad formam circularem accedunt, fit
 GG ad $bT^{m-1} + cT^{n-1}$, ut FF ad $mbT^{m-1} + ncT^{n-1}$, &
 vicissim GG ad FF ut $bT^{m-1} + cT^{n-1}$ ad $mbT^{m-1} + ncT^{n-1}$
 Quæ proportio, exponendo altitudinem maximam CV seu Tarith-
 metice per Unitatem, fit GG ad FF ut $b+c$ ad $mb+nc$, adeoque ut
 1 ad $\frac{mb+nc}{b+c}$. Unde est G ad F , id est angulus VCP ad angulum
 VCP , ut 1 ad $\sqrt{\frac{mb+nc}{b+c}}$. Et propterea cum Angulus VCP inter
 Apfidem summam & Apfidem imam in Ellipsi immobili sit 180 gr.
 erit angulus VCP inter easdem Apfides, in Orbe quem corpus vi
 centripeta quantitati $\frac{bA^m + cA^n}{A cub.}$ proportionali describit, æqua-
 lis angulo graduum $180 \sqrt{\frac{b+c}{mb+nc}}$. Et eodem argumento si vis cen-
 tripeta sit ut $\frac{bA^m - cA^n}{A cub.}$, angulus inter Apfides invenietur gra-
 duum $180 \sqrt{\frac{b-c}{mb-nc}}$. Nec secus resolvetur Problema in casibus
 difficilioribus. Quantitas cui vis centripeta proportionalis est, re-
 solvi temper debet in Series convergentes denominatorem habentes
 $A cub.$ Dein pars data numeratoris qui ex illa operatione prove-
 nit, ad ipsius partem alteram non datam, & pars data numeratoris
 hujus $RGG - RFF + TFF - FFX$ ad ipsius partem alte-
 ram non datam in eadem ratione ponendæ sunt: Et quantitates
 superfluas delendo, scribendoque Unitatem pro T , obtinebitur
 proportio G ad F .

Corol. 1. Hinc si vis centripeta sit ut aliqua altitudinis dignitas,
 inveniri potest dignitas illa ex motu Apfidum; & contra. Ni-
 mirum si motus totus angularis, quo corpus redit ad Apfidem
 eandem, sit ad motum angularem revolutionis unius, seu graduum
 360 , ut numerus aliquis m ad numerum alium n , & altitudo no-
 minetur A : erit vis ut altitudinis dignitas illa $A^{\frac{nn}{mm}} - 3$, cujus In-

R

dex

DE MOTU
CORPORUM

$\text{dex est } \frac{nn}{mm} - 3$. Id quod per exempla secunda manifestum est.
 Unde liquet vim illam in maiore quam triplicata altitudinis ratione,
 in recessu a centro, decrecere non posse: Corpus tali vi revolvens
 deque Apfide discedens, si coeperit descendere nunquam perveniet
 ad Apfidem imam seu altitudinem minimam, sed descendet usque
 ad centrum, describens Curvam illam lineam de qua egimus in Cor.
 3. Prop. xli. Sin coeperit illud, de Apfide discedens, vel minimum
 ascendere, ascendet in infinitum, neque unquam perveniet ad Ap-
 fidem summam. Describet enim Curvam illam lineam de qua ac-
 tum est in eodem Corol. & in Corol. 6. Prop. xlii. Sic & ubi vis,
 in recessu a centro, decrescit in maiore quam triplicata ratione al-
 titudinis, corpus de Apfide discedens, perinde ut coeperit descen-
 dere vel ascendere, vel descendet ad centrum usque vel ascendet
 in infinitum. At si vis, in recessu a centro, vel decrescat in mino-
 re quam triplicata ratione altitudinis, vel crescat in altitudinis ra-
 tione quacunque; corpus nunquam descendet ad centrum usque,
 sed ad Apfidem imam aliquando perveniet: & contra, si corpus de
 Apfide ad Apfidem alternis vicibus descendens & ascendens nun-
 quam appellat ad centrum; vis in recessu a centro aut augebitur,
 aut in minore quam triplicata altitudinis ratione decrescet: & quo-
 citius corpus de Apfide ad Apfidem redierit, eo longius ratio virium
 recedet a ratione illa triplicata. Ut si corpus revolutionibus 8 vel
 4. vel 2 vel 1: de Apfide summa ad Apfidem summam alterno de-
 scensu & ascensu redierit; hoc est, si fuerit m ad n ut 8 vel 4 vel
 2 vel $1\frac{1}{2}$ ad 1, adeoque $\frac{nn}{mm} - 3$ valeat $\frac{1}{64} - 3$ vel $\frac{1}{16} - 3$ vel $\frac{1}{4} - 3$
 vel $\frac{4}{9} - 3$: erit vis ut $A^{\frac{1}{64}} - 3$ vel $A^{\frac{1}{16}} - 3$ vel $A^{\frac{1}{4}} - 3$ vel $A^{\frac{4}{9}} - 3$, id
 est, reciproce ut $A^3 - \frac{1}{64}$ vel $A^3 - \frac{1}{16}$ vel $A^3 - \frac{1}{4}$ vel $A^3 - \frac{4}{9}$. Si
 corpus singulis revolutionibus redierit ad Apfidem eandem immo-
 tam; erit m ad n ut 1 ad 1, adeoque $A^{\frac{nn}{mm}} - 3$ æqualis $A - 2$ seu $\frac{x}{AA}$,
 & propterea decrementum virium in ratione duplicata altitudinis,
 ut in præcedentibus demonstratum est. Si corpus partibus revolu-
 tionis unius vel tribus quartis, vel duabus tertiis, vel una ter-
 tia, vel una quarta, ad Apfidem eandem redierit; erit m ad n ut
 $\frac{1}{4}$ vel $\frac{2}{3}$ vel $\frac{1}{2}$ vel $\frac{3}{4}$ ad 1, adeoque $A^{\frac{nn}{mm}} - 3$ æqualis $A^{\frac{16}{9}} - 3$ vel
 $A^{\frac{9}{4}} - 3$ vel $A^3 - 1$ vel $A^6 - 1$; & propterea vis aut reciproce ut
 $A^{\frac{9}{16}}$

$A^{\frac{1}{2}}$ vel $A^{\frac{1}{4}}$, aut directe ut A^6 vel $A^{\frac{1}{2}}$. Denique si corpus pergendo ab Apside summa ad Apsidem summam confecerit revolutionem integram, & præterea gradus tres, adeoque Aplis illa singulis corporis revolutionibus confecerit in consequentia gradus tres; erit m ad n ut

363 gr. ad 360 gr. sive ut 121 ad 120, adeoque $A^{\frac{nn}{mm}} = 3$ erit æquale $A^{\frac{29523}{14644}}$; & propterea vis centripeta reciproce ut $A^{\frac{29523}{14644}}$ seu reciproce ut $A^{\frac{1}{14644}}$ proxime. Decrescit igitur vis centripeta in ratione paulo majore quam duplicata, sed quæ vicibus 59 $\frac{1}{4}$ propius ad duplicatam quam ad triplicatam accedit.

Corol. 2. Hinc etiam si corpus vi centripeta, quæ sit reciproce ut quadratum altitudinis, revolvatur in Ellipsi umbilicum habente in centro virium, & huic vi centripetæ addatur vel auferatur vis alia quævis extranea; cognosci potest (per Exempla tertia) motus Apfidum qui ex vi illa extranea oriatur, & contra. Ut si vis qua corpus revolvitur in Ellipsi sit ut $\frac{1}{AA}$, & vis extranea ab-

lata ut cA , adeoque vis reliqua ut $\frac{A-cA^4}{A^{cub.}}$; erit (in Exemplis tertiis) b æqualis 1, m æqualis 1, n æqualis 4, adeoque angulus revolutionis inter Apfides æqualis angulo graduum 180 $\sqrt{\frac{1-c}{1-4c}}$. Po-

natur vim illam extraneam esse 357, $\frac{1}{4}$ partibus minorem quam vis altera qua corpus revolvitur in Ellipsi, id est c esse $\frac{100}{35745}$, existente A vel T æquali 1; & 180 $\sqrt{\frac{1-c}{1-4c}}$ evadet 180 $\sqrt{\frac{100}{35745}}$ seu 180, 7623,

id est, 180 gr. 45. m. 44. s. Igitur corpus de Apside summa discedens, motu angulari 180 gr. 45. m. 44. s. perveniet ad Apfidem imam, & hoc motu duplicato ad Apsidem summam redibit: adeoque Aplis summa singulis revolutionibus progrediendo conficiet 1 gr. 31 m. 28 sec.

Haftenus de Motu Corporum in Orbibus quorum plana per centrum Virium transeunt. Superest ut Motus etiam determinemus in planis excentricis. Nam Scriptores qui Motum gravium tractant, considerare solent ascensus & descensus ponderum, tam obliquos in planis quibuscunque datis, quam perpendiculares: & pari jure Motus corporum Viribus quibuscunque cen-

DE MOTU
CORPORUM.

tra petentium, & planis excentricis innitentium hic considerandus venit. Plana autem supponimus esse politissima & absolute lubrica ne corpora retardent. Quinimo, in his demonstrationibus, vice planorum quibus corpora incumbunt quæque tangunt incumbendo, usurpamus plana his parallela, in quibus centra corporum moventur & Orbitas movendo describunt. Et eadem lege Motus corporum in superficiebus Curvis peractos subinde determinamus.

S E C T I O X.

De Motu Corporum in Superficiebus datis, deque Funipendulorum Motu reciproco.

PROPOSITIO XLVI. PROBLEMA XXXII.

Posita cujuscunque generis Vi centripeta, datoque tum Virium centro tum Plano quocunque in quo corpus revolvitur, & concessis Figurarum curvilinearum quadraturis: requiritur Motus corporis de loco dato, data cum Velocitate, secundum rectam in Plano illo datam egressi.

Sit S centrum Virium, SC distantia minima centri hujus a Plano dato, P corpus de loco P , secundum rectam PZ egrediens, Q corpus idem in Trajectoria sua revolvens, & PQR Trajectoria illa, in Plano dato descripta, quam invenire oportet. Jungantur CQ , QS , & si in QS capiatur SV proportionalis vi centripetæ quæ corpus trahitur versus centrum S , & agatur VT quæ sit parallela CQ & occurrat SC in T : Vis SV resolvetur (per Legum Corol. 2.) in vires ST , TV ; quarum ST trahendo corpus secundum lineam plano perpendicularem, nil mutat motum ejus in hoc plano. Vis autem altera TV , agendo secundum positionem plani, trahit corpus directe versus punctum C in plano datum, adeoque facit illud in hoc plano perinde moveri ac si vis ST tolleretur, & corpus vi sola TV revolveretur circa centrum C in spatio libero. Data autem

vi

DE MOTU æqualibus, vel descriptent Ellipses in plano illo circa centrum *C*,
CORPORUM vel periodos movendi ultro citroque in lineis rectis per centrum *C*
in plano illo ductis, complebunt. Q. E. D.

Scholium.

His affines sunt ascensus ac descensus corporum in superficiebus curvis. Concipe lineas curvas in plano describi, dein circa axes quosvis datos per centrum Virium transeuntes revolvi, & ea revolutione superficies curvas describere; tum corpora ita moveri ut eorum centra in his superficiebus perpetuo reperiantur. Si corpora illa oblique ascendendo & descendendo currant ultro citroque peragentur eorum motus in planis per axem transeuntibus, atque adeo in lineis curvis quarum revolutione curvæ illæ superficies genitæ sunt. Istis igitur in casibus sufficit motum in his lineis curvis considerare.

PROPOSITIO XLVIII. THEOREMA XVI.


Si Rota Globo extrinsecus ad angulos rectos insistas, & more rotarum revolvendo progrediatur in circulo maximo; longitudo Itineris curvilinei, quod punctum quodvis in Rotæ perimetro datum, ex quo Globum tetigit, confecit, (quodque Cycloidem vel Epicycloidem nominare licet) erit ad duplicatum sinum versum arcus dimidii qui Globum ex eo tempore inter eundem tetigit, ut summa diametrorum Globi & Rotæ ad semidiametrum Globi.

PROPOSITIO XLIX. THEOREMA XVII.

Si Rota Globo concavo ad rectos angulos intrinsecus insistas & revolvendo progrediatur in circulo maximo; longitudo Itineris curvilinei quod punctum quodvis in Rotæ perimetro datum, ex quo Globum tetigit, confecit, erit ad duplicatum sinum versum arcus dimidii qui Globum toto hoc tempore inter eundem tetigit, ut differentia diametrorum Globi & Rotæ ad semidiametrum Globi.

Sit

Sit ABL Globus, C centrum ejus, BPV Rota ei insitens, E centrum Rotæ, B punctum contactus, & P punctum datum in perimetro Rotæ. Concipe hanc Rotam pergere in circulo maximo ABL ab A per B versus L , & inter eundem ita revolvi ut arcus AB , PB sibi invicem semper æquantur, atque punctum illud P in perimetro Rotæ datum interea describere Viam curvilineam AP . Sit autem AP Via tota curvilinea descripta ex quo Rota Globum tetigit in A , & erit Viæ hujus longitudo AP ad duplum



sinum versum arcus $\frac{1}{2} PB$, ut $2 CE$ ad CB . Nam recta CE (si opus est producta) occurrat Rotæ in V , junganturque CP , BP , EP , VP , & in CP productam demittatur normalis VF . Tangant PH , VH Circulum in P & V concurrentes in H , secetque PH ipsam VF in G , & ad VP demittantur normales GI , HK .
Centro.

id est ratio mutationum momentanearum curvæ AP , rectæ CP , arcus circularis BP , ac rectæ VP , eadem erit quæ linearum PV , PF , PG , PI , respective. Cum autem VF ad CF & VH ad CV perpendiculares sunt, angulique HVG , VCF propterea æquales; & angulus VHG (ob angulos quadrilateri $HVEP$ ad V & P rectos) angulo CEP æqualis est, similia erunt triangu-
 gula VHG , CEP ; & inde fiet ut EP ad CE ita HG ad HV seu HP & ita KI ad KP , & compositæ vel divisim ut CB ad CE ita PI ad PK , & duplicatis consequentibus ut CB ad 2 CE ita PI ad PV , atque ideo ut Pq ad Pm . Est igitur decremen-
 tum lineæ VP , id est, incrementum lineæ $BV-VP$ ad incre-
 mentum lineæ curvæ AP in data ratione CB ad 2 CE ; & prop-
 terea (per Corol. Lem. iv.) longitudines $BV-VP$ & AP , in-
 crementis illis genitæ, sunt in eadem ratione. Sed, existente BV
 radio, est VP co-sinus anguli BVP seu $\frac{1}{2} BEP$, adeoque
 $BV-VP$ sinus versus ejusdem anguli; & propterea in hac Rota,
 cujus radius est $\frac{1}{2} BV$, erit $BV-VP$ duplus sinus versus arcus $\frac{1}{2} BP$.
 Ergo AP est ad duplum sinum versus arcus $\frac{1}{2} BP$ ut 2 CE ad
 CB . $\mathcal{Q} E. D.$

Lineam autem AP in Propositione priore Cycloidem extra
 Globum, alteram in posteriore Cycloidem intra Globum distinc-
 tionis gratia nominabimus.

Corol. 1. Hinc si describatur Cyclois integra ASL & bifecetur
 ea in S , erit longitudo partis PS ad longitudinem VP (quæ du-
 plus est sinus anguli VBP , existente EB radio) ut 2 CE ad CB ,
 atque adeo in ratione data.

Corol. 2. Et longitudo semiperimetri Cycloidis AS æquabitur li-
 neæ rectæ quæ est ad Rotæ diametrum BV , ut 2 CE ad CB .


PROPOSITIO L. PROBLEMA XXXIII.

Facere ut Corpus pendulum oscilletur in Cycloide data.

Intra Globum $\mathcal{Q}VS$, centro C descriptum, detur Cyclois $\mathcal{Q}RS$
 bifecta in R & punctis suis extremis \mathcal{Q} & S superficiiei Globi hinc
 inde occurrens. Agatur CR bifecans arcum $\mathcal{Q}S$ in O , & produca-
 tur ea ad A , ut sit CA ad CO ut CO ad CR . Centro C in-
 tervallo

DE MOTU
CORPORUM

tervallo CA describatur Globus exterior ABD , & intra hunc Globum a Rota, cujus diameter sit AO , describantur duæ Semicycloides AQ , AS , quæ Globum interiorem tangent in Q & S & Globo exteriori occurrant in A . A puncto illo A , Filo APT longitudinem AR æquante, pendeat corpus T , & ita intra Semicycloides AQ , AS oscilletur, ut quoties pendulum digreditur a



perpendiculari AR , Filum parte sui superiore AP applicetur ad Semicycloidem illam APS versus quam peragitur motus, & circum eam ceu obſtaculum ſlectatur, parteque reliqua PT cui Semicyclois nondum objicitur, protendatur in lineam rectam; & pondus T oscillabitur in Cycloide data QRS . Q, E, F .

Occurrat enim Filum PT tum Cycloidi QRS in T , tum circulo QOS in V , agaturque CV ; & ad Fili partem rectam PT , e punctis extremis P ac T , erigantur perpendiculara PB , TW , occurrentia rectæ CV in B & W . Patet, ex constructione & genesi similium Figurarum AS , SR , perpendiculara illa PB , TW abſcindere de CV longitudines VB , VW Rotarum diametris OA , OR æquales. Est igitur TP ad VP (duplum ſinum anguli VBP exiſtente $\frac{1}{2} BV$ radio)

dio) ut BW ad BV , seu $AO+OR$ ad AO , id est (cum sint CA LIEBR. ad CO , CO ad CR & divisim AO ad OR proportionales,) ut $CA+CO$ ad CA , vel, si bisecetur BV in E , ut $2CE$ ad CB . Proinde, (per Corol. 1. Prop. XLIX.) longitudo partis rectæ Fili PT æquatur semper Cycloidis arcui PS , & Filum totum APT æquatur semper Cycloidis arcui dimidio APS , hoc est (per Corol. 2. Prop. XLIX.) longitudini AR . Et propterea vicissim, si Filum manet semper æquale longitudini AR , movebitur punctum T in Cycloide data QRS . *Q. E. D.*

Corol. Filum AR æquatur Semicycloidi AS , adeoque ad semidiametrum AC eandem habet rationem quam similis illi Semicyclois SR habet ad semidiametrum CO .

PROPOSITIO LI. THEOREMA XVIII.

Si vis centripeta tendens undique ad Globi centrum C sit in locis singulis ut distantia loci cujusque a centro, & hac sola Vi agente corpus T oscilletur (modo jam descripto) in perimetro Cycloidis QRS: dico quod oscillationum utcumque inæqualium æqualia erunt Tempora.

Nam in Cycloidis tangentem TW infinite productam cadat perpendiculum CX & jungatur CT . Quoniam vis centripeta qua corpus T impellitur versus C est ut distantia CT , atque hæc (per Legum Corol. 2.) resolvitur in partes CX , TX ; quarum CX impellendo corpus directe a P distendit filum PT & per ejus resistentiam tota cessat, nullum alium edens effectum; pars autem altera TX , urgendo corpus transversim seu versus X , directe accelerat motum ejus in Cycloide; manifestum est quod corporis acceleratio, huic vi acceleratrici proportionalis, sit singulis momentis ut longitudo TX , id est, (ob datas CV , WV iisque proportionales VX , TW ,) ut longitudo TW , hoc est (per Corol. 1. Prop. XLIX.) ut longitudo arcus Cycloidis TR . Pendulis igitur duobus APT , Apt de perpendiculo AR inæqualiter deductis & simul dimissis, accelerationes eorum semper erunt ut arcus describendi TR , tR . Sunt autem partes sub initio descriptæ ut accelerationes, hoc est, ut totæ sub initio describendæ, & propterea partes quæ manent describen-

dæ & accelerationes subsecuentes, his partibus proportionales, sunt etiam ut totæ; & sic deinceps. Sunt igitur accelerationes atque adeo velocitates genitæ & partes his velocitatibus descriptæ partefque describendæ, semper ut totæ; & propterea partes describendæ datam servantes rationem ad invicem simul evanescent, id est, corpora duo oscillantia simul pervenient ad perpendicularum AR . Cumque vicissim ascensus perpendicularorum de loco infimo R , per eosdem arcus Cycloïdales motu retrogrado facti, retardentur in locis singulis a viribus iisdem a quibus descensus accelerabantur, patet velocitates ascensuum ac descensuum per eosdem arcus factorum æquales esse, atque adeo temporibus æqualibus fieri; & propterea, cum Cycloïdis partes duæ RS & RQ ad utrumque perpendiculari latus jacentes sint similes & æquales, pendula duo oscillationes suas tam totas quam dimidias iisdem temporibus semper peragent. $Q.E.D.$


Corol. Vis qua corpus T in loco quovis T acceleratur vel retardatur in Cycloïde, est ad totum corporis ejusdem Pondus in loco altissimo S vel Q , ut Cycloïdis arcus TR ad ejusdem arcum SR vel QR .

PROPOSITIO LII. PROBLEMA XXXIV.

Definire & Velocitates Pendulorum in locis singulis, & Tempora quibus tum oscillationes totæ, tum singulæ oscillationum partes peraguntur.

Centro quovis G , intervallo GH Cycloïdis arcum RS æquante, describe semicirculum $HKMG$ semidiametro GK bisectum. Et si vis centripeta, distantiis locorum a centro proportionalis, tendat ad centrum G , sitque ea in perimetro HIK æqualis vi centripetæ in perimetro Globi QOS (*Vide Fig. Prop. I.*) ad ipsius centrum tendenti; & eodem tempore quo pendulum T dimittitur e loco supremo S , cadat corpus aliquod L ab H ad G : quoniam vires quibus corpora urgentur sunt æquales sub initio & spatiis describendis TR , LG semper proportionales, atque adeo, si æquantur TR & LG , æquales in locis T & L ; patet corpora illa describere spatia ST , HL æqualia sub initio, adeoque subinde pergere æqualiter urgeri, & æqualia spatia describere. Quare, per Prop. xxxviii, tempus quo corpus describit arcum ST est ad tempus oscil-

oscillationis unius, ut arcus HI (tempus quo corpus H perveniet ad L) ad semiperipheriam HKM (tempus quo corpus H perveniet ad M .) Et velocitas corporis penduli in loco T est ad velocitatem ipsius in loco infimo R , (hoc est, velocitas corporis H in loco L ad velocitatem ejus in loco G , seu incrementum momentaneum lineæ HL ad incrementum momentaneum lineæ HG , arcubus HI , HK æquabili fluxu crescentibus) ut ordinatim applicata LI ad radium GK , sive ut $\sqrt{SRq - TRq}$. ad SR . Unde cum, in oscillationibus inæqualibus, describantur æqualibus temporibus arcus totis oscillationum arcubus proportionales; habentur, ex datis temporibus, & velocitates & arcus descripti in oscillationibus universis. Quæ erant primo inveniendæ.



Oscillantur jam Funipendula corpora in Cycloidibus diversis intra Globos diversos, quorum diversæ sunt etiam Vires absolutæ, descriptis: &, si Vis absoluta Globi cujusvis QOS dicatur V , Vis acceleratrix qua Pendulum urgetur in circumferentia hujus Globi, ubi incipit directe versus centrum ejus moveri, erit ut distantia Corporis penduli a centro illo & Vis absoluta Globi conjunctim, hoc est, ut $CO \times V$. Itaque lineola HT , quæ sit ut hæc Vis acceleratrix $CO \times V$, describetur dato tempore; &, si erigatur normalis TZ circumferentiæ occurrens in Z , arcus nascens HZ denotabit datum illud tempus. Est autem arcus hic nascens HZ in subduplicata ratione rectanguli GHT , adeoque ut $\sqrt{GH \times CO \times V}$. Unde Tempus oscillationis integræ in Cycloide QRS (cum sit ut semiperipheria HKM , quæ oscillationem illam integram denotat, directe, utque arcus HZ , qui datum tempus similiter denotat, inverse) fiet ut GH directe & $\sqrt{GH \times CO \times V}$ inverse, hoc est, obæquales GH

 SR
 AR

& SR , ut $\sqrt{CO \times V}$, sive (per Corol. Prop. I.) ut $\sqrt{AC \times V}$. Itaque Oscillationes in Globis & Cycloidibus omnibus, quibuscunque cum Viribus absolutis factæ, sunt in ratione quæ componitur ex subduplicata ratione longitudinis Fili directe, & subduplicata ratione distantie inter punctum suspensionis & centrum Globi.

DE MOTU Globi inverſe, & ſubduplicata ratione Viſ abſolutæ Globi etiam CORPORUM. inverſe. Q. E. I.

Corol. 1. Hinc etiam Oſcillantium, Cadentium & Revolventium corporum tempora poſſunt inter ſe conferri. Nam ſi Rotæ, qua Cyclois intra globum deſcribitur, diameter conſtituatur æqualis ſemidiametro globi, Cyclois evadet Linea recta per centrum globi tranſiens, & Oſcillatio jam erit deſcenſus & ſubſequens aſcenſus in hac recta. Unde datur tum tempus deſcenſus de loco quovis ad centrum, tum tempus huic æquale quo corpus uniformiter circa centrum globi ad diſtantiam quamvis revolvens arcum quadrantalem deſcribit. Eſt enim hoc tempus (per Caſum ſecundum) ad tempus ſemioſcillationis in Cycloide quavis QRS ut 1 ad $\sqrt{\frac{AR}{AC}}$

Corol. 2. Hinc etiam conſeſtantur quæ *Wrennus* & *Hugenius* de Cycloide vulgari adinvenierunt. Nam ſi Globi diameter augeatur in infinitum: mutabitur ejus ſuperficies ſphærica in planum, Viſque centripeta aget uniformiter ſecundum lineas huic plano perpendiculares, & Cyclois noſtra abibit in Cycloidem vulgi. Iſto autem in caſu longitudo arcus Cycloidis, inter planum illud & punctum deſcribens, æqualis evadet quadruplicato ſinui verſo dimidii arcus Rotæ inter idem planum & punctum deſcribens; ut invenit *Wrennus*: Et Pendulum inter duas ejuſmodi Cycloides in ſimili & æquali Cycloide temporibus æqualibus oſcillabitur, ut demonſtravit *Hugenius*. Sed & Deſcenſus gravium, tempore Oſcillationis unius, is erit quem *Hugenius* indicavit.


Aptantur autem Propositiones a nobis demonſtratæ ad veram conſtitutionem Terræ, quatenus Rotæ cundo in ejus circulis maximis deſcribunt motu Clavorum, perimetris ſuis infixorum, Cycloides extra globum; & Pendula inferius in fodinis & cavernis Terræ ſuſpenſa, in Cycloidibus intra globos oſcillari debent, ut Oſcillationes omnes evadant Hoehronæ. Nam Gravitæ (ut in Libro tertio docebitur) decreſcit in progreſſu a ſuperficie Terræ, ſurſum quidem in duplicata ratione diſtantiarum a centro ejus, deorſum vero in ratione ſimplici.

PROPO.

PROPOSITIO LIII. PROBLEMA XXXV.

Concessis Figurarum curvilinearum quadraturis, invenire Vires quibus corpora in datis curvis lineis Oscillationes semper Isochronas peragent.

Oscilletur Corpus T in curva quavis linea $STRQ$, cujus axis sit OR transiens per virium centrum C . Agatur TX quæ curvam illam in corporis loco quovis T contingat, inque hac tan-



gente TX capiatur TT' æqualis arcui TR . Nam longitudo arcus illius ex Figurarum quadraturis (per Methodos vulgares) innotescit. De puncto T' educatur recta $T'Z$ tangenti perpendicularis. Agatur CT perpendiculari illi occurrens in Z , & erit Vis centripeta proportionalis rectæ TZ : *Q. E. I.*

Nam

DE MOTU
CORPORUM

Nam si vis, quæ corpus trahitur de T versus C , exponatur per rectam TZ captam ipsi proportionalem, resolvetur hæc in vires TT , TZ ; quarum TZ trahendo corpus secundum longitudinem Fili PT , motum ejus nil mutat, vis autem altera TT motum ejus in curva $STRQ$ directe accelerat, vel directe retardat. Proinde cum hæc sit ut via describenda TR , accelerationes corporis vel retardationes in Oscillationum duarum (majoris & minoris) partibus proportionalibus describendis, erunt semper ut partes illæ, & propterea facient ut partes illæ simul describantur. Corpora autem quæ partes totis semper proportionales simul describunt, simul describent totas. $Q. E. D.$

Corol. 1. Hinc* si corpus T Filo rectilineo AT a centro A pendens, describat arcum circulem $STRQ$, & interea urgeatur secundum lineas parallelas deorsum a vi aliqua, quæ sit ad vim uniformem Gravitatis, ut arcus TR ad ejus sinum TN : æqualia erunt Oscillationum singularum tempora. Etenim ob parallelas TZ , AR , similia erunt triangu-
la ATN , ZTT ; & propterea TZ erit ad AT ut TT ad TN ; hoc est, (si Gravitatis vis uniformis exponatur per longitudinem datam AT) vis TZ , qua Oscillationes evadent Isochronæ, erit ad vim Gravitatis AT , ut arcus TR ipsi TT æqualis ad arcus illius sinum TN .

Corol. 2. Igitur in Horologiis, si vires a Machina in Pendulum ad motum conservandum impressæ ita cum vi Gravitatis componi possint, ut vis tota deorsum semper sit ut linea quæ oritur applicando rectangulum sub arcu TR & radio AR ad sinum TN , Oscillationes omnes erunt Isochronæ.

PROPOSITIO LIV. PROBLEMA XXXVI.


Concessis Figurarum curvilinearum quadraturis, inveniri Tempora quibus corpora vi qualibet centripeta in lineis quibuscunque curvis, in plano per centrum Virium transeunte descriptis, descendant & ascendant.

Descendat corpus de loco quovis S per lineam quamvis curvam $STtR$, in plano per virium centrum C transeunte datam. Jungatur CS & dividatur eadem in partes innumeras æquales, sitque Dd partium

partium illarum aliqua. Centro C , intervallis CD , Cd describantur circuli DT , dt , lineæ curvæ $STtR$ occurrentes in T & t .

LIBER
PRIMUS.

Et ex data tum lege vis centripetæ tum altitudine CS de qua corpus cecidit, dabitur velocitas corporis in alia quavis altitudine CT , per Prop. xxxix. Tempus autem, quo corpus describit lineolam Tt , est ut lineolæ hujus longitudo (id est ut secans anguli tTC) directe, & velocitas inverse. Tempori huic proportionalis sit ordinatim applicata DN ad rectam CS per punctum D perpendicularis, & ob datam Dd erit rectangulum $Dd \times DN$, hoc est area $DNnd$, eidem tempori proportionale. Ergo si SNn sit curva illa lineæ quam punctum N perpetuo tangit, erit area $SNDS$ proportionalis tempori quo corpus descendendo descripsit lineam ST ; proindeque ex inventa illa area dabitur Tempus. Q. E. I.



PROPOSITIO LV. THEOREMA XIX.

Si corpus movetur in superficie quacunque curva, cujus axis per centrum Virium transit, & a corpore in axem demittatur perpendicularis, eique parallela & æqualis ab axis puncto quovis dato ducatur: dico quod parallela illa aream tempori proportionalem describet.


Sit $BSKL$ superficies curva, T corpus in ea revolvens, $STtR$ Trajectoria quam corpus in eadem describit, S initium Trajectoriæ, $OMNK$ axis superficiæ curvæ, TN recta a corpore in axem perpendicularis, OP huic parallela & æqualis a puncto O quod in axe datur educta, AP vestigium Trajectoriæ a puncto P in lineæ volubilis OP plano AOP descriptum, A vestigii initium puncto S respondens, TC recta a corpore ad centrum ducta; TG pars ejus vi centripetæ qua corpus urgetur in centrum C proportionalis; TM recta ad superficiem curvam perpendicularis, TI pars ejus vi pressiois, qua corpus urget superficiem vicissimque urgetur versus M

T

a

DE MOTU
CORPORUM

a superficie, proportionalis; *PHTF* recta axi parallela per corpus transiens, & *GF*, *IH* rectæ a punctis *G* & *I* in parallelam illam *PHTF* perpendiculariter demissæ. Dico jam quod area *AOP*, radio *OP* ab initio motus descripta, sit tempori proportionalis. Nam vis *TG* (per Legum Corol. 2.) resolvitur in vires *TF*, *FG*; & vis *TI* in vires *TH*, *HI*: Vires autem *TF*, *TH* agendo secundum lineam *PF* plano *AOP* perpendicularem mutant solummodo motum corporis



quatenus huic plano perpendicularem. Ideoque motus ejus quatenus secundum positionem plani factus, hoc est, motus puncti *P* quo Trajectoriæ vestigium *AP* in hoc plano describitur, idem est ac si vires *TF*, *TH* tollerentur, & corpus solis viribus *FG*, *HI* ageretur; hoc est, idem ac si corpus in plano *AOP*, vi centripeta ad centrum *O* tendente & summam virium *FG* & *HI* æquante, describeret curvam *AP*. Sed vi tali describitur area *AOP* (per Prop. 1.) tempori proportionalis. Q. E. D.

Corol. Eodem argumento si corpus a viribus agitatum ad centra duo vel plura in eadem quavis recta *CO* data tendentibus, describeret in spatio libero lineam quamcunque curvam *ST*; foret area *AOP* tempori semper proportionalis.

PROPOSITIO LVI. PROBLEMA XXXVII.

Concessis Figurarum curvilinearum quadraturis, datisque tum lege Vis centripetæ ad centrum datum tendentis, tum superficie curva cujus axis per centrum illud transit; invenienda est Trajectoria quam corpus in eadem superficie describet, de loco dato, data cum Velocitate, versus plagam in superficie illa datam egressum.

Stan-

Stantibus quæ in superiore Propositione constructa sunt, exeat LITERA corpus de loco S in Trajectoriam inveniendam $STtR$; &, ex da-PRIMUM ta ejus velocitate in altitudine SC , dabitur ejus velocitas in alia quavis altitudine TC . Ea cum velocitate, dato tempore quam minimo, describat corpus Trajectoriæ suæ particulam Tt , sitque Pp vestigium ejus in plano AOP descriptum. Jungatur Op , & Circelli centro T intervallo Tt in superficie curva descripti sit PpQ vestigium Ellipticum in eodem plano $OAPp$ descriptum. Et ob datum magnitudine & positione Circellum, dabitur Ellipsis illa PpQ . Cumque area POp sit tempori proportionalis, atque adeo ex dato tempore detur, dabitur Op positione, & inde dabitur communis ejus & Ellipteos intersectio p , una cum angulo OPp , in quo Trajectoriæ vestigium APp secat lineam OP . Inde autem inveniatur Trajectoriæ vestigium illud APp , eadem methodo qua curva linea $VIKk$ in Propositione XLI, ex similibus datis inventa fuit. Tum ex singulis vestigii punctis P erigendo ad planum AOP perpendicularia PT superficiiei curvæ occurrentia in T , dabuntur singula Trajectoriæ puncta T . *Q. E. I.*

S E C T I O XI.

De Motu Corporum Viribus centripetis se mutuo petentium.

Hactenus exposui Motus corporum attractorum ad centrum immobile, quale tamen vix extat in rerum natura. Attractiones enim fieri solent ad corpora; & corporum trahentium & attractorum actiones semper mutua sunt æquales, per Legem tertiam: adeo ut neque attrahens possit quiescere neque attractum, si duo sint corpora, sed ambo (per Legum Corollarium quartum) quasi attractione mutua, circum gravitatis centrum commune revolvantur; & si plura sint corpora (quæ vel ab unico attrahantur vel omnia se mutuo attrahant) hæc ita inter se moveri debeant, ut gravitatis centrum commune vel quiescat vel uniformiter moveatur in directum. Qua de causa jam pergo Motum exponere corporum se mutuo trahentium, considerando Vires centripetas tanquam Attractiones, quamvis fortasse, si physice loquamur, verius dicantur Impulsus. In Mathematicis enim jam versamur, & propterea missis disputationibus Physicis, familiari utimur sermone, quo possimus a Lectoribus Mathematicis facilius intelligi.

T 2

PRO-

PROPOSITIO LVII. THEOREMA XX.


Corpora duo se invicem trahentia describunt, & circum commune centrum gravitatis, & circum se mutuo, Figuras similes.

Sunt enim distantiae a communi gravitatis centro reciproce proportionales corporibus, atque adeo in data ratione ad invicem, & componendo in data ratione ad distantiam totam inter corpora. Feruntur autem hae distantiae circum terminos suos communi motu angulari, propterea quod in directum temper jacentes non mutant inclinationem ad se mutuo. Lineae autem rectae, quae sunt in data ratione ad invicem, & aequali motu angulari circum terminos suos feruntur, Figuras circum eisdem terminos (in planis quae una cum his terminis vel quiescunt vel motu quovis non angulari moventur) describunt omnino similes. Proinde similes sunt Figurae quae his distantis circumactis describuntur. Q. E. D.

PROPOSITIO LVIII. THEOREMA XXI.

Si corpora duo Viribus quibusvis se mutuo trahunt, & interea volvuntur circa gravitatis centrum commune: dico quod Figuris, quas corpora sic mota describunt circum se mutuo, potest Figura similis & aequalis, circum corpus alterutrum immotum, Viribus iisdem describi.

Revolvantur corpora S , P circa commune gravitatis centrum C , pergendo de S ad T deque P ad Q . A dato puncto s ipsi



SP , TQ aequales & parallelae ducantur semper sp , sq ; & Curva pqv quam punctum p , revolvendo circum punctum immotum s , describit,

describit, erit similis & æqualis Curvis quas corpora S , P describunt circum se mutuo : proindeque (per Theor. xx.) similis Curvis ST & PQV , quas eadem corpora describunt circum commune gravitatis centrum C : id adeo quia proportionales linearum SC , CP & SP vel sp ad invicem dantur.

Caf. 1. Commune illud Gravitatis centrum C , per Legum Corollarium quantum, vel quiescit vel movetur uniformiter in directum. Ponamus primo quod id quiescit, inque s & p locentur corpora duo, immobile in s , mobile in p , corporibus S & P similia & æqualia. Dein tangant rectæ PR & pr Curvas PQ & pq in P & p , & producantur CQ & sq ad R & r . Et, ob similitudinem Figurarum $CPRQ$, $sprq$, erit RQ ad rq ut CP ad sp , adeoque in data ratione. Proinde si vis qua corpus P versus corpus S , atque adeo versus centrum intermedium C attrahitur, esset ad vim qua corpus p versus centrum s attrahitur in eadem illa ratione data; hæ vires æqualibus temporibus attraherent semper corpora de tangentibus PR , pr ad arcus PQ , pq , per intervalla ipsis proportionalia RQ , rq ; adeoque vis posterior efficeret ut corpus p gyraretur in Curva pqv , quæ similis esset Curvæ PQV , in qua vis prior efficit ut corpus P gyretur, & revolutiones iisdem temporibus complerentur. At quoniam vires illæ non sunt ad invicem in ratione CP ad sp , sed (ob similitudinem & æqualitatem corporum S & s , P & p , & æqualitatem distantiarum SP , sp) sibi mutuo æquales; corpora æqualibus temporibus æqualiter trahentur de tangentibus: & propterea, ut corpus posterius p trahatur per intervallum majus rq , requiritur tempus majus, idque in subduplicata ratione intervallorum; propterea quod (per Lemma decimum) spatia, ipso motus initio descripta, sunt in duplicata ratione temporum. Ponatur igitur velocitas corporis p esse ad velocitatem corporis P in subduplicata ratione distantie sp ad distantiam CP , eo ut temporibus, quæ sint in eadem subduplicata ratione, describantur arcus pq , PQ , qui sunt in ratione integra: Et corpora P , p viribus æqualibus tempe attracta describent circum centra quiescentia C & s figuras similes PQV , pqv , quarum posterior pqv similis est & æqualis figuræ quam corpus P circum corpus mobile S describit. *Q.E.D.*

Caf. 2. Ponamus jam quod commune gravitatis centrum, una cum spatio in quo corpora moventur inter se, progreditur uniformiter in directum; & per Legum Corollarium sextum, motus omnes in hoc spatio peragentur ut prius, adeoque corpora descri-

DE MOTU
CORPORUM

bent circum se mutuo Figuras easdem ac prius, & propterea Figuræ pqv similes & æquales. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc corpora duo Viribus distantiae suæ proportionalibus se mutuo trahentia, describunt (per Prop. x.) & circum commune gravitatis centrum, & circum se mutuo, Ellipses concentricas: & vice versa, si tales Figuræ describuntur, sunt Vires distantiae proportionales.

Corol. 2. Et corpora duo Viribus quadrato distantiae suæ reciproce proportionalibus describunt (per Prop. xi, xii, xiii.) & circum commune gravitatis centrum, & circum se mutuo, Sectiones conicas umbilicum habentes in centro circum quod Figuræ describuntur. Et vice versa, si tales Figuræ describuntur, Vires centripetæ sunt quadrato distantiae reciproce proportionales.

Corol. 3. Corpora duo quævis circum gravitatis centrum commune gyrantia, radiis & ad centrum illud & ad se mutuo ductis, describunt areas temporibus proportionales.

PROPOSITIO LIX. THEOREMA XXII.

Corporum duorum S & P circa commune gravitatis centrum C revolvendum Tempus periodicum esse ad Tempus periodicum corporis alterutrius P, circa alterum immotum S gyrantis & Figuris quæ corpora circum se mutuo describunt Figuram similem & æqualem describentis, in subduplicata ratione corporis alterius S, ad summam corporum S + P.

Namque, ex demonstratione superioris Propositionis, temporibus quibus arcus quivis similes PQ & pq describuntur, sunt in subduplicata ratione distantiarum CP & SP vel sp , hoc est, in subduplicata ratione corporis S ad summam corporum $S + P$. Et componendo, summæ temporum quibus arcus omnes similes PQ & pq describuntur, hoc est, tempora tota quibus Figuræ totæ similes describuntur, sunt in eadem subduplicata ratione. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO LX. THEOREMA XXIII.

Si corpora duo S & P, Viribus quadrato distantiae suae reciproce proportionalibus se mutuo trahentia, revolvuntur circa gravitatis centrum commune: dico quod Ellipseos, quam corpus alterutrum P hoc motu circa alterum S describit, Axis principalis erit ad Axem principalem Ellipseos, quam corpus idem P circa alterum quiescens S eodem tempore periodico describere posset, ut summa corporum duorum S + P ad primam duarum medie proportionalium inter hanc summam & corpus illud alterum S.

Nam si descriptæ Ellipses essent sibi invicem æquales, tempora periodica (per Theorema superius) forent in subduplicata ratione corporis S ad summam corporum S + P. Minuatur in hac ratione tempus periodicum in Ellipti posteriore, & tempora periodica evadent æqualia; Ellipseos autem axis principalis (per Prop. xv.) minuatur in ratione cujus hæc est sesquuplicata, id est in ratione, cujus ratio S ad S + P est triplicata; adeoque erit ad axem principalem Ellipseos alterius, ut prima duarum medie proportionalium inter S + P & S ad S + P. Et inverse, axis principalis Ellipseos circa corpus mobile descriptæ erit ad axem principalem descriptæ circa immobile, ut S + P ad primam duarum medie proportionalium inter S + P & S. Q. E. D.

PROPOSITIO LXI. THEOREMA XXIV.

Si corpora duo Viribus quibuscumque se mutuo trahentia, neque alias agitata vel impedita, quomodocunque moveantur; motus eorum perinde se habebunt ac si non traherent se mutuo, sed utrumque a corpore tertio in communem gravitatis centro constituto Viribus iisdem traheretur: Et Virium trahentium eadem erit Lex respectu distantiae corporum a centro illo communi atque respectu distantiae totius inter corpora.

Nam vires illæ, quibus corpora se mutuo trahunt, tendendo ad corpora, tendunt ad commune gravitatis centrum intermedium,

DE MOTU
CORPORUM

dium, adeoque eadem sunt ac si a corpore intermedio manarent.
Q. E. D.

Et quoniam data est ratio distantiae corporis utriusvis a centro illo communi ad distantiam corporis ejusdem a corpore altero, dabitur ratio cujusvis potestatis distantiae unius ad eandem potestatem distantiae alterius; ut & ratio quantitatis cujusvis, quæ ex una distantia & quantitibus datis utcumque derivatur, ad quantitatem aliam, quæ ex altera distantia & quantitibus totidem datis datamque illam distantiarum rationem ad priores habentibus similiter derivatur. Proinde si vis, qua corpus unum ab altero trahitur, sit directe vel inverse ut distantia corporum ad invicem; vel ut quælibet hujus distantiae potestas; vel denique ut quantitas quævis ex hac distantia & quantitibus datis quomodocumque derivata: erit eadem vis, qua corpus idem ad commune gravitatis centrum trahitur, directe itidem vel inverse ut corporis attracti distantia a centro illo communi, vel ut eadem distantiae hujus potestas, vel denique ut quantitas ex hac distantia & analogis quantitibus datis similiter derivata. Hoc est, Vis trahentis eadem erit Lex respectu distantiae utriusque. Q. E. D.

PROPOSITIO LXII. PROBLEMA XXXVIII.

Corporum duorum quæ Viribus quadrato distantiae suæ reciproce proportionalibus se mutuo trahunt, ac de locis datis demittuntur, determinare Motus.

Corpora (per Theorema novissimum) perinde movebuntur ac si a corpore tertio, in communi gravitatis centro constituto, traherentur; & centrum illud ipso motus initio quiescet per Hypothesin; & propterea (per Legum Corol. 4.) semper quiescet. Determinandi sunt igitur motus corporum (per Prob. xxv,) perinde ac si a viribus ad centrum illud tendentibus urgerentur, & habebuntur motus corporum se mutuo trahentium. Q. E. I.

PROPOSITIO LXIII. PROBLEMA XXXIX.

Corporum duorum quæ Viribus quadrato distantiae suæ reciproce proportionalibus se mutuo trahunt, deque locis datis, secundum datas rectas, datis cum Velocitatibus exeunt, determinare Motus.

Ex


De Motu
Corporum.

viribus prioribus majores; adeoque (per Corol. 1. Prop. x. & Corol. 1 & 8. Prop. 1v) efficiunt ut corpora illa describant Ellipses ut prius, sed motu celeriore. Vires reliquæ acceleratrices SD & SD , actionibus motricibus $SD \times T$ & $SD \times L$, quæ sunt ut corpora, trahendo corpora illa æqualiter & secundum lineas TI , LK , ipsi DS parallelas, nil mutant situs eorum ad invicem, sed faciunt ut ipsa æqualiter accedant ad lineam IK ; quam ductam concipe per medium corporis S , & lineæ DS perpendicularem. Impedietur autem ille ad lineam IK accessus faciendo ut Systema corporum T & L ex una parte, & corpus S ex altera, iustis cum velocitatibus, gyrentur circa commune gravitatis centrum C . Tali motu corpus S (eo quod summa virium motricium $SD \times T$ & $SD \times L$, distantia CS proportionalium, tendit versus centrum C) describit Ellipsin circa idem C ; & punctum D , ob proportionales CS , CD , describit Ellipsin consimilem e regione. Corpora autem T & L viribus motricibus $SD \times T$ & $SD \times L$, (prius priore, posterius posteriore) æqualiter & secundum lineas parallelas TI & LK (ut dictum est) attracta, pergent (per Legum Corollarium quintum & sextum) circa centrum mobile D Ellipses suas describere, ut prius.

Q. E. I.

Addatur jam corpus quantum V , & simili argumento concludetur hoc & punctum C Ellipses circa omnium commune centrum gravitatis B describere; manentibus motibus priorum corporum T , L & S circa centra D & C , sed paulo acceleratis. Et eadem methodo corpora plura adjungere licebit. Q. E. I.

Hæc ita se habent ubi corpora T & L trahunt se mutuo viribus acceleratricibus majoribus vel minoribus quam quibus trahunt corpora reliqua pro ratione distantiarum. Sunt mutua omnium attractiones acceleratrices ad invicem ut distantia ductæ in corpora trahentia, & ex præcedentibus facile deducetur quod corpora omnia æqualibus temporibus periodicis Ellipses varias, circa omnium commune gravitatis centrum B , in plano immobili describunt. Q. E. I.



PROPO-

PROPOSITIO LXV. THEOREMA XXV.

LIXPR.
PRIMUS.

Corpora plura, quorum Vires decreſcant in duplicata ratione diſtantiarum ab eorundem centrīs, moveri poſſe inter ſe in Ellipſibus; & radiis ad umbilicos ductis areas deſcribere temporibus proportionales quam proxime.

In Propositione ſuperiore demonſtratus eſt caſus ubi motus plures peraguntur in Ellipſibus accurate. Quo magis recedit Lex virium a Lege ibi poſita, eo magis corpora perturbabunt mutuos motus; neque fieri poteſt ut corpora, ſecundum Legem hic poſitam ſe mutuo trahentia, moveantur in Ellipſibus accurate; niſi ſervando certam proportionem diſtantiarum ab invicem. In ſequentibus autem caſibus non multum ab Ellipſibus errabitur.

Caſ. 1. Pone corpora plura minora circa maximum aliquod ad varias ab eo diſtantias revolvi, tendantque ad ſingula vires abſolutæ proportionales iſdem corporibus. Et quoniam omnium commune gravitatis centrum (per Legum Corol. quartum) vel quieſcit vel movetur uniformiter in directum, ſingamus corpora minora tam parva eſſe, ut corpus maximum nunquam diſtet ſenſibiliter ab hoc centro: & maximum illud vel quieſcet vel movebitur uniformiter in directum, abſque errore ſenſibili; minora autem revolvuntur circa hoc maximum in Ellipſibus, atque radiis ad idem ductis deſcribent areas temporibus proportionales; niſi quatenus errores inducuntur, vel per errorem maximi a communi illo gravitatis centro; vel per actiones minorum corporum in ſe mutuo. Diminui autem poſſunt corpora minora uſque donec error iſte & actiones mutue ſint datis quibuſvis minores, atque adeo donec Orbes cum Ellipſibus quadrent, & areae respondeant temporibus abſque errore qui non ſit minor quovis dato. Q. E. O.

Caſ. 2. Singamus jam Syſtema corporum minorum modo jam deſcripto circa maximum revolventium, aliudve quodvis duorum circum ſe mutuo revolventium corporum Syſtema progredi uniformiter in directum, & interea vi corporis alterius longe maximi & ad magnam diſtantiā ſiti urgeri ad latus. Et quoniam æquales vires acceleratrices, quibus corpora ſecundum lineas parallelas urgentur, non mutant ſitus corporum ad invicem, ſed ut Syſtema totum, ſervatis partium motibus inter ſe, ſimul transferatur efficiunt: maniſeſtum eſt quod, ex attractionibus in corpus maximum,

DE MOTU
CORPORUM

nulla prorsus orietur mutatio motus attractorum inter se, nisi vel ex attractionum acceleratricum inæqualitate, vel ex inclinatione linearum ad invicem, secundum quas attractiones fiunt. Pone ergo attractiones omnes acceleratrices in corpus maximum esse inter se reciproce ut quadrata distantiarum; & augendo corporis maximi distantiam, donec reclarum ab hoc ad reliqua ductarum differentia, respectu earum longitudinis, & inclinationes ad invicem minores sint quam data quævis, perseverabunt motus partium Systematis inter se absque erroribus qui non sint quibuscvis datis minores. Et quoniam, ob exiguum partium illarum ab invicem distantiam, Systema totum ad modum corporis unius attrahitur; movebitur idem hac attractione ad modum corporis unius; hoc est, centro suo gravitatis describet circa corpus maximum Sectionem aliquam Conicam (*viz.* Hyperbolam vel Parabolam attractione languida, Ellipsin fortiore,) & Radio ad maximum ducto describet areas temporibus proportionales, absque aliis erroribus, nisi quas partium distantia (perexigua sane & pro lubitu minuenda) valeant efficere. *Q. E. O.*

Simili argumento pergere licet ad casus magis compositos in infinitum.

Corol. 1. In casu secundo; quo propius accedit corpus omnium maximum ad Systema duorum vel plurium, eo magis turbabuntur motus partium Systematis inter se; propterea quod linearum a corpore maximo ad has ductarum jam major est inclinatio ad invicem, majorque proportionis inæqualitas.

Corol. 2. Maxime autem turbabuntur, ponendo quod attractiones acceleratrices partium Systematis versus corpus omnium maximum, non sint ad invicem reciproce ut quadrata distantiarum a corpore illo maximo; præsertim si proportionis hujus inæqualitas major sit quam inæqualitas proportionis distantiarum a corpore maximo: Nam si vis acceleratrix, æqualiter & secundum lineas parallelas agendo, nil perturbat motus inter se, necesse est ut ex actionis inæqualitate perturbatio oriatur, majorque sit vel minor pro majore vel minore inæqualitate. Excessus impulsuum majorum, agendo in aliqua corpora & non agendo in alia, necessario mutant situm eorum inter se. Et hæc perturbatio, addita perturbationi quæ ex linearum inclinatione & inæqualitate oritur, majorem reddet perturbationem totam.

Corol. 3. Unde si Systematis hujus partes in Ellipsis vel Circulis sine perturbatione insigni moveantur; manifestum est, quod eadem


eædem a viribus acceleratricibus ad alia corpora tendentibus, aut non urgentur nisi levissime, aut urgentur aequaliter secundum lineas parallelas quamproxime: LIBER PRIMUS

PROPOSITIO LXVI. THEOREMA XXVI:

Si corpora tria, quorum Vires decrescunt in duplicata ratione distantiarum, se mutuo trahant, & attractiones acceleratrices binorum quorumcunque in tertium sint inter se reciproce ut quadrata distantiarum; minora autem circa maximum revolvantur: Dico quod interius circa intimum & maximum, radiis ad ipsum ductis, describet areas temporibus magis proportionales, & Figuram ad formam Ellipseos umbilicum in concursu radiorum habentis magis accedentem, si corpus maximum his attractionibus agitur, quam si maximum illud vel a minoribus non attractum quiescat, vel multo minus vel multo magis attractum aut multo minus aut multo magis agitur.

Liquet fere ex demonstratione Corollarii secundi Propositionis præcedentis; sed argumento magis distincto & latius cogente sic evincitur.

Cas. 1. Revolvantur corpora minora P & S in eodem plano circa maximum T , quorum P describat Orbem interiorem PAB , & S exteriorem SE . Sit SK mediocris distantia corporum P & S ; & corporis P versus S attractio acceleratrix in mediocri illa distantia exponatur per eandem. In duplicata ratione SK ad SP capiatur SL ad SK , & erit SL attractio acceleratrix corporis P versus S in distantia quavis SP . Iunge PT , eique parallelam age LM occurrentem ST in M , & attractio SL resolvetur (per Legum Corol. 2.) in attractiones SM , LM . Et sic urgebitur corpus P vi acceleratrice triplici:



Exponatur corporis T attractio acceleratrix versus S per lineam SN ; & si attractiones acceleratrices SM , SN æquales essent; hæc trahendo corpora T & P æqualiter & secundum lineas parallelas, nil mutarent situm eorum ad invicem. Iidem jam forent corporum illorum motus inter se (per Legum Corol. 6.) ac si hæc attractiones tollerentur. Et pari ratione si attractio SN minor esset attractione SM , tolleretur ipsa attractionis SM partem SN , & maneret pars sola MN , qua temporum & arearum proportionalitas & Orbitæ forma illa Elliptica perturbaretur. Et similiter si attractio SN major esset attractione SM , oriretur ex differentia sola MN perturbatio proportionalitatis & Orbitæ. Sic per attractionem SN reducitur semper attractio tertia superior SM ad attractionem MN , attractione prima & secunda manentibus prorsus immutatis: & propterea areæ ac tempora ad proportionalitatem, & Orbita PAB ad formam præfatam Ellipticam tum maxime accedunt, ubi attractio MN vel nulla est, vel quam fieri possit minima; hoc est, ubi corporum P & T attractiones acceleratrices, factæ versus corpus S , accedunt quantum fieri potest ad æqualitatem; id est, ubi attractio SN non est nulla, neque minor minima attractionum omnium SM , sed inter attractionum omnium SM maximam & minimam quasi mediocris, hoc est, non multo major neque multo minor attractione SK . *Q. E. D.*

Caf 2. Revolvantur jam corpora minora P , S circa maximum T in planis diversis; & vis LM , agendo secundum lineam PT in plano Orbitæ PAB sitam, eundem habebit effectum ac prius, neque corpus P de plano Orbitæ suæ deturbabit. At vis altera NM , agendo secundum lineam quæ ipsi ST parallela est, (atque adeo, quando corpus S versatur extra lineam Nodorum, inclinatur ad planum Orbitæ PAB ;) præter perturbationem motus in Longitudinem jam ante expositam, inducet perturbationem motus in Latitudinem, trahendo corpus P de plano suæ Orbitæ. Et hæc perturbatio, in dato quovis corporum P & T ad invicem situ, erit ut vis illa generans NM , adeoque minima evadet ubi MN est minima, hoc est (uti jam exposui) ubi attractio SN non est multo major, neque multo minor attractione SK . *Q. E. D.*

Corol. 1. Ex his facile colligitur quod, si corpora plura minora P , S , R , &c. revolvantur circa maximum T , motus corporis intimi P minime perturbabitur attractionibus exteriorum, ubi corpus maximum T pariter a cæteris, pro ratione virium acceleratricum, attrahitur & agitur atque cætera a se mutuo.

Corol.

ris periodici inverſe: patet hanc rationem compoſitam diminui per actionem vis KL , adeoque tempus periodicum, ſi maneat Orbis radius TP , augeri, idque in ſubduplicata ratione qua vis illa centripeta diminuitur: auctoque adeo vel diminuto hoc Radio, tempus periodicum augeri magis, vel diminui minus quam in Radii huius ratione ſeſquiplicata, per Corol. 6. Prop. 1v. Si vis illa corporis centralis paulatim languſceret, corpus P minus ſemper & minus attractum perpetuo recederet longius a centro T ; & contra, ſi vis illa augetur, accederet propius. Ergo ſi actio corporis longinqui S , qua vis illa diminuitur, augeatur ac diminuat per vices; augebitur ſimul ac diminuetur Radius TP per vices, & tempus periodicum augebitur ac diminuetur in ratione compoſita ex ratione ſeſquiplicata Radii & ratione ſubduplicata qua vis illa centripeta corporis centralis T , per incrementum vel decrementum actionis corporis longinqui S , diminuitur vel augetur.

Corol. 7. Ex præmiſſis conſequitur etiam quod Ellipſeos a corpore P deſcriptæ Axis, ſeu Aphidum linea, quoad motum angularem progreditur & regreditur per vices, ſed magis tamen progreditur, & in ſingulis corporis revolutionibus per exceſſum progreſſionis fertur in conſequentia. Nam vis qua corpus P urgetur in corpus T in Quadraturis, ubi vis MN evanuit, componitur ex vi LM & vi centripeta qua corpus T trahit corpus P . Vis prior LM , ſi augeatur diſtantiæ PT , augetur in eadem fere ratione cum hac diſtantiæ, & vis poſterior decreſcit in duplicata illa ratione, adeoque ſumma harum virium decreſcit in minore quam duplicata ratione diſtantiæ PT , & propterea (per Corol. 1. Prop. xlv.) eſſicit ut Aux, ſeu Apſis ſumma, regrediatur. In Conjunctione vero & Oppoſitione, vis qua corpus P urgetur in corpus T differentia eſt inter vim qua corpus T trahit corpus P & vim KL ; & differentia illa, propterea quod vis KL augetur quamproxime in ratione diſtantiæ PT , decreſcit in majore quam duplicata ratione diſtantiæ PT , adeoque (per Corol. 1. Prop. xlv.) eſſicit ut Aux progrediatur. In locis inter Syzygias & Quadraturas pendet motus Augis ex cauſa utraque conjunctim, adeo ut pro huius vel alterius exceſſu progrediatur ipſa vel regrediatur. Unde cum vis KL in Syzygiis ſit quaſi duplo major quam vis LM in Quadraturis; exceſſus in tota revolutione erit penes vim KL , transferetque Augem ſingulis revolutionibus in conſequentia. Veritas autem huius præcedentis Corollarii facilius intelligitur concipiendo Systema corporum duorum T , P corporibus pluribus S , S , S , &c. in Orbe ESE conſiſtentibus, undique cingi. Namque horum actioni

X

bus

& maxima fit ubi Apfides sunt in Syzygiis. Si Apfides constituantur in Quadraturis, ratio prope Apfides minor est & prope Syzy-
 gias major quam duplicata distantiarum, & ex ratione illa majori oritur Augis motus velocissimus, uti jam dictum est. At si consideretur ratio incrementi vel decrementi totius in progressu inter Apfides, hæc minor est quam duplicata distantiarum. Vis in Apfide ima est ad vim in Apfide summa in minore quam duplicata ratione distantiae Apfidis summæ ab umbilico Ellipseos ad distantiam Apfidis imæ ab eodem umbilico: & e contra, ubi Apfides constituantur in Syzygiis, vis in Apfide ima est ad vim in Apfide summa in majore quam duplicata ratione distantiarum. Nam vires LM in Quadraturis additæ viribus corporis T componunt vires in ratione minore, & vires KL in Syzygiis subductæ viribus corporis T relinquunt vires in ratione majore. Est igitur ratio decrementi & incrementi totius, in transitu inter Apfides, minima in Quadraturis, maxima in Syzygiis: & propterea in transitu Apfidum a Quadraturis ad Syzygias perpetuo augetur, augetque Excentricitatem Ellipseos; inque transitu a Syzygiis ad Quadraturas perpetuo diminuitur, & Excentricitatem diminuit.

Corol. 10. Ut rationem ineamus errorum in Latitudinem, fingamus planum Orbis EST immobile manere; & ex errorum exposita causa manifestum est, quod, ex viribus NM , ML , quæ sunt causa illa tota, vis ML agendo semper secundum planum Orbis PAB , nunquam perturbat motus in Latitudinem; quodque vis NM , ubi Nodi sunt in Syzygiis, agendo etiam secundum idem Orbis planum, non perturbat hos motus; ubi vero sunt in Quadraturis eos maxime perturbat, corpusque P de plano Orbis sui perpetuo trahendo, minuit inclinationem plani in transitu corporis a Quadraturis ad Syzygias, augetque vicissim eandem in transitu a Syzygiis ad Quadraturas. Unde fit ut corpore in Syzygiis existente inclinatio evadat omnium minima, redeatque ad priorem magnitudinem circiter, ubi corpus ad Nodum proximum accedit. At si Nodi constituantur in Octantibus post Quadraturas, id est, inter C & A , D & B , intelligitur ex modo expositis quod, in transitu corporis P a Nodo alterutro ad gradum inde nonagesimum, inclinatio plani perpetuo minuitur; deinde in transitu per proximos 45 gradus, usque ad Quadraturam proximam, inclinatio augetur, & postea de novo in transitu per alios 45 gradus, usque ad Nodum proximum, diminuitur. Magis itaque diminuitur inclinatio quam augetur, & propterea minor est semper in Nodo subsequente quam in præcedente.

DE MOTU
CORPORUM

dente. Et simili ratiocinio, inclinatio magis augeatur quam diminuitur ubi Nodi sunt in Oſtantibus alteris inter $A \& D$, $B \& C$. Inclinatio igitur ubi Nodi sunt in Syzygiis est omnium maxima. In transitu eorum a Syzygiis ad Quadraturas, in singulis corporis ad Nodos appulſibus, diminuitur, ſitque omnium minima ubi Nodi sunt in Quadraturis & corpus in Syzygiis: dein creſcit iſſdem gradibus quibus antea decreverat, Nodisque ad Syzygias proximas appulſis ad magnitudinem primam revertitur.

Corol. 11. Quoniam corpus P ubi Nodi sunt in Quadraturis perpetuo trahitur de plano Orbis ſui, idque in partem verſus S , in transitu ſuo a Nodo C per Conjunctionem A ad Nodum D ; & in contrariam partem in transitu a Nodo D per Oppositionem B ad Nodum C ; manifeſtum eſt quod in motu ſuo a Nodo C , corpus perpetuo recedit ab Orbis ſui plano primo CD , uſque dum perventum eſt ad Nodum proximum; adeoque in hoc Nodo, longiſſime diſtans a plano illo primo CD , tranſit per planum Orbis EST non in plani illius Nodo altero D , ſed in puncto quod inde vergit ad partes corporis S , quodque proinde novus eſt Nodi locus in anteriora vergens. Et ſimili argumento pergent Nodi recedere in transitu corporis de hoc Nodo in Nodum proximum. Nodi igitur in Quadraturis conſtituti perpetuo recedunt: in Syzygiis (ubi motus in Latitudinem nil perturbatur) quieſcunt; in locis intermediis, conditionis utriuſque participes, recedunt tardius; adeoque, ſemper vel retrogradi vel ſtationarii, ſingulis revolutionibus feruntur in antecedentia.

Corol. 12. Omnes illi in his Corollariis deſcripti Errores ſunt paulo majores in Conjunctione corporum P , S quam in eorum Oppositione, idque ob majores vires generantes NM & ML .


Corol. 13. Cumque rationes horum Corollariorum non pendeant a magnitudine corporis S , obtinent præcedentia omnia, ubi corporis S tanta ſtatuitur magnitudo ut circa ipſum revolvatur corporum duorum T & P Syſtema. Et ex aucto corpore S auctaque adeo ipſius vi centripeta, a qua errores corporis P oriuntur, evadent errores illi omnes (paribus diſtantiis) majores in hoc caſu quam in altero, ubi corpus S circum Syſtema corporum P & T revolvitur.

Corol. 14. Cum autem vires NM , ML , ubi corpus S longinquum eſt, ſint quamproxime ut vis SK & ratio PT ad ST conjunctum, hoc eſt, ſi detur tum diſtantia PT , tum corporis S vis abſoluta, ut ST cub. reciproce; ſint autem vires illæ NM , ML cauſæ errorum & effectuum omnium de quibus actum eſt in præcedentibus

dentibus Corollariis: manifestum est quod effectus illi omnes, stan-
 te corporum T & P Systemate, & mutatis tantum distantia ST & LIBER
PRIMUS,
 vi absoluta corporis S , sint quamproxime in ratione composita ex
 ratione directa vis absolutæ corporis S & ratione triplicata inver-
 sa distantia ST . Unde si Systema corporum T & P revolvatur cir-
 ca corpus longinquum S , vires illæ NM , ML & earum effectus
 erunt, (per Corol. 2. & 6. Prop. 1v.) reciproce in duplicata ratio-
 ne temporis periodici. Et inde etiam, si magnitudo corporis S pro-
 portionalis sit ipsius vi absolutæ, erunt vires illæ NM , ML & ea-
 rum effectus directè ut cubus diametri apparentis longinqui corpo-
 ris S e corpore T spectati, & vice versa. Namque hæ rationes eæ-
 dem sunt atque ratio superior composita.

Corol. 15. Et quoniam si, manentibus Orbium ESE & PAB
 forma, proportionibus & inclinatione ad invicem, mutetur eorum
 magnitudo, & si corporum S & T vel maneant vel mutantur vires

in data quavis ratio-
 ne, hæ vires (hoc
 est, vis corporis T
 qua corpus P de rec-
 to tramite in Orbi-
 tam PAB deflecte-
 re, & vis corporis S
 qua corpus idem P
 de Orbita illa deviare
 cogitur) agunt sem-



per eodem modo & eadem proportionem: necesse est ut similes &
 proportionales sint effectus omnes & proportionalia effectuum tem-
 pora; hoc est, ut errores omnes lineares sint ut Orbium diametri,
 angulares vero iidem qui prius, & errorum linearium similium vel
 angularium æqualium tempora ut Orbium tempora periodica.

Corol. 16. Unde, si dentur Orbium formæ & inclinatio ad invi-
 cem, & mutantur utcumque corporum magnitudines, vires & di-
 stantia, ex datis erroribus & errorum temporibus in uno Casu,
 colligi possunt errores & errorum tempora in alio quovis, quam
 proxime: Sed brevius hac Methodo. Vires NM , ML , cæteris
 stantibus, sunt ut Radius TP , & harum effectus periodici (per Cor.
 2. Lem. x.) ut vires & quadratum temporis periodici corporis P con-
 junctim. Hi sunt errores lineares corporis P ; & hinc errores an-
 gulares e centro T spectati (id est, tam motus Augis & Nodorum,
 quam omnes in Longitudinem & Latitudinem errores apparentes)
 sunt, in qualibet revolutione corporis P , ut quadratum temporis
 X 3 revo-

agendo, propius accedent ad corpus T , & celerius movebuntur in Conjunctione & Oppositione ipsarum & corporis S , quam in Quadraturis. Et Nodi Annuli hujus seu interlectiones ejus cum plano Orbitæ corporis S vel T , quiescent in Syzygiis, extra Syzygias vero movebuntur in antecedentia, & velocissime quidem in Quadraturis, tardius aliis in locis. Annuli quoque inclinatio variabitur, & axis ejus singulis revolutionibus oscillabitur, completaque revolutione ad pristinum situm redibit, nisi quatenus per præcessionem Nodorum circumfertur.

Corol. 19. Fingas jam Globum corporis T , ex materia non fluida constantem, ampliari & extendi usque ad hunc Annulum, & alveo per circuitum excavato continere Aquam, motuque eodem periodico circa axem suum uniformiter revolvi. Hic liquor per vices acceleratus & retardatus (ut in superiore Corollario) in Syzygiis velocior erit, in Quadraturis tardior quam superficies Globi, & sic fluat in alveo resluetque ad modum Maris. Aqua revolvens circa Globi centrum quiescens, si tollatur attractio corporis S nullum acquireret motum fluxus & refluxus. Par est ratio Globi uniformiter progredientis in directum & interea revolventis circa centrum suum (per Legum Corol. 5.) ut & Globi de cursu rectilineo uniformiter tracti, per Legum Corol. 6. Accedat autem corpus S , & ab ipsius inæquabili attractione mox turbabitur Aqua. Etenim major erit attractio aquæ propioris, minor ea remotioris. Vis autem LM trahet aquam deorsum in Quadraturis, facietque ipsam descendere usque ad Syzygias; & vis KL trahet eandem sursum in Syzygiis, sistetque descensum ejus & faciet ipsam ascendere usque ad Quadraturas.

Corol. 20. Si Annulus jam rigeat & minuatur Globus, cessabit motus fluendi & refluentis: sed Oscillatorius ille inclinationis motus & præcessio Nodorum manebunt. Habeat Globus eundem axem cum Annulo, gyrosque compleat iisdem temporibus, & superficie sua contingat ipsum interius, eique inhæreat; & participando motum ejus, compages utriusque oscillabitur & Nodi regredientur. Nam Globus, ut mox dicetur, ad suscipiendas impressiones omnes indifferens est. Annuli Globo orbiati maximus inclinationis angulus est ubi Nodi sunt in Syzygiis. Inde in progressu Nodorum ad Quadraturas conatur is inclinationem suam minuire, & isto conatu motum imprimit Globo toti. Retinet Globus motum impressum usque dum Annulus conatu contrario motum hunc tollat, imprimatque motum novum in contrariam partem: Atque hac ratione

DE MOTU
CORPORUM.

ratione maximus decreſcentis inclinationis motus fit in Quadraturis Nodorum, & minimus inclinationis angulus in Octantibus poſt Quadraturas; dein maximus reclinationis motus in Syzygiis, & maximus angulus in Octantibus proximis. Et eadem eſt ratio Globi Annulo nudati, qui in regionibus æquatoris vel alior eſt paulo quam juxta polos, vel conſtat ex materia paulo denſiore. Supplet enim vicem Annuli iſte materiæ in æquatoris regionibus exceſſus. Et quanquam, auſta utcunque Globi hujus vi centripeta, tendere ſupponantur omnes ejus partes deorſum, ad modum gravitantium partium telluris, tamen Phænomena hujus & præcedentis Corol. larii vix inde mutabuntur.

Corol. 21. Eadem ratione qua materia Globi juxta æquatorem redundans efficit ut Nodi regrediantur, atque adeo per hujus incrementum augetur iſte regreſſus, per diminutionem vero diminuitur & per ablationem tollitur; ſi materia pluſquam redundans tollatur, hoc eſt, ſi Globus juxta æquatorem vel depreſſior reddatur vel rarior quam juxta polos, orietur motus Nodorum in conſequentia.

Corol. 22. Et inde viciffim, ex motu Nodorum innotefcit conſtitutio Globi. Nimirum ſi Globus polos eoſdem conſtanter ſervat, & motus fit in antecedentia, materia juxta æquatorem redundat; ſi in conſequentia, deficit. Pone Globum uniformem & perfectè circinatum in ſpatiis liberis primo quieſcere; dein impetu quocunque oblique in ſuperficiem ſuam factò propelli, & motum inde concipere partim circularem, partim in directum. Quoniam Globus iſte ad axes omnes per centrum ſuum tranſeuntes indifferenter ſe habet, neque propenſior eſt in unum axem, unumve axis ſitum, quam in alium quemvis; perſpicuum eſt quod is axem ſuum axisque inclinationem vi propria nunquam mutabit. Impellatur jam Globus oblique, in eadem illa ſuperficie parte qua prius, impulſu quocunque novo; & cum citior vel ſerius impulſus effectum nil mutet, manifeſtum eſt quod hi duo impulſus ſucceſſive impreſſi eundem producent motum ac ſi ſimul impreſſi fuiſſent, hoc eſt, eundem ac ſi Globus vi ſimplici ex utroque (per Legum Corol. 2.) compoſita impulſus fuiſſet, atque adeo ſimplicem, circa axem inclinatione datum. Et par eſt ratio impulſus ſecundi facti in locum alium quemvis in æquatore motus primi; ut & impulſus primi facti in locum quemvis in æquatore motus, quem impulſus ſecundus abſque primo generaret; atque adeo impulſuum amborum factorum in loca quæcunque; Generabunt hi eundem motum circularem

cularem ac si simul & semel in locum intersectionis æquatorum motuum illorum, quos scorsim generarent, fuissent impressi. Globus igitur homogeneus & perfectus non retinet motus plures distinctos, sed impressos omnes componit & ad unum reducit, & quatenus in se est, gyatur semper motu simplici & uniformi circa axem unicum, inclinatione semper invariabili datum. Sed nec vis centripeta inclinationem axis, aut rotationis velocitatem mutare potest. Si Globus plano quocunque, per centrum suum & centrum in quod vis dirigitur transeunte, dividi intelligatur in duo hemisphæria; urgebit semper vis illa utrumque hemisphærium æqualiter, & propterea Globum, quoad motum rotationis, nullam in partem inclinabit. Addatur vero alicubi inter polum & æquatorem materia nova in formam montis cumulata, & hæc, perpetuo conatu recedendi a centro sui motus, turbabit motum Globi, facietque polos ejus errare per ipsius superficiem, & circulos circum se punctumque sibi oppositum perpetuo describere. Neque corrigetur illa vagationis enormitas, nisi locando montem illum vel in polo alterutro, quo in Casu (per Corol. 21.) Nodi æquatoris progredientur; vel in æquatore, qua ratione (per Corol. 20.) Nodi regredientur; vel denique ex altera axis parte addendo materiam novam, qua mons inter movendum libretur, & hoc pacto Nodi vel progredientur, vel recedent, perinde ut mons & hacce nova materia sunt vel polo vel æquatori propiores.

PROPOSITIO LXVII. THEOREMA XXVII.

Positis iisdem attractionum legibus, dico quod corpus exterius S , circa interiorum P, T commune gravitatis centrum C , radiis ad centrum illud ductis, describit areas temporibus magis proportionales & Orbem ad formam Ellipseos umbilicum in centro eodem habentis magis accedentem, quam circa corpus intimum & maximum T , radiis ad ipsum ductis, describere potest.

Nam corporis S attractiones versus T & P componunt ipsius attractionem absolutam, quæ magis dirigitur in corporum T & P commune gravitatis centrum C , quam in corpus maximum T , quæque quadrato distantie SC magis est proportionalis reciproce, quam quadrato distantie ST : ut rem pendenti facile constabit.

Y

PRO-

Corol. Et hinc, si corpora plura minora revolvantur circa maximum, colligere licet quod Orbitæ descriptæ propius accedent ad Ellipticas, & arearum descriptiones fient magis æquabiles, si corpora omnia viribus acceleratricibus, quæ sunt ut eorum vires absolutæ directæ & quadrata distantiarum inverse, se mutuo trahant agitentque, & Orbitæ cujusque umbilicus collocetur in communi centro gravitatis corporum omnium interiorum (nimirum umbilicus Orbitæ primæ & intimæ in centro gravitatis corporis maximi & intimi; ille Orbitæ secundæ, in communi centro gravitatis corporum duorum intimorum; iste tertiæ, in communi centro gravitatis trium interiorum; & sic deinceps) quam si corpus intimum quiescat & statuatur communis umbilicus Orbitalium omnium.

PROPOSITIO LXIX. THEOREMA XXIX.

In Systemate corporum plurium A, B, C, D, &c. si corpus aliquod A trahit cætera omnia B, C, D, &c. viribus acceleratricibus quæ sunt reciproce ut quadrata distantiarum a trahente; & corpus aliud B trahit etiam cætera A, C, D, &c. viribus quæ sunt reciproce ut quadrata distantiarum a trahente: erunt Absolutæ corporum trahentium A, B vires ad invicem, ut sunt ipsa corpora A, B, quorum sunt vires.

Nam attractiones acceleratrices corporum omnium B, C, D versus A, paribus distantiiis, sibi invicem æquantur ex Hypothesi; & similiter attractiones acceleratrices corporum omnium versus B, paribus distantiiis, sibi invicem æquantur. Est autem absoluta vis attractiva corporis A ad vim absolutam attractivam corporis B, ut attractio acceleratrix corporum omnium versus A ad attractionem acceleratricem corporum omnium versus B, paribus distantiiis; & ita est attractio acceleratrix corporis B versus A, ad attractionem acceleratricem corporis A versus B. Sed attractio acceleratrix corporis B versus A est ad attractionem acceleratricem corporis A versus B, ut massa corporis A ad massam corporis B; propterea quod vires motrices, quæ (per Definitionem secundam, septimam & octavam) ex viribus acceleratricibus in corpora attracta ductis oriuntur, sunt (per motus Legem tertiam) sibi invicem æquales.

DE MOTU
CORPORUM.

les. Ergo absoluta vis attractiva corporis *A* est ad absolutam vim attractivam corporis *B*, ut massa corporis *A* ad massam corporis *B*. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si singula Systematis corpora *A, B, C, D*, &c. seorsim spectata trahant cætera omnia viribus acceleratricibus quæ sunt reciproce ut quadrata distantiarum a trahente; erunt corporum illorum omnium vires absolutæ ad invicem ut sunt ipsa corpora.

Corol. 2. Eodem argumento, si singula Systematis corpora *A, B, C, D*, &c. seorsim spectata trahant cætera omnia viribus acceleratricibus quæ sunt vel reciproce vel directe in ratione dignitatis cujuscunque distantiarum a trahente, quæve secundum Legem quamcunque communem ex distantis ab unoquoque trahente definiuntur, constat quod corporum illorum vires absolutæ sunt ut corpora.

Corol. 3. In Syllemate corporum, quorum vires decrefcunt in ratione duplicata distantiarum, si minora circa maximum in Ellipsis umbilicum communem in maximi illius centro habentibus quam fieri potest accuratissimis revolvantur, & radiis ad maximum illud ductis describant areas temporibus quam maxime proportionales: erunt corporum illorum vires absolutæ ad invicem, aut accurate aut quamproxime in ratione corporum; & contra. Patet per Corol. Prop. LXVIII. collatum cum hujus Corol. 1.

Scholium.

His Propositionibus manuducimur ad analogiam inter vires centripetas & corpora centralia, ad quæ vires illæ dirigi solent. Rationi enim consentaneum est, ut vires quæ ad corpora diriguntur pendeant ab eorundem natura & quantitate, ut fit in Magneticis. Et quoties hujusmodi casus incidunt, æstimandæ erunt corporum attractiones, assignando singulis eorum particulis vires proprias, & colligendo summas virium. Vocem Attractionis hic generaliter usurpo pro corporum conatu quocunque accedendi ad invicem, sive conatus iste fiat ab actione corporum, vel se mutuo petentium, vel per Spiritus emissos se invicem agitantium, sive is ab actione Ætheris, aut Aeris, Mediivæ cujuscunque seu corporei seu incorporei oriatur corpora innatantia in se invicem utcunque impellentis. Eodem sensu generali usurpo vocem Impulsus, non species virium &c.

& qualitates Physicas, sed quantitates & proportiones Mathematicas in hoc Tractatu expendens, ut in Definitionibus explicui. LIBER PRIMUS.
 In Mathesi investigandæ sunt virium quantitates & rationes illæ, quæ ex conditionibus quibuscunque positis consequentur: deinde, ubi in Physicam descenditur, conferendæ sunt hæ rationes cum Phænomenis, ut innotescat quanam virium conditiones singulis corporum attractivorum generibus competant. Et tum demum de virium speciebus, causis & rationibus Physicis tutius disputare licebit. Videamus igitur quibus viribus corpora Sphærica, ex particulis modo jam expolito attractivis constantia, debeant in se mutuo agere, & quales motus inde consequantur.


S E C T I O XII.

De Corporum sphæricorum Viribus attractivis.

PROPOSITIO LXX. THEOREMA XXX.

Si ad Sphæricæ superficiei puncta singula tendant vires æquales centripetæ decrecentes in duplicata ratione distantiarum a punctis: dico quod corpusculum intra superficiem constitutum his viribus nullam in partem attrahitur.

Sit $HIKL$ superficies illa Sphærica, & P corpusculum intus constitutum. Per P agantur ad hanc superficiem lineæ duæ HK, IL , arcus quam minimos HI, KL intercipientes; &, ob triângula HPI, LPK (per Corol. 3. Lem. VII.) similia, arcus illi erunt distantis HP, LP proportionales; & superficiei Sphæricæ particulæ quævis ad HI & KL , rectis per punctum P transeuntibus undique terminatæ, erunt in duplicata illa ratione. Ergo vires harum particularum in corpus P exercitæ sunt inter se æquales. Sunt enim ut particulæ directæ & quadrata distantiarum inverse. Et hæ duæ rationes componunt rationem æquali-




DE MOTU æqualitatis: Attractiones igitur, in contrarias partes æqualiter factæ, se mutuo destruunt. Et simili argumento, attractiones omnes per totam Sphæricam superficiem a contrariis attractionibus destruiuntur. Proinde corpus P nullam in partem his attractionibus impellitur. Q. E. D.

PROPOSITIO LXXI. THEOREMA XXXI.

Iisdem positis, dico quod corpusculum extra Sphæricam superficiem constitutum, attrahitur ad centrum Sphære vi reciproce proportionali quadrato distantie sue ab eodem centro.

Sint $AHKB$, $abkb$ æquales duæ superficies Sphæricæ, centris S, s , diametris AB , ab descriptæ, & P, p corpuscula sita extrinsecus in diametris illis productis. Agantur a corpusculis lineæ



PHK, PIL, pbk, pil , auferentes a circulis maximis AHB, abb , æquales arcus $HK, bk \& IL, il$: Et ad eas demittantur perpendicularia $SD, sd; SE, se; IR, ir$; quorum SD, sd secant PL, pl in $F \& f$: Demittantur etiam ad diametros perpendicularia IQ, iq . Evanescant anguli DPE, dpe : & (ob æquales $DS, ds, ES \& es$,) lineæ $PE, PF \& pe, pf$ & lineolæ DF, df pro æqualibus habeantur; quippe quarum ratio ultima, angulis illis DPE, dpe simul evanescentibus, est æqualitatis. His itaque constitutis, erit PI , ad PF , ut RI ad DF , & pf , ad pi , ut df , vel DF ad ri , & ex æquo $PI \times pf$ ad $PF \times pi$ ut RI , ad ri , hoc est (per Corol. 4. Lem. vii,) ut arcus IH ad arcum ib . Rursus PI , ad PS ut IQ ad SE , & ps ad pi ut se vel SE ad iq ; & ex æquo $PI \times ps$ ad $PS \times pi$ ut IQ ad iq . Et conjunctis rationibus $PI \text{ quad.} \times pf \times ps$ ad $pi \text{ quad.} \times PF \times PS$, ut $IH \times IQ$ ad $ib \times iq$; hoc est, ut superficies circularis, quam

arcus

arcus IH convolutione semicirculi AKB circa diametrum AB describet, ad superficiem circula-
LIBER
PART. III.
 rem, quam arcus ib convolutione semicirculi akb circa diametrum ab describet. Et vires, quibus hæ superficies secundum lineas ad se tendentes attrahunt corpuscula P & p , sunt (per Hypothesin) ut ipsæ superficies applicatæ ad quadrata distantiarum suarum a corporibus, hoc est, ut $pf \times ps$ ad $PF \times PS$. Suntque hæ vires ad ipsarum partes obliquas quæ (facta per Legum Corol. 2. resolutione virium) secundum lineas PS , ps ad centra tendunt, ut PI ad PQ , & pi ad pq ; id est (ob similia triangula PIQ & PSF , piq & psf) ut PS ad PF & ps ad pf . Unde, ex æquo, fit attractio corpusculi hujus P versus S ad attractionem corpusculi p versus s , ut $\frac{PF \times pf \times ps}{PS}$ ad

$\frac{pf \times PF \times PS}{ps}$, hoc est, ut ps quad. ad PS quad. Et simili argu-

mento vires, quibus superficies convolutione arcuum KL , kl descriptæ trahunt corpuscula, erunt ut ps quad. ad PS quad.; inque eadem ratione erunt vires superficierum omnium circularium in quas utraque superficies Sphærica, capiendò semper s & æqualem SD & se æqualem SE , distingui potest. Et, per compositionem, vires totarum superficierum Sphæricarum in corpuscula exercitæ erunt in eadem ratione. $Q. E. D.$

PROPOSITIO LXXII. THEOREMA XXXII.

Si ad Sphæra cujusvis puncta singula tendant vires æquales centripetæ decrescientes in duplicata ratione distantiarum a punctis, ac detur tum Sphæra densitas, tum ratio diametri Sphæra ad distantiam corpusculi a centro ejus; dico quod vis qua corpusculum attrahitur proportionalis erit semidiametro Sphæra.

Nam concipe corpuscula duo seorsim a Sphæris duabus attrahi, unum ab una & alterum ab altera, & distantias eorum a Sphærarum centris proportionales esse diametris Sphærarum respectivæ, Sphæras autem resolvì in particulas similes & similiter positas ad corpuscula. Et attractiones corpusculi unius, factæ versus singulas particulas Sphærae unius, erunt ad attractiones alterius versus analogas totidem particulas Sphærae alterius, in ratione composita ex ratione particularum directæ & ratione duplicata distantiarum in-

verse

DE MOTU
CORPORUM,

verse. Sed particulæ sunt ut Sphæræ, hoc est, in ratione triplicata diametrorum, & distantia sunt ut diametri, & ratio prior directe una cum ratione posteriore bis inverse est ratio diametri ad diametrum. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si corpuscula in Circulis, circa Sphæræ ex materia æqualiter attractiva constantes, revolvantur; sintque distantia a centrīs Sphærarum proportionales earundem diametris: Tempora periodica erunt æqualia.


Corol. 2. Et vice versa, si Tempora periodica sunt æqualia; distantia erunt proportionales diametris. Constant hæc duo per *Corol. 3. Prop. IV.*

Corol. 3. Si ad Solidorum duorum quorumvis similium & æqualiter densorum puncta singula tendant vires æquales centripetæ decrescentes in duplicata ratione distantiarum a punctis: vires quibus corpuscula, ad Solida illa duo similiter sita, attrahentur ab iisdem, erunt ad invicem ut diametri Solidorum.

PROPOSITIO LXXIII. THEOREMA XXXIII.

Si ad Sphæra alicujus data puncta singula tendant æquales vires centripetæ decrescentes in duplicata ratione distantiarum a punctis: dico quod corpusculum intra Sphæram constitutum attrahitur vi proportionali distantia sue ab ipsius centro.

In Sphæra *ABCD*, centro *S* descripta, locetur corpusculum *P*; & centro eodem *S*, intervallo *SP*, concipe Sphæram interiorem *PEQF* describi. Manifestum est, per *Prop. LXX.* quod Sphæricæ superficies concentricæ ex quibus Sphærarum differentia *AEBF* componitur, attractionibus per attractiones contrarias destructis, nil agunt in corpus *P*. Restat sola attractio Sphære interioris *PEQF*. Et per *Prop. LXXI.* hæc est ut distantia *PS*. *Q. E. D.*



Scholium.

Superficies ex quibus solida componuntur, hic non sunt pure Mathematicæ, sed Orbis adeo tenues ut eorum crassitudo instar nihili

nihili sit; nimirum Orbes evanescentes ex quibus Sphæra ultimo constat, ubi Orbium illorum numerus augetur & crassitudo minuitur in infinitum. Similiter per puncta ex quibus lineæ, superficies & solida componi dicuntur, intelligendæ sunt particulæ æquales magnitudinis contemnendæ.

PROPOSITIO LXXIV. THEOREMA XXXIV.

Iisdem positis, dico quod corpusculum extra Sphæram constitutum attrahitur vi reciproce proportionali quadrato distantie sue ab ipsius centro.

Nam distinguatur Sphæra in superficies Sphæricas innumeras concentricas, & attractiones corpusculi a singulis superficiebus oriundæ erunt reciproce proportionales quadrato distantie corpusculi a centro, per Prop. LXXI. Et componendo, fiet summa attractionum, hoc est attractio corpusculi in Sphæram totam, in eadem ratione.

Q. E. D.

Corol. 1. Hinc in æqualibus distantiiis a centrīs homogenearum Sphærarum, attractiones sunt ut Sphæræ: Nam per Prop. LXXII, si distantie sunt proportionales diametris Sphærarum, vires erunt ut diametri. Minuatur distantia major in illa ratione; &, distantiiis jam factis æqualibus, augebitur attractio in duplicata illa ratione; adeoque erit ad attractionem alteram in triplicata illa ratione, hoc est, in ratione Sphærarum.

Corol. 2. In distantiiis quibuscvis attractiones sunt ut Sphæræ applicatæ ad quadrata distantiarum.

Corol. 3. Si corpusculum, extra Sphæram homogeneam positum, trahitur vi reciproce proportionali quadrato distantie suæ ab ipsius centro, constet autem Sphæra ex particulis attractivis; decrescet vis particulæ cuiusque in duplicata ratione distantie a particulâ.

PROPOSITIO LXXV. THEOREMA XXXV.

Si ad Sphæra data puncta singula tendant vires æquales centripetæ, decrescentes in duplicata ratione distantiarum a punctis; dico quod Sphæra quævis alia similis ab eadem attrahitur vi reciproce proportionali quadrato distantie centrorum.

Nam particulæ cuiusvis attractio est reciproce ut quadratum distantie suæ a centro Sphæræ trahentis, (per Prop. LXXIV.) & prop-

Z

terea

DE MOTU terea eadem est ac si vis tota attrahens maneret de corpusculo
CORPORUM, unico sito in centro hujus Sphæræ. Hæc autem attractio tanta
 est quanta foret vicissim attractio corpusculi ejusdem, si modo
 illud a singulis Sphæræ attractæ particulis eadem vi traheretur qua
 ipsas attrahit. Foret autem illa corpusculi attractio (per Prop.
 LXXIV.) reciproce proportionalis quadrato distantiae suæ a centro
 Sphæræ; adeoque huic æqualis attractio Sphæræ est in eadem ra-
 tione. Q. E. D.

Corol. 1. Attractiones Sphærarum, versus alias Sphæras homoge-
 neas, sunt ut Sphæræ trahentes applicatæ ad quadrata distantiarum
 centrorum suorum a centris earum quas attrahunt.

Corol. 2. Idem valet ubi Sphæra attracta etiam attrahit. Nam-
 que hujus puncta singula trahent singula alterius, eadem vi qua
 ab ipsis vicissim trahuntur, adeoque cum in omni attractione ur-
 geatur (per Legem III.) tam punctum attrahens, quam punctum
 attractum, geminabitur vis attractionis mutuæ, conservatis propor-
 tionibus.

Corol. 3. Eadem omnia, quæ superius de motu corporum circa
 umbilicum Conicarum Sectionum demonstrata sunt, obtinent ubi
 Sphæra attrahens locatur in umbilico & corpora moventur extra
 Sphæram.


Corol. 4. Ea vero quæ de motu corporum circa centrum Coni-
 carum Sectionum demonstrantur, obtinent ubi motus peraguntur
 intra Sphæram.

PROPOSITIO LXXVI. THEOREMA XXXVI.

*Si Sphæra in progressu a centro ad circumferentiam (quo-
 ad materiæ densitatem & vim attractivam) utcumque
 dissimilares, in progressu vero per circuitum ad datam
 omnem a centro distantiam sunt undique similes, & vis
 attractiva puncti cujusque decrescit in duplicata ratione
 distantie corporis attracti: dico quod vis tota qua hujus-
 modi Sphæra una attrahit aliam sit reciproce proportio-
 nalis quadrato distantie centrorum.*

Sunt Sphæræ quocumque concentricæ similes *AB, CD, EF,*
 &c. quarum interiores additæ exterioribus component materiam
 densiorem

denfiozem verſus centrum, vel ſubductæ relinquant tenuiorem; & ^{LIBRA} hæ (per Prop. LXXV.) trahent Sphæras alias quocunque concentricas ſimilares *GH*, *IK*, *LM*, &c. ſingulæ ſingulas, viribus reciproce proportionalibus quadrato diſtantiæ *SP*. Et componendo vel dividendo, ſumma virium illarum omnium, vel exceſſus aliquarum ſupra alias, hoc eſt, vis qua Sphæra tota ex concentricis, quibuſcunque vel concentricarum differentiis compoſita *AB*, trahit totam ex concentricis quibuſcunque vel concentricarum differentiis compoſitam *GH*, erit in eadem ratione. Augeatur numerus Sphærarum concentricarum in infinitum ſic, ut materiæ denſitas una cum vi attrahiva, in progreſſu a circumferentia ad centrum, ſecundum Legem quacunque creſcat vel decreſcat: &, addita materia



non attrahiva, compleatur ubivis denſitas deficiens, eo ut Sphæra acquirant formam quamvis optatam; & vis qua harum una attrahet alteram erit etiamnum (per argumentum ſuperius) in eadem illa diſtantiæ quadratæ ratione inverſa. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc ſi ejuſmodi Sphæra complures, ſibi invicem per omnia ſimiles, ſe mutuo trahant; attractiones acceleratrices ſingularum in ſingulas erunt, in æqualibus quibuſvis centrorum diſtantiis, ut Sphæra attrahentes.

Corol. 2. Inque diſtantiis quibuſvis inæqualibus, ut Sphæra attrahentes applicatæ ad quadrata diſtantiarum intra centra.

Corol. 3. Attractiones vero morrices, ſeu pondera Sphærarum in Sphæras erunt, in æqualibus centrorum diſtantiis, ut Sphæra attrahentes & attrahæ conjunctim, id eſt, ut contenta ſub Sphæris per multiplicationem producta.

Corol. 4. Inque diſtantiis inæqualibus, ut contenta illa applicata ad quadrata diſtantiarum inter centra.

L. 2

Corol.

trahitur versus centrum S , est ut planum illud ductum in distantiam suam Pg , sive ut huic æquale planum EF ductum in distantiam illam Pg ; & summa virium plani utriusque ut planum. EF ductum in summam distantiarum $PG + Pg$, id est, ut planum illud ductum in duplam centri & corpusculi distantiam PS , hoc est, ut duplum planum EF ductum in distantiam PS , vel ut summa æqualium planorum $EF + ef$ ducta in distantiam eandem. Et simili argumento, vires omnium planorum in Sphæra tota, hinc inde æqualiter a centro Sphære distantium, sunt ut summa planorum ducta in distantiam PS , hoc est, ut Sphæra tota ducta in distantiam centri sui S a corpusculo P . *Q. E. D.*

Cas. 2. Trahat jam corpusculum P Sphæram $AEBF$. Et eodem argumento probabitur quod vis, qua Sphæra illa trahitur, erit ut distantia PS . *Q. E. D.*

Cas. 3. Componatur jam Sphæra altera ex corpusculis innumeris P , & quoniam vis, qua corpusculum unumquodque trahitur, est ut distantia corpusculi a centro Sphære primæ ducta in Sphæram eandem, atque adeo eadem est ac si prodiret tota de corpusculo in centro Sphære; vis tota qua corpuscula omnia in Sphæra secunda trahuntur, hoc est, qua Sphæra illa tota trahitur, eadem erit ac si Sphæra illa traheretur vi prodeunte de corpusculo unico in centro Sphære primæ, & propterea proportionalis est distantia inter centra Sphærarum. *Q. E. D.*

Cas. 4. Trahant Sphære se mutuo, & vis geminata proportionem priorem servabit. *Q. E. D.*

Cas. 5. Locetur jam corpusculum p intra Sphæram $AEBF$; & quoniam vis plani ef in corpusculum est ut contentum sub plano illo & distantia pg ; & vis contraria plani EF ut contentum sub plano illo & distantia pG ; erit vis ex utraque composita ut differentia contentorum, hoc est, ut summa æqualium planorum ducta in semissem differentia distantiarum, id est, ut summa illa ducta in pS distantiam corpusculi a centro Sphære. Et simili argumento, attractio planorum omnium EF , ef in Sphæra tota, hoc est, attractio Sphære totius, est ut summa planorum omnium, seu Sphæra tota, ducta in pS distantiam corpusculi a centro Sphære. *Q. E. D.*

Cas. 6. Et si ex corpusculis innumeris p componatur Sphæra nova, intra Sphæram priorem $AEBF$ sita; probabitur ut prius quod attractio, sive simplex Sphære unius in alteram, sive mutua utriusque in se invicem, erit ut distantia centrorum pS . *Q. E. D.*

DE MOTU
CORPORUM.

PROPOSITIO LXXVIII. THEOREMA XXXVIII.

*Si Sphæra in progressu a centro ad circumferentiam sint ut-
cunque dissimilares & inæquabiles, in progressu vero per
circuitum ad datam omnem a centro distantiam sint undi-
que similes; & vis attractiva puncti cuiusque sit ut di-
stantia corporis attracti: dico quod vis tota qua huiusmo-
di Sphæra due se mutuo trahunt sit proportionalis distan-
tiæ inter centra Sphærarum.*

Demonstratur ex Propositione præcedente, eodem modo quo
Propositio LXXVI ex Propositione LXXV demonstrata fuit.

Corol. Quæ superius in Propositionibus x & LXIV de motu cor-
porum circa centra Conicarum Sectionum demonstrata sunt, valent
ubi attractiones omnes fiunt vi Corporum Sphærae conditionis ejus-
dem.

Scholium.

Attractionum Casus duos insigniores jam dedi expositos; nimi-
rum ubi Vires centripetæ decrescunt in duplicata distantiarum ra-
tione, vel crescunt in distantiarum ratione simplici; efficientes in
utroque Casu ut corpora gyrentur in Conicis Sectionibus, & com-
ponentes corporum Sphæricorum Vires centripetas eadem Lege,
in recessu a centro, decrescentes vel crescentes cum seipsis: Quod
est notatu dignum. Casus ceteros, qui conclusiones minus elegan-
tes exhibent, sigillatim percurrere longum esset. Malim cunctos
methodo generali simul comprehendere ac determinare, ut sequitur.

L E M M A XXIX.

*Si describantur centro S circulus quilibet AEB, & centro P
circuli duo EF, ef, secantes priorem in E, c, lineam-
que PS in F, f; & ad PS demittantur perpendiculara ED,
ed: dico quod, si distantia arcuum EF, ef in infinitum
minui intelligatur, ratio ultima lineæ evanescentis Dd ad
lineam evanescentem Ff ea sit, quæ lineæ PE ad lineam
PS.*

Nam

Etenim stantibus quæ in Lemmate & Theoremate novissimo LIBER PRIMUS. constructa sunt, concipe axem Sphæræ AB dividi in particulas innumeras æquales Dd , & Sphæram totam dividi in totidem laminas Sphæricas concavo-convexas $EFfe$, & erigatur perpendiculum dn . Per Theorema superius, vis qua lamina $EFfe$ trahit corpusculum P est ut $DEq \times Ff$ & vis particulæ unius ad distantiam PE vel PF exercita conjunctim. Est autem per Lemma novissimum, Dd ad Ff ut PE ad PS , & inde Ff æqualis $\frac{PS \times Dd}{PE}$; & $DEq \times Ff$ æquale Dd in $\frac{DEq \times PS}{PE}$, & prop-

terea vis laminæ $EFfe$ est ut Dd in $\frac{DEq \times PS}{PE}$ & vis particulæ ad distantiam PF exercita conjunctim, hoc est (ex Hypothesi) ut $DN \times Dd$, seu area evanescens $DNnd$. Sunt igitur laminarum omnium vires, in corpus P exercitæ, ut aræ omnes $DNnd$, hoc est, Sphæræ vis tota ut area tota $ABNA$. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc si vis centripeta, ad particulas singulas tendens, eadem semper maneat in omnibus distantis, & fiat DN ut $\frac{DEq \times PS}{PE}$; erit vis tota qua corpusculum a Sphæra attrahitur, ut area $ABNA$.

Corol. 2. Si particularum vis centripeta sit reciproce ut distantia corpusculi a se attracti, & fiat DN ut $\frac{DEq \times PS}{PEq}$; erit vis qua corpusculum P a Sphæra tota attrahitur ut area $ABNA$.

Corol. 3. Si particularum vis centripeta sit reciproce ut cubus distantie corpusculi a se attracti, & fiat DN ut $\frac{DEq \times PS}{PEqq}$; erit vis qua corpusculum a tota Sphæra attrahitur ut area $ABNA$.

Corol. 4. Et universaliter si vis centripeta ad singulas Sphæræ particulas tendens ponatur esse reciproce ut quantitas V , fiat autem DN ut $\frac{DEq \times PS}{PE \times V}$; erit vis qua corpusculum a Sphæra tota attrahitur ut area $ABNA$.

Exempl. 1. Si vis centripeta ad singulas Sphære particulas tendens sit reciproce ut distantia; pro V scribe distantiam PE ; dein $PS \times LD$ pro PEq , & fiet DN ut $SL - \frac{ALB}{2LD}$.


Pone DN æqualem duplo eius $2SL - LD - \frac{ALB}{LD}$; & ordi-

nata pars data $2SL$ ducta in longitudinem AB describet arcum rectangulam $2SL \times AB$; & pars indefinita LD ducta normaliter in eandem longitudinem per motum continuum, ea lege ut inter movendum crescendo vel decrecendo æquetur semper longitudini LD , describet arcum $\frac{LBq - LAq}{2}$, id est, arcum $SL \times AB$; quæ

subducta de area priorè $2SL \times AB$ relinquit aream $SL \times AB$.

Pars autem tertia $\frac{ALB}{LD}$ ducta itidem per motum localem norma-

liter in eandem longitudinem, describet aream Hyperbolicam; quæ subducta de area $SL \times AB$ relinquet aream quæsitam $ABNA$. Unde talis emergit Problematibus constructio. Ad puncta L, A, B erige perpendicula Ll, Aa, Bb , quorum Aa ipsi LB , & Bb ipsi LA æquetur. Asymptotis Ll, LB , per puncta a, b describatur Hyperbola ab . Et acta chorda ba claudet aream $abba$ areæ quæsitæ $ABNA$ æqualem.



Exempl. 2. Si vis centripeta ad singulas Sphære particulas tendens sit reciproce ut cubus distantie, vel (quod perinde est) ut cubus ille applicatus ad planum quodvis datum; scribe $\frac{PE cub.}{2ASq}$ pro V ,

dein $PS \times LD$ pro PEq , & fiet DN ut $\frac{SL \times ASq}{PS \times LD} - \frac{ASq}{2PS}$

$-\frac{ALB \times ASq}{2PS \times LDq}$, id est (ob continue proportionales PS, AS, SI)

ut $\frac{LSI}{LD} - \frac{1}{2}SI - \frac{ALB \times SI}{2LDq}$. Si ducantur hujus partes tres in

longitudinem AB , prima $\frac{LSI}{LD}$ generabit aream Hyperboli-

cam;


cam;

De Motu
CORPORUM

cam; secunda; SI aream; $AB \times SI$; tertia $\frac{ALB \times SI}{2LDq}$ are-

am $\frac{ALB \times SI}{2LA} - \frac{ALB \times SI}{2LB}$, id est; $AB \times SI$. De prima sub-

ducatur summa secundæ & tertiæ, & manebit area quæsita $ABNA$. Unde talis emergit Problematis constructio. Ad puncta L, A, S, B erige perpendiculara Ll, Aa, Ss, Bb , quorum Ss ipsi SI æquetur, perque punctum s Asymptotis Ll, LB describatur Hyperbola asb occurrens perpendicularis Aa, Bb in a & b ; & rectangulum $2ASI$ subductum de area Hyperbolica $AasbB$ relinquet aream quæsitam $ABNA$.



Exempl. 3. Si Vis centripeta, ad singulas Sphæræ particulas tendens, decrefcit in quadruplicata ratione distantiae a particulis, fcribe $\frac{PEqq}{2AScub}$ pro V , dein $\sqrt{2PS \times LD}$ pro PE , & fiet DN ut

$\frac{SIq \times SL}{\sqrt{2SI} \times \sqrt{LDc}} - \frac{SIq}{2\sqrt{2SI} \times \sqrt{LD}} - \frac{SIq \times ALB}{2\sqrt{2SI} \times \sqrt{LDq}}$
Cujus tres partes ductæ in longitudinem AB , producant areas totidem, viz. $\frac{2SIq \times SL}{\sqrt{2SI} \times \sqrt{LA}} - \frac{SIq}{\sqrt{2SI} \times \sqrt{LB}}$; $\frac{SIq}{\sqrt{2SI} \times \sqrt{LB}} - \frac{SIq}{\sqrt{2SI} \times \sqrt{LA}}$; & $\frac{SIq \times ALB}{3\sqrt{2SI} \times \sqrt{LAcub}} - \frac{SIq}{\sqrt{2SI} \times \sqrt{LBcub}}$. Et hæc post debitam reductionem fiunt.

$\frac{2SIq \times SL}{LI}$, SIq , & $SIq + \frac{2SIcub}{3LI}$. Hæc vero subductis posterioribus de priore, evadunt $\frac{4SIcub}{3LI}$. Igitur vis tota,

qua corpusculum P in Sphæræ centrum trahitur, est ut $\frac{SIcub}{PI}$ id est, reciproce ut $PScub \times PI$. Q.E.I.

Eadem Methodo determinari poteit Attractio corpusculi siti intra Sphæram, sed expeditius per Theorema sequens.


PRO.

PROPOSITIO LXXXII. THEOREMA XLI.

LXXXII
Palmqv.

In Sphæra centro S intervallo SA descripta, si capiantur SI, SA, SP continue proportionales: dico quod corpusculi intra Sphæram in loco quovis I attractio est ad attractionem ipsius extra Sphæram in loco P, in ratione composita ex subduplicata ratione distantiarum a centro IS, PS & subduplicata ratione virium centripetarum, in locis illis P & I, ad centrum tendentium.

Ut si vires centripetæ particularum Sphære sint reciproce ut distantie corpusculi a se attracti; vis, qua corpusculum situm in I trahitur a Sphæra tota, erit ad vim qua trahitur in P, in ratione



composita ex subduplicata ratione distantie SI ad distantiam SP & ratione subduplicata vis centripetæ in loco I, a particula aliqua in centro oriundæ, ad vim centripetam in loco P ab eadem in centro particula oriundam, id est, ratione subduplicata distantiarum SI, SP ad invicem reciproce. Hæ duæ rationes subduplicatæ componunt rationem æqualitatis, & propterea attractiones in I & P a Sphæra tota factæ æquantur. Simili computo, si vires particularum Sphære sunt reciproce in duplicata ratione distantiarum, colligetur quod attractio in I sit ad attractionem in P, ut distantia SP ad Sphære semidiametrum SA: Si vires illæ sunt reciproce in triplicata ratione distantiarum, attractiones in I & P erunt ad invicem

Aa 3

cem

DE MOTU
CORPORUM. cem ut SP quad. ad SA quad. Si in quadruplicata, ut SP cub. ad SA cub. Unde cum attractio in P , in hoc ultimo casu, inventa fuit reciproce ut PS cub. $\times PI$, attractio in I erit reciproce ut SA cub. $\times PI$, id est (ob datum SA cub.) reciproce ut PI . Et similis est progressus in infinitum. Theorema vero sic demonstratur.

Stantibus jam ante constructis, & existente corpore in loco quovis P , ordinatim applicata DN inventa fuit ut $\frac{DEq \times S}{PE \times V}$

Ergo si agatur IE , ordinata illa ad alium quemvis locum I , mutatis mutandis, evadet ut $\frac{DEq \times IS}{IE \times V}$. Pone vires centripetas, e

Sphæræ puncto quovis E manantes, esse ad invicem in distantis IE , PE , ut PE^n ad IE^n , (ubi numerus n designet indicem potestatum PE & IE) & ordinatæ illæ fient ut $\frac{DEq \times PS}{PE \times PE^n}$ & $\frac{DEq \times IS}{IE \times IE^n}$, quarum ratio ad invicem est ut $PS \times IE \times IE^n$ ad $IS \times PE \times PE^n$. Quoniam ob similia triangula SPE , SEI , fit IE ad PE ut IS ad SE vel SA ; pro ratione IE ad PE scribe rationem IS ad SA ; & ordinarum ratio evadet $PS \times IE^n$ ad $SA \times PE^n$. Sed PS ad SA subduplicata est ratio distantiarum PS , SI ; & IE^n ad PE^n subduplicata est ratio virium in distantis PS , IS . Ergo ordinatæ, & propterea aræ quas ordinatæ describunt, hisque proportionales attractiones, sunt in ratione composita ex subduplicatis illis rationibus. $\mathcal{Q} \ E. \mathcal{D}.$


PROPOSITIO LXXXIII. PROBLEMA XLII.

Invenire vim qua corpusculum in centro Sphæræ locatum ad ejus Segmentum quodcunque attrahitur.

Sit P corpus in centro Sphæræ, & $RBSD$ Segmentum ejus plano RDS & superficie Sphærica RBS contentum. Superficie Sphærica EFG centro P descripta secetur DB in F , ac distinguatur Segmentum in partes $BREFGS$, $FEDG$. Sit autem superficies illa non pure Mathematica, sed Physica, profunditatem habens quam minimam. Nominetur illa profunditas O ,

tas O , & erit hæc superficies (per demonstrata *Archimedis*) ut $PF \times DF \times O$. Ponamus præterea vires attractivas particularum Sphæræ esse reciproce ut distantiarum dignitas illa cuius Index est n ; & vis qua superficies FE trahit corpus P erit ut $\frac{DF \times O}{PF^{n-1}} - \frac{DFg \times O}{PF^n}$. Huic

proportionale sit perpendicularum FN ductum in O ; & area curvilinea $BDLIB$, quam ordinatim applicata FN in longitudinem DB per motum continuum ducta describit, erit ut vis tota qua Segmentum totum $RBSD$ trahit corpus P . *Q. E. I.*



PROPOSITIO LXXXIV. PROBLEMA XLIII.

Invenire vim qua corpusculum, extra centrum Sphæræ in axe Segmenti cuiusvis locatum, attrahitur ab eodem Segmento.

A Segmento EBK trahatur corpus P (Vide Fig. Prop. LXXIX, LXXX, LXXXI.) in ejus axe ADB locatum. Centro P intervallo PE describatur superficies Sphærica EFK , qua distinguatur Segmentum in partes duas $EBKF$ & $EFKD$. Quæraturs vis partis prioris per Prop. LXXXI, & vis partis posterioris per Prop. LXXXIII; & summa virium erit vis Segmenti totius $EBKD$. *Q. E. I.*

Scholium.

Explicatis attractionibus corporum Sphæricorum, jam pergere liceret ad Leges attractionum aliorum quorundam ex particulis attractivis similiter constantium corporum; sed ista particulatim tractare minus ad institutum spectat. Suffecerit Propositiones quasdam generatiores de viribus hujusmodi corporum, deque motibus inde oriundis, ob earum in rebus Philosophicis aliqualem usum, subungere.

SECTIO

S E C T I O XIII.

De Corporum non Sphæricorum viribus attractivis.

PROPOSITIO LXXXV. THEOREMA XLII.

Si corporis attracti, ubi attrahenti contiguum est, attractio longe fortior sit, quam cum vel minimo intervallo separantur ab invicem: vires particularum trahentis, in recessu corporis attracti, decrescunt in ratione plusquam duplicata distantiarum a particulis.

Nam si vires decrescunt in ratione duplicata distantiarum a particulis, attractio versus corpus Sphæricum, propterea quod (per Prop. LXXIV.) sit reciproce ut quadratum distantiae attracti corporis a centro Sphære, haud sensibilibiter augebitur ex contactu; atque adhuc minus augebitur ex contactu, si attractio in recessu corporis attracti decrescat in ratione minore. Patet igitur Propositio de Sphæris attractivis. Et par est ratio Orbium Sphæricorum concavorum corpora externa trahentium. Et multo magis res constat in Orbibus corpora interius constituta trahentibus, cum attractiones passim per Orbium cavitates ab attractionibus contrariis (per Prop. LXX.) tollantur, ideoque vel in ipso contactu nullæ sunt. Quod si Sphæris hisce Orbibusque Sphæricis partes quælibet a loco contactus remotæ auferantur, & partes novæ ubivis addantur: mutari possunt figuræ horum corporum attractivorum pro lubitu, nec tamen partes additæ vel subductæ, cum sint a loco contactus remotæ, augebunt notabiliter attractionis excessum qui ex contactu oritur. Constat igitur propositio de corporibus figurarum omnium. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO LXXXVI. THEOREMA XLIII.

LIBER
PRIMUS.

Si particularum, ex quibus corpus attractivum componitur, vires in recessu corporis attracti decrescunt in triplicata vel plusquam triplicata ratione distantiarum a particulis: attractio longe fortior erit in contactu, quam cum attrahens & attractum intervallo vel minimo separantur ab invicem.

Nam attractionem in accessu attracti corpusculi ad hujusmodi Sphæram trahentem augeri in infinitum, constat per solutionem Problematis XLI, in Exemplo secundo ac tertio exhibitam. Idem, per Exempla illa & Theorema XLI. inter se collata, facile colligitur de attractionibus corporum versus Orbes concavo-convexos, five corpora attracta collocentur extra Orbes, five intra in eorum cavitatibus. Sed & addendo vel auferendo his Sphæris & Orbibus ubivis extra locum contactus materiam quamlibet attractivam, eo ut corpora attractiva induant figuram quamvis assignatam, constabit Propositio de corporibus universis. Q. E. D.

PROPOSITIO LXXXVII. THEOREMA XLIV.

Si corpora duo sibi invicem similia, & ex materia equaliter attractiva constantia, seorsim attrahant corpuscula sibi ipsis proportionalia, & ad se similiter posita: attractiones acceleratrices corpusculorum in corpora tota erunt ut attractiones acceleratrices corpusculorum in eorum particulas totis proportionales & in totis similiter positas.

Nam si corpora distinguantur in particulas, quæ sint totis proportionales & in totis similiter sitæ; erit, ut attractio in particulam quamlibet unius corporis ad attractionem in particulam correspondentem in corpore altero, ita attractiones in particulas singulas primi corporis ad attractiones in alterius particulas singulas correspondentes; & componendo, ita attractio in totum primum corpus ad attractionem in totum secundum. Q. E. D.

Corol. 1. Ergo si vires attractivæ particularum, augendo distantias corpusculorum attractorum, decrescant in ratione dignitatis
Bb
cujusvis


DE MOTU cuiusvis distantiarum; attractiones acceleratrices in corpora tota e-
CORPORUM, runt ut corpora directe & distantiarum dignitates illæ inverse. Ut
si vires particularum decrecant in ratione duplicata distantiarum
a corpusculis attractis, corpora autem sint ut $A \text{ cub.}$ & $B \text{ cub.}$ ad-
eoque tum corporum latera cubica tum corpusculorum attractorum
distantiæ a corporibus, ut A & B : attractiones acceleratrices in cor-
pora erunt ut $\frac{A \text{ cub.}}{A \text{ quad.}}$ & $\frac{B \text{ cub.}}{B \text{ quad.}}$ id est, ut corporum latera illa
cubica A & B . Si vires particularum decrecant in ratione tripli-
cata distantiarum a corpusculis attractis; attractiones acceleratrices
in corpora tota erunt ut $\frac{A \text{ cub.}}{A \text{ cub.}}$ & $\frac{B \text{ cub.}}{B \text{ cub.}}$ id est, æquales. Si vi-
res decrecant in ratione quadruplicata; attractiones in corpora
erunt ut $\frac{A \text{ cub.}}{A \text{ qq.}}$ & $\frac{B \text{ cub.}}{B \text{ qq.}}$ id est, reciproce ut latera cubica A & B :
Et sic in cæteris.

Corol. 2. Unde vicissim, ex viribus quibus corpora similia trahunt
corpuscula ad se similiter posita, colligi potest ratio decrementi vi-
rium particularum attractivarum in recessu corpusculi attracti: si
modo decrementum illud sit directe vel inverse in ratione aliqua
distantiarum.

PROPOSITIO LXXXVIII. THEOREMA XLV.

*Si particularum equalium Corporis cujuscunque vires attrac-
tive sint ut distantie locorum a particulis: vis corporis
totius tendet ad ipsius centrum gravitatis; & eadem erit
cum vi Globi ex materia consimili & equali constantis &
centrum habentis in ejus centro gravitatis.*

Corporis $RSTV$ particulae A ,
 B trahant corpusculum aliquod
 Z viribus quæ, si particulae æ-
quantur inter se, sint ut distan-
tiæ AZ , BZ ; si particulae sta-
tuantur inæquales, sint ut hæ par-
ticulae in distantias suas AZ , BZ
respective ductæ. Et exponantur
hæ vires per contenta illa $A \times AZ$
& $B \times BZ$. Jungatur AB , &
fecetur ea in G ut sit AG ad BG ut particula B ad particulam A ;



&

& erit G commune centrum gravitatis particularum A & B . Vis $A \times AZ$ (per Legum Corol. 2.) resolvitur in vires $A \times GZ$ & $A \times AG$, & vis $B \times BZ$ in vires $B \times GZ$ & $B \times BG$. Vires autem $A \times AG$ & $B \times BG$, ob proportionales A ad B & BG ad AG , æquantur; adeoque cum dirigantur in partes contrarias, se mutuodestruunt. Restant vires $A \times GZ$ & $B \times GZ$. Tendunt hæ ab Z versus centrum G , & vim $A+B \times GZ$ componunt; hoc est, vim eandem ac si particulæ attractivæ A & B consisterent in eorum communi gravitatis centro G , Globum ibi componentes.

Eodem argumento, si adjungatur particula tertia C , & componatur hujus vis cum vi $A+B \times GZ$ tendente ad centrum G ; vis inde oriunda tendet ad commune centrum gravitatis trium particularum A , B , C ; & eadem erit ac si Globus & particula C consisterent in centro illo communi, Globum majorem ibi componentes. Et sic pergitur in infinitum. Eadem est igitur vis tota particularum omnium corporis cujuscunque $RSTV$ ac si corpus illud, servato gravitatis centro, figuram Globi indueret. Q. E. D.

Corol. Hinc motus corporis attracti Z idem erit ac si corpus attrahens $RSTV$ esset Sphæricum; & propterea si corpus illud attrahens vel quiescat, vel progrediatur uniformiter in directum; corpus attractum movebitur in Ellipsi centrum habente in attrahentis centro gravitatis.

PROPOSITIO LXXXIX. THEOREMA XLVI.

Si Corpora sint plura ex particulis æqualibus constantia, quarum vires sunt ut distantie locorum a singulis: vis ex omnium viribus composita, qua corpusculum quodcunque trahitur, tendet ad trahentium commune centrum gravitatis, & eadem erit ac si trahentia illa, servato gravitatis centro communi, coirent & in Globum formarentur.

Demonstratur eodem modo, atque Propositio superior.


Corol. Ergo motus corporis attracti idem erit ac si corpora trahentia, servato communi gravitatis centro, coirent & in Globum formarentur. Ideoque si corporum trahentium commune gravitatis centrum vel quiescit, vel progreditur uniformiter in linea recta: corpus attractum movebitur in Ellipsi, centrum habente in communi illo trahentium centro gravitatis.

PROPOSITIO XC. PROBLEMA XLIV.

De Moto
Corporum,

Si ad singula Circuli cujuscunque puncta tendant vires æquales centripetæ, decreſcentes in quacunque diſtantiarum ratione: invenire vim qua corpusculum attrahitur ubiſque poſitum in recta quæ plano Circuli ad centrum ejus perpendiculariter inſiſtit.

Centro *A* intervallo quovis *AD*, in plano cui recta *AP* perpendicularis eſt, deſcribi intelligatur Circulus; & invenienda ſit vis qua corpusculum quodvis *P* in eundem attrahitur. A Circuli puncto quovis *E* ad corpusculum attractum *P* agatur recta *PE*: In recta *PA* capiatur *PF* ipſi *PE* æqualis, & erigatur normalis *FK*, quæ ſit ut vis qua punctum *E* trahit corpusculum *P*. Sitque *IKL* curva linea quam punctum *K* perpetuo tangit. Occurrat eadem Circuli plano in *L*. In *PA* capiatur *PH* æqualis *PD*, & erigatur perpendicularum *HI* curvæ prædictæ occurrens in *I*; & erit corpusculi *P* attractio in Circulum ut area *AHIL* ducta in altitudinem *AP*. Q. E. I.



Etenim in *AE* capiatur linea quam minima *Ee*. Jungatur *Pe*; & in *PE*, *PA* capiatur *PC*, *Pf* ipſi *Pe* æquales. Et quoniam vis, qua annuli centro *A* intervallo *AE* in plano prædicto deſcripti punctum quodvis *E* trahit ad ſe corpus *P*, ponitur eſſe ut $\frac{AP \times FK}{PE}$, & inde vis qua punctum illud trahit corpus *P* verſus *A* eſt ut $\frac{AP \times FK}{PE}$, & vis qua annulus totus trahit corpus *P* verſus *A*,

ut annulus & $\frac{AP \times FK}{PE}$ conjunctim; annulus autem iſte eſt ut rectangulum ſub radio *AE* & latitudine *Ee*, & hoc rectangulum (ob proportionales *PE* & *AE*, *Ee* & *CE*) æquatur rectangulo *PE* × *CE* ſeu *PE* × *Ff*; erit vis qua annulus iſte trahit corpus *P* verſus *A*, ut *PE* × *Ff* & $\frac{AP \times FK}{PE}$ conjunctim, id eſt, ut contentum *Ff* × *FK* × *AP*, ſive ut area *FKkf* ducta in *AP*. Et propterea ſumma virium, quibus annuli omnes in Circulo, qui centro *A* & intervallo

tervallo AD describitur, trahunt corpus P versus A , est ut area tota $AHIKL$ ducta in AP . \mathcal{Q} . E . D .

Corol. 1. Hinc si vires punctorum decreſcunt in duplicata distantiarum ratione, hoc est, si sit FK ut $\frac{1}{PF \text{ quad.}}$, atque adeo area $AHIKL$ ut $\frac{1}{PA} - \frac{1}{PH}$; erit attractio corpusculi P in Circulum ut $1 - \frac{PA}{PH}$, id est, ut $\frac{AH}{PH}$.


Corol. 2. Et universaliter, si vires punctorum ad distantias D sint reciproce ut distantiarum dignitas quælibet D^n , hoc est, si sit FK ut $\frac{1}{D^n}$, adeoque area $AHIKL$ ut $\frac{1}{PA^{n-1}} - \frac{1}{PH^{n-1}}$; erit attractio corpusculi P in Circulum ut $\frac{1}{PA^{n-1}} - \frac{PA}{PH^{n-1}}$.

Corol. 3. Et si diameter Circuli augeatur in infinitum, & numerus n sit unitate major; attractio corpusculi P in planum totum infinitum erit reciproce ut PA^{n-2} , propterea quod terminus alter $\frac{PA}{PH^{n-1}}$ evanescet.

PROPOSITIO XCI. PROBLEMA XLV.

Invenire attractionem corpusculi siti in axe solidi rotundi, ad cujus puncta singula tendunt vires æquales centripetæ in quacunque distantiarum ratione decreſcentes.

In Solidum $ADEFG$ trahatur corpusculum P , situm in ejus axe AB . Circuloquoque RFS ad hunc axem perpendiculari secetur hoc Solidum, & in ejus diametro FS , in plano aliquo $PALKB$ per axem tranſeunte, capiatur (per Prop. xc.) longitudo FK vi qua corpusculum P in circulum illum attrahitur proportionalis. Tangat autem punctum K curvam lineam LKI , planis extimorum circulorum AL & BI occurrentem in L & I ; & erit attractio corpusculi P in Solidum ut area $LABI$. \mathcal{Q} . E . I .




Bb. 3

Corol.

DE MOTU
CORPORUM,


Corol. 1. Unde si Solidum Cylindrus sit, parallelogrammo $ADEB$ circa axem AB revolutus descriptus, & vires centripetæ in singula ejus puncta tendentes sint reciproce ut quadrata distantiarum a punctis: erit attractio corpusculi P in hunc Cylindrum ut $AB - PE + PD$. Nam ordinatim applicata FK



(per *Corol. 1. Prop. xc.*) erit ut $1 - \frac{PF}{PR}$. Hujus pars 1 ducta in

longitudinem AB , describit aream $1 \times AB$; & pars altera $\frac{PF}{PR}$ ducta in longitudinem PB , describit aream 1 in $PE - AD$ (id quod ex curvæ LIK quadratura facile ostendi potest:) & similiter pars eadem ducta in longitudinem PA describit aream 1 in $PD - AD$, ductaque in ipsarum PB , PA differentiam AB , describit arearum differentiam 1 in $PE - PD$. De contento primo $1 \times AB$ auferatur contentum postremum 1 in $PE - PD$, & restabit area $LABI$ æqualis 1 in $AB - PE + PD$. Ergo vis, huic areæ proportionalis, est ut $AB - PE + PD$.

Corol. 2. Hinc etiam vis innotescit qua Sphæroides $AGBCD$ attrahit corpus quodvis P , exterius in axe suo AB situm. Sit $NKRM$ Sectio Conica cujus ordinatim applicata ER , ipsi PE perpendicularis, æquetur semper longitudini PD , quæ ducitur ad punctum illud D , in




quo applicata ista Sphæroidem secat. A Sphæroidis verticibus A, B ad ejus axem AB erigantur perpendiculara AK, BM ipsis AP, BP æqualia respective, & propterea Sectioni Conicæ occurrentia in K & M ; & jungatur KM auferens ab eadem segmentum $KMRK$. Sit autem Sphæroidis centrum S & semidiameter maxima SC : & vis qua

qua Sphærois trahit corpus P erit ad vim qua Sphæra, diametro AB descripta, trahit idem corpus, ut $\frac{AS \times CSq - PS \times KMRK}{PSq + CSq - ASq}$

ad $\frac{AS \text{ cub.}}{3PS \text{ quad.}}$. Et eodem computandi fundamento invenire licet vires segmentorum Sphæroidis.

Corol. 3. Quod si corpusculum intra Sphæroidem, in data quavis ejusdem diametro, collocetur; attractio erit ut ipsius distantia a centro. Id quod facilius colligetur hoc argumento. Sit $AGOF$ Sphærois attrahens, S centrum ejus & P corpus attractum. Per corpus illud P agantur tum semidiameter SPA , tum rectæ duæ quævis DE , FG Sphæroidi hinc inde occurrentes in D & E , F & G : Sintque PCM , HLN superficies Sphæroidum duarum interiorum, exteriori similium & concentricarum, quarum prior transeat per corpus P & secet rectas DE & FG in B & C , posterior secet easdem rectas in H , I & K , L . Habeant autem Sphæroides omnes axem communem, & erunt rectarum partes hinc inde interceptæ DP & BE , FP & CG , DH & IE , FK & LG sibi mutuo æquales; propterea quod rectæ DE , PB & HI bisequantur in eodem puncto, ut & rectæ FG , PC & KL . Concipe jam DPF , EPG designare Conos oppositos, angulis verticalibus DPF , EPG infinite parvis descriptos, & lineas etiam



DH , EI infinite parvas esse; & Conorum particule Sphæroidum superficiebus abscissæ $DHKF$, $GLIE$, ob æqualitatem linearum DH , EI , erunt ad invicem ut quadrata distantiarum suarum a corpusculo P , & propterea corpusculum illud æqualiter trahent. Et pari ratione, si superficiebus Sphæroidum innumerarum similium concentricarum & axem communem habentium dividantur spatia DPF , $EGCB$ in particulas, hæ omnes utrinque æqualiter trahent corpus P in partes contrarias. Æquales igitur sunt vires Coni DPF & segmenti Conici $EGCB$, & per contrarietatem se mutuo destruant. Et par est ratio virium materiæ omnis extra Sphæroidem intimam $PCBM$. Trahitur igitur corpus P a sola Sphæroide intima $PCBM$, & propterea (per Corol. 3. Prop. LXXII.) attractio ejus est ad vim, qua corpus A trahitur a Sphæroide tota $AGOD$, ut distantia PS ad distantiam AS . Q. E. D.

PRO.

vis qua planum quodvis mHM trahit punctum C est reciproce ut CH^n-2 . In plano mHM capiatur longitudo HM ipsi CH^n-2 reciproce proportionalis, & erit vis illa ut HM . Similiter in planis singulis IGL , nIN , oKO , &c. capiuntur longitudines GL , IN , KO , &c. ipsis CG^n-2 , CI^n-2 , CK^n-2 , &c. reciproce proportionales; & vires planorum eorundem erunt ut longitudines captae, adeoque summa virium ut summa longitudinum, hoc est, vis Solidi totius ut area $GLOK$ in infinitum versus OK producta. Sed area illa (per notas quadraturarum methodos) est reciproce ut CG^n-3 , & propterea vis Solidi totius est reciproce ut CG^n-3 . *Q. E. D.*

Cas. 2. Collocetur jam corpusculum C ex parte plani IGL intra Solidum, & capiatur distantia CK aequalis distantiae CG . Et Solidi pars $LGloKO$, planis parallelis IGL , oKO terminata, corpusculum C in medio situm nullam in partem trahet, contrariis oppositorum punctorum actionibus se mutuo per aequalitatem tollentibus, Proinde corpusculum C sola vi Solidi ultra planum OK siti trahitur. Hæc autem vis (per Casum primum) est reciproce ut CK^n-3 , hoc est (ob æquales CG , CK) reciproce ut CG^n-3 . *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si Solidum $LGIN$ planis duobus infinitis parallelis LG , IN utrinque terminetur, innotescit ejus vis attractiva, subducendo de vi attractiva Solidi totius infiniti $LGKO$ vim attractivam partis ulterioris $NIKO$, in infinitum versus KO productæ.

Corol. 2. Si Solidi hujus infiniti pars ulterior, quando attractio ejus collata cum attractione partis citerioris nullius pene est momenti, rejiciatur: attractio partis illius citerioris augendo distantiam decrescet quam proxime in ratione potestatis CG^n-3 .

Corol. 3. Et hinc si corpus quodvis finitum & ex una parte planum trahat corpusculum e regione medii illius plani, & distantia inter corpusculum & planum collata cum dimensionibus corporis attrahentis perexigua sit, constet autem corpus attrahens ex particulis homogeneis, quarum vires attractivæ decrescunt in ratione potestatis cujusvis plusquam quadruplicatæ distantiarum; vis attractiva corporis totius decrescet quamproxime in ratione potestatis, cujus laus sit distantia illa perexigua, & Index ternario minor quam Index potestatis prioris. De corpore ex particulis constante, quarum vires attractivæ decrescunt in ratione potestatis triplicatæ distantiarum, assertio non valet; propterea quod, in hoc casu, attractio partis illius ulterioris corporis infiniti in Corollario secundo, semper est infinite major quam attractio partis citerioris.

Cc

Scholium.

Si corpus aliquod perpendiculariter versus planum datum trahatur, & ex data lege attractionis quærat motus corporis: Solvetur Problema quærendo (per Prop. xxxix.) motum corporis recta descendentis ad hoc planum, & (per Legum Corol. 2.) componendo motum istum cum uniformi motu, secundum lineas eidem plano parallelas factæ. Et contra, si quærat Lex attractionis in planum secundum lineas perpendiculares factæ, ea conditione ut corpus attractum in data quacunque curva linea moveatur, solvetur Problema operando ad exemplum Problematis tertii.

Operationes autem contrahi solent resolvendo ordinatim applicatas in Series convergentes. Ut si ad basem A in angulo quovis dato ordinatim applicetur longitudo B, quæ sit ut basis dignitas quælibet $A^{\frac{m}{n}}$; & quærat vis qua corpus, secundum positionem ordinatim applicatæ, vel in basem attractum vel a basi fugatum, moveri possit in curva linea quam ordinatim applicata termino suo superiore semper attingit: Suppono basem augeri parte

quam minima O, & ordinatim applicatam $\overline{A + O}^{\frac{m}{n}}$ resolve in Seriem infinitam $A^{\frac{m}{n}} + \frac{m}{n} OA^{\frac{m-n}{n}} + \frac{m(m-n)}{2nn} OOA^{\frac{m-2n}{n}}$ &c. atque hujus termino in quo O duarum est dimensionum, id est, termino $\frac{m(m-n)}{2nn} OOA^{\frac{m-2n}{n}}$ vim proportionalem esse suppono. Est

igitur vis quæsitæ ut $\frac{m(m-n)}{nn} A^{\frac{m-2n}{n}}$, vel quod perinde est, ut $\frac{m(m-n)}{nn} B^{\frac{m-2n}{n}}$. Ut si ordinatim applicata Parabolam attingat,

existente $m=2$, & $n=1$: fiet vis ut data $2 B^2$, adeoque dabitur. Data igitur vi corpus movebitur in Parabola, quemadmodum Galileus demonstravit. Quod si ordinatim applicata Hyperbolam attingat, existente $m=0-1$, & $n=1$: fiet vis ut $2 A^{-1}$ seu $2 B^{-1}$: adeoque vi, quæ sit ut cubus ordinatim applicatæ, corpus movebitur in Hyperbola. Sed missis hujusmodi Propositionibus, pergo ad alias quasdam de Motu, quas nondum attingi.

SECTIO

S E C T I O XIV.


LIBER
PRIMUS.

De Motu corporum minimorum, quæ Viribus centripetis ad singulas magni alicujus corporis partes tendentibus agitantur.

PROPOSITIO XCIV. THEOREMA XLVIII.

Si Media duo similiaria, spatio planis parallelis utrinque terminato, distinguantur ab invicem, & corpus in transitu per hoc spatium attrahatur vel impellatur perpendiculariter versus Medium alterutrum, neque ulla alia vi agitetur vel impediatur: Sit autem attractio, in æqualibus ab utroque plano distantis ad eandem ipsius partem capitis, ubique eadem: dico quod sinus incidentiæ in planum alterutrum erit ad sinum emergentiæ ex plano altero in ratione data.


Caf. 1. Sunto Aa , Bb plana duo parallela. Incidat corpus in planum prius Aa secundum lineam GH , actoto suo per spatium intermedium transitu attrahatur vel impellatur versus Medium incidentiæ eaque actione describat lineam curvam HI , & emergat secundum lineam IK . Ad planum emergentiæ Bb erigatur perpendicularum IM , occurrens tum lineæ incidentiæ GH productæ in M , tum plano incidentiæ Aa in R ; & linea emergentiæ KI producta occurrat HM in L . Centro L intervallo LI describatur Circulus, secans



Cc 2

DE MOTU
CORPORUM,

secans tam HM in P & Q , quam MI productam in N , & primo si attractio vel impulsus ponatur uniformis, erit (ex demonstratis *Galilei*) curva HI Parabola, cujus hæc est proprietas, ut rectangulum sub dato latere recto & linea IM æquale sit HM quadrato; sed & linea HM bifecabitur in L . Unde si ad MI demittatur perpendicularum LO , æquales erunt MO , OR ; & additis æqualibus ON , OI , fient totæ æquales MN , & IR . Proinde cum IR detur, datur etiam MN ; estque rectangulum NMI ad rectangulum sub latere recto & IM , hoc est, ad HMq , in data ratione. Sed rectangulum NMI æquale est rectangulo PMQ , id est, differentiæ quadratorum MLq , & PLq seu LIq ; & HMq datam rationem habet ad sui ipsius quartam partem MLq ; ergo datur ratio $MLq - LIq$ ad MLq , & divisim, ratio LIq ad MLq , & ratio dimidiata LI ad ML . Sed in omni triangulo LMI , sinus angulorum sunt proportionales lateribus oppositis. Ergo datur ratio sinus anguli incidentiæ LMR ad sinum anguli emergentiæ LIR . *Q.E.D.*



Caf. 2. Transeat jam corpus successive per spacia plura parallelis planis terminata, $AabB$, $BbcC$, &c. & agitetur vi quæ sit in singulis

singulis separatim uniformis, ac in diversis diversa, & Per jam demonstrata, sinus incidentiæ in planum primum Aa erit ad LIBER PRIMUS.
 sinum emergentiæ ex plano secundo Bb , in data ratione; & hic sinus, qui est sinus incidentiæ in planum secundum Bb , erit ad sinum emergentiæ ex plano tertio Cc , in data ratione; & hic sinus ad sinum emergentiæ ex plano quarto Dd , in data ratione, & sic in infinitum: & ex æquo, sinus incidentiæ in planum primum ad sinum emergentiæ ex plano ultimo in data ratione. Minuantur jam planorum intervalla & augeatur numerus in infinitum, eo ut attractionis vel impulsus actio, secundum legem quamcunque assignatam, continua reddatur; & ratio sinus incidentiæ in planum primum ad sinum emergentiæ ex plano ultimo, semper data existens, etiamnum dabitur. Q. E. D.

PROPOSITIO XCV. THEOREMA XLIX.


Iisdem positis; dico quod velocitas corporis ante incidentiam est ad ejus velocitatem post emergentiam, ut sinus emergentiæ ad sinum incidentiæ.

Capiantur AH , Id æquales, & erigantur perpendiculara AG , dK occurrentia lineis incidentiæ & emergentiæ GH , IK , in G & K . In GH capiatur TH æqualis IK , & ad planum Aa demittatur normaliter Tv . Et (per Legum Corol. 2.) distinguatur motus corporis in duos, unum planis Aa , Bb , Cc , &c. perpendiculararem, alterum iisdem parallelum. Vis attractionis vel impulsus, agendo secundum lineas perpendiculares, nil mutat motum secundum parallelas, & propterea corpus hoc motu conficiet æqualibus temporibus æqualia illa secundum parallelas intervalla, quæ sunt inter lineam AG & punctum H , interque punctum I & lineam dK ; hoc est, æqualibus temporibus describet lineas GH , IK . Proinde velocitas ante incidentiam est ad velocitatem post emergentiam, ut GH ad IK vel TH , id est, ut AH vel Id ad vH , hoc est (respectu radii TH vel IK) ut sinus emergentiæ ad sinum incidentiæ. Q. E. D.

PROPOSITIO XCVI. THEOREMA L.

Iisdem positis & quod motus ante incidentiam velocior sit quam postea : dico quod corpus, inclinando lineam incidentiæ, reflectetur tandem, & angulus reflexionis fiet æqualis angulo incidentiæ.

Nam concipe corpus inter parallela plana Aa , Bb , Cc , &c. describere arcus Parabolicos, ut supra; sintque arcus illi HP , PQ , QR , &c. Et sit ea lineæ incidentiæ GH obliquitas ad planum primum Aa , ut sinus incidentiæ sit ad radium circuli, cujus est sinus, in ea ratione quam habet idem sinus incidentiæ ad sinum emergentiæ ex plano Dd , in spatium $DdeE$: & ob sinum emergentiæ jam factum æqualem radio, angulus emergentiæ erit rectus, adeoque linea emergentiæ coincidit cum plano Dd . Perveniat corpus ad hoc planum in puncto R ; & quoniam linea emergentiæ coincidit cum eodem plano, perspicuum est quod corpus non potest ultra pergere versus planum Ee . Sed nec potest idem pergere in linea emergentiæ Rd , propterea quod perpetuo attrahitur vel impellitur versus Medium incidentiæ. Reverteretur itaque inter plana Cc , Dd , describendo arcum Parabolæ QRq , cujus vertex principalis (juxta demonstrata Galilæi) est in R ; secabit planum Cc in eodem angulo in q , ac prius in Q ; dein pergendo in arcubus parabolicis qp , pb , &c. arcubus prioribus QP , PH similibus & æqualibus secabit reliqua plana in iisdem angulis in p , b , &c. ac prius in P , H , &c. emergetque tandem eadem obliquitate in b , qua incidit in H . Concipe jam planorum Aa , Bb , Cc , Dd , Ee , &c. intervallo in infinitum minui & numerum augeri, eo ut actio attractionis vel impulsus secundum legem quamcunque assignatam continua reddatur; & angulus emergentiæ semper angulo incidentiæ æqualis existens, eidem etiamnum manebit æqualis. Q ; E . D .



Scholium.

Scolium.

LIBER
PRIMUS.


Harum attractionum haud multum dissimiles sunt Lucis reflexiones & refractiones, factæ secundum datam Secantium rationem, ut invenit *Snellius*, & per consequens secundum datam Sinuum rationem, ut exposuit *Cartesius*. Namque Lucem successive propagari & spatio quasi septem vel octo minorum primorum a Sole ad Terram venire, jam constat per Phenomena Satellitum *Jovis*, Observationibus diversorum Astronomorum confirmata. Radii autem in aere existentes (uti dudum *Grimaldus*, luce per foramen in tenebrosam cubiculum admissa, invenit, & ipse quoque expertus sum) in transitu suo prope corporum vel opacorum vel perspicuorum angulos (quales sunt nummorum ex auro, argento & ære cultorum termini rectanguli circulares, & cultorum, lapidum aut fractorum vitrorum acies) incurvantur circum corpora, quasi attracti in eadem: & ex his radiis, qui in transitu illo propius accedunt ad corpora incurvantur magis, quasi magis attracti, ut ipse etiam diligenter observavi. In figura designat *s* aciem cultri vel cunei cujusvis *AsB*; & *gowog*, *fnunf*, *emtme*, *dlsld*, sunt radii, arcubus *owo*, *nun*, *mtm*, *lsl* versus cultrum incurvati; idque magis vel minus pro distantia eorum a cultro. Cum autem talis incurvatio radiorum fiat in aere extra cultrum, debent etiam radii, qui incidunt in cultrum, prius incurvari in aere quam cultrum attingunt. Et par est ratio incidentium in vitrum. Fit igitur refraction, non in puncto incidentiæ, sed paulatim per continuam incurvationem radiorum, factam partim in aere antequam attingunt vitrum, partim (ni fallor) in vitro, postquam illud ingressi sunt: uti in radiis *ckzkc*, *biiyb*, *abxha* incidentibus ad *r*, *q*, *p*, & inter *k* & *z*, *i* & *y*, *b* & *x* incurvatis, delineatum est. Igitur ob analogiam quæ est inter propagationem radiorum lucis & progressum corporum, visum est Propositiones sequentes in usus Opticos subjungere; interea de natura radiorum (utrum sint corpora necne) nihil omnino disputans, sed Trajectorias corporum Trajectorias radiorum persimiles solummodo determinans.



PROPO:

De Motu
Corporum

& divisim ut $DL - FB$ seu $PH - PD - FB$ ad FD seu $FQ - QD$;
& compositè ut $PH - FB$ ad FQ , id est (ob æquales PH &
 CG , QS & CE) CE
 $+ BG - FR$ ad $CE -$
 FS . Verum (ob propor-
tionales BG ad CE &
 $M - N$ ad N) est etiam
 $CE + BG$ ad CE ut M
ad N : adeoque divisim
 FR ad FS ut M ad N ,
& propterea (per Corol.
2. Prop. xcvi) superfi-
cies EF cogit corpus,
in ipsam secundum lineam DF incidens, pergere in linea FR ad
locum B . $Q. E. D.$



Scholium.

Eadem methodo pergere liceret ad superficies tres vel plures. Ad
usus autem Opticos maxime accommodatæ sunt figuræ Sphæricæ.
Si Perspicillorum vitra Objectiva ex vitris duobus sphæricè figura-
tis & Aquam inter se claudentibus conflentur; fieri potest ut a
refractionibus Aquæ errores refractionum, quæ sunt in vitrorum
superficiebus extremis, satis accurate corrigantur. Talia autem
vitra Objectiva vitris Ellipticis & Hyperbolicis præferenda sunt,
non solum quod facilius & accuratius formari possint, sed etiam
quod Penicillos radiorum extra axem vitri sitos accuratius refrin-
gant. Verum tamen diversa diversorum radiorum Refrangibilitas
impedimento est, quo minus Optica per Figuras vel Sphæricas vel
alias quasunque perfici possit. Nisi corrigi possint errores illinc
oriundi, labor omnis in cæteris corrigendis imperite collocabitur.

D E

DE

MOTU CORPORUM

LIBER SECUNDUS.

S E C T I O I.

*De Motu Corporum quibus resistitur in ratione
Velocitatis.*

PROPOSITIO I. THEOREMA I.

Corporis, cui resistitur in ratione velocitatis, motus ex resis-
stentia amissus est ut spatium movendo confectum.

NAM cum motus singulis temporis particulis æqualibus amissus sit ut velocitas, hoc est, ut itineris confecti particula: erit, componendo, motus toto tempore amissus ut iter totum. *Q. E. D.*

Corol. Igitur si corpus, gravitate omni destitutum, in spatiis liberis sola vi insita moveatur; ac detur tum motus totus sub initio, tum etiam motus reliquus post spatium aliquod confectum: dabitur spatium totum quod corpus infinito tempore describere potest. Erit enim spatium illud ad spatium jam descriptum, ut motus totus sub initio ad motus illius partem amissam.

L E M M A I.

*Quantitatis differentiis suis proportionales, sunt continue
proportionales.*

Sit A ad A—B ut B ad B—C & C ad C—D, &c. & dividendo fiet A ad B ut B ad C & C ad D, &c. *Q. E. D.*

Dd 2

PRO-

DE MOTU
CORPORUM,


PROPOSITIO II. THEOREMA II.

Si Corpori refistitur in ratione velocitatis, & idem sola vi infusa per Medium simile moveatur, sumantur autem tempora æqualia: velocitates in principiis singulorum temporum sunt in progressionem Geometricam, & spatia singulis temporibus descripta sunt ut velocitates.

Cas. 1. Dividatur tempus in particulas æquales; & si ipsis particularum initiis agat vis resistentiæ impulsio unico, quæ sit ut velocitas: erit decrementum velocitatis singulis temporis particulis ut eadem velocitas. Sunt ergo velocitates differentiis suis proportionales, & propterea (per Lem. 1. Lib. 11.) continue proportionales. Proinde si ex æquali particularum numero componantur tempora quolibet æqualia, erunt velocitates ipsis temporum initiis, ut termini in progressionem continua, qui per saltum capiuntur, omisso passim æquali terminorum intermediorum numero. Componuntur autem horum terminorum rationes ex æqualibus rationibus terminorum intermediorum æqualiter repetitis, & propterea sunt æquales. Igitur velocitates, his terminis proportionales, sunt in progressionem Geometricam. Minuantur jam æquales illæ temporum particule, & augeatur earum numerus in infinitum, eo ut resistentiæ impulsus reddatur continuus; & velocitates in principiis æqualium temporum, semper continue proportionales, erunt in hoc etiam casu continue proportionales. *Q. E. D.*

Cas. 2. Et divisim velocitatum differentiæ, hoc est, earum partes singulis temporibus amissæ, sunt ut totæ: Spatia autem singulis temporibus descripta sunt ut velocitatum partes amissæ, (per Prop. 1. Lib. 11.) & propterea etiam ut totæ. *Q. E. D.*

Corol. Hinc si Asymptotis rectangulis *ADC*, *CH* describatur Hyperbola *BG*, sintque *AB*, *DG* ad Asymptoton *AC* perpendiculares, & exponatur tum corporis velocitas tum resistentia Medii, ipso motus initio, per lineam quamvis datam *AC*, elapso autem tempore aliquo per lineam indefinitam *DC*: exponi potest tempus per aream *ABGD*, & spatium eo tempore descriptum per lineam *AD*. Nam si area illa per motum puncti *D* augeatur uniformiter ad modum tempo-



ris,



ris, decrefcet recta DC in ratione Geometrica ad modum veloci-
tatis, & partes rectæ AC æqualibus temporibus defcriptæ decref-
cent in eadem ratione. L 122
SECUNDUS.

PROPOSITIO III. PROBLEMA I.

*Corporis, cui dum in Medio fimilari recta afcendit vel defcen-
dit, refiftitur in ratione velocitatis, quodque ab uniformi
gravitate urgetur, definire motum.*

Corpore afcendente, expo-
natur gravitas per datum quod-
vis rectangulum BC , & refi-
ftentia Medii initio afcenfus per
rectangulum $B'D$ fumprum ad
contrarias partes. Afymptotis
rectangulis AC, CH , per punc-
tum B defcribatur Hyperbola
fecans perpendiculara DE, de in
 G, g ; & corpus afcendendo,
tempore DGg , defcribet fpatium $EGge$, tempore $DGBA$
fpatium afcenfus totius EGB ; tempore $ABzGzD$ fpatium de-
fcenfus $BFzG$, atque tempore $zDzGzgd$ fpatium defcenfus
 $zGFzgzg$; & velocitates corporis (refiftentiæ Medii proportiona-
les) in horum temporum periodis erunt $ABED, ABed$, nulla,
 $ABFzD, ABzgzd$ refpectivæ; atque maxima velocitas, quam
corpus defcendendo potefit acquirere, erit BC .

Refolvatur enim rectan-
gulum AH in rectangula
innumera Ak, Kl, Lm, Mn ,
&c. quæ fint ut incrementa
velocitatum æqualibus toti-
dem temporibus facta; &
erunt nihil, Ak, Al, Am, An ,
&c. ut velocitates totæ, at-
que adeo (per Hypothefin)
ut refiftentiæ Medii princi-
pio fingulorum temporum
æqualium. Fiat AC ad AK vel $ABHC$ ad $ABkK$, ut vis gra-
vitatís ad refiftentiam in principio temporis fecundi, deque vi gravi-
tatis



DE MOTU tatis subducantur resistentiæ, & manebunt $ABHC$, $KkHC$, $LlHC$,
CORPORUM, $Nn HC$, &c. ut vires absolutæ quibus corpus in principio singulo-
 rum temporum urgetur, atque adeo (per motus Legem 11) ut in-
 crementa velocitatum, id est, ut rectangula Ak , Kl , Lm , Mn , &c.;
 & propterea (per Lem. 1. Lib. 11.) in progressione Geometrica. Qua-
 re si rectæ Kk , Ll , Mm , Nn , &c. productæ occurrant Hyperbolæ
 in q, r, s, t , &c. erunt areae $ABqK$, $KqrL$, $LrsM$, $MstN$, &c.
 æquales, adeoque tum temporibus tum viribus gravitatis semper
 æqualibus analogæ. Est autem area $ABqK$ (per Corol. 3 Lem. VII
 & Lem. VIII. Lib. 1.) ad aream Bkq ut Kq ad kq seu AC ad $i AK$,
 hoc est, ut vis gravitatis ad resistentiam in medio temporis primi.

Et simili argumento areae
 $qK Lr$, $r L M s$, $s M N t$, &c.

sunt ad areas $qklr$, $rlms$,

$smnt$, &c. ut vires gravi-

tatis ad resistentias in me-

dio temporis secundi, ter-

tii, quarti, &c. Proinde

cum areae æquales $BAKq$,

$qK Lr$, $r L M s$, $s M N t$,

&c. sint viribus gravitatis

analogæ, erunt areae Bkq ,

$qklr$, $rlms$, $smnt$, &c.

resistentiis in mediis singulorum tempo-

rum, hoc est (per Hypothesin) velocitatibus, atque adeo descriptis

spatiis analogæ. Sumantur analogarum summae, & erunt areae Bkq ,

Blr , Bms , Bnt , &c. spatiis totis descriptis analogæ; necnon areae

$ABqK$, $ABrL$, $ABsM$, $ABtN$, &c. temporibus. Corpus

igitur inter descendendum, tempore quovis $ABrL$, describit spa-

tium Blr , & tempore $Lrtn$ spatium $rlnt$. *Q. E. D.* Et simili

lis est demonstratio motus expositi in ascensu. *Q. E. D.*

Corol. 1. Igitur velocitas maxima, quam corpus cadendo potest

acquirere, est ad velocitatem dato quovis tempore acquisitam, ut

vis data gravitatis qua perpetuo urgetur, ad vim resistentiæ qua in

sine temporis illius impeditur.

Corol. 2. Tempore autem aucto in progressione Arithmetica, sum-

ma velocitatis illius maximæ ac velocitatis in ascensu (atque etiam


earundem differentiæ in descensu) decrescit in progressione Geo-

metrica.

Corol. 3. Sed & differentiæ spatorum, quæ in æqualibus tempo-

rum differentiis describuntur, decrescunt in eadem progressione

Geometrica.



Corol.

DE MOTU
CORPORUM,

inde est, cape Rr æqualem $\frac{GTIE}{N}$; & Projectile tempore $DRTG$

perveniet ad punctum r , describens curvam lineam $DraF$, quam punctum r semper tangit, perveniens autem ad maximam altitudinem a in perpendiculari AB , & postea semper appropinquans ad Asymptoton PLC . Estque velocitas ejus in puncto quovis r ut Curvæ Tangens rL . *Q. E. I.*

Est enim N ad QB ut DC ad CP seu DR ad RV , adeoque RV æqualis $\frac{DR \times QB}{N}$, & Rr (id est $RV - Vr$ seu $\frac{DR \times QB - tGT}{N}$)


æqualis $\frac{DR \times AB - RDGT}{N}$

Exponatur jam tempus per aream

$RDGT$, & (per Legum Corol. 2.) distinguatur motus corporis in duos, unum ascensus, alterum ad latus. Et cum resistentia sit ut motus, distinguetur etiam hæc in partes duas partibus motus proportionales & contrarias: ideoque longitudo, a motu ad latus descripta, erit (per Prop. 11. hujus) ut linea DR , altitudo vero (per Prop. 111. hujus) ut area $DR \times AB - RDGT$, hoc est, ut linea Rr . Ipso autem motus initio area $RDGT$ æqualis est rectangulo $DR \times AQ$, ideoque linea illa Rr (seu $\frac{DR \times AB - DR \times AQ}{N}$)

tunc est ad DR ut $AB - AQ$ seu QB ad N , id est, ut CP ad DC ; atque adeo ut motus in altitudinem ad motum in longitudinem sub initio. Cum igitur Rr semper sit ut altitudo, ac DR semper ut longitudo, atque Rr ad DR sub initio ut altitudo ad longitudinem: necesse est ut Rr semper sit ad DR ut altitudo ad longitudinem, & propterea ut corpus moveatur in linea $DraF$, quam punctum r perpetuo tangit. *Q. E. D.*

Corol.



Corol. 1. Est igitur Rr æqualis $\frac{DR \times AB}{N} - \frac{RDGT}{N}$, ideo LIBER
SECUNDUS;

que si producatur RT ad X ut sit RX æqualis $\frac{DR \times AB}{N}$, (id est, si compleatur parallelogrammum $ACPT$, jungatur DT secans CP in Z , & producatur RT donec occurrat DT in X ,) erit Xr æqualis $\frac{RDGT}{N}$, & propterea temporibus proportionalis.

Corol. 2. Unde si capiantur innumeræ CR vel, quod perinde est, innumeræ ZX , in progressionem Geometricam: erunt totidem Xr in progressionem Arithmeticam. Et hinc Curva $DraF$ per tabulam Logarithmorum facile delineatur.

Corol. 3. Si vertice D , diametro DE deorsum producta, & Latere recto quod sit ad $2DP$ ut resistentia tota, ipso motus initio, ad vim gravitatis, Parabola construatur: velocitas quacum corpus exire debet de loco D secundum rectam DP , ut in Medio uniformi resistente describat Curvam $DraF$, ea ipsa erit quacum exire debet de eodem loco D , secundum eandem rectam DP , ut in spatio non resistente describat Parabolam. Nam Latus rectum Parabolæ hujus, ipso motus initio, est $\frac{DV \text{ quad.}}{Vr}$ & Vr est

$\frac{tGT}{N}$ seu $\frac{DR \times Tt}{2N}$. Recta autem quæ, si duceretur, Hyperbolam GTB tangeret in G , parallela est ipsi DK , ideoque Tt est $\frac{CK \times DR}{DC}$ & N erat $\frac{QB \times DC}{CP}$. Et propterea Vr est

$\frac{DRq \times CK \times CP}{2DCq \times QB}$, id est, (ob proportionales DR & DC , DV & DP) $\frac{DVq \times CK \times CP}{2DPq \times QB}$, & Latus rectum $\frac{DV \text{ quad.}}{Vr}$ prodit

$\frac{2DPq \times QB}{CK \times CP}$, id est (ob proportionales QB & CK , DA & AC)

$\frac{2DPq \times DA}{AC \times CP}$, adeoque ad $2DP$, ut $DP \times DA$ ad $CP \times AC$; hoc est, ut resistentia ad gravitatem. $Q. E. D.$

Corol. 4. Unde si corpus de loco quovis D , data cum velocitate, secundum rectam quamvis positione datam DP projiciatur; & resistentia Medii ipso motus initio detur: inveniri potest Curva $DraF$, quam corpus idem describet. Nam ex data velocitate

Et


datur

tione qualibet, & exponatur ratio illa per longitudinem quamvis *SM*. Deinde per computationem, ex longitudine illa assumpta

LIBER
 SECUNDUS

DP, inveniantur longitudines *DF*, *Df*, ac de ratione $\frac{Ff}{DF}$ per

calculum inventa, auferatur ratio eadem per experimentum inventa, & exponatur differentia per perpendicularum *MN*. Idem fac iterum ac tertio, assumendo semper novam resistantiæ ad gravitatem rationem *SM*, & colligendo novam differentiam *MN*. Ducantur autem differentiæ affirmativæ ad unam partem rectæ *SM*, & negativæ ad alteram; & per puncta *N*, *N*, *N* agatur curva regularis *NNN* secans rectam *SM* in *X*; & erit *SX* vera ratio resistantiæ ad gravitatem, quam invenire oportuit. Ex hac ratione colligenda est longitudo *DF* per calculum; & longitudo quæ sit ad assumptam longitudinem *DP*, ut longitudo *DF* per experimentum cognita ad longitudinem *DF* modo inventam, erit vera longitudo *DP*. Qua inventa, habetur tum Curva linea *DraF* quam corpus describit, tum corporis velocitas & resistantia in locis singulis.



Scholium.

Cæterum resistantiam corporum esse in ratione velocitatis, Hypothesis est magis Mathematica quam Naturalis. Obtinet hæc ratio quamproxime ubi corpora in Mediis rigore aliquo præditis tardissime moventur. In Mediis autem quæ rigore omni vacant resistantiæ corporum sunt in duplicata ratione velocitatum. Etenim actione corporis velocioris communicatur eidem Medii quantitati, tempore minore, motus major in ratione majoris velocitatis; adeoque tempore æquali (ob majorem Medii quantitatem perturbatam) communicatur motus in duplicata ratione major; estque resistantia (per motus Legem II & III.) ut motus communicatus. Videamus igitur quales oriantur motus ex hac lege Resistantiæ.


S E C T I O II.

*De motu Corporum quibus resistitur in duplicata ratione
Velocitatum.*

PROPOSITIO V. THEOREMA III.

*Si Corpori resistitur in velocitatis ratione duplicata, & idem
sola vi insita per Medium simile movetur; tempora ve-
ro sumantur in progressione Geometrica a minoribus ter-
minis ad majores pergente: dico quod velocitates initio sin-
gulorum temporum sunt in eadem progressione Geometrica
inverse, & quod spatia sunt aequalia quæ singulis tempo-
ribus describuntur.*

Nam quoniam quadrato velocita-
tis proportionalis est resistentia Me-
dii, & resistentiæ proportionale est
decrementum velocitatis; si tempus
in particulas innumeras æquales di-
vidatur, quadrata velocitatum sin-
gulis temporum initiis erunt velo-
citatum earundem differentiis pro-
portionalia. Sunt temporis particu-
læ illæ AK, KL, LM &c. in recta
 CD sumptæ, & erigantur perpen-
dicularæ AB, Kk, Ll, Mm , &c. Hy-
perbolæ $BklmG$, centro C Asymptotis rectangulis CD, CH descrip-
tæ. occurrentia in B, k, l, m , &c. & erit AB ad Kk ut CK ad CA , &
divisim $AB - Kk$ ad Kk ut AK ad CA , & vicissim $AB - Kk$ ad
 AK ut Kk ad CA , adeoque ut $AB \times Kk$ ad $AB \times CA$. Unde,
cum AK & $AB \times CA$ dentur. erit $AB - Kk$ ut $AB \times Kk$; & ultimo,
ubi coeunt AB & Kk ut ABq . Et simili argumento erunt $Kk - Ll$,
 $Ll - Mm$, &c. ut Kkq, Llq , &c. Linearum igitur AB, Kk, Ll, Mm
qua-



quadrata sunt ut earundem differentiarum; & idcirco cum quadrata velocitatum fuerint etiam ut ipsarum differentiarum, similis erit eorum progressio. Quo demonstrato, consequens est etiam ut areae his lineis descriptae sint in progressionem consimili cum spatiis quae velocitatibus describuntur. Ergo si velocitas initio primi temporis AK exponatur per lineam AB , & velocitas initio secundi KL per lineam Kk , & longitudo primo tempore descripta per aream $AKkB$; velocitates omnes subsequentes exponentur per lineas subsequentes Ll, Mm , &c. & longitudines descriptae per areas Kl, Lm , &c. Et compositae, si tempus totum exponatur per summam partium suarum AM , longitudo tota descripta exponetur per summam partium suarum $AMmB$. Concipe jam tempus AM ita dividi in partes AK, KL, LM , &c. ut sint CA, CK, CL, CM , &c. in progressionem Geometricam; & erunt partes illae in eadem progressionem, & velocitates AB, Kk, Ll, Mm , &c. in progressionem eadem inversam, atque spatia descripta Ak, Kl, Lm , &c. aequalia. *Q. E. D.*

Corol. 1. Patet ergo quod, si tempus exponatur per Asymptotum partem quamvis AD , & velocitas in principio temporis per ordinatam applicatam AB , velocitas in fine temporis exponetur per ordinatam DG , & spatium totum descriptum per aream Hyperbolicam adjacentem $ABGD$; necnon spatium quod corpus aliquod eodem tempore AD , velocitate prima AB , in Medio non resistente describere posset, per rectangulum $AB \times AD$.

Corol. 2. Unde datur spatium in Medio resistente descriptum, capiendū illud ad spatium quod velocitate uniformi AB in medio non resistente simul describi posset, ut est area Hyperbolica $ABGD$ ad rectangulum $AB \times AD$.

Corol. 3. Datur etiam resistentia Medii, statuendo eam ipso motus initio aequalem esse vi uniformi centripetae, quae in cadente corpore, tempore AC , in Medio non resistente, generare posset velocitatem AB . Nam si ducatur BT quae tangat Hyperbolam in B , & occurrat Asymptoto in T ; recta AT aequalis erit ipsi AC , & tempus exponet quo resistentia prima uniformiter continuata tollere posset velocitatem totam AB .

Corol. 4. Et inde datur etiam proportio hujus resistentiae ad vim gravitatis aliamve quamvis datam vim centripetam.


Corol. 5. Et viceversa, si datur proportio resistentiae ad datam quamvis vim centripetam, datur tempus AC , quo vis centripeta resistentiae aequalis generare possit velocitatem quamvis AB ; & inde

De Motu
Conformi, de datur punctum B per quod Hyperbola, Asymptotis CH, CD , describi debet; ut & spatium $ABGD$, quod corpus incipiendo motum suum cum velocitate illa AB , tempore quovis AD , in Medio similari resistente describere potest.

PROPOSITIO VI. THEOREMA IV.

Corpora Spherica homogenea & equalia, resistentiis in duplicata ratione velocitatum impedita, & solis viribus insitis incitata, temporibus quæ sunt reciproce ut velocitates sub initio, describunt semper equalia spatia, & amittunt partes velocitatum proportionales totis.

Asymptotis rectangulis CD , CH descripta Hyperbola quavis $BbEe$ secante perpendicularia AB, ab, DE, de , in B, b, E, e , exponantur velocitates initiales per perpendicularia AB, DE , & tempora per lineas Aa, Dd . Est ergo ut Aa ad Dd ita (per Hypothesin) DE ad AB , & ita (ex natura Hyperbolæ) Ca ad Cd ; & componendo, ita Ca ad Cd . Ergo aræ $ABba, DEed$, hoc est, spatia descripta æquantur inter se, & velocitates primæ AB, DE sunt ultimis ab, de , & propterea (dividendo) partibus etiam suis amissis $AB-ab, DE-de$ proportionales. $Q. E. D.$



PROPOSITIO VII. THEOREMA V.

Corpora Spherica quibus resistitur in duplicata ratione velocitatum, temporibus quæ sunt ut motus primi directe & resistentiæ primæ inverse, amittent partes motuum proportionales totis, & spatia descripta temporibus istis in velocitates primas ductis proportionalia.

Namque motuum partes amissæ sunt ut resistentiæ & tempora
con-

conjunctim. Igitur ut partes illæ sint totis proportionales, debet resistētia & tempus conjunctim esse ut: motus. Proinde tempus erit ut motus directē & resistētia inversē. Quare temporum particulis in ea ratione sumptis, corpora amittent semper particulas motuum proportionales totis, adeoque retinebunt velocitates in ratione prima. Et ob datam velocitatum rationem, describent semper spatia quæ sunt ut velocitates primæ & tempora conjunctim.

Q. E. D.

Corol. 1. Igitur si æquielocibus corporibus resistitur in duplicata ratione diametrorum: Globi homogenei quibuscunque cum velocitatibus moti, describendo spatia diametris suis proportionalia, amittent partes motuum proportionales totis. Motus enim Globi cujusque erit ut ejus velocitas & Massa conjunctim, id est, ut velocitas & cubus diametri; resistētia (per Hypothesin) erit: ut quadratum diametri & quadratum velocitatis conjunctim; & tempus (per hanc Propositionem) est in ratione priore directē & ratione posteriore inversē, id est, ut diameter directē & velocitas inversē; adeoque spatium (tempori & velocitati proportionale) est ut diameter.

Corol. 2. Si æquielocibus corporibus resistitur in ratione sesquialtera diametrorum: Globi homogenei quibuscunque cum velocitatibus moti, describendo spatia in sesquialtera ratione diametrorum, amittent partes motuum proportionales totis.

Corol. 3. Et universaliter, si æquielocibus corporibus resistitur in ratione dignitatis cujuscunque diametrorum: spatia quibus Globi homogenei, quibuscunque cum velocitatibus moti, amittent partes motuum proportionales totis, erunt ut cubi diametrorum ad dignitatem illam applicati. Sinto diametri D & E : & si resistentiæ, ubi velocitates æquales ponuntur, sint ut D^m & E^n : spatia quibus Globi, quibuscunque cum velocitatibus moti, amittent partes motuum proportionales totis; erunt ut D^{m+1} & E^{n+1} . Igitur describendo spatia ipsis D^{m+1} & E^{n+1} proportionalia, retinebunt velocitates in eadem ratione ad invicem ac sub initio.

Corol. 4. Quod si Globi non sint homogenei, spatium a Globo densiore descriptum augeri debet in ratione densitatis. Motus enim, sub pari velocitate, major est in ratione densitatis, & tempus (per hanc propositionem) augetur in ratione motus directē, ac spatium descriptum in ratione temporis.

Corol.

De Motu
Cuaorum.

Corol. 5. Et si Globi moveantur in Mediis diversis; spatium in Medio, quod cæteris paribus magis resistit, diminuendum erit in ratione majoris resistentiæ. Tempus enim (per hanc Propositionem) diminuetur in ratione resistentiæ auctæ, & spatium in ratione temporis.

L E M M A II.

Momentum Genitæ æquatur Momentis laterum singulorum generantium in eorundem laterum indices dignitatum & coefficientia continue ductis.

Genitam voco quantitatem omnem quæ ex lateribus vel terminis quibuscunque, in Arithmetica per multiplicationem, divisionem, & extractionem radicum; in Geometria per inventionem vel contentorum & laterum, vel extremarum & mediarum proportionalem, absque additione & subtractione generatur. Ejusmodi quantitates sunt Facti, Quoti, Radices, Rectangula, Quadrata, Cubi, Latera quadrata, Latera cubica, & similes. Has quantitates ut indeterminatas & instabiles, & quasi motu fluxuve perpetuo crescentes vel decrecentes, hic considero; & earum incrementa vel decrementa momentanea sub nomine Momentorum intelligo: ita ut incrementa pro momentis additiis seu affirmativis, ac decrementa pro subductiis seu negativis habeantur. Cave tamen intellexeris particulas finitas. Particulæ finitæ non sunt momenta, sed quantitates ipsæ ex momentis genitæ. Intelligenda sunt principia jamjam nascentia finitarum magnitudinum. Neque enim spectatur in hoc Lemmate magnitudo momentorum, sed prima nascentium proportio. Eodem recidit si loco momentorum usurpentur vel velocitates incrementorum ac decrementorum, (quas etiam motus, mutationes & fluxiones quantitarum nominare licet) vel finitæ quævis quantitates velocitatibus hisce proportionales. Lateris autem cujusque generantis Coefficientis est quantitas, quæ oritur applicando Genitam ad hoc latus.

Igitur sensus Lemmatis est, ut, si quantitarum quorumcunque perpetuo motu crescentium vel decrecentium A, B, C , &c. momenta, vel mutationum velocitates dicantur a, b, c , &c. momentum vel mutatio geniti rectanguli AB fuerit $aB + bA$, & geniti contenti ABC momentum fuerit $aBC + bAC + cAB$: & genitarum digni-

dignitatum $A^1, A^1, A^1, A^{\frac{1}{2}}, A^{\frac{1}{2}}, A^{\frac{1}{2}}, A^{\frac{1}{2}}, A^{-1}, A^{-1}, A^{-1}$ momenta
 $2aA, 3aA^1, 4aA^1, \frac{1}{2}aA^{-1}, \frac{1}{2}aA^{\frac{1}{2}}, \frac{1}{2}aA^{\frac{1}{2}}, \frac{1}{2}aA^{-1}, -aA^{-1},$
 $-2aA^{-1}, \& -\frac{1}{2}aA^{-1}$, respective. Et generaliter, ut dignitatis

cujuscunque $A^{\frac{n}{m}}$ momentum fuerit $\frac{n}{m}aA^{\frac{n-m}{m}}$. Item ut Genitæ
 A^1B momentum fuerit $2aAB + bA^1$; & Genitæ $A^1B^1C^1$ momen-
 tum $3aA^1B^1C^1 + 4bA^1B^1C^1 + 2cA^1B^1C^1$; & Genitæ $\frac{A^1}{B^1}$ sive
 A^1B^{-1} momentum $3aA^1B^{-1} - 2bA^1B^{-1}$; & sic in cæteris. De-
 monstratur vero Lemma in hunc modum.

Caf. 1. Rectangulum quodvis motu perpetuo auctum AB , ubi
 de lateribus A & B deerant momentorum dimidia $\frac{1}{2}a$ & $\frac{1}{2}b$, fuit
 $A - \frac{1}{2}a$ in $B - \frac{1}{2}b$, seu $AB - \frac{1}{2}aB - \frac{1}{2}bA + \frac{1}{4}ab$; & quam pri-
 mum latera A & B alteris momentorum dimidiis aucta sunt, eva-
 dit $A + \frac{1}{2}a$ in $B + \frac{1}{2}b$ seu $AB + \frac{1}{2}aB + \frac{1}{2}bA + \frac{1}{4}ab$. De hoc rec-
 tangulo subducatur rectangulum prius, & manebit excessus $aB + bA$.
 Igitur laterum incrementis totis a & b generatur rectanguli incre-
 mentum $aB + bA$. *Q. E. D.*

Caf. 2. Ponatur AB semper æquale G , & contenti ABC seu
 GC momentum (per *Caf. 1.*) erit $gC + cG$, id est (si pro G & g
 scribantur AB & $aB + bA$) $aBC + bAC + cAB$. Et par est ra-
 tio contenti sub lateribus quocunque. *Q. E. D.*

Caf. 3. Ponantur latera A, B, C sibi mutuo semper æqualia; &
 ipsius A^1 , id est rectanguli AB , momentum $aB + bA$ erit $2aA$, ip-
 sius autem A^1 , id est contenti ABC , momentum $aBC + bAC$
 + cAB erit $3aA^1$. Et eodem argumento momentum dignitatis
 cujuscunque $A^{\frac{n}{m}}$ est $\frac{n}{m}aA^{\frac{n-m}{m}}$. *Q. E. D.*

Caf. 4. Unde cum $\frac{1}{A}$ in A sit 1 , momentum ipsius $\frac{1}{A}$ ductum
 in A , una cum $\frac{1}{A}$ ducto in a erit momentum ipsius 1 , id est, ni-
 hil. Proinde momentum ipsius $\frac{1}{A}$ seu ipsius A^{-1} est $-\frac{a}{A^1}$. Et ge-
 neraliter cum $\frac{1}{A^1}$ in A^1 sit 1 , momentum ipsius $\frac{1}{A^1}$ ductum in A^1

Ff

una

DE MOTU
CORPORUM. una cum $\frac{1}{A^a}$ in $na A^{-a}$ erit nihil. Et propterea momentum ip-

fius $\frac{1}{A^a}$ seu A^{-a} erit $-\frac{na}{A^{a+1}}$. *Q.E.D.*

Caf. 5. Et cum $A^{\frac{1}{2}}$ in $A^{\frac{1}{2}}$ fit A , momentum ipsius $A^{\frac{1}{2}}$ ductum in $2 A^{\frac{1}{2}}$ erit a , per *Caf. 3*: ideoque momentum ipsius $A^{\frac{1}{2}}$ erit $\frac{a}{2 A^{\frac{1}{2}}}$

sive $\frac{1}{2} a A^{-\frac{1}{2}}$. Et generaliter si ponatur $A^{\frac{m}{n}}$ æquale B , erit A^n æquale B^n , ideoque $ma A^{n-m}$ æquale $nb B^{n-1}$, & $ma A^{n-m}$ æquale $nb B^{n-1}$ seu $nb A^{n-\frac{n}{n}}$, adeoque $\frac{m}{n} a A^{\frac{m-n}{n}}$ æquale b , id est, æquale momento ipsius $A^{\frac{m}{n}}$. *Q.E.D.*

Caf. 6. Igitur Genitæ cujuscunque $A^n B^n$ momentum est momentum ipsius A^n ductum in B^n , una cum momento ipsius B^n ducto in A^n , id est $ma A^{n-1} B^n + nb B^{n-1} A^n$; idque sive dignitatum indices m & n sint integri numeri vel fracti, sive affirmativi vel negativi. Et par est ratio contenti sub pluribus dignitatibus. *Q.E.D.*

Corol. 1. Hinc in continue proportionalibus, si terminus unus datur, momenta terminorum reliquorum erunt ut iidem termini multiplicati per numerum intervallorum inter ipsos & terminum datum. Sunt A, B, C, D, E, F , continue proportionales; & si detur terminus C , momenta reliquorum terminorum erunt inter se ut $2 A, 3 B, 4 C, 5 D, 6 E, 7 F$.

Corol. 2. Et si in quatuor proportionalibus duæ mediæ dentur, momenta extremarum erunt ut eadem extremæ. Idem intelligendum est de lateribus rectanguli cujuscunque dati.

Corol. 3. Et si summa vel differentia duorum quadratorum detur, momenta laterum erunt reciproce ut latera.

Scholium.

In Literis quæ mihi cum Geometra peritissimo *G. G. Leibnitio* annis abhinc decem intercedebant, cum significarem me compotem esse methodi determinandi Maximas & Minimas, ducendi Tangentes, & similia peragendi, quæ in terminis surdis æque ac in rationalibus procederet, & literis transpositis hanc sententiam involventibus

tibus [*Data Equatione quocunque Fluentes quantitates involvente, Fluxiones invenire, & vice versa*] eandem celarem: rescripsit LIBER
SECUNDUS.
Vir Clarissimus se quoque in ejusmodi methodum incidisse, & methodum suam communicavit a mea vix abludentem præterquam in verborum & notarum formulis, & Idea generationis quantitatum. Utriusque fundamentum continetur in hoc Lemmate.

PROPOSITIO VIII. THEOREMA VI.

Si corpus in Medio uniformi, Gravitate uniformiter agente, recta ascendat vel descendat, & spatium totum descriptum distinguatur in partes æquales, inque principiis singularum partium (addendo resistantiam Medii ad vim gravitatis, quando corpus ascendit, vel subducendo ipsam quando corpus descendit) colligantur vires absolutæ; dico quod vires illæ absolutæ sunt in progressionem Geometrica.

Exponatur enim vis gravitatis per datam lineam AC ; resistantia per lineam indefinitam AK ; vis absoluta in descensu corporis per differentiam KC ; velocitas corporis per lineam AP (quæ sit media proportionalis inter AK & AC , ideoque in subduplicata ratione resistantiæ;) incrementum resistantiæ data temporis particula factum per lineolam KL , & contemporaneum velocitatis incrementum per lineolam PQ ; & centro C Asymptotis rectangulis CA , CH describatur Hyperbola quævis BNS , erectis perpendicularibus AB , KN , LO , PR , QS occurrens in B , N , O , R , S . Quoniam AK est ut AP^2 , erit hujus momentum KL ut illius momentum $2 APQ$, id est, ut AP in KC . Nam velocitatis incrementum PQ , (per motus Leg. 11.) proportionale est vi generanti KC . Componatur ratio ipsius KL , cum ratione ipsius KN , & fiet rectangulum $KL \times KN$ ut $AP \times KC \times KN$, hoc est, ob datum rectangulum $KC \times KN$, ut AP . Atqui area Hyperbolice $KNOL$ ad rectangulum $KL \times KN$ ratio ultima, ubi coeunt puncta K & L , est æqualitatis. Ergo area illa Hyperbolica evanescens est ut AP . Componitur igitur area tota Hyperbolica $ABOL$ ex particulis $KNOL$ velocitati AP semper proportionalibus, & propterea spatio velocitate ista descripto proportionalis est. Dividatur jam area illa in partes æquales $ABMI$, $IMNK$, $KNOL$, &c. & vi-

tatem illam, datam in subduplicata ratione, quam habet vis Gravitatis ad Medii resistentiam illam cognitam.

L I P P A.
S E C U N D U S

PROPOSITIO IX. THEOREMA VII.

Positis jam demonstratis, dico quod si Tangentes angulorum sectoris Circularis & sectoris Hyperbolici sumantur velocitatibus proportionales, existente radio jussu magnitudinis: erit tempus omne ascensus futuri ut sector Circuli, & tempus omne descensus præteriti ut sector Hyperbolæ.

Rectæ AC , qua vis gravitatis exponitur, perpendicularis & æqualis ducatur AD . Centro D semidiametro AD describatur tum Circuli quadrans AtE , tum Hyperbola rectangula AVZ axem habens AX , verticem principalem A & Asymptoton DC . Jungantur Dp , DP , & erit sector Circularis AtD ut tempus ascensus omnis futuri; & sector Hyperbolicus ATD ut tempus descensus omnis præteriti. Si modo sectorum Tangentes Ap , AP sint ut velocitates:

Cas. 1. Agatur enim Dvq abscindens sectoris ADt & trianguli ADp momenta, seu particulas quam minimas simul descriptas tDv & pDq . Cum particulae illæ, ob angulum communem D , sunt in duplicata ratione laterum, erit particula tDv ut qDp . Sed pD quad. est AD quad. + Ap quad. id est, AD quad. + $AD \times Ak$ seu $AD \times Ck$; & qDp est $AD \times pq$. Ergo sectoris particula tDv est ut $\frac{pq}{Ck}$, id est, ut velocitatis decrementum quam minimum pq directe & vis illa Ck quæ velocitatem diminuit inverse, atque adeo ut particula temporis decremento respondens. Et componendo fit summa particularum omnium tDv in sectore ADt , ut summa particularum temporis singulis velocitatis decrescantis Ap particulis amissis pq respondentium, usque dum velocitas illa in nihilum diminuta evanuerit; hoc est, sector totus ADt est ut ascensus totius futuri tempus. Q. E. D.

PQ generantur, ut summa particularum sectoris ATD , id est, LIBER
SECUNDUS.
tempus totum ut sector totus. $Q. E. D.$

Corol. 1. Hinc si AB æquetur quartæ parti ipsius AC , spatium quod corpus tempore quovis cadendo describit, erit ad spatium quod corpus velocitate maxima AC , eodem tempore uniformiter progrediendo describere potest, ut area $ABNK$, qua spatium cadendo descriptum exponitur, ad aream ATD qua tempus exponitur. Nam cum sit AC ad AP ut AP ad AK , erit (per *Corol. 1. Lem. 11.* hujus) LK ad PQ ut AK ad AP , hoc est, ut $2 AP$ ad AC , & inde LK ad $\frac{1}{2} PQ$ ut AP ad $(\frac{1}{2} AC \text{ vel }) AB$; est & KN ad $(AC \text{ vel }) AD$ ut AB ad CK ; itaque ex æquo LKN ad DPQ ut AP ad CK . Sed erat DPQ ad DTV ut CK ad AC . Ergo rursus ex æquo LKN est ad DTV ut AP ad AC ; hoc est, ut velocitas corporis cadentis ad velocitatem maximam quam corpus cadendo potest acquirere. Cum igitur arearum $ABNK$ & ATD momenta LKN & DTV sunt ut velocitates, erunt arearum illarum partes omnes simul genitæ ut spatia simul descripta, ideoque areæ totæ ab initio genitæ $ABNK$ & ATD ut spatia tota ab initio descensus descripta. $Q. E. D.$

Corol. 2. Idem consequitur etiam de spatio quod in ascensu describitur. Nimirum quod spatium illud omne sit ad spatium, uniformi cum velocitate AC eodem tempore descriptum, ut est area $ABnk$ ad sectorem ADt .

Corol. 3. Velocitas corporis tempore ATD cadentis est ad velocitatem, quam eodem tempore in spatio non resistente acquireret, ut triangulum APD ad sectorem Hyperbolicum ATD . Nam velocitas in Medio non resistente foret ut tempus ATD , & in Medio resistente est ut AP , id est, ut triangulum APD . Et velocitates illæ initio descensus æquantur inter se, perinde ut areæ illæ ATD , APD .

Corol. 4. Eodem argumento velocitas in ascensu est ad velocitatem, qua corpus eodem tempore in spatio non resistente omnem suum ascendendi motum amittere posset, ut triangulum ApD ad sectorem Circularem AtD ; sive ut recta Ap ad arcum At .

Corol. 5. Est igitur tempus quo corpus in Medio resistente cadendo velocitatem AP acquirit, ad tempus quo velocitatem maximam AC in spatio non resistente cadendo acquirere posset, ut sector ADT ad triangulum ADC ; & tempus, quo velocitatem Ap in Medio

DE MOTU
CORPORUM.

Medio resistente ascendendo possit amittere, ad tempus quo velocitatem eandem in spatio non resistente ascendendo posset amittere, ut arcus At ad ejus tangentem Ap .


Corol. 6. Hinc ex dato tempore datur spatium ascensu vel descensu descriptum. Nam corporis in infinitum descendens datur velocitas maxima, per *Corol. 2, & 3, Theor. vi, Lib. II*; indeque datur tempus quo corpus velocitatem illam in spatio non resistente cadendo posset acquirere. Et sumendo Sectorem ADT vel ADt ad triangulum ADC in ratione temporis dati ad tempus modo inventum; dabitur tum velocitas AP vel Ap , tum area $ABNK$ vel $ABnk$, quæ est ad sectorem ADT vel ADt ut spatium quæsitus ad spatium quod tempore dato, cum velocitate illa maxima jam ante inventa, uniformiter describi potest.

Corol. 7. Et regrediendo, ex dato ascensus vel descensus spatio $ABnk$ vel $ABNK$, dabitur tempus ADt vel ADT .

PROPOSITIO X. PROBLEMA III.

Tendat uniformis vis gravitatis directe ad planum Horizontis, sitque resistentia ut Medii densitas & quadratum velocitatis conjunctim: requiritur tum Medii densitas in locis singulis, quæ faciat ut corpus in data quavis linea curva moveatur, tum corporis velocitas & Medii resistentia in locis singulis.

Sit PQ planum illud plano Schematis perpendiculari; $PFHQ$ linea curva plano huic occurrens in punctis P & Q ; G, H, I, K loca quatuor corporis in hac curva ab F ad Q pergentis; & GB, HC, ID, KE ordinatæ quatuor parallelæ ab his punctis ad horizontem



demissæ & lineæ horizontali PQ ad puncta B, C, D, E insistentes; & sint BC, CD, DE distantie Ordinarum inter se æquales. A punctis G & H ducantur rectæ GL, HN curvam tangentes in G & H , & Ordinatis CH, DI sursum productis occurrentes in L & N , & compleatur parallelogrammum $HCDM$. Et

Et tempora quibus corpus describit arcus GH , HI , erunt in subduplicata ratione altitudinum LH , NI quas corpus temporibus illis describere posset, a tangentibus cadendo: & velocitates erunt ut longitudines descriptæ GH , HI directe & tempora inverse. Exponentur tempora per T & t , & velocitates per $\frac{GH}{T}$ & $\frac{HI}{t}$: & decrementum velocitatis tempore t factum ex-

ponetur per $\frac{GH}{T} - \frac{HI}{t}$. Hoc decrementum oritur a resistentia

corpus retardante & gravitate corpus accelerante. Gravitatis in corpore cadente & spatium NI cadendo describente, generat velocitatem qua duplum illud spatium eodem tempore describi posuisset (ut *Galileus* demonstravit) id est, velocitatem $\frac{2NI}{t}$: at

in corpore arcum HI describente, auget arcum illum sola longitudine $HI - HN$ seu $\frac{MI \times NI}{HI}$, ideoque generat tantum velocitatem $\frac{2MI \times NI}{t \times HI}$. Addatur hæc velocitas ad decrementum præ-

dictum, & habebitur decrementum velocitatis ex resistentia sola oriundum, nempe $\frac{GH}{T} - \frac{HI}{t} + \frac{2MI \times NI}{t \times HI}$. Proindeque cum

gravitas eodem tempore in corpore cadente generet velocitatem $\frac{2NI}{t}$; Resistentia erit ad Gravitatem ut $\frac{GH}{T} - \frac{HI}{t} + \frac{2MI \times NI}{t \times HI}$

ad $\frac{2NI}{t}$, sive ut $\frac{t \times GH}{T} - HI + \frac{2MI \times NI}{HI}$ ad $2NI$.

Jam pro abscissis CB , CD , CE scribantur $0, o, 2o$. Pro Ordinata CH scribatur P , & pro MI scribatur series quælibet $Qo + Roo + So' + \&c$. Et seriei termini omnes post primum, nempe $Roo + So' + \&c$. erunt NI , & Ordinatæ DI , EK , & BG erunt $P - Qo - Roo - So' - \&c$, $P - 2Qo - 4Roo - 8So' - \&c$, & $P + Qo - Roo + So' - \&c$. respective. Et quadrando differentias Ordinarum $BG - CH$ & $CH - DI$, & ad quadrata prodeuntia addendo quadrata ipsarum BC , CD , habebuntur arcuum GH , HI quadrata $oo + QQoo - 2QRo' + \&c$; & $oo + QQoo + 2QRo' + \&c$. Quorum radices $o\sqrt{1+QQ} - \frac{QRoo}{\sqrt{1+QQ}}$, &

Gg

$o\sqrt{1+}$

DE MOTU
CORPORUM

$\sqrt{1+QQ} + \frac{QR_{00}}{\sqrt{1+QQ}}$ sunt arcus GH & HI . Præterea si ab

Ordinata CH subducatur semisumma Ordinarum BG ac DI , & ab Ordinata DI subducatur semisumma Ordinarum CH & EK , manebunt arcuum GI & HK sagittæ R_{00} & $R_{00} + 3S_0$. Et hæ sunt lineolis LH & NI proportionales, adeoque in duplicata ratione temporum infinite parvorum T & t , & inde ratio $\frac{t}{T}$ est $\sqrt{\frac{R+3S_0}{R}}$ seu $\frac{R+1S_0}{R}$: & $\frac{t \times GH}{T} = HI + \frac{2MI \times NI}{HI}$,

substituendo ipsorum $\frac{t}{T}$ GH , HI , MI & NI valores jam inventos, evadit $\frac{3S_{00}}{2R} \sqrt{1+QQ}$. Et cum $2NI$ sit $2R_{00}$, Resistencia jam erit ad Gravitatem ut $\frac{3S_{00}}{2R} \sqrt{1+QQ}$ ad $2R_{00}$,

id est, ut $3S \sqrt{1+QQ}$ ad $4RR$.

Velocitas autem ea est quacum corpus de loco quovis H , secundum tangentem HN egrediens, in Parabola diametrum HC & latus rectum $\frac{HN^2}{NI}$ seu $\frac{1+QQ}{R}$ habente, deinceps in vacuo moveri potest.

Et resistentia est ut Medii densitas & quadratum velocitatis conjunctum, & propterea Medii densitas est ut resistentia directè & quadratum velocitatis inversè, id est, ut $\frac{3S \sqrt{1+QQ}}{4RR}$ directè & $\frac{1+QQ}{R}$ inversè, hoc est, ut $\frac{S}{R \sqrt{1+QQ}}$. Q. E. I.

Corol. 1. Si tangens HN producat utrinque donec occurrat Ordinatæ cuilibet AF in T : erit $\frac{HT}{AC}$ æqualis $\sqrt{1+QQ}$, adeoque in superioribus pro $\sqrt{1+QQ}$ scribi potest. Qua ratione Resistencia erit ad Gravitatem ut $3S \times HT$ ad $4RR \times AC$; Velocitas erit ut $\frac{HT}{AC \sqrt{R}}$; & Medii densitas erit ut $\frac{S \times AC}{R \times HT}$.

Corol. 2. Et hinc, si curva linea $PFHQ$ definiatur per relationem inter basem seu abscissam AC & ordinatim applicatam CH ,

CH, (ut moris est) & valor ordinatim applicatæ resolvatur in feriem convergentem: Problema per primos seriei terminos expedite solvetur, ut in exemplis sequentibus.


Exempl. 1. Sit Linea *PFHQ* Semicirculus super diametro *PQ* descriptus, & requiratur Medii densitas quæ faciat ut Projectile in hac linea moveatur.

Bifecetur diameter *PQ* in *A*, dic *AQ* *n*, *AC* *a*, *CH* *e*, & *CD* *o*: & erit *DIq* seu *AQq* — *ADq* = *nn* — *aa* — *2ao* — *oo*, seu *ee* — *2ao* — *oo*, & radice per methodum nostram extracta, fiet

$$DI = e - \frac{ao}{e} - \frac{oo}{2e} - \frac{aao}{2e^2} - \frac{ao^2}{2e^3} - \frac{a^2o^2}{2e^3} \&c. \text{ Hic scribatur } nn \text{ pro}$$

$$ee + aa, \& \text{ evadet } DI = e - \frac{ao}{e} - \frac{nnoo}{2e^3} - \frac{annoo^2}{2e^3} - \&c.$$

Hujusmodi series distinguo in terminos successivos in hunc modum. Terminum primum appello in quo quantitas infinite parva *o* non extat, secundum in quo quantitas illa est unius dimensionis, tertium in quo extat duarum, quartum in quo trium est, & sic in infinitum. Et primus terminus qui hic est *e*, denotabit semper longitudinem Ordinatæ *CH* insistentis ad initium indefinitæ quantitatis *o*; secundus terminus qui hic est $\frac{ao}{e}$, denotabit differentiam



inter *CH* & *DN*, id est, lineolam *MN* quæ abscinditur complendo parallelogrammum *HCDM*, atque adeo positionem tangentis *HN* semper determinat; ut in hoc casu capiendõ *MN* ad

HM ut est $\frac{ao}{e}$ ad *o*, seu *a* ad *e*. Terminus tertius qui hic est

$\frac{nnoo}{2e^3}$ designabit lineolam *IN* quæ jacet inter tangentem & curvam,

adeoque determinat angulum contactus *IHN* seu curvaturam quam curva linea habet in *H*. Si lineola illa *IN* finitæ est magnitudinis, designabitur per terminum tertium una cum sequentibus in infinitum. At si lineola illa minuatur in infinitum,

Gg 2

termi-

DE MOTU
CORPORUM,

termini subsequeutes evadent infinite minores tertio, ideoque negligi possunt. Terminus quartus determinat variationem curvaturæ; quintus variationem variationis, & sic deinceps. Unde obiter patet usum non contemnendum harum Serierum in Solutione Problematum quæ pendent a tangentibus & curvatura curvarum.

Conferatur jam series $e - \frac{ao}{e} - \frac{nnoo}{2e^2} - \frac{annoo^3}{2e^3} - \&c$, cum serie $P - Qo - Roo - So - \&c$. & perinde pro P, Q, R & S scribatur $e, \frac{a}{e}, \frac{nn}{2e^2}$ & $\frac{ann}{2e^3}$, & pro $\sqrt{1+QQ}$ scribatur $\sqrt{1 + \frac{aa}{ee}}$ seu $\frac{n}{e}$, & prodibit Medii densitas ut $\frac{a}{ne}$ hoc est, (ob datam n), ut $\frac{a}{e}$, seu

$\frac{AC}{CH}$, id est, ut tangentis longitudo illa HT quæ ad semidiametrum

AF ipsi PQ normaliter insistentem terminatur: & resistentia erit ad gravitatem ut $3a$ ad $2n$, id est, ut $3AC$ ad Circuli diametrum PQ : velocitas autem erit ut \sqrt{CH} . Quare si corpus iusta cum velocitate secundum lineam ipsi PQ parallelam exeat de loco F , & Medii densitas in singulis locis H sit ut longitudo tangentis HT , & resistentia etiam in loco aliquo H sit ad vim gravitatis ut $3AC$ ad PQ , corpus illud describet Circuli quadrantem FHQ . $Q. E. I.$

At si corpus idem de loco P , secundum lineam ipsi PQ perpendicularem egrederetur, & in arcu semicirculi PFQ moveri inciperet, fumenda esset AC seu a ad contrarias partes centri A , & propterea signum ejus mutandum esset & scribendum $-a$ pro $+a$. Quo pacto prodiret Medii densitas ut $-\frac{a}{e}$. Negativam autem densitatem, hoc est, quæ motus corporum accelerat, Natura non admittit: & propterea naturaliter fieri non potest, ut corpus ascendendo a P describat Circuli quadrantem PF . Ad hunc effectum deberet corpus a Medio impellente accelerari, non a resistente impediri.

Exempl. 2. Sit linea $PFHQ$ Parabola, axem habens AF horizonti PQ perpendicularem, & requiratur Medii densitas quæ faciat ut Projectile in ipsa moveatur.

Ex natura Parabolæ, rectangulum PDQ æquale est rectangulo sub ordinata DI & recta aliqua data; hoc est, si dicantur
recta

recta illa b , PCa , PQc , CHc & CDo ; rectangulum $a+o$ in $LIBRA$
 $c-a-o$ seu $ac-aa-2ao+co-oo$ æquale est rectangulo b in $SECUNDO$.

DI , adeoque DI æquale $\frac{ac-aa}{b} + \frac{c-2a}{b} o - \frac{oo}{b}$. Jam scriben-

dus effiet hujus seriei secundus terminus $\frac{c-2a}{b} o$ pro Qo , tertius

item terminus $\frac{oo}{b}$ pro Ro . Cum vero plures non sint termini, de-

bebit quarti coefficientens S evanescere, & propterea quantitas
 $\frac{S}{RV+QQ}$ cui Medii densitas proportionalis est, nihil erit. Nulla
 igitur Medii densitate movebitur Projectile in Parabola, uti olim de-

monstravit *Galileus. Q. E. I.*

Exempl. 3. Sit linea AGK Hyperbola, Asymptoton habens NX
 plano horizontali AK perpendicularem; & quærat Medii densitas
 quæ faciat ut Projectile moveatur in hac linea.

Sit MX Asymptotos altera, ordinatim applicatæ DG productæ
 occurrens in V , & ex natura Hyperbolæ, rectangulum XV in VG
 dabitur. Datur autem ratio DN ad VX , & propterea datur etiam
 rectangulum DN in VG . Sit illud bb ; & completo parallelogram-

mo $DNXZ$, dicatur BNa , $BD o$, NXc , & ratio data VZ ad
 ZX vel DN ponatur esse $\frac{m}{n}$. Et erit DN æqualis $a-o$, VG

æqualis $\frac{bb}{a-o}$, VZ æqualis $\frac{m}{n} a-o$, & GD seu $NX-VZ-VG$

æqualis $c-\frac{m}{n}a+\frac{m}{n}o-\frac{bb}{a-o}$. Resolvatur terminus $\frac{bb}{a-o}$ in seriem

convergentem $\frac{bb}{a} + \frac{bb}{aa} o + \frac{bb}{a^2} oo + \frac{bb}{a^3} o^3$ &c. & fiet GD æqua-

lis $c-\frac{m}{n}a-\frac{bb}{a} + \frac{m}{n}o-\frac{bb}{aa} o-\frac{bb}{a^2} o^2 + \frac{bb}{a^3} o^3$ &c. Hujus seriei

terminus secundus $\frac{m}{n}o-\frac{bb}{aa} o$ usurpandus est pro Qo , tertius cum

signo mutato $\frac{bb}{a^2} o^2$ pro Ro , & quartus cum signo etiam mutato $\frac{bb}{a^3} o^3$

pro So , eorumque coefficientes $\frac{m}{n}-\frac{bb}{aa}$, $\frac{bb}{a^2}$ & $\frac{bb}{a^3}$ scribendæ sunt

in Regula superiore pro Q , R & S . Quo facto prodit medii densitas
 Gg 3 ut

Asymptoton ejus in V , fuerit VG reciproce ut ipsius ZX vel DN Liber
 dignitas aliqua DN^n , cujus index est numerus n : & quæretur Me- Secundus.
 dii densitas, qua Projectile progrediatur in hac curva.

Pro BN , BD , NX scribantur A , O , C respective, sitque VZ
 ad XZ vel DN ut d ad e , & VG æqualis $\frac{bb}{DN}$, & crit DN æqua-

lis $A - O$, $VG = \frac{bb}{A - O}$, $VZ = \frac{d}{e} \overline{A - O}$, & GD seu $NX - VZ$
 $- VG$ æqualis $C - \frac{d}{e} A + \frac{d}{e} O - \frac{bb}{A - O}$. Resolvatur terminus ille

$\frac{bb}{A - O}$ in seriem infinitam $\frac{bb}{A^n} + \frac{nbb}{A^{n+1}} O + \frac{n(n+1)}{2A^{n+2}} bbO^2 +$
 $\frac{n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}} bbO^3$ &c. ac fiet GD æqualis $C - \frac{d}{e} A - \frac{bb}{A^n} +$

$\frac{d}{e} O - \frac{nbb}{A^{n+1}} O - \frac{n(n+1)}{2A^{n+2}} bbO^2 - \frac{n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}} bbO^3$ &c. Hu-
 jus seriei terminus secundus $\frac{d}{e} O - \frac{nbb}{A^{n+1}} O$ usurpandus est pro Qo ,

tertius $\frac{n(n+1)}{2A^{n+2}} bbO^2$ pro Ro , quartus $\frac{n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}} bbO^3$ pro

So . Et inde Medii densitas $\frac{S}{R\sqrt{1+QQ}}$, in loco quovis G , fit

$\frac{n+2}{3VA^n + \frac{dd}{ee} A^n - \frac{2dnbb}{eA^n} A + \frac{nbb}{A^{n+1}}}$, adeoque si in VZ capiatur VT

æqualis $n \times VG$, densitas illa est reciproce ut XT . Sunt enim A^n
 & $\frac{dd}{ee} A^n - \frac{2dnbb}{eA^n} A + \frac{nbb}{A^{n+1}}$ ipsarum XZ & ZT quadrata. Resisten-

tia autem in eodem loco G fit ad gravitatem ut $3S$ in $\frac{XT}{A}$ ad $4RR$,

id est, XT ad $\frac{2nn+2n}{n+2} VG$. Et velocitas ibidem ea ipsa est qua-

cum corpus projectum in Parabola pergeret, verticem G , diametrum
 GD & latus rectum $\frac{1+QQ}{R}$ seu $\frac{2XT quad.}{nn+n \text{ in } VG}$ habente. $Q. E. I.$

Scholium.

De Motu
CORPORUM,

Scholium.

Eadem ratione qua prodit densitas Medii ut $\frac{S \times AC}{R \times HT}$ in Corollario primo, si resistentia ponatur ut velocitatis V dignitas quælibet V^n prodibit densitas Medii ut $\frac{S}{R^{\frac{n+1}{2}}} \times \frac{AC}{HT}^{n-1}$.

Et propterea si Curva inveniri potest ea lege ut data fuerit ratio $\frac{S}{R^{\frac{n+1}{2}}}$ ad $\frac{HT}{AC}^{n-1}$, vel $\frac{S}{R^{\frac{n+1}{2}}}$ ad $\frac{1}{1+QQ}^{n-1}$: corpus movebitur in

hac Curva in uniformi Medio cum resistentia quæ sit ut velocitatis dignitas V^n . Sed redeamus ad Curvas simpliciores.

Quoniam motus non fit in Parabola nisi in Medio non resistente, in Hyperbolis vero hic descriptis fit per resistentiam perpetuam; perspicuum est quod Linea, quam projectile in Medio uniformiter resistente describit, propius accedit ad Hyperbolas hasce quam ad Parabolas. Est utique linea illa Hyperbolici generis, sed quæ circa verticem magis distat ab Asymptotis; in partibus a vertice remotioribus propius ad ipsas accedit quam pro ratione Hyperbolarum quas hic descripsi. Tanta vero non est inter has & illam differentia, quin illius loco possint hæ in rebus practicis non incommode adhiberi. Et utiles forsan futuræ sunt hæ, quam Hyperbola magis accurata & simul magis composita. Ipsæ vero in usum sic deducuntur.

Compleatur parallelogrammum $XYGT$, & recta GT tanget Hyperbolam in G , ideoque densitas Medii in G est reciproce ut tangens GT , & velocitas ibidem ut $\sqrt{\frac{GTq}{GV}}$, resistentia autem ad

vim gravitatis ut GT ad $\frac{2nn+2n}{n+2}GV$.

Proinde si corpus de loco A secundum rectam AH projectum describat Hyperbolam AGK , & AH producta occurrat Asymptoto NX in H , actaque AI eidem parallela occurrat alteri Asymptoto MX in I ; erit Medii densitas in A reciproce ut AH , & corporis velocitas ut $\sqrt{\frac{AHq}{AI}}$, ac resistentia ibidem ad gravitatem ut

AH ad $\frac{2nn+2n}{n+2}$ in AI . Unde prodeunt sequentes Regulæ.

Reg. 1.

DE MOTU
CORPORUM

Reg. 4. Quoniam densitas Medii prope verticem Hyperbolæ major est quam in loco A , ut habeatur densitas mediocris, debet ratio minimæ tangentium GT ad tangentem AH inveniri, & densitas in A augeri in ratione paulo majore quam semisummæ harum tangentium ad minimam tangentium GT .


Reg. 5. Si dantur longitudines AH , AI , & describenda sit Figura AGK : producat HN ad X , ut sit HX æqualis facto sub $n + 1$ & AI ; centroque X & Asymptotis MX , NX per punctum A describatur Hyperbola, ea lege, ut sit AI ad quamvis VG ut XV ad XI .

Reg. 6. Quo major est numerus n , eo magis accuratæ sunt hæ Hyperbolæ in ascensu corporis ab A , & minus accuratæ in ejus descensu ad K ; & contra. Hyperbola Conica mediocrem rationem tenet, estque cæteris simplicior. Igitur si Hyperbola sit hujus generis, & punctum K , ubi corpus projectum incidet in rectam quamvis AN per punctum A transcurrentem, quærat: occurrat producta AN Asymptotis MX , NX in M & N , & sumatur NK ipsi AM æqualis.

Reg. 7. Et hinc liquet methodus expedita determinandi hanc Hyperbolam ex Phenomenis. Projiciantur corpora duo similia & æqualia, eadem velocitate, in angulis diversis HAK , bAk , incidantque in planum Horizontis in K & k ; & notetur proportio AK ad Ak . Sit ea d ad e . Tum erecto cujusvis longitudinis perpendiculari AI , assume utcumque longitudinem AH vel Ab , & inde collige graphice longitudines AK , Ak , per Reg. 6. Si ratio AK ad Ak sit eadem cum ratione d ad e , longitudo AH recte assumpta fuit. Sin minus cape in recta infinita SM longitudinem SM æqualem assumptæ AH , & erige perpendicularum MN æquale ratio-

num differentiæ $\frac{AK}{Ak} - \frac{d}{e}$ ductæ in rectam quamvis datam. Simili methodo ex assumptis pluribus longitudinibus AH inveniendæ sunt plura puncta N , & per omnia agenda Curva lineæ regularis $NNXN$, secans rectam SM in X . Assumatur demum AH æqualis abscissæ SX & inde de novo inveniatur longitudo AK ; & longitudines, quæ sint ad assumptam longitudinem AI & hanc ultimam AH ut longitudo AK per experimentum cognita ad ultimo inventam longitudinem AK , erunt veræ illæ longitudines AI & AH , quas invenire oportuit. Hilce vero datis dabitur & resistentia Medii in loco A , quippe quæ sit ad vim gravitatis ut AH ad $2 AI$. Augenda est autem densitas Medii per Reg. 4. & resistentia modo inventa, si in eadem ratione augeatur, fiet accuratior.

Reg.



DE MOTU
CORPORUM,


Circulum semel describere, deinde regulam interminatam CH ita applicare ad punctum C , ut ejus pars FH , Circulo & rectæ FK interjecta, æqualis sit ejus parti CE inter punctum C & rectam AK sitæ.

Quæ de Hyperbolis dicta sunt facile applicantur ad Parabolas. Nam si $XAGK$ Parabolam designet quam recta XV tangat in vertice X , sintque ordinatim applicatæ IA , VG ut quælibet abscissarum XI , XV dignitates XI^2 , XV^2 ; agantur XT , GT , AH , quarum XT parallela sit VG , & GT , AH Parabolam tangent in G & A : & corpus de loco quovis A , secundum rectam AH productam, juxta cum velocitate projectum, describet hanc Parabolam, si modo densitas Medii, in locis singulis G , sit reciproce ut tangens GT .

Velocitas autem in G ea erit quacum Projectile pergeret, in spatio non resiliente, in Parabola Conica verticem G , diametrum VG deorsum productam, & latus rectum $\frac{2 GT q.}{nn - n \times VG}$ habente.

Et resistentia in G erit ad vim gravitatis ut GT ad $\frac{2 nn - 2n}{n-2} VG$.

Unde si NAK lineam horizontalem designet, & manente tum densitæ Medii in A , tum velocitate quacum corpus projicitur, mutetur utcumque angulus NAH ; manebunt longitudines AH , AI , HX , & inde datur Parabolæ vertex X , & positio rectæ XI , & sumendo VG ad IA ut XV ad XI , dantur omnia Parabolæ puncta G , per quæ Projectile transibit.



S E C T I O III.


 LIBER
SECUNDUS

De Motu Corporum quibus resistitur partim in ratione velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata.

PROPOSITIO XI. THEOREMA VIII.

Si Corpori resistitur partim in ratione velocitatis, partim in velocitatis ratione duplicata, & idem sola vi insita in Medio simili movetur, sumantur autem tempora in progressione Arithmetica: quantitates velocitatum reciproce proportionales, datâ quadam quantitate auctâ, erunt in progressione Geometrica.

Centro C , Asymptotis rectangulis $CADd$ & CH , describatur Hyperbola $BEeS$, & Asymptoto CH parallelæ sint AB , DE , de . In Asymptoto CD dentur puncta A , G : Et si tempus exponatur per aream Hyperbolicam $ABED$ uniformiter crescentem; dico quod velocitas exponi potest per longitudinem DF , cujus reciproca GD una cum data CG componat longitudinem CD in progressione Geometrica crescentem.



Sit enim areola $DEed$ datum temporis incrementum quam minimum, & erit Dd reciproce ut DE , adeoque directe ut

CD . Ipsi autem $\frac{1}{GD}$ decrementum, quod (per hujus Lem. 11.)

est $\frac{Dd}{GDq}$ erit ut $\frac{CD}{GDq}$ seu $\frac{CG+GD}{GDq}$, id est, ut $\frac{1}{GD} + \frac{CG}{GDq}$.

Igitur tempore $ABED$ per additionem datarum particularum $EDde$

uniformiter crescente, decrescit $\frac{1}{GD}$ in eadem ratione cum velocitate. Nam decrementum velocitatis est ut resistentia, hoc est (per Hypothesin) ut summa duarum quantitatum, quarum una est ut

Hh 3

velo-

decrementum est ipsius GD , erit reciproce ut ED , adeoque directe ut CD , hoc est, ut summa ejusdem GD & longitudinis datæ CG . Sed velocitatis decrementum, tempore sibi reciproce proportionali, quo data spatii particula $DdeE$ describitur, est ut resistentia & tempus conjunctim, id est, directe ut summa duarum quantitarum, quarum una est ut velocitas, altera ut velocitatis quadratum, & inverse ut velocitas; adeoque directe ut summa duarum quantitarum, quarum una datur, altera est ut velocitas. Igitur decrementum tam velocitatis quam lineæ GD , est ut quantitas data & quantitas decrescens conjunctim, & propter analogia decrementa, analogæ semper erunt quantitates decrescentes: nimirum velocitas & lineæ GD . Q. E. D.

Corol. 1. Igitur si velocitas exponatur per longitudinem GD , spatium descriptum erit ut area Hyperbolica $DES R$.

Corol. 2. Et si utcumque assumatur punctum R , inveniatur punctum G , capiendo GR ad GD , ut est velocitas sub initio ad velocitatem post spatium quodvis $RSED$ descriptum. Invento autem puncto G , datur spatium ex data velocitate, & contra.

Corol. 3. Unde cum, per Prop. XI, detur velocitas ex dato tempore, & per hanc Propositionem detur spatium ex data velocitate; dabitur spatium ex dato tempore, & contra.

PROPOSITIO XIII. THEOREMA X.

Posito quod Corpus ab uniformi gravitate deorsum attractum recta ascendit vel descendit, & quod eidem resistitur partim in ratione velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata: dico quod si Circuli & Hyperbolæ diametris parallele rectæ per conjugatarum diametrorum terminos ducantur, & velocitates sint ut segmenta quedam parallelarum a dato puncto ducta, Tempora erunt ut arearum Sectores, rectis a centro ad segmentorum terminos ductis abscissi: & contra.

Cas. 1. Ponamus primo quod corpus ascendit, centroque D & semidiametro quovis DB describatur Circuli quadrans $BETF$, & per semidiametri DB terminum B agatur infinita BAP , semidiametro DF parallela. In ea detur punctum A , & capiatur segmentum AP velocitati proportionale. Et cum resistentiæ pars aliqua sit

ut

DE MOTU
CORPORUM, pori atque adeo sectori huic proportionalis est; in Medio resistentia est ut triangulum; & in Medio utroque, ubi quam minima est, accedit ad rationem æqualitatis, pro more sectoris & trianguli.

PROPOSITIO XIV. THEOREMA XI.

Isdem positis, dico quod spatium ascensu vel descensu descriptum, est ut differentia areae per quam tempus exponitur, & areae cujusdam alterius quæ augetur vel diminuitur in progressionem Arithmetica; si vires ex resistentia & gravitate compositæ sumantur in progressionem Geometrica.

Capiatur AC (in Fig. tribus ultimis,) gravitati, & AK resistentiæ proportionalis. Capiantur autem ad eandem partes puncti A si corpus descendit, aliter ad contrarias. Erigatur Ab quæ sit ad DB ut DBq ad $4BAC$: & area $AbNK$ augebitur vel diminuetur in progressionem Arithmetica, dum vires CK in progressionem Geometrica sumuntur. Dico igitur quod distantia corporis ab ejus altitudine maxima sit ut excessus areae $AbNK$ supra aream DET .

Nam cum AK sit ut resistentia, id est, ut $APq + 2BAP$; assumatur data quævis quantitas Z , & ponatur AK æqualis $\frac{APq + 2BAP}{Z}$; & (per hujus Lemma 11.) erit ipsius AK mo-

mentum KL æquale $\frac{2APQ + 2BA \times P}{Z}$ seu $\frac{2BPQ}{Z}$, &

areae $AbNK$ momentum $KLON$ æquale $\frac{2BPQ \times LO}{Z}$ seu

$\frac{BPQ \times BD \text{ cub.}}{2Z \times CK \times AB}$.

Cas. 1. Jam si corpus ascendit, sitque gravitas ut $ABq + BDq$ existente BET Circulo, (in Fig. Cas. 1. Prop. XIII.) linea AC , quæ gravitati proportionalis est, erit $\frac{ABq + BDq}{Z}$, & DPq seu $APq + 2BAP + ABq + BDq$ erit $AK \times Z + AC \times Z$ seu $CK \times Z$; ideoque area DTV erit ad aream DPQ ut DTq vel DBq ad $CK \times Z$.

Cas.

Caf. 2. Sin corpus ascendit, & gravitas fit ut $ABq - BDq$, linea AC (Fig. Caf. 2. Prop. XIII) erit $\frac{ABq - BDq}{Z}$, & DTq erit

ad DPq ut DFq seu DBq ad $BPq - BDq$ seu $APq + 2BAP + ABq - BDq$, id est, ad $AK \times Z + AC \times Z$ seu $CK \times Z$. Ideoque area DTV erit ad aream DPQ ut DBq ad $CK \times Z$.

Caf. 3. Et eodem argumento, si corpus descendit, & propterea gravitas fit ut $BDq - ABq$, & linea AC (Fig. Caf. 3. Prop. præced.) æquetur $\frac{BDq - ABq}{Z}$, erit area DTV ad aream DPQ ut DBq ad $CK \times Z$: ut supra.

Cum igitur area illæ semper sint in hac ratione, si pro area DTV , qua momentum temporis sibi met ipsi semper æquale exponitur, scribatur determinatum quodvis rectangulum, puta $BD \times m$, erit area DPQ , id est, $\frac{1}{2} BD \times PQ$ ad $BD \times m$, ut $CK \times Z$ ad BDq . Atque inde fit $PQ \times BD$ cub. æquale $2BD \times m \times CK \times Z$, & area $AbNK$ momentum $KLON$ superius inventum, fit $\frac{BP \times BD \times m}{AB}$. Auferatur area DET mo-

mentum DTV seu $BD \times m$, & restabit $\frac{AP \times BD \times m}{AB}$. Est igitur differentia momentorum, id est, momentum differentie arearum, æqualis $\frac{AP \times BD \times m}{AB}$; & propterea (ob datum $\frac{BD \times m}{AB}$)

ut velocitas AP , id est, ut momentum spatii quod corpus ascendendo vel descendendo describit. Ideoque differentia arearum & spatium illud, proportionalibus momentis crescentia vel decrefcentia & simul incipientia vel simul evanescentia, sunt proportionalia. $Q. E. D.$

Corol. Igitur si longitudo aliqua V sumatur in ea ratione ad duplum longitudinis M , quæ oritur applicando aream DET ad BD , quam habet linea DA ad lineam DE ; spatium quod corpus ascensu vel descensu toto in Medio resistente describit, erit ad spatium quod in Medio non resistente eodem tempore describere posset, ut arearum illarum differentia ad $\frac{BD \times V^2}{4AB}$, ideoque ex dato tem-

pore datur. Nam spatium in Medio non resistente est in duplicata ratione temporis, sive ut V^2 , & ob datas BD & AB , ut

DE MOTU
CORPORUM,

$\frac{BD \times V^2}{4AB}$. Momentum hujus areae five huic æqualis $\frac{DAq \times BD \times M^2}{DEq \times AB}$ est ad momentum differentiae arearum DET & $AbNK$, ut $\frac{DAq \times BD \times M \times m}{DEq \times AB}$ ad $\frac{AP \times BD \times m}{AB}$, hoc est, ut $\frac{DAq \times BD \times M}{DEq}$

ad $BD \times AP$, five ut $\frac{DAq}{DEq}$ in DET ad DAP ; adeoque ubi areae DET & DAP quam minimæ sunt, in ratione æqualitatis.

Æqualis igitur est area quam minima $\frac{BD \times V^2}{4AB}$ differentiae quam minimæ arearum DET & $AbNK$. Unde cum spatia in Medio utroque, in principio descensus vel fine ascensus simul descripta accedunt ad æqualitatem, adeoque tunc sunt ad invicem ut area $\frac{BD \times V^2}{4AB}$ & arearum DET & $AbNK$ differentia; ob eorum ana-


loga incrementa necesse est ut in æqualibus quibuscunque temporibus sint ad invicem ut area illa $\frac{BD \times V^2}{4AB}$ & arearum DET & $AbNK$ differentia. Q. E. D.

SECTIO

PROPOSITIO XV. THEOREMA XII.

Si Medii densitas in locis singulis sit reciproce ut distantia locorum a centro immobili, sitque vis centripeta in duplicata ratione densitatis: dico quod corpus gyrari potest in Spirali, quæ radios omnes a centro illo ductos intersecat in angulo dato.

Ponantur quæ in superiore Lemmate, & producat SQ ad V , ut sit SV æqualis SP . Tempore quovis, in medio resistente, describat corpus arcum quam minimum PQ , & tempore duplo arcum quam minimum PR ; & decrementsa horum arcuum ex resistentia oriunda, sive defectus ab arcubus qui in Medio non resistente iisdem temporibus describerentur, erunt ad invicem ut quadrata temporum in quibus generantur: Est itaque decrementum arcus PQ pars quarta decrementi arcus PR . Unde etiam, si area PSQ , æqualis capiatur area QSR , erit decrementum arcus PQ , æquale dimidio lineolæ Rr ; adeoque vis resistentiæ & vis centripeta sunt ad invicem ut lineolæ Rr & TQ quas simul generant.



Quoniam vis centripeta, qua corpus urgetur in P , est reciproce ut SPq , & (per Lem. x. Lib. 1.) lineola TQ , quæ vi illa generatur, est in ratione composita ex ratione hujus vis & ratione duplicata temporis quo arcus PQ describitur, (Nam resistentiam in hoc casu, ut infinite minorem quam vis centripeta, negligo) erit $TQ \propto SPq$ id est (per Lemma novissimum) $PQq \times SP$, in ratione duplicata temporis, adeoque tempus est ut $PQ \times \sqrt{SP}$; & corporis velocitas, qua arcus PQ illo tempore describitur, ut $\frac{PQ}{PQ \times \sqrt{SP}}$, seu

$\frac{1}{\sqrt{SP}}$, hoc est, in subduplicata ratione ipsius SP reciproce. Et simili argumento, velocitas qua arcus QR describitur, est in subduplicata

duplicata ratione ipsius SQ reciproce. Sunt autem arcus illi PQ & QR ut velocitates descriptrices ad invicem, id est, in subduplicata ratione SQ ad SP , sive ut SQ ad $\sqrt{SP \times SQ}$; & ob æquales angulos SPQ , SQR & æquales areas PSQ , QSR , est arcus PQ ad arcum QR ut SQ ad SP . Sumantur proportionalium consequentium differentiæ, & fiet arcus PQ ad arcum Rr ut SQ ad $SP - \sqrt{SP \times SQ}$, seu $\frac{1}{2}VQ$; nam punctis P & Q coeuntibus, ratio ultima $SP - \sqrt{SP \times SQ}$ ad $\frac{1}{2}VQ$ fit æqualitatis. Quoniam decrementum arcus PQ , ex resistentia oriundum, sive hujus duplum Rr , est ut resistentia & quadratum temporis conjunctim; erit resistentia ut

$\frac{Rr}{PQ \times SQ \times SP}$. Erat autem PQ ad Rr , ut SQ ad $\frac{1}{2}VQ$, & inde $\frac{Rr}{PQ \times SQ \times SP}$ fit ut $\frac{\frac{1}{2}VQ}{PQ \times SP \times SQ}$ sive

ut $\frac{\frac{1}{2}OS}{OP \times SP \times SQ}$. Namque punctis P & Q coeuntibus, SP & SQ coincidunt, & angulus PSQ fit rectus; & ob similia triangula PSQ , PSO , fit PQ ad $\frac{1}{2}VQ$ ut OP ad $\frac{1}{2}OS$. Est igitur

$\frac{OS}{OP \times SP \times SQ}$ ut resistentia, id est, in ratione densitatis Medii in P & ratione duplicata velocitatis conjunctim. Auferatur duplicata ratio velocitatis, nempe ratio $\frac{1}{SP}$, & manebit Medii densitas in P ut

$\frac{OS}{OP \times SP}$. Detur Spiralis, & ob datam rationem OS ad OP , densitas Medii in P erit ut $\frac{1}{SP}$. In Medio igitur, cujus densitas est reciproce ut distantia a centro SP , corpus gyri potest in hac Spirali. $Q. E. D.$

Corol. 1. Velocitas in loco quovis P ea semper est quacum corpus in Medio non resistente gyri potest in Circulo, ad eandem a centro distantiam SP ,

Corol. 2. Medii densitas, si datur distantia SP , est ut $\frac{OS}{OP}$ sin distantia illa non datur, ut $\frac{OS}{OP \times SP}$. Et inde Spiralis ad quamlibet Medii densitatem aptari potest.

Corol. 3. Vis resistentiæ in loco quovis P , est ad vim centripetam

De Motu
Corporum,

tam in eodem loco ut $\frac{1}{2} OS$ ad OP . Nam vires illæ sunt ad invicem ut Rr & TQ sive ut $\frac{\frac{1}{2} VQ \times PQ}{SQ}$ & $\frac{\frac{1}{2} PQq}{SP}$ hoc est, ut $\frac{1}{2} VQ \times PQ$, seu $\frac{1}{2} OS \times OP$. Data igitur Spirali datur proportio resistentiæ ad vim centripetam, & viceversa ex data illa proportionem datur Spiralis.


Corol. 4. Corpus itaque gyron nequit in hac Spirali, nisi ubi vis resistentiæ minor est quam dimidium vis centripetæ. Fiat resistentia æqualis dimidio vis centripetæ & Spiralis conveniet cum linea recta PS , inque hac recta corpus descendet ad centrum, ea cum velocitate quæ sit ad velocitatem, qua probavimus in superioribus in casu Parabolæ (Theor. x. Lib. 1.) descensum in Medio non resistentem fieri, in subduplicata ratione unitatis ad numerum binarium. Et tempora descensus hic erunt reciproce ut velocitates, atque adeo dantur.

Corol. 5. Ex quoniam in æqualibus a centro distantis velocitas eadem est in Spirali PQR atque in recta SP , & longitudo Spiralis ad longitudinem rectæ PS est in data ratione, nempe in ratione OP ad OS ; tempus descensus in Spirali erit ad tempus descensus in recta SP in eadem illa data ratione, proindeque datur.

Corol. 6. Si centro S intervallis duobus quibuscunque datis describantur duo Circuli; & manentibus hisce Circulis, mutetur utcumque angulus quem Spiralis continet cum radio PS ; numerus revolutionum quas corpus intra Circulorum circumferentias, pergendo in Spirali a circumferentia ad circumferentiam, complere potest, est ut $\frac{PS}{OS}$, sive ut Tangens anguli illius quem Spiralis continet cum radio PS ; tempus vero revolutionum earundem ut $\frac{OP}{OS}$, id est, ut Secans anguli ejusdem, vel etiam reciproce ut Medii densitas.

Corol. 7. Si corpus, in Medio cujus densitas est reciproce ut distantia locorum a centro, revolutionem in curva quacunque AB circa centrum illud fecerit, & Radium primum AS in eodem angulo secuerit in B quo prius in A , idque cum velocitate quæ fuerit ad velocitatem suam primam in A reciproce in subduplicata ratione distantiarum a centro (id est, ut AS ad mediam proportionalem inter AS & BS) corpus illud perget innumeras confimiles revolutiones BFC , CGD &c. facere, & interfectionibus

tionibus distinguet Radium AS in partes AS , BS , CS , DS , &c. continue proportionales. Revolutionum vero tempora erunt ut



perimetri Orbitalium AEB , BFC , CGD , &c. directe, & velocitates in principiis A , B , C , inverse; id est, ut AS^3 , BS^3 , CS^3 . Atque tempus totum, quo corpus perveniet ad centrum, erit ad tempus revolutionis primæ, ut summa omnium continue proportionalium AS^3 , BS^3 , CS^3 , pergentium in infinitum, ad terminum primum AS^3 , id est, ut terminus ille primus AS^3 ad differentiam duorum primorum $AS^3 - BS^3$, sive ut $\frac{1}{2} AS$ ad AB quam proximè. Unde tempus illud totum expedite invenitur.

Corol. 8. Ex his etiam præter propter colligere licet motus corporum in Mediis, quorum densitas aut uniformis est, aut aliam quamcunque legem assignatam observat. Centro S , intervallis continue proportionalibus SA , SB , SC , &c. describe Circulos quoscunque, & statue tempus revolutionum inter perimetros duorum quorumvis ex his Circulis, in Medio de quo egimus, esse ad tempus revolutionum inter eosdem in Medio proposito, ut Medii propositi densitas mediocris inter hos Circulos ad Medii, de quo egimus, densitatem mediocrem inter eosdem quam proximè: Sed & in eadem quoque ratione esse Secantem anguli quo Spiralis præfinita, in Medio de quo egimus, secat radium AS , ad Secantem anguli

K k

quo

DE MOTU
CORPORUM,

quo Spiralis nova fecat radium eundem in Medio proposito: Atque etiam ut sunt eorundem angulorum Tangentes ita esse numeros revolutionum omnium inter Circulos eosdem duos quam proxime. Si hæc fiant passim inter Circulos binos, continuabitur motus per Circulos omnes. Atque hoc pacto haud difficulter imaginari possumus quibus modis ac temporibus corpora in Medio quocunque regulari gyrari debebunt.

Corol. 9. Et quamvis motus excentrici in Spiralibus ad formam Ovalium accedentibus peragantur; tamen concipiendo Spiralium illarum singulas revolutiones iisdem ab invicem intervallis distare, iisdemque gradibus ad centrum accedere cum Spirali superius descripta, intelligemus etiam quomodo motus corporum in huiusmodi Spiralibus peragantur.

PROPOSITIO XVI. THEOREMA XIII.

Si Medii densitas in locis singulis sit reciproce ut distantia locorum a centro immobili, sitque vis centripeta reciproce ut dignitas qualibet ejusdem distantiae: dico quod corpus gyrari potest in Spirali quæ radios omnes a centro illo ductos interfecat in angulo dato.

Demonstratur eadem methodo cum Propositione superiore. Nam si vis centripeta in P sit reciproce ut distantia SP dignitas qualibet $S P^{n+1}$ cujus index est $n+1$; colligetur ut supra, quod tempus quo corpus describit arcum quemvis PQ erit ut

$PQ \times SP^{1/2}$, & resistentia in P ut $\frac{Rr}{PQ \times SP^{n+1}}$ sive ut $\frac{1 - \frac{1}{2}n \times VQ}{PQ \times SP^{n+1} \times SQ}$

adeoque ut $\frac{1 - \frac{1}{2}n \times OS}{OP \times SP^{n+1}}$, hoc est, ob datum $\frac{1 - \frac{1}{2}n \times OS}{OP}$, reciproce ut SP^{n+1} . Et propterea, cum velocitas sit reciproce ut $SP^{1/2}$, densitas in P erit reciproce ut SP .

Corol. 1. Resistentia est ad vim centripetam, ut $1 - \frac{1}{2}n \times OS$ ad OP .

Corol. 2. Si vis centripeta sit reciproce ut $SP^{cub.}$, erit $1 - \frac{1}{2}n = 0$; adeoque resistentia & densitas Medii nulla erit, ut in Propositione nona Libri primi.

Corol. 3. Si vis centripeta sit reciproce ut dignitas aliqua radii SP cujus index est major numero 3, resistentia affirmativa in negativam mutabitur.

Scho-

*Scholium.*LIBER
SECUNDUS.

Cæterum hæc Propositio & superiores, quæ ad Media inæqualiter densa spectant, intelligendæ sunt de motu corporum adeo parvorum, ut Medii ex uno corporis latere major densitas quam ex altero non considerata veniat. Resistentiam quoque cæteris paribus densitati proportionalem esse suppono. Unde in Mediis quorum vis resistendi non est ut densitas, debet densitas eo usque augeri vel diminui, ut resistentiæ vel tollatur excessus vel defectus suppleatur.

PROPOSITIO XVII. PROBLEMA IV.

Invenire vim centripetam & Medii resistentiam qua corpus in data Spirali, data velocitatis Lege, revolvitur potest.

Sit Spiralis illa PQR . Ex velocitate qua corpus percurrit arcum quam minimum PQ dabitur tempus, & ex altitudine TQ , quæ est ut vis centripeta & quadratum temporis, dabitur vis. Deinde ex arearum, æqualibus temporum particulis confectarum PSQ & QSR , differentia RSr , dabitur corporis retardatio, & ex retardatione inveniatur resistentia ac densitas Medii.

PROPOSITIO XVIII. PROBLEMA V.

Data Lege vis centripetæ, invenire Medii densitatem in locis singulis, qua corpus datam Spiralem describet.

Ex vi centripeta invenienda est velocitas in locis singulis, deinde ex velocitatis retardatione quærenda Medii densitas: ut in Propositione superiore.

Methodum vero tractandi hæc Problemata aperui in hujus Propositione decima, & Lemmate secundo; & Lectorem in hujusmodi perplexis disquisitionibus diutius detinere nolo. Addenda jam sunt aliqua de viribus corporum ad progrediendum, deque densitate & resistentia Mediorum, in quibus motus hætenus expositi & his affines peraguntur.

S E C T I O V.

*De Densitate & Compressione Fluidorum, deque
Hydrostatica.*


Definitio Fluidi.

Fluidum est corpus omne cujus partes cedunt vi cuicunque illatae, & cedendo facile moventur inter se.

PROPOSITIO XIX. THEOREMA XIV.

Fluidi homogenei & immoti, quod in vase quocunque immoto clauditur & undique comprimitur, partes omnes (seposita condensationis, gravitatis & virium omnium centripetarum consideratione) equaliter premuntur undique, & absque omni motu a pressione illa orto permanent in locis suis.

Cas. 1. In vase Sphærico *ABC* claudatur & uniformiter comprimatur fluidum undique: dico quod ejusdem pars nulla ex illa pressione movebitur. Nam si pars aliqua *D* moveatur, necesse est ut omnes hujusmodi partes, ad eandem a centro distantiam undique consistentes, simili motu simul moveantur; atque hoc adeo quia similis & æqualis est omnium pressio, & motus omnis exclusus supponitur, nisi qui a pressione illa oriatur. Atqui non possunt omnes ad centrum propius accedere, nisi fluidum ad centrum condensetur; contra Hypothesin. Non possunt longius ab eo recedere, nisi fluidum ad circumferentiam condensetur; etiam contra Hypothesin. Non possunt servata sua a centro distantia moveri in plagam quamcunque, quia pari ratione movebuntur in plagam contrariam; in plagas autem contrarias non potest pars



pars eadem, eodem tempore, moveri. Ergo fluidi pars nulla de loco suo movebitur. *Q. E. D.* LIBER
SECUNDUS

Caf. 2. Dico jam quod fluidi hujus partes omnes sphaericæ æqualiter premuntur undique: sit enim EF pars sphaerica fluidi, & si hæc undique non premitur æqualiter, augeatur pressio minor; usque dum ipsa undique prematur æqualiter; & partes ejus, per Casum primum, permanebunt in locis suis. Sed ante auctam pressionem permanebunt in locis suis, per Casum eundem primum, & additione pressionis novæ movebuntur de locis suis, per definitionem Fluidi. Quæ duo repugnant. Ergo falso dicebatur quod Sphæra EF non undique premebatur æqualiter. *Q. E. D.*

Caf. 3. Dico præterea quod diversarum partium sphaerarum æqualis sit pressio. Nam partes sphaericæ contiguæ se mutuo premunt æqualiter in puncto contactus, per motus Legem *III*. Sed & per Casum secundum, undique premuntur eadem vi. Partes igitur duæ quævis sphaericæ non contiguæ, quia pars sphaerica intermedia tangere potest utramque, prementur eadem vi. *Q. E. D.*

Caf. 4. Dico jam quod fluidi partes omnes ubique premuntur æqualiter. Nam partes duæ quævis tangi possunt a paribus Sphaericis in punctis quibuscunque; & ibi partes illas Sphaericas æqualiter premunt, per Casum 3. & vicissim ab illis æqualiter premuntur, per Motus Legem tertiam. *Q. E. D.*

Caf. 5. Cum igitur fluidi pars quælibet GHI in fluido reliquo tanquam in vase claudatur, & undique prematur æqualiter, partes autem ejus se mutuo æqualiter premant & quiescant inter se; manifestum est quod Fluidi cujuscunque GHI , quod undique premitur æqualiter, partes omnes se mutuo premunt æqualiter, & quiescunt inter se. *Q. E. D.*

Caf. 6. Igitur si Fluidum illud in vase non rigido claudatur, & undique non prematur æqualiter, cedet idem pressioni fortiori, per Definitionem Fluiditatis.

Caf. 7. Ideoque in vase rigido Fluidum non sustinebit pressionem fortiorem ex uno latere quam ex alio, sed eidem cedet, idque in momento temporis, quia latus vasis rigidum non persequitur liquorem cedentem. Cedendo autem urgebit latus oppositum, & sic pressio undique ad æqualitatem verget. Et quoniam Fluidum, quam primum a parte magis pressa recedere conatur, inhibetur per resistentiam vasis ad latus oppositum; reducetur pressio undique ad æqualitatem, in momento temporis, absque motu locali: & subinde partes fluidi, per Casum quintum, se mutuo prement æqualiter, & quiescent inter se. *Q. E. D.*

Kk 3

Corol.


DE MOTU
CORPORUM

Corol. Unde nec motus partium fluidi inter se, per pressionem fluido ubivis in externa superficie illatam, mutari possunt, nisi quatenus aut figura superficiei alicubi mutatur, aut omnes fluidi partes intensius vel remissius sese premendo difficilior vel facilius labuntur inter se.

PROPOSITIO XX. THEOREMA XV.

Si Fluidi Sphærici, & in æqualibus a centro distantis homogenei, fundo Sphærico concentrico incumbentis partes singule versus centrum totius gravitent; sustinet fundum pondus Cylindri, cujus basis æqualis est superficiei fundi, & altitudo eadem quæ Fluidi incumbentis.

Sit DHM superficies fundi, & AEI superficies superior fluidi. Superficiebus sphæricis innumeris BFK , CGL distinguatur fluidum in Orbis concentricos æqualiter crassos; & concipe vim gravitatis agere solummodo in superficiem superiorem Orbis cujusque, & æquales esse actiones in æquales partes superficierum omnium. Premitur ergo superficies suprema AEI vi simplici gravitatis propriæ, quæ & omnes Orbis supremi partes & superficies secunda BFK (per Prop. xix.) pro mensura sua æqualiter premuntur. Premitur præterea superficies secunda BFK vi propriæ gravitatis, quæ addita vi priori facit pressionem duplam. Hac pressione, pro mensura sua, & insuper vi propriæ gravitatis, id est pressione tripla, urgetur superficies tertia CGL . Et similiter pressione quadrupla urgetur superficies quarta, quintupla quinta, & sic deinceps. Pressio igitur qua superficies unaquæque urgetur, non est ut quantitas solida fluidi incumbentis, sed ut numerus Orbium ad usque summitatem fluidi; & æquatur gravitati Orbis infimi multiplicatæ per numerum Orbium: hoc est, gravitati solidi cujus ultima ratio ad Cylindrum præfinitum (si modo Orbium augeatur numerus & minuatur crassitudo in infinitum, sic ut actio gravitatis a superficie infima ad supremam continua reddatur) fiet ratio æqualitatis. Sustinet ergo superficies infima pondus Cylindri præfinitum.



præfiniti. *Q. E. D.* Et simili argumentatione patet Propositio, *LIBER*
ubi gravitas decrefcit in ratione quavis assignata diftantiæ a centro, *SECUNDUS.*
ut & ubi Fluidum furfum rarius eft, deorfum denfius. *Q. E. D.*

Corol. 1. Igitur fundum non urgetur a toto fluidi incumbētis pondere, fed eam folummodo ponderis partem fuftinet quæ in propofitione defcribitur; pondere reliquo a fluidi figura fornicata fuftentato.

Corol. 2. In æqualibus autem a centro diftantiis eadem femper eft preffionis quantitas, five superficies preffa fit Horizonti parallela vel perpendicularis vel obliqua; five fluidum, a superficie preffa furfum continuatum, furgat perpendiculariter fecundum lineam rectam, vel ferpat oblique per tortas cavitates & canales, casque regulares vel maxime irregulares, amplas vel anguftiffimas. Hifce circumftantiis preffionem nil mutari colligitur, applicando demonftrationem Theorematis hujus ad Cafus fingulos Fluidorum.

Corol. 3. Eadem Demonftratione colligitur etiam (per Prop. xix.) quod fluidi gravis partes nullum, ex preffione ponderis incumbētis, acquirunt motum inter fe, fi modo excludatur motus qui ex condensatione oritur.

Corol. 4. Et propterea fi aliud ejufdem gravitatis specificæ corpus, quod fit condensationis expers, fubmergatur in hoc fluido, id ex preffione ponderis incumbētis nullum acquirere motum: non defcendet, non afcendet, non cogetur figuram fuam mutare. Si fphæricum eft manebit fphæricum, non obftante preffione; fi quadratum eft manebit quadratum: idque five molle fit, five fluidiffimum; five fluido libere innatet, five fundo incumbat. Habet enim fluidi pars quælibet interna rationem corporis fubmerfi, & par eft ratio omnium ejufdem magnitudinis, figuræ & gravitatis specificæ fubmerforum corporum. Si corpus fubmerfum fervato pondere liquefceret & indueret formam fluidi; hoc, fi prius afcenderet vel defcenderet vel ex preffione figuram novam indueret, etiam nunc afcenderet vel defcenderet vel figuram novam induere cogeretur: id adeo quia gravitas ejus cæteræque motuum cauſæ permanent. Atqui, per Caf. 5. Prop. xix. jam quiefceret & figuram retineret. Ergo & prius.

Corol. 5. Proinde corpus quod specificè gravius eft quam Fluidum fibi contiguum fubfidebit, & quod specificè levius eft afcendet, motumque & figuræ mutationem confequetur, quantum exceffus ille vel defectus gravitatis efficere poſſit. Namque exceffus ille vel defectus rationem habet impulfus, quo corpus alias in æquili-

De Motu
Corporum

æquilibrio cum fluidi partibus constitutum, urgetur; & comparari potest cum excessu vel defectu ponderis in lance alterutra libræ.

Corol. 6. Corporum igitur in fluidis constitutorum duplex est Gravititas: altera vera & absoluta, altera apparens, vulgaris & comparativa. Gravititas absoluta est vis tota qua corpus deorsum tendit: relativa & vulgaris est excessus gravitatis quo corpus magis tendit deorsum quam fluidum ambiens. Prioris generis Gravititate partes fluidorum & corporum omnium gravitant in locis suis: ideoque conjunctis ponderibus componunt pondus totius. Nam totum omne grave est, ut in vasis liquorum plenis experiri licet; & pondus totius æquale est ponderibus omnium partium, ideoque ex iisdem componitur. Alterius generis Gravititate corpora non gravitant in locis suis, id est, inter se collata non prægravant, sed mutuos ad descendendum conatus impediencia permanent in locis suis, perinde ac si gravia non essent. Quæ in Aere sunt & non prægravant, vulgus gravia non judicat. Quæ prægravant vulgus gravia judicat, quatenus ab Aeris pondere non sustinentur. Pondera vulgi nihil aliud sunt quam excessus verorum ponderum supra pondus Aeris. Unde & vulgo dicuntur levia, quæ sunt minus gravia, Aerique prægravanti cedendo superiora petunt. Comparative levia sunt, non vere, quia descendunt in vacuo. Sic & in Aqua corpora, quæ ob majorem vel minorem gravitatem descendunt vel ascendunt, sunt comparative & apparenter gravia vel levia, & eorum gravitas vel levitas comparativa & apparens est excessus vel defectus quo vera eorum gravitas vel superat gravitatem aquæ vel ab ea superatur. Quæ vero nec prægravando descendunt, nec prægravanti cedendo ascendunt, etiam si veris suis ponderibus adaugeant pondus totius, comparative tamen & in sensu vulgi non gravitant in aqua. Nam similis est horum Casuum Demonstratio.

Corol. 7. Quæ de gravitate demonstrantur, obtinent in aliis quibuscunque viribus centripetis.

Corol. 8. Proinde si Medium, in quo corpus aliquod movetur, urgetur vel a gravitate propria, vel ab alia quacunque vi centripeta, & corpus ab eadem vi urgeatur fortius: differentia virium est vis illa motrix, quam in præcedentibus Propositionibus ut vim centripetam consideravimus. Sin corpus a vi illa urgeatur levius, differentia virium pro vi centrifuga haberi debet.

Corol. 9. Cum autem fluida premendo corpora inclusa non mutant eorum Figuras externas, patet insuper, per Corollarium Prop.

Prop. XIX., quod non mutabunt situm partium internarum inter se: proindeque, si Animalia immergantur, & sensatio omnis a motu partium oritur; nec lædent corpora immersa, nec sensationem ullam excitabunt, nisi quatenus hæc corpora a compressione condensari possunt. Et par est ratio cujuscunque corporum Systematis fluido comprimente circumdati. Systematis partes omnes iisdem agitabuntur motibus, ac si in vacuo constituerentur, ac solam retinerent gravitatem suam comparativam, nisi quatenus fluidum vel motibus earum nonnihil resistat, vel ad easdem compressione conglutinandas requiratur.


PROPOSITIO XXI. THEOREMA XVI.

Sit Fluidi cujusdam densitas compressioni proportionalis, & partes ejus a vi centripeta distantiis suis a centro reciproce proportionalis deorsum trahantur: dico quod, si distantiæ illæ sumantur continue proportionales, densitates Fluidi in iisdem distantiis erunt etiam continue proportionales.

Designet ATV fundum Sphæricum cui fluidum incumbit, S centrum, SA, SB, SC, SD, SE , &c. distancias continue proportionales. Erigantur perpendiculara AH, BI, CK, DL, EM , &c. quæ sint ut densitates Medii in locis A, B, C, D, E ; & specificæ gravitates in iisdem locis erunt ut $\frac{AH}{AS}, \frac{BI}{BS}, \frac{CK}{CS}$, &c. vel, quod


perinde est, ut $\frac{AH}{AB}, \frac{BI}{BC}, \frac{CK}{CD}$, &c. Finge

primum has gravitates uniformiter continuari ab A ad B , a B ad C , a C ad D , &c. factis per gradus decrementis in punctis B, C, D , &c. Et hæc gravitates ductæ in altitudines AB, BC, CD , &c. confluent pressiones AH, BI, CK , quibus fundum ATV (juxta Theorema xv.) urgetur. Sustinet ergo particula A pressiones omnes AH, BI, CK, DL , pergendo in infinitum; & particula B pressiones omnes præter primam AH ; & particula C omnes præter duas primas AH, BI ; & sic deinceps: adeoque particula primæ A densitas AH est ad particula secundæ B densitatem



Da Motu tatem BI ut summa omnium $AH+BI+CK+DL$, in infinitum, ad summam omnium $BI+CK+DL$, &c. Et BI densitas secundæ B , est ad CK densitatem tertiæ C , ut summa omnium $BI+CK+DL$, &c. ad summam omnium $CK+DL$, &c. Sunt igitur summæ illæ differentiis suis AH, BI, CK , &c. proportionales, atque adeo continue proportionales, per hujus Lem. 1. proindeque differentiæ AH, BI, CK , &c. summis proportionales, sunt etiam continue proportionales. Quare cum densitates in locis A, B, C , &c. sint ut AH, BI, CK , &c. erunt etiam hæ continue proportionales. Pergatur per saltum, & (ex æquo) in distantiiis SA, SC, SE continue proportionalibus, erunt densitates AH, CK, EM continue proportionales. Et eodem argumento, in distantiiis quibuscumque continue proportionalibus SA, SD, SG , densitates AH, DL, GO erunt continue proportionales. Coeant jam puncta A, B, C, D, E , &c. eo ut progressio gravitatum specificarum a fundo A ad summam Fluidi continua reddatur, & in distantiiis quibuscumque continue proportionalibus SA, SD, SG , densitates AH, DL, GO , semper existentes continue proportionales, manebunt etiam continue proportionales. Q. E. D.

Corol. Hinc si detur densitas Fluidi in duobus locis, puta A & E , colligi potest ejus densitas in alio quovis loco Q . Centro S , Asymptotis reſtanguis SQ, SX , deſcribatur Hyperbola ſecans perpendicularia AH, EM, QT in a, e, q , ut & perpendicularia HX, MT, TZ , ad Asymptota SX demiffa, in b, m & z . Fiat area $ZYmtZ$ ad aream datam $YmbX$ ut area data $EeqQ$ ad aream datam $EeaA$; & linea Zt producta abſcindet lineam Qt denſitati proportionalem. Namque ſi lineæ SA, SE, SQ ſunt continue proportionales, erunt areæ $EeqQ, EeaA$ æquales, & inde areæ hiſ proportionales $YmtZ, XbmT$ etiam æquales, & lineæ SX, ST, SZ , id eſt AH, EM, QT continue proportionales, ut oportet. Et ſi lineæ SA, SE, SQ obtinent alium quemvis ordinem in ſerie continue proportionalium, lineæ AH, EM, QT , ob proportionales areæ Hyperbolicas, obtinebunt eundem ordinem in alia ſerie quantitatum continue proportionalium.




PROPO.

PROPOSITIO XXII. THEOREMA XVII.

 LIBER
SECUNDUS.

Sit Fluidi cujusdam densitas compressioni proportionalis, & partes ejus a gravitate quadratis distantiarum suarum a centro reciproce proportionali deorsum trahantur: dico quod, si distantiae sumantur in progressionem Musica, densitates Fluidi in his distantiis erunt in progressionem Geometrica.

Designet S centrum, & SA, SB, SC, SD, SE distantias in progressionem Geometrica. Erigantur perpendiculara AH, BI, CK , &c. quæ sint ut Fluidi densitates in locis A, B, C, D, E , &c. & ipsius



gravitates specificæ in iisdem locis erunt $\frac{AH}{SA^2}, \frac{BI}{SB^2}, \frac{CK}{SC^2}$, &c.

Finge has gravitates uniformiter continuari, primam ab A ad B , secundam a B ad C , tertiam a C ad D , &c. Et hæ ductæ in altitudines AB, BC, CD, DE , &c. vel, quod perinde est, in distantias SA, SB, SC , &c. altitudinibus illis proportionales facient ex-

ponentes pressionum $\frac{AH}{SA}, \frac{BI}{SB}, \frac{CK}{SC}$, &c. Quare cum densitates

sint ut harum pressionum summæ, differentiæ densitatum $AH - BI$,


$BI - CK$, &c. erunt ut summarum differentiæ $\frac{AH}{SA}, \frac{BI}{SB}, \frac{CK}{SC}$, &c.

LI 2

Centro

DE MOTU
CORPORUM,

Centro S , Asymptotis SA , Sx , describatur Hyperbola quævis; quæ secet perpendiculara AH , BI , CK , &c. in a , b , c , &c. ut & perpendiculara ad Asymptoton Sx demissa Ht , Iu , Kw in b , i , k ; & densitatum differentiarum tu , uw , &c. erunt ut $\frac{AH}{SA} \cdot \frac{BI}{SB}$, &c. Et rectangula $tu \times tb$, $uw \times ui$, &c. seu tp , uq , &c. ut $\frac{AH \times tb}{SA}$, $\frac{BI \times ui}{SB}$, &c. id est, ut Aa , Bb , &c. Est enim, ex natura Hyperbolæ, SA ad AH vel St , ut tb ad Aa , adeoque $\frac{AH \times tb}{SA}$ æquale Aa .



Et simili argumento est $\frac{BI \times ui}{SB}$ æquale Bb , &c. Sunt autem Aa , Bb , Cc , &c. continue proportionales, & propterea differentiis suis $Aa - Bb$, $Bb - Cc$, &c. proportionales; ideoque differentiis hisce proportionalia sunt rectangula tp , uq , &c. ut & summis differentiarum $Aa - Cc$ vel $Aa - Dd$ summæ rectangulorum $tp + uq$ vel $tp + uq + wr$. Sunt ejusmodi termini quam plurimi; & summa omnium differentiarum, puta $Aa - Ff$, erit summæ omnium rectangulorum, puta $ztbn$, proportionalis. Augeatur numerus terminorum & minuuntur distantie punctorum A , B , C , &c. in infinitum, & rectangula illa evadent æqualia aræ Hyperbolice $ztbn$, adeoque huic aræ proportionalis est differentia $Aa - Ff$. Sumantur

tur jam differentiæ quælibet, puta SA , SD , SF in progressionē Musica, & differentiæ $Aa—Dd$, $Dd—Ff$ erunt æquales; & propterea differentiis hisce proportionales aræ $t b l x$, $x l n z$ æquales erunt inter se, & densitates $S t$, $S x$, $S z$, id est, AH , DL , FN , continue proportionales. Q. E. D.

Corol. Hinc si dentur Fluidi densitates duæ quævis, puta AI & CK , dabitur aræ $t b k w$ harum differentiæ $t w$ respondens; & inde inveniatur densitas FN in altitudine quacunque SF , sumendo aræam $t b n z$ ad aræam illam datam $t b k w$ ut est differentia $Aa—Ff$ ad differentiam $Aa—Cc$.

Scholium.

Simili argumentatione probari potest, quod si gravitas particularum Fluidi diminuatur in triplicata ratione distantiarum a centro; & quadratorum distantiarum SA , SB , SC , &c. reciproca (nempe $\frac{SA cub.}{SA q.} \cdot \frac{SB cub.}{SB q.}, \frac{SC cub.}{SC q.}$) fumantur in progressionē Arithmetica; densitates AH , BI , CK , &c. erunt in progressionē Geometrica. Et si gravitas diminuatur in quadruplicata ratione distantiarum, & cuborum distantiarum reciproca (puta $\frac{SA q q q}{SA cub.}, \frac{SB q q q}{SB cub.}$) fumantur in progressionē Arithmetica; densitates AH , BI , CK , &c. erunt in progressionē Geometrica: Et sic in infinitum. Rursus si gravitas particularum Fluidi in omnibus distantis eadem sit, & distantiae sint in progressionē Arithmetica, densitates erunt in progressionē Geometrica, uti Vir Cl. *Edmundus Halleius* invenit. Si gravitas sit ut distantia, & quadrata distantiarum sint in progressionē Arithmetica, densitates erunt in progressionē Geometrica. Et sic in infinitum. Hæc ita se habent ubi Fluidi compressione condensati densitas est ut vis compressionis, vel, quod perinde est, spatium a Fluido occupatum reciproce ut hæc vis. Fingi possunt aliæ condensationis Leges, ut quod cubus vis comprimantis sit ut quadrato-quadratum densitatis, sed triplicata ratio Vis æqualis quadruplicatæ rationi densitatis. Quo in casu, si gravitas est reciproce ut quadratum distantiae a centro, densitas erit reciproce ut cubus distantiae. Fingatur quod cubus vis comprimantis sit ut quadrato-cubus densitatis, & si gravitas est reciproce ut quadratum distantiae, densitas erit reciproce in sesquuplicata ratione


DE MOTU
CORPORUM,

tione distantiae. Fingatur quod vis comprimens sit in duplicata ratione densitatis, & gravitas reciproce in ratione duplicata distantiae, & densitas erit reciproce ut distantia. Casus omnes percurrere longum esset.

PROPOSITIO XXIII. THEOREMA XVIII.

Si Fluidi ex particulis se mutuo fugientibus composui densitas sit ut compressio, vires centrifugae particularum sunt reciproce proportionales distantis centrorum suorum. Et vice versa, particula viribus quae sunt reciproce proportionales distantis centrorum suorum se mutuo fugientes componunt Fluidum Elasticum, cujus densitas est compressioni proportionalis.

Includi intelligatur Fluidum in spatio cubico ACE , dein compressione redigi in spatium cubicum minus ace ; & particularum, similem situm inter se in utroque spatio obtinentium, distantiae erunt ut cuborum latera AB , ab ; & Medii densitates reciproce ut spatia continentia $AB\ cub.$ & $ab\ cub.$ In latere cubi majoris $ABCD$ capiatur quadratum DP æquale lateri cubi minoris db ; & ex Hypo-



thesi, pressio qua quadratum DP urget Fluidum inclusum, erit ad pressionem qua latus illud quadratum db urget Fluidum inclusum ut Medii densitates ad invicem, hoc est, ut $ab\ cub.$ ad $AB\ cub.$ Sed pressio qua quadratum DB urget Fluidum inclusum, est ad pressionem qua quadratum DP urget idem Fluidum, ut quadratum DB , ad quadratum DP , hoc est, ut AB , quad. ad ab quad. Ergo, ex æquo, pressio qua latus DB urget Fluidum, est ad pressionem qua latus db urget Fluidum, ut ab ad AB . Planis FGH , fgb , per media cuborum ductis, distinguatur Fluidum in duas partes, & hæc se mutuo prement iisdem viribus, quibus preminuntur a planis AC , ac , hoc est, in proportionem ab ad AB : adeoque vires centrifugæ, quibus hæc pressionem sustinentur, sunt in eadem ratione. Ob eundem particularum numerum similemque situm in utroque cubo, vires quas particulae omnes secundum plana FGH , fgb exercent in omnes,

nes, sunt ut vires quas singulae exercent in singulas. Ergo vires, LIBER
SECUNDUS.
 quas singulae exercent in singulas secundum planum FGH in cubo majore, sunt ad vires quas singulae exercent in singulas secundum planum fgb in cubo minore ut ab ad AB , hoc est, reciproce ut distantiae particularum ad invicem. $\mathcal{Q}. E. D.$

Et vice versa, si vires particularum singularum sunt reciproce ut distantiae, id est, reciproce ut cuborum latera AB , ab ; summæ virium erunt in eadem ratione, & pressiones laterum DB , db ut summæ virium; & pressio quadrati DP ad pressionem lateris DB ut ab quad. ad AB quad. Et, ex æquo, pressio quadrati DP ad pressionem lateris db ut ab cub. ad AB cub. id est, vis compressionis ad vim compressionis ut densitas ad densitatem. $\mathcal{Q}. E. D.$

Scholium.

Simili argumento, si particularum vires centrifugae sint reciproce in duplicata ratione distantiarum inter centra, cubi virium comprimentium erunt ut quadrato-quadrata densitatum. Si vires centrifugae sint reciproce in triplicata vel quadruplicata ratione distantiarum, cubi virium comprimentium erunt ut quadrato-cubi vel cubo-cubi densitatum. Et universaliter, si D ponatur pro distantia, & E pro densitate Fluidi compressi, & vires centrifugae sint reciproce ut distantiae dignitas quaelibet D^n , cujus index est numerus n ; vires comprimentes erunt ut latera cubica dignitatis E^{n+2} , cujus index est numerus $n+2$; & contra. Intelligenda vero sunt hæc omnia de particularum Viribus centrifugis quæ terminantur in particulis proximis, aut non longe ultra diffunduntur. Exemplum habemus in corporibus Magneticis. Horum Virtus attractiva terminatur fere in sui generis corporibus sibi proximis. Magnetis virtus per interpositam laminam ferri contrahitur, & in lamina fere terminatur. Nam corpora ulteriora non tam a Magnete quam a lamina trahuntur. Ad eundem modum si particulae fugiant alias sui generis particulas sibi proximas, in particulas autem remotiores virtutem nullam exerceant, ex huiusmodi particulis componentur Fluida de quibus actum est in hac Propositione. Quod si particulae cujusque virtus in infinitum propagetur, opus erit vi majori ad aequalem condensationem majoris quantitatis Fluidi. An vero Fluida elastica ex particulis se mutuo fugantibus consent, Quæstio Physica est. Nos proprietatem Fluidorum ex ejusmodi particulis constantium Mathematicè demonstravimus, ut Philosophis ansam præbeamus Quæstionem illam tractandi.

SECTIO

S E C T I O VI.

De Motu & Resistentia Corporum Funependulorum.

PROPOSITIO XXIV. THEOREMA XIX.

Quantitates materiæ in corporibus funependulis, quorum centra oscillationum a centro suspensionis æqualiter distant, sunt in ratione composita ex ratione ponderum & ratione duplicata temporum oscillationum in vacuo.

Nam velocitas, quam data vis in data materia dato tempore generare potest, est ut vis & tempus directe, & materia inverse. Quo major est vis vel majus tempus vel minor materia, eo major generabitur velocitas. Id quod per motus Legem secundam manifestum est. Jam vero si Pendula ejusdem sint longitudinis, vires motrices in locis a perpendiculo æqualiter distantibus sunt ut pondera: ideoque si corpora duo oscillando describant arcus æquales, & arcus illi dividantur in partes æquales; cum tempora quibus corpora describunt singulas arcuum partes correspondentes, sint ut tempora oscillationum totarum, erunt velocitates ad invicem in correspondentibus oscillationum partibus, ut vires motrices & tota oscillationum tempora directe & quantitates materiæ reciproce: adeoque quantitates materiæ ut vires & oscillationum tempora directe & velocitates reciproce. Sed velocitates reciproce sunt ut tempora, atque adeo tempora directe & velocitates reciproce sunt ut quadrata temporum, & propterea quantitates materiæ sunt ut vires motrices & quadrata temporum, id est, ut pondera & quadrata temporum. *Q. E. D.*

Corol. 1. Ideoque si tempora sunt æqualia, quantitates materiæ in singulis corporibus erunt ut pondera.

Corol. 2. Si pondera sunt æqualia, quantitates materiæ erunt ut quadrata temporum.

Corol. 3. Si quantitates materiæ æquantur, pondera erunt reciproce ut quadrata temporum.

Corol.

Corol. 4. Unde cum quadrata temporum, cæteris paribus, sint ut longitudines pendulorum; si & tempora & quantitates materiæ æqualia sunt, pondera erunt ut longitudines pendulorum.

Corol. 5. Et universaliter, quantitas materiæ pendulæ est ut pondus & quadratum temporis directè, & longitudo penduli inverſe.

Corol. 6. Sed & in Medio non reſiſtente quantitas materiæ pendulæ est ut pondus comparativum & quadratum temporis directè & longitudo penduli inverſe. Nam pondus comparativum est vis motrix corporis in Medio quovis gravi, ut ſupra explicui; adeoque idem præſtat in tali Medio non reſiſtente atque pondus abſolutum in vacuo.


Corol. 7. Et hinc liquet ratio tum comparandi corpora inter ſe, quoad quantitatem materiæ in ſingulis; tum comparandi pondera ejuſdem corporis in diverſis locis, ad cognoscendam variationem gravitatis. Factis autem experimentis quam accuratiſſimis inveni ſemper quantitatem materiæ in corporibus ſingulis eorum ponderi proportionalem eſſe.

PROPOSITIO XXV. THEOREMA XX.

Corpora Funependula quibus, in Medio quovis, reſiſtitur in ratione momentorum temporis, & corpora Funependula quæ in ejuſdem gravitatis ſpecificæ Medio non reſiſtente moventur, oſcillationes in Cycloide eodem tempore peragunt, & arcuum partes proportionales ſimul deſcribunt.

Sit AB Cycloidis arcus, quem corpus D tempore quovis in Medio non reſiſtente oſcillando deſcribit. Biſecetur idem in C , ita ut C ſit infimum ejus punctum; & erit vis acceleratrix qua corpus urgetur in loco quovis D vel d vel E ut longitudo arcus CD vel Cd vel CE .

Exponatur vis illa per eundem arcum; & cum reſiſtentia ſit ut momentum temporis, adeoque detur, exponatur




$M m$

dur

DE MOTU
CORPORUM,

tur eadem per datam arcus Cycloidis partem CO , & fumatur arcus Od in ratione ad arcum CD quam habet arcus OB ad arcum CB : & vis qua corpus in d urgetur in Medio resistente, cum sit excessus vis Cd supra resistentiam CO , exponetur per arcum Od , adeoque erit ad vim qua corpus D urgetur in Medio non resistente, in loco D , ut arcus Od ad arcum CD ; & propterea etiam in loco B ut arcus OB ad arcum CB . Proinde si corpora duo, D , d exeant de loco B , & his viribus urgeantur: cum vires sub initio sint ut arcus CB & OB , erunt velocitates primæ & arcus primo descripti in eadem ratione. Sunt arcus illi BD & Bd , & arcus reliqui CD , Od erunt in eadem ratione. Proinde vires, ipsi CD , Od proportionales, manebunt in eadem ratione ac sub initio, & propterea corpora pergent arcus in eadem ratione simul describere. Igitur vires & velocitates & arcus reliqui CD , Od semper erunt ut arcus toti CB , OB , & propterea arcus illi reliqui simul describentur. Quare corpora duo D , d simul pervenient ad loca C & O , alterum quidem in Medio non resistente ad locum C , & alterum in Medio resistente ad locum O . Cum autem velocitates in C & O sint ut arcus CB , OB ; erunt arcus quos corpora ulterius pergendo simul describunt, in eadem ratione. Sunt illi CE & Oe . Vis qua corpus D in Medio non resistente retardatur in E est ut CE , & vis qua corpus d in Medio resistente retardatur in e est ut summa vis Ce & resistentiæ CO , id est ut Oe ; ideoque vires, quibus corpora retardantur, sunt ut arcubus CE , Oe proportionales arcus CB , OB ; proindeque velocitates, in data illa ratione retardatæ, manent in eadem illa data ratione. Velocitates igitur & arcus iisdem descripti semper sunt ad invicem in data illa ratione arcuum CB & OB ; & propterea si fumantur arcus toti AB , aB in eadem ratione, corpora D , d simul describent hos arcus, & in locis A & a motum omnem simul amittent. Isochronæ sunt igitur oscillationes totæ, & arcubus totis BA , Ba proportionales sunt arcuum partes quælibet BD , Bd vel BE , Be quæ simul describuntur. Q. E. D.



Corol.

Corol. Igitur motus velocissimus in Medio resistente non incidit in punctum infimum *C*, sed reperitur in puncto illo *O*, quo arcus totus descriptus *aB* bisecatur. Et corpus subinde pergendo ad *a*, iisdem gradibus retardatur quibus antea accelerabatur in descensu suo a *B* ad *O*.

L. IBER
SALUDUS.

PROPOSITIO XXVI. THEOREMA XXI.

Corporum Funependulorum quibus resistitur in ratione velocitatum, oscillationes in Cycloide sunt Isochrone.

Nam si corpora duo, a centrīs suspensionum æqualiter distantia, oscillando describant arcus inæquales, & velocitates in arcuum partibus correspondentibus sint ad invicem ut arcus toti: resistentiæ velocitatibus proportionales, erunt etiam ad invicem ut iidem arcus. Proinde si viribus motricibus a gravitate oriundis, quæ sint ut iidem arcus, auferantur vel addantur hæ resistentiæ, erunt differentiæ vel summæ ad invicem in eadem arcuum ratione, cumque velocitatum incrementa vel decrementa sint ut hæ differentiæ vel summæ, velocitates semper erunt ut arcus toti: Igitur velocitates, si sint in aliquo casu ut arcus toti, manebunt semper in eadem ratione. Sed in principio motus, ubi corpora incipiunt descendere & arcus illos describere, vires, cum sint arcubus proportionales, generabunt velocitates arcubus proportionales. Ergo velocitates semper erunt ut arcus toti describendi, & propterea arcus illi simul describentur. *Q. E. D.*

PROPOSITIO XXVII. THEOREMA XXII.

Si Corporibus Funependulis resistitur in duplicata ratione velocitatum, differentiæ inter tempora oscillationum in Medio resistente ac tempora oscillationum in ejusdem gravitatis specificæ Medio non resistente, erunt arcubus oscillando descriptis proportionales, quam proxime.

Nam pendulis æqualibus in Medio resistente describantur arcus inæquales, *A, B*; & resistentia corporis in arcu *A*, erit ad resistentiam corporis in parte correspondente arcus *B*, in duplicata ratione velocitatum, id est, ut *AA* ad *BB*, quam proxime. Si resi-

Mm 2

stentia

DE MOTU
CORPORUM.

stentia in arcu B esset ad resistentiam in arcu A ut AB ad AA; tempora in arcubus A & B forent æqualia, per Propositionem superiorem. Ideoque resistentia AA in arcu A, vel AB in arcu B, efficit excessum temporis in arcu A supra tempus in Medio non resistente: & resistentia BB efficit excessum temporis in arcu B supra tempus in Medio non resistente. Sunt autem excessus illi ut vires efficientes AB & BB quam proxime, id est, ut arcus A & B. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc ex oscillationum temporibus, in Medio resistente, in arcubus inæqualibus factarum, cognosci possunt tempora oscillationum in ejusdem gravitatis specificæ Medio non resistente. Nam differentia temporum erit ad excessum temporis in arcu minore supra tempus in Medio non resistente, ut differentia arcuum ad arcum minorem.

Corol. 2. Oscillationes breviores sunt magis Isochronæ, & brevissimæ iisdem temporibus peraguntur ac in Medio non resistente, quam proxime. Earum vero quæ in majoribus arcubus fiunt, tempora sunt paulo majora, propterea quod resistentia in descensu corporis qua tempus producit, major sit pro ratione longitudinis in descensu descriptæ, quam resistentia in ascensu subsequente qua tempus contrahitur. Sed & tempus oscillationum tam brevium quam longarum nonnihil produci videtur per motum Medii. Nam corporibus tardescentibus paulo minus resistitur, pro ratione velocitatis, & corporibus acceleratis paulo magis quam iis quæ uniformiter progrediuntur: id adeo quia Medium, eo quem a corporibus accepit motu, in eandem plagam pergendo, in priore casu magis agitur; in posteriore minus; ac proinde magis vel minus cum corporibus motis conspirat. Pendulis igitur in descensu magis resistit, in ascensu minus quam pro ratione velocitatis, & ex utraque causa tempus producit.

PROPOSITIO XXVIII. THEOREMA XXIII.

Si Corpori Funependulo in Cycloide oscillanti resistitur in ratione momentorum temporis, erit ejus resistentia ad vim gravitatis ut excessus arcus descensu toto descripti supra arcum ascensu subsequente descriptum, ad penduli longitudinem duplicatam.


Designet BC arcum descensu descriptum, Ca arcum ascensu descriptum, & Aa differentiam arcuum: & stantibus quæ in Propositione

fitione xxv. constructa & demonstrata sunt, erit vis qua corpus
 oscillans urgetur in loco quovis \mathcal{D} , ad vim resistentiæ ut arcus
 CD ad arcum CO , qui semissis est differentiæ illius Aa . Ideoque
 vis qua corpus oscillans urgetur in Cycloidis principio seu puncto
 altissimo, id est, vis gravitatis, erit ad resistentiam ut arcus Cy-
 cloidis inter punctum illud supremum & punctum infimum C ad
 arcum CO ; id est (si arcus duplicentur) ut Cycloidis totius arcus,
 seu dupla penduli longitudo, ad arcum Aa . \mathcal{Q} . E . \mathcal{D} .

PROPOSITIO XXIX. PROBLEMA VI.

*Posito quod Corpori in Cycloide oscillanti resistitur in du-
 plicata ratione velocitatis: invenire resistentiam in locis
 singulis.*

Sit Ba (Fig. Prop. xxv.) arcus oscillatione integra descriptus,
 sitque C infimum Cycloidis punctum, & CZ semissis arcus Cycloi-
 dis totius, longitudini Penduli æqualis; & quærat resistentia cor-



poris in loco quovis \mathcal{D} . Secetur recta infinita OQ in punctis O ,
 C , P , Q , ea lege ut (si erigantur perpendiculara OK , CT , PI , & QE ,
 centroque O & Asymptotis OK , OQ describatur Hyperbola $TIGE$
 secans perpendiculara CT , PI , QE in T , I & E , & per punctum I
 agatur KF parallela Asymptoto OQ occurrens Asymptoto OK in
 K , & perpendicularis CT & QE in L & F) fuerit area Hyperbolica
 PIE \mathcal{Q} ad aream Hyperbolicam $PITC$ ut arcus BC descensu cor-
 poris descriptus ad arcum Ca ascensu descriptum, & area IEF ad
 Mm 3 aream

dicatur Y , atque area $PIGR$ decrementum $RGgr$ detur, erit $LIII$
 incrementum areae Y ut $PIGR - Y$. SECUNDUS.

Quod si V designet vim a gravitate oriundam, arcui describendo CD proportionalem, qua corpus urgetur in D : & R pro resistentia ponatur: erit $V - R$ vis tota qua corpus urgetur in D . Est itaque incrementum velocitatis ut $V - R$ & particula illa temporis in qua factum est conjunctim: Sed & velocitas ipsa est ut incrementum contemporaneum spatii descripi directe & particula eadem temporis inverse. Unde, cum resistentia (per Hypothesin) sit ut quadratum velocitatis, incrementum resistentiae (per Lem. 11.) erit ut velocitas & incrementum velocitatis conjunctim, id est, ut momentum spatii & $V - R$ conjunctim; atque adeo, si momentum spatii detur, ut $V - R$; id est, si pro vi V scribatur ejus exponens $PIGR$, & resistentia R exponatur per aliam aliquam aream Z , ut $PIGR - Z$.

Igitur area $PIGR$ per datorum momentorum subductionem uniformiter decrefcente, crescunt area Y in ratione $PIGR - Y$, & area Z in ratione $PIGR - Z$. Et propterea si areae Y & Z simul incipiant & sub initio æquales sint, hæ per additionem æqualium momentorum pergent esse æquales, & æqualibus itidem momenti subinde decrefcentes simul evanescunt. Et vicissim, si simul incipiunt & simul evanescunt, æqualia habebunt momenta & semper erunt æquales: id adeo quia si resistentia Z augeatur, velocitas una cum arcu illo Ca , qui in ascensu corporis describitur, diminuetur; & puncto in quo motus omnis una cum resistentia cessat propius accedente ad punctum C , resistentia citius evanescet quam area Y . Et contrarium eveniet ubi resistentia diminuitur.

Jam vero area Z incipit definitque ubi resistentia nulla est, hoc est, in principio & fine motus, ubi arcus CD , CD arcubus CB & Ca æquantur, adeoque ubi recta RG incidit in rectas QE & CT .

Et area Y seu $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ incipit definitque ubi nulla est,

adeoque ubi $\frac{OR}{OQ}IEF$ & IGH æqualia sunt: hoc est (per constructionem) ubi recta RG incidit in rectas QE & CT . Proindeque areae illæ simul incipiunt & simul evanescunt, & propterea semper sunt æquales. Igitur area $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ æqualis est areae Z , per quam resistentia exponitur, & propterea est ad arcum $PINM$ per quam gravitas exponitur, ut resistentia ad gravitatem. QE . D .

Corol.

DE MOTU
CORPORUM,

Corol. 1. Est igitur resistentia in loco infimo C ad vim gravitatis, ut area $OPQIEF$ ad aream $PINM$.

Corol. 2. Fit autem maxima, ubi area $PIHR$ est ad aream IEF ut OR ad OQ . Eo enim in casu momentum ejus (nimirum $PIGR - Y$) evadit nullum.

Corol. 3. Hinc etiam innotescit velocitas in locis singulis: quippe quæ est in subduplicata ratione resistentiæ, & ipso motus initio æquatur velocitati corporis in eadem Cycloide absque omni resistentia oscillantis.

Cæterum ob difficilem calculum quo resistentia & velocitas per hanc Propositionem inveniendæ sunt, visum est Propositionem sequentem subungere, quæ & generalior sit & ad usus Philosophicos abunde satis accurata.

PROPOSITIO XXX. THEOREMA XXIV.

Si recta aB æqualis sit Cycloidis arcui quem corpus oscillando describit, & ad singula ejus puncta D erigantur perpendiculara DK, quæ sint ad longitudinem Penduli ut resistentia corporis in arcus punctis correspondentibus ad vim gravitatis: dico quod differentia inter arcum descensu toto descriptum, & arcum ascensu toto subsequente descriptum, ducta in arcuum eorundem semisummam, æqualis erit area BK aB a perpendicularis omnibus DK occupata.

Exponatur enim tum Cycloidis arcus, oscillatione integra descriptus, per rectam illam sibi æqualem aB , tum arcus qui describeretur in vacuo per longitudinem AB . Bisecetur AB in C , & punctum C representabit infimum Cycloidis punctum, & erit CD ut vis a gravitate oriunda, qua corpus in D secundum tangentem Cycloidis urgetur, eamque habebit rationem ad longitudinem Penduli quam habet vis in D ad vim gravitatis. Exponatur igitur vis illa per longitudinem CD , & vis gravitatis per longitudinem penduli, & si in DE capiatur DK in ea ratione ad longitudinem penduli

cum Figura $BKVTa$ in puncto medio V , hæc si ad partem alterutram BRV vel VSa excedit Figuram illam, deficit ab eadem ad partem alteram, & sic eidem æquabitur proxime.

LIBER
SECUNDUS,

PROPOSITIO XXXI. THEOREMA XXV.

Si Corporis oscillantis resistentia in singulis arcuum descriptorum partibus proportionalibus augeatur vel minuat in data ratione; differentia inter arcum descensu descriptum & arcum subsequente ascensu descriptum, augebitur vel diminuetur in eadem ratione.

Oritur enim differentia illa ex retardatione Penduli per resistentiam Medii, adeoque est ut retardatio tota eique proportionalis resistentia retardans. In superiore Propositione rectangulum sub recta aB & arcuum illorum CB , Ca differentia Aa , æqualis erat areae BKT . Et area illa, si maneat longitudo aB , augeatur vel diminuitur in ratione ordinatim applicatarum DK ; hoc est, in ratione resistentiæ, adeoque est ut longitudo aB & resistentia conjunctim. Proindeque rectangulum sub Aa & aB est ut aB & resistentia conjunctim, & propterea Aa ut resistentia.
Q. E. D.

Corol. 1. Unde si resistentia sit ut velocitas, differentia arcuum in eodem Medio erit ut arcus totus descriptus: & contra.

Corol. 2. Si resistentia sit in duplicata ratione velocitatis, differentia illa erit in duplicata ratione arcus totius: & contra.

Corol. 3. Et universaliter, si resistentia sit in triplicata vel alia quavis ratione velocitatis, differentia erit in eadem ratione arcus totius: & contra.

Corol. 4. Et si resistentia sit partim in ratione simplici velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata, differentia erit partim in ratione arcus totius & partim in ejus ratione duplicata: & contra. Eadem erit lex & ratio resistentiæ pro velocitate, quæ est differentiæ illius pro longitudine arcus.

Corol. 5. Ideoque si, pendulo inæquales arcus successive describente, inveniri potest ratio incrementi ac decrementi differentiæ hujus pro longitudine arcus descripti; habebitur etiam ratio incrementi ac decrementi resistentiæ pro velocitate majore vel minore.

N n 2

Scholium

Ex his Propositionibus, per oscillationes Pendulorum in Mediis quibuscunque, invenire licet resistentiam Mediorum. Aeris vero resistentiam investigavi per Experimenta sequentia. Globum ligneum pondere unciarum *Romanarum* 57½, diametro digitorum *Londinensium* 6½ fabricatum, filo tenui ab unco fatis firmo suspendi, ita ut inter unicum & centrum oscillationis Globi distantia esset pedum 10½. In filo punctum notavi pedibus decem & uncia una a centro suspensionis distans: & e regione puncti illius collocavi Regulam in digitos distinctam, quorum ope notarem longitudines arcuum a Pendulo descriptas. Deinde numeravi oscillationes quibus Globus octavam motus sui partem amitteret. Si pendulum deducebatur a perpendiculari ad distantiam duorum digitorum, & inde demittebatur; ita ut toto suo descensu describeret arcum duorum digitorum, totaque oscillatione prima, ex descensu & ascensu subsequente composita, arcum digitorum fere quatuor: idem oscillationibus 164 amisit octavam motus sui partem, sic ut ultimo suo ascensu describeret arcum digiti unius cum tribus partibus quartis digiti. Si primo descensu descripsit arcum digitorum quatuor; amisit octavam motus partem oscillationibus 121, ita ut ascensu ultimo describeret arcum digitorum 3½. Si primo descensu descripsit arcum digitorum octo, sexdecim, triginta duorum vel sexaginta quatuor; amisit octavam motus partem oscillationibus 69, 35½, 18½, 9½, respective. Igitur differentia inter arcus descensu primo & ascensu ultimo descriptos, erat in casu primo, secundo, tertio, quarto, quinto, sexto, digitorum ½, ½, 1, 2, 4, 8 respective. Dividantur eæ differentiæ per numerum oscillationum in casu unoquoque, & in oscillatione una mediocri, qua arcus digitorum 3½, 7½, 15, 30, 60, 120 descriptus fuit, differentia arcuum descensu & subsequente ascensu descriptorum, erit $\frac{1}{656}, \frac{1}{141}, \frac{1}{69}, \frac{4}{71}, \frac{8}{37}, \frac{24}{19}$ partes digiti respective. Hæ autem in majoribus oscillationibus sunt in duplicata ratione arcuum descriptorum quam proxime, in minoribus vero paulo majores quam in ea ratione: & propterea (per Corol. 2. Prop. xxxi Libri hujus) resistentia Globi, ubi celerius movetur, est in duplicata ratione velocitatis quam proxime; ubi tardius, paulo major quam in ea ratione.

Designet

Designet jam V velocitatem maximam in oscillatione quavis, sintque A, B, C quantitates datæ, & fingamus quod differentia arcuum sit $AV + BV^{\frac{1}{2}} + CV^2$. Cum velocitates maximæ sint in Cycloide ut semisses arcuum oscillando descriptorum, in Circulo vero ut semissium arcuum illorum chordæ, adeoque paribus arcubus majores sint in Cycloide quam in Circulo, in ratione semissium arcuum ad eorundem chordas; tempora autem in Circulo sint majora quam in Cycloide in velocitatis ratione reciproca; patet arcuum differentias (quæ sunt ut resistentia & quadratum temporis conjunctim) easdem fore, quamproxime, in utraque Curva: deberent enim differentiæ illæ in Cycloide augeri, una cum resistentia, in duplicata circiter ratione arcus ad chordam, ob velocitatem in ratione illa simplici auctam; & diminui, una cum quadrato temporis, in eadem duplicata ratione. Itaque ut reductio fiat ad Cycloidem, eadem sumendæ sunt arcuum differentiæ quæ fuerunt in Circulo observatæ, velocitates vero maximæ ponendæ sunt arcubus dimidiatis vel integris, hoc est, numeris 1, 2, 4, 8, 16 analogæ. Scribamus ergo in casu secundo, quarto & sexto numeros 1, 4 & 16 pro V , & prodibit arcuum differentia $\frac{1}{121} = A + B + C$ in casu secundo; $\frac{2}{351} = 4A + 8B + 16C$ in ca-

su quarto; & $\frac{8}{91} = 16A + 64B + 256C$ in casu sexto. Et ex his æquationibus, per debitam collationem & reductionem Analyticam, fit $A = 0,0000916$, $B = 0,0010847$, & $C = 0,0029558$. Est igitur differentia arcuum ut $0,0000916V + 0,0010847V^{\frac{1}{2}} + 0,0029558V^2$: & propterea cum (per Corollarium Propositionis xxx) resistentia Globi in medio arcus oscillando descripti, ubi velocitas est V , sit ad ipsius pondus ut $\frac{1}{121}AV + \frac{1}{351}BV^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{91}CV^2$ ad longitudinem Penduli; si pro A, B & C scribantur numeri inventi, fiet resistentia Globi ad ejus pondus, ut $0,0000583V + 0,0007546V^{\frac{1}{2}} + 0,0022169V^2$ ad longitudinem Penduli inter centrum suspensionis & Regulam, id est, ad 121 digitos. Unde cum V in casu secundo designet 1, in quarto 4, in sexto 16: erit resistentia ad pondus Globi in casu secundo ut $0,0030298$ ad 121, in quarto ut $0,0417402$ ad 121, in sexto ut $0,61675$ ad 121.

Arcus quem punctum in filo notatum in casu sexto descripsit, erat $120 - \frac{8}{91}$ seu $119 \frac{1}{11}$ digitorum. Et propterea cum radius esset 121 digitorum, & longitudo Penduli inter punctum suspensionis &

De Motu Corporum, & centrum Globi esset 126 digitorum, arcus quem centrum Globi descripsit erat $124 \frac{1}{4}$ digitorum. Quoniam corporis oscillantis velocitas maxima, ob resistantiam Aeris, non incidit in punctum infimum arcus descripti, sed in medio fere loco arcus totius versatur: hæc eadem erit circiter ac si Globus descensu suo toto in Medio non resistente describeret arcus illius partem dimidium digitorum $62 \frac{1}{2}$, idque in Cycloide, ad quam motum Penduli supra reduximus: & propterea velocitas illa æqualis erit velocitati quam Globus, perpendiculariter cadendo & casu suo describendo altitudinem arcus illius sinui verso æqualem, acquirere posset. Est autem sinus ille versus in Cycloide ad arcum istum $62 \frac{1}{4}$ ut arcus idem ad penduli longitudinem duplam 252, & propterea æqualis digitis 15, 278. Quare velocitas ea ipsa est quam corpus cadendo & casu suo spatium 15, 278 digitorum describendo acquirere posset. Tali igitur cum velocitate Globus resistantiam patitur, quæ sit ad ejus pondus ut 0, 61675 ad 121, vel (si resistantiæ pars illa sola spectetur quæ est in velocitatis ratione duplicata) ut 0, 56752 ad 121.

Experimento autem Hydrostatico inveni quod pondus Globi hujus lignei esset ad pondus Globi aquei magnitudinis ejusdem, ut 55 ad 97: & propterea cum 121 sit ad 213, 4 in eadem ratione, erit resistantia Globi aquei præfata cum velocitate progredientis ad ipsius pondus, ut 0, 56752 ad 213, 4 id est, ut 1 ad 376 $\frac{1}{4}$. Unde cum pondus Globi aquei, quo tempore Globus cum velocitate uniformiter continuata describat longitudinem digitorum 30, 556 velocitatem illam omnem in Globo cadente generare posset, manifestum est quod vis resistantiæ eodem tempore uniformiter continuata tollere posset velocitatem minorem in ratione 1 ad 376 $\frac{1}{4}$, hoc est,

velocitatis totius partem $\frac{1}{376 \frac{1}{4}}$. Et propterea quo tempore Globus, ea cum velocitate uniformiter continuata, longitudinem semidiametri suæ, seu digitorum 3 $\frac{1}{2}$, describere posset, eodem amitteret motus sui partem $\frac{1}{3342}$.

Numerabam etiam oscillationes quibus Pendulum quartam motus sui partem amisit. In sequente Tabula numeri supremi denotant longitudinem arcus descensu primo descripti, in digitis & partibus digiti expressam: numeri medii significant longitudinem arcus ascensu ultimo descripti; & loco infimo stant numeri oscillationum. Experimentum descripsi tanquam magis accuratum quam cum motus pars tantum octava amitteretur. Calculum tentet qui volet.

Descen-

<i>Descensus primus</i>	2	4	8	16	32	64	LIBER SECUNDUS.
<i>Ascensus ultimus</i>	1½	3	6	12	24	48	
<i>Numerus Oscillat.</i>	374	272	162½	83½	41½	22½	

Postea Globum plumbeum, diametro digitorum 2, & pondere unciarum *Romanarum* 26½, suspendi filo eodem, sic ut inter centrum Globi & punctum suspensionis intervallum esset pedum 10½, & numerabam oscillationes quibus data motus pars amitteretur. Tabularum subsequentium prior exhibet numerum oscillationum quibus pars octava motus totius cessavit; secunda numerum oscillationum quibus ejusdem pars quarta amissa fuit.

<i>Descensus primus</i>	1	2	4	8	16	32	64
<i>Ascensus ultimus</i>	½	1	2	4	8	16	32
<i>Numerus Oscillat.</i>	226	228	193	140	90½	53	30
<i>Descensus primus</i>	1	2	4	8	16	32	64
<i>Ascensus ultimus</i>	½	1½	3	6	12	24	48
<i>Numerus Oscillat.</i>	510	518	420	318	204	121	70

In Tabula priorie seligendo ex observationibus tertiam, quintam & septimam, & exponendo velocitates maximas in his observationibus particulatim per numeros 1, 4, 16 respective, & generaliter per quantitatem V ut supra: emergit in observatione tertia

$$\frac{1}{193} = A + B + C, \text{ in quinta } \frac{2}{901} = 4A + 8B + 16C, \text{ in septima}$$

$$\frac{8}{30} = 16A + 64B + 256C. \text{ Hæ vero æquationes reductæ dant}$$

$A = 0,001414$, $B = 0,000297$, $C = 0,000879$. Et inde prodit resistentia Globi cum velocitate V moti, in ea ratione ad pondus suum unciarum 26½, quam habet $0,0009 V + 0,000207 V^{\frac{1}{2}} + 0,000659 V^{\frac{1}{4}}$ ad penduli longitudinem 121 digitorum. Et si spectemus eam solummodo resistentiæ partem quæ est in duplicata ratione velocitatis, hæc erit ad pondus Globi ut $0,000659 V^{\frac{1}{4}}$ ad 121 digitos. Erat autem hæc pars resistentiæ in experimento primo ad pondus Globi lignei unciarum 57½, ut $0,002217 V^{\frac{1}{4}}$ ad 121: & inde fit resistentia Globi lignei ad resistentiam Globi plumbei (paribus eorum velocitatibus) ut 57½, in $0,002217$ ad 26½ in $0,000659$, id est, ut 7; ad 1. Diametri Globorum duorum erant 6; & 2 digitorum, & harum quadrata sunt ad invicem ut 47½ & 4, seu 11½ & 1 quamproxime. Ergo resistentiæ Globorum æquivelocium erant in minore ratione quam duplicata diametrorum. At nondum consideravimus resistentiam

DE MOTU
CORPORUM,

stantiam fili, quæ certe permagna erat, ac de pendulorum inventa resistentia subduci debet. Hanc accurate definire non potui, sed majorem tamen inveni quam partem tertiam resistentiæ totius minoris penduli; & inde didici quod resistentiæ Globorum, dempta fili resistentia, sunt quam proxime in duplicata ratione diametrorum. Nam ratio $7\frac{1}{2}$ ad $1\frac{1}{2}$, seu $10\frac{1}{2}$ ad 1 , non longe abest a diametrorum ratione duplicata $11\frac{1}{2}$ ad 1 .

Cum resistentia fili in Globis majoribus minoris sit momenti, tentavi etiam experimentum in Globo cujus diameter erat $18\frac{1}{2}$ digitorum. Longitudo penduli inter punctum suspensionis & centrum oscillationis erat digitorum $122\frac{1}{2}$ inter punctum suspensionis & nodum in filo $109\frac{1}{2}$ dig. Arcus primo penduli descensu a nodo descriptus, 32 dig. Arcus ascensu ultimo post oscillationes quinque ab eodem nodo descriptus, 28. dig. Summa arcuum seu arcus totus oscillatione mediocri descriptus, 60 dig. Differentia arcuum 4 dig. Ejus pars decima seu differentia inter descensum & ascensum in oscillatione mediocri $\frac{1}{2}$ dig. Ut radius 109, ad radium $122\frac{1}{2}$, ita arcus totus 60 dig. oscillatione mediocri a nodo descriptus, ad arcum totum $67\frac{1}{2}$ dig. oscillatione mediocri a centro Globi descriptum: & ita differentia $\frac{1}{2}$ ad differentiam novam 0, 4475. Si longitudo penduli, manente longitudine arcus descripti, augeretur in ratione 126 ad $122\frac{1}{2}$; tempus oscillationis augetur & velocitas penduli diminueretur in ratione illa subduplicata, maneret vero arcuum descensu & subsequente ascensu descriptorum differentia 0, 4475. Deinde si arcus descriptus augetur in ratione $124\frac{1}{2}$ ad $67\frac{1}{2}$, differentia ista 0, 4475 augetur in duplicata illa ratione, adeoque evaderet 1, 5295. Hæc ita se haberent, ex hypothefi quod resistentia Penduli esset in duplicata illa ratione velocitatis. Ergo si pendulum describeret arcum totum $124\frac{1}{2}$ digitorum, & longitudo ejus inter punctum suspensionis & centrum oscillationis esset 126 digitorum, differentia arcuum descensu & subsequente ascensu descriptorum foret 1, 5295 digitorum. Et hæc differentia ducta in pondus Globi penduli, quod erat unciarum 208, producit 318, 136. Rursus ubi pendulum superius ex Globo ligneo constructum, centro oscillationis, quod a puncto suspensionis digitos 126 distabat, describebat arcum totum $124\frac{1}{2}$ digitorum, differentia arcuum descensu & ascensu descriptum fuit $\frac{126}{121}$ in $\frac{8}{91}$, quæ ducta in pondus Globi, quod erat unciarum 57,7, producit 49, 396. Duxi autem differentias hæc in pondera Globorum ut invenirem eorum resistentias. Nam differentię oriuntur

untur ex resistentiis, suntque ut resistentiæ directe & pondera inverse. Sunt igitur resistentiæ ut numeri 318, 136 & 49, 396. Pars autem resistentiæ Globi minoris, quæ est in duplicata ratione velocitatis, erat ad resistentiam totam, ut 0,56752 ad 0,61675, id est, ut 45, 453 ad 49, 396; & pars resistentiæ Globi majoris propemodum æquatur ipsius resistentiæ toti; adeoque partes illæ sunt ut 318, 136 & 45, 453 quamproxime, id est, ut 7 & 1. Sunt autem Globorum diametri 18 $\frac{1}{2}$ & 6 $\frac{1}{2}$; & harum quadrata 351 $\frac{1}{4}$ & 47 $\frac{1}{4}$ sunt ut 7, 438 & 1, id est, ut Globorum resistentiæ 7 & 1 quamproxime. Differentia rationum haud major est quam quæ ex fili resistentia oriri potuit. Igitur resistentiarum partes illæ quæ sunt, paribus Globis, ut quadrata velocitatum; sunt etiam, paribus velocitatibus, ut quadrata diametrorum Globorum.

Cæterum Globorum, quibus usus sum in his experimentis, maximus non erat perfecte Sphæricus, & propterea in calculo hic allato minutias quasdam brevitatis gratia neglexi; de calculo accurato in experimento non satis accurato minime sollicitus. Optarim itaque (cum demonstratio Vacui ex his dependeat) ut experimenta cum Globis & pluribus & maioribus & magis accuratis tentarentur. Si Globi sumantur in proportionem Geometricam, puta quorum diametri sint digitorum 4, 8, 16, 32; ex progressionem experimentorum colligetur quid in Globis adhuc maioribus evenire debeat.

Jam vero conferendo resistentias diversorum Fluidorum inter se tentavi sequentia. Arcam ligneam paravi longitudine pedum quatuor, latitudine & altitudine pedis unius. Hanc operculo nudatam implevi aqua fontana, fecique ut immersa pendula in medio aquæ oscillando moverentur. Globus autem plumbeus pondere 166 $\frac{1}{2}$ unciarum, diametro 3 $\frac{1}{2}$ digitorum, movebatur ut in Tabula sequente descripsimus, existente videlicet longitudine penduli a puncto suspensionis ad punctum quoddam in filo notatum 126 digitorum, ad oscillationis autem centrum 134 $\frac{1}{2}$ digitorum.

<i>Arcus descensu primo a puncto in filo notato descriptus, digitorum</i>	64	32	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
<i>Arcus ascensu ultimo descriptus, digitorum</i>	48	24	12	6	3	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
<i>Arcuum differentia motui amisso proportionalis, digitorum</i>	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
<i>Numerus Oscillationum in aqua</i>						11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	
<i>Numerus Oscillationum in aere</i>	85 $\frac{1}{2}$					287	535		
	O o								In

DE MOTU
CORPORUM

In experimento columnæ quartæ, motus æquales oscillationibus 535 in aere, & 17 in aqua amissi sunt. Erant quidem oscillationes in aere paulo celeriores quam in aqua. At si oscillationes in aqua in ea ratione accelerarentur ut motus pendulorum in Medio utroque fierent æquivalentes, maneret numerus idem oscillationum 17 in aqua, quibus motus idem ac prius amitteretur; ob resistantiam auctam & simul quadratum temporis diminutum in eadem ratione illa duplicata. Paribus igitur pendulorum velocitatibus motus æquales in aere oscillationibus 535 & in aqua oscillationibus 17 amissi sunt; ideoque resistantia penduli in aqua est ad ejus resistantiam in aere ut 535 ad 17. Hæc est proportio resistantiarum totarum in casu columnæ quartæ.

Designet jam $AV + CV^2$ differentiam arcuum in descensu & subsequente ascensu descriptorum a Globo, in Aere cum velocitate maxima V moto; & cum velocitate maxima, in casu columnæ quartæ, sit ad velocitatem maximam in casu columnæ primæ, ut 1 ad 8; & differentia illa arcuum, in casu columnæ quartæ, ad differentiam in casu columnæ primæ ut $\frac{2}{535}$ ad $\frac{16}{85}$, seu ut 85 ad 4280: scribamus in his casibus 1 & 8 pro velocitatibus, atque 85 & 4280 pro differentiis arcuum, & fiet $A + C = 85$ & $8A + 64C = 4280$ seu $A + 8C = 535$; indeque per reductionem æquationum proveniet $7C = 449$ & $C = 64\frac{1}{7}$ & $A = 21\frac{1}{7}$: atque adeo resistantia, cum sit ut $\frac{1}{2}AV + \frac{1}{2}CV^2$, erit ut $13\frac{1}{2}V + 48\frac{1}{2}V^2$. Quare in casu columnæ quartæ, ubi velocitas erat 1, resistantia tota est ad partem suam quadrato velocitatis proportionalem, ut $13\frac{1}{2} + 48\frac{1}{2}$ seu 61 ad 48; & idcirco resistantia penduli in aqua est ad resistantiæ partem illam in aere quæ quadrato velocitatis proportionalis est, quæque sola in motibus velocioribus considerata venit, ut 61 ad 48 & 535 ad 17 conjunctim, id est, ut 571 ad 1. Si penduli in aqua oscillantis filum totum fuisset immersum, resistantia ejus fuisset adhuc major; adeo ut penduli in aere oscillantis resistantia illa quæ velocitatis quadrato proportionalis est, quæque sola in corporibus velocioribus considerata venit, sit ad resistantiam ejusdem penduli totius, eadem cum velocitate, in aqua oscillantis, ut 800 vel 900 ad 1 circiter; hoc est, ut densitas aquæ ad densitatem aeris sumi quaproxime.

In hoc calculo sumi quoque deberet pars illa resistantiæ penduli in aqua, quæ esset ut quadratum velocitatis, sed (quod mirum forte videatur) resistantia in aqua augebatur in ratione velocitatis plus-

plusquam duplicata. Ejus rei causam investigando, in hanc incidi, LIBER
SECUNDUS.
 quod Arca nimis angusta esset pro magnitudine Globi penduli, &
 motum aquæ cedentis præ angustia sua nimis impediabat. Nam si
 Globus pendulus, cujus diameter erat digiti unius, immergeretur;
 resistentia augebatur in duplicata ratione velocitatis quamproxime.
 Id tentabam construendo pendulum ex Globis duobus, quorum
 inferior & minor oscillaretur in aqua, superior & major proxime
 supra aquam filo affixus esset, & in Aere oscillando, adjuvaret mo-
 tum penduli eumque diuturniorem redderet. Experimenta au-
 tem hoc modo instituta se habebant ut in Tabula sequente de-
 scribitur.

<i>Arcus descensu primo descriptus</i>	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
<i>Arcus ascensu ultimo descriptus</i>	12	6	3	$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
<i>Arcuum diff. motui amisso proport.</i>	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
<i>Numerus Oscillationum</i>		$3\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	$21\frac{1}{2}$	34	$53\frac{1}{2}$

Conferendo resistentias Mediorum inter se, effeci etiam ut pen-
 dula ferrea oscillarentur in argento vivo. Longitudo fili ferrei erat
 pedom quasi trium, & diameter Globi penduli quasi tertia pars di-
 giti. Ad filum autem proxime supra Mercurium affixus erat Glo-
 bus alius plumbeus satis magnus ad motum penduli diutius conti-
 nuandum. Tum vasculum, quod capiebat quasi libras tres argenti
 vivi, implebam vicibus alternis argento vivo & aqua communi, ut
 pendulo in Fluido utroque successive oscillante, invenirem propor-
 tionem resistentiarum: & prædiit resistentia argenti vivi ad resisten-
 tiam aquæ, ut 13 vel 14 ad 1 circiter: id est, ut densitas argenti
 vivi ad densitatem aquæ. Ubi Globum pendulum paulo majorem
 adhibebam, puta cujus diameter esset quasi $\frac{1}{2}$ vel $\frac{3}{4}$ partes di-
 giti, prodibat resistentia argenti vivi in ea ratione ad resistentiam
 aquæ quam habet numerus 12 vel 10 ad 1 circiter. Sed experi-
 mento priori magis fidendum est, propterea quod in his ultimis
 Vas nimis angustum fuit pro magnitudine Globi immersi. Am-
 pliatio Globo, deberet etiam Vas ampliari. Constitueram quidem
 hujusmodi experimenta in vasis majoribus & in liquoribus tum
 Metallorum fusorum, tum aliis quibusdam tam calidis quam frigi-
 dis repetere: sed omnia experiri non vacat, & ex jam descriptis
 satis liquet resistentiam corporum celeriter motorum densitati Flui-
 dorum in quibus moventur proportionalem esse quam proxime.

Non dico accurate. Nam Fluida tenaciora, pari densitate, procu-
 dubio

DE MOTO
CORPORUM. dubio magis resistunt quam liquidiora, ut Oleum frigidum quam calidum, calidum quam aqua pluvialis, aqua quam Spiritus Vini. Verum in liquoribus qui ad sensum satis fluidi sunt, ut in Aere, in Aqua seu dulci seu falsa, in Spiritibus Vini, Terebinthi & Salium, in Oleo a facibus per distillationem liberato & calefacto, Oleoque Vitrioli & Mercurio, ac Metallis liquefactis, & siqui sint alii, qui tam fluidi sunt ut in vasis agitati motum impressum diutius conservent, effusique liberrime in guttas decurrendo resolvantur, nullus dubito quin regula allata satis accurate obtineat: præsertim si experimenta in corporibus pendulis & majoribus & velocius motis instituantur.

Denique cum receptissima Philosophorum ætatis hujus opinio sit, Medium quoddam æthereum & longe subtilissimum extare, quod omnes omnium corporum poros & meatus liberrime permeet; a tali autem Medio per corporum poros fluente resistentia oriri debeat: ut tentarem an resistentia, quam in motis corporibus experimur, tota sit in eorum externa superficie, an vero partes etiam internæ in superficiebus propriis resistentiam notabilem sentiant, excogitavi experimentum tale. Filo pedum undecim longitudinis, ab unco chalybeo satis firmo, mediante annulo chalybeo, suspendebam pyxidem abiernam rotundam, ad constituendum pendulum longitudinis prædictæ. Uncus sursum præacutus erat acie concava, ut annulus arcu suo superiore aciei innixus liberrime moveretur. Arcui autem inferiori annectebatur filum. Pendulum ita constitutum deducebam a perpendiculari ad distantiam quasi pedum sex, idque secundum planum aciei unci perpendicularare, ne annulus, oscillante pendulo, supra aciem unci ultro citroque laberetur. Nam punctum suspensionis, in quo annulus unicum tangit, immotum manere debet. Locum igitur accurate notabam, ad quem deduxeram pendulum, dein pendulo demisso notabam alia tria loca ad quæ redibat in fine oscillationis primæ, secundæ ac tertiæ. Hoc repetebam sæpius, ut loca illa quam potui accuratissime invenirem. Tum pyxidem plumbo & gravioribus, quæ ad manus erant, metallis implebam. Sed prius ponderabam pyxidem vacuum, una cum parte fili quæ circum pyxidem volvebatur ac dimidio partis reliquæ quæ inter unicum & pyxidem pendulam tendebatur. (Nam filum dimidio ponderis sui pendulum a perpendiculari digressum semper urget.) Huic ponderi addebam pondus Aeris quem pyxis capiebat. Et pondus totum erat quæ pars septuagesima octava pyxididis metallorum plenæ. Tum quoniam pyxis metallorum

tallorum plena, pondere suo tendendo filum, augebat longitudinem penduli, contrahebam filum ut penduli jam oscillantis eadem esset longitudo ac prius. Dein pendulo ad locum primo notatum retrac- to ac dimisso, numerabam oscillationes quasi septuaginta & septem, donec pyxis ad locum secundo notatum rediret, totidemque subin- de donec pyxis ad locum tertio notatum rediret, atque rursus to- tidem donec pyxis reditu suo attingeret locum quartum. Unde concludo quod resistentia tota pyxididis plenæ non majorem habebat proportionem ad resistentiam pyxididis vacuæ quam 78 ad 77. Nam si æquales essent ambarum resistentiæ, pyxis plena ob vim suam in- sitam septuagies & octies majorem vi insita pyxididis vacuæ, motum suum oscillatorium tanto diutius conservare deberet, atque adeo completis semper oscillationibus 78 ad loca illa notata redire. Re- diit autem ad eadem completis oscillationibus 77.

Designet igitur A resistentiam pyxididis in ipsius superficie exter- na, & B resistentiam pyxididis vacuæ in partibus internis; & si resi- stentiæ corporum æquielocum in partibus internis sint ut mate- ria, seu numerus particularum quibus resistitur: erit 78 B resisten- tia pyxididis plenæ in ipsius partibus internis: adeoque pyxididis va- cuæ resistentia tota $A + B$ erit ad pyxididis plenæ resistentiam to- tam $A + 78 B$ ut 77 ad 78, & divisim $A + B$ ad 77 B, ut 77 ad 1, indeque $A + B$ ad B ut 77×77 ad 1, & divisim A ad B ut 5928 ad 1. Est igitur resistentia pyxididis vacuæ in partibus internis quinquies millies minor quam ejusdem resistentia in externa super- ficie, & amplius. Sic vero disputamus ex Hypothesi quod major illa resistentia pyxididis plenæ, non ab alia aliqua causa latente oria- tur, sed ab actione sola Fluidi alicujus subtilis in metallum inclu- sum.

Hoc experimentum recitavi memoriter. Nam charta, in qua il- lud aliquando descripseram, intercidit. Unde fractas quasdam nu- merorum partes, quæ memoria exciderunt, omittere compulsus sum. Nam omnia denuo tentare non vacat. Prima vice, cum un- co infirmo usus essem, pyxis plena citius retardabatur. Causam quærendo, reperi quod uncus infirmus cedebat ponderi pyxididis, & ejus oscillationibus obsequendo in partes omnes flectebatur. Para- bam igitur uncum firmum, ut punctum suspensionis immotum ma- neret, & tunc omnia ita evenerunt uti supra descripsimus.

S E C T I O VII.

De Motu Fluidorum & Resistentia Projectilium.

PROPOSITIO XXXII. THEOREMA XXVI.

Si corporum Systemata duo similia ex æquali particularum numero consent, & particulae correspondentes similes sint & proportionales, singula in uno Systemate singulis in altero, & similiter sita inter se, ac datam habeant rationem densitatis ad invicem, & inter se temporibus proportionalibus similiter moveri incipiant, (ea inter se quæ in uno sunt Systemate & ea inter se quæ sunt in altero) & si non tangant se mutuo quæ in eodem sunt Systemate, nisi in momentis reflexionum, neque attrahant vel fugant se mutuo, nisi viribus acceleratricibus quæ sint ut particularum correspondentium diametri inverse & quadrata velocitatum directe: dico quod Systematum particulae illæ pergent inter se temporibus proportionalibus similiter moveri.

Corpora similia & similiter sita temporibus proportionalibus inter se similiter moveri dico, quorum situs ad invicem in fine temporum illorum semper sunt similes: puta si particulae unius Systematis cum alterius particulis correspondentibus conferantur. Unde tempora erunt proportionalia, in quibus similes & proportionales Figurarum similium paries a particulis correspondentibus describuntur. Igitur si duo sint ejusmodi Systemata, particulae correspondentes, ob similitudinem inceptorum motuum, pergent similiter moveri usque donec sibi mutuo occurrant. Nam si nullis agitantur viribus, progredientur uniformiter in lineis rectis per motus Leg. 1. Si viribus aliquibus se mutuo agitant, & vires illæ sint ut particularum correspondentium diametri inverse & quadrata velotatum directe; quoniam particularum situs sunt similes & vires proportionales, vires totæ quibus particulae correspondentes agitantur, ex viribus singulis agitantibus (per Legum Corollarium secundum)

secundum) compositæ, similes habebunt determinationes, perinde ac si centra inter particulas similiter sita respicerent; & erunt vires illæ totæ ad invicem ut vires singulæ componentes, hoc est, ut correspondentium particularum diametri inverse, & quadrata velocitatum directe: & propterea efficient ut correspondentes particulæ figuras similes describere pergant. Hæc ita se habebunt per Corol. 1. & 8. Prop. 14. Lib. 1. si modo centra illa quiescant. Sin moveantur, quoniam ob translationum similitudinem, similes manent eorum situs inter Systematum particulas; similes inducuntur mutationes in figuris quas particulæ describunt. Similes igitur erunt correspondentium & similium particularum motus usque ad occursum suos primos, & propterea similes occursum, & similes reflexiones, & subinde (per jam ostensa) similes motus inter se, donec iterum in se mutuo inciderint, & sic deinceps in infinitum. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si corpora duo quævis, quæ similia sint & ad Systematum particulas correspondentes similiter sita, inter ipsas temporibus proportionalibus similiter moveri incipiant, sintque eorum magnitudines ac densitates ad invicem ut magnitudines ac densitates correspondentium particularum: hæc pergent temporibus proportionalibus similiter moveri. Est enim eadem ratio partium majorum Systematis utriusque atque particularum.

Corol. 2. Et si similes & similiter positæ Systematum partes omnes quiescant inter se: & earum duæ, quæ cæteris majores sint, & sibi mutuo in utroque Systemate correspondeant, secundum lineas similiter sitas simili cum motu utcumque moveri incipiant: hæc similes in reliquis Systematum partibus excitabunt motus, & pergent inter ipsas temporibus proportionalibus similiter moveri; atque adeo spatia diametris suis proportionalia describere.

PROPOSITIO XXXIII. THEOREMA XXVII.

Isdem positis, dico quod Systematum partes majores, resistunt in ratione composita ex duplicata ratione velocitatum suarum & duplicata ratione diametrorum & ratione densitatis partium Systematum.

Nam resistantia oritur partim ex viribus centripetis vel centrifugis quibus particulæ Systematum se mutuo agitant, partim ex occursum & reflexionibus particularum & partium majorum.

Prioris.

DE MOTU
CORPORUM

Prioris autem generis resistentiæ sunt ad invicem ut vires totæ motrices a quibus oriuntur; id est, ut vires totæ acceleratrices & quantitates materiæ in partibus correspondentibus; hoc est (per Hypothefin) ut quadrata velocitatum directæ & distantiae particularum correspondentium inverse & quantitates materiæ in partibus correspondentibus directæ: ideoque (cum distantiae particularum Systematis unius sint ad distantias correspondentes particularum alterius, ut diameter particulæ vel partis in Systemate prioris ad diametrum particulæ vel partis correspondentis in altero, & quantitates materiæ sint ut densitates partium & cubi diametrorum) resistentiæ sunt ad invicem ut quadrata velocitatum & quadrata diametrorum & densitates partium Systematum. *Q. E. D.* Posterioris generis resistentiæ sunt ut reflexionum correspondentium numeri & vires conjunctim. Numeri autem reflexionum sunt ad invicem ut velocitates partium correspondentium directæ, & spatia inter earum reflexiones inverse. Et vires reflexionum sunt ut velocitates & magnitudines & densitates partium correspondentium conjunctim; id est, ut velocitates & diametrorum cubi & densitates partium. Et conjunctis his omnibus rationibus, resistentiæ partium correspondentium sunt ad invicem ut quadrata velocitatum & quadrata diametrorum & densitates partium conjunctim. *Q. E. D.*

Corol. 1. Igitur si Systemata illa sint Fluida duo Elastica ad modum Aeris, & partes eorum quiescant inter se: corpora autem duo similia & partibus fluidorum quoad magnitudinem & densitatem proportionalia, & inter partes illas similiter posita, secundum lineas similiter positas utcumque projiciantur; vires autem acceleratrices, quibus particulæ Fluidorum se mutuo agitant, sint ut corporum projectorum diametri inverse, & quadrata velocitatum directæ: corpora illa temporibus proportionalibus similes excitabunt motus in Fluidis, & spatia similia ac diametris suis proportionalia describent.

Corol. 2. Proinde in eodem Fluido projectile velox resistentiam patitur quæ est in duplicata ratione velocitatis quamproxime. Nam si vires, quibus particulæ distantes se mutuo agitant, augerentur in duplicata ratione velocitatis, resistentia foret in eadem ratione duplicata accurate: ideoque in Medio, cujus partes ab invicem distantes sese viribus nullis agitant, resistentia est in duplicata ratione velocitatis accurate. Sunt igitur Media tria *A, B, C* ex partibus similibus & æqualibus & secundum distantias æquales regulariter dispo-

dispositis constantia. Partes Mediorum A & B fugiant se mutuo viribus quæ sint ad invicem ut T & V , illæ Medii C ejusmodi viribus omnino destituantur. Et si corpora quatuor æqualia D , E , F , G in his Mediis moveantur, priora duo D & E in prioribus duobus A & B , & altera duo F & G in tertio C ; sitque velocitas corporis D ad velocitatem corporis E , & velocitas corporis F ad velocitatem corporis G , in subduplicata ratione virium T ad vires V : resistentia corporis D erit ad resistentiam corporis E , & resistentia corporis F ad resistentiam corporis G , in velocitatum ratione duplicata; & propterea resistentia corporis D erit ad resistentiam corporis F ut resistentia corporis E ad resistentiam corporis G . Sunt corpora D & F æquielocia ut & corpora E & G ; & augendo velocitates corporum D & F in ratione quacunque, ac diminuendo vires particularum Medii B in eadem ratione duplicata, accedet Medium B ad formam & conditionem Medii C pro lubitu, & ideo resistentiæ corporum æqualium & æquielocium E & G in his Mediis, perpetuo accedent ad æqualitatem, ita ut earum differentia evadat tandem minor quam data quævis. Proinde cum resistentiæ corporum D & F sint ad invicem ut resistentiæ corporum E & G , accedent etiam hæc similiter ad rationem æqualitatis. Corporum igitur D & F , ubi velocissime moventur, resistentiæ sunt æquales quam proxime: & propterea cum resistentia corporis F sit in duplicata ratione velocitatis, erit resistentia corporis D in eadem ratione quam proxime.

Corol. 3. Igitur corporis in Fluido quovis Elastico velocissime moti eadem fere est resistentia ac si partes Fluidi viribus suis centrifugis destituerentur, seque mutuo non fugerent: si modo Fluidi vis Elastica ex particularum viribus centrifugis oriatur & velocitas adeo magna sit ut vires non habeant satis temporis ad agendum.


Corol. 4. Proinde cum resistentiæ similium & æquielocium corporum in Medio cujus partes distantes se mutuo non fugiunt, sint ut quadrata diametrorum; sunt etiam æquielocium & celerem motorum corporum resistentiæ in Fluido Elastico ut quadrata diametrorum quam proxime.

Corol. 5. Et cum corpora similia, æqualia & æquielocia, in Mediis ejusdem densitatis, quorum particulæ se mutuo non fugiunt, sive particulæ illæ sint plures & minores, sive pauciores & majores, in æqualem materiæ quantitatem temporibus æqualibus impingant, eique æqualem motus quantitatem imprimant, & vi-

mittantur perpendiculares BE , DL , & vis qua particula Medii, secundum rectam FB oblique incidendo, Globum ferit in B , erit ad vim qua particula eadem Cylindrum $ONGQ$ axe ACI circa Globum descriptum perpendiculariter feriret in b , ut LD ad LB vel BE ad BC . Rursus efficacia hujus vis ad movendum Globum secundum incidentiæ suæ plagam FB vel AC , est ad ejusdem efficaciam ad movendum Globum secundum plagam determinationis suæ, id est, secundum plagam rectæ BC qua Globum directe urget, ut BE ad BC . Et conjunctis rationibus, efficacia particulæ, in Globum secundum rectam FB oblique incidentis, ad movendum eundem secundum plagam incidentiæ suæ, est ad efficaciam particulæ ejusdem secundum eandem rectam in Cylindrum perpendiculariter incidentis, ad ipsum movendum in plagam eandem, ut BE quadratum ad BC quadratum. Quare si ad Cylindri basem circulem NAO erigatur perpendiculum bHE , & sit bE æqualis radio AC , & bH æqualis $\frac{BE \text{ quad.}}{CB}$: erit bH ad bE ut effectus particulæ in Globum ad effectum particulæ in Cylindrum. Et propterea solidum quod a rectis omnibus bH occupatur erit ad solidum quod a rectis omnibus BE occupatur, ut effectus particularum omnium in Globum ad effectum particularum omnium in Cylindrum. Sed solidum prius est parabolis vertice C , axe CA & latere recto CA descriptum, & solidum posterius est Cylindrus Paraboloidi circumscriptus: & notum est quod Parabolis sit semissis Cylindri circumscripti. Ergo vis tota Medii in Globum est duplo minor quam ejusdem vis tota in Cylindrum. Et propterea si particulæ Medii quiescerent, & Cylindrus ac Globus æquali cum velocitate moverentur, foret resistentia Globi duplo minor quam resistentia Cylindri. $Q. E. D.$

Scholium.

Eadem methodo Figuræ aliæ inter se quoad resistentiam comparari possunt, eæque inveniri quæ ad motus suos in Mediis resistentibus continuandos aptiores sunt. Ut si basē circuli $CEBH$, quæ centro O , radio OC describitur, & altitudine OD , construendum sit frustum Coni $CBGF$, quod omnium eadem basī & altitudine constructorum & secundum plagam



Globus vel Cylindrus incidit, vi reflexionis quam maxima resiliant. Et cum resistentia Globi (per Propositionem novissimam) sit duplo minor quam resistentia Cylindri, & Globus sit ad Cylindrum ut duo ad tria, & Cylindrus incidendo perpendiculariter in particulas ipsasque quam maxime reflectendo, duplam sui ipsius velocitatem ipsis communicet: Cylindrus quo tempore dimidiam longitudinem axis sui describit communicabit motum particulis qui sit ad totum Cylindri motum ut densitas Medii ad densitatem Cylindri; & Globus quo tempore totam longitudinem diametri suæ describit, communicabit motum eundem particulis; & quo tempore duas tertias partes diametri suæ describit communicabit motum particulis qui sit ad totum Globi motum ut densitas Medii ad densitatem Globi. Et propterea Globus resistentiam patitur quæ sit ad vim qua totus ejus motus vel auferri possit vel generari quo tempore duas tertias partes diametri suæ describit, ut densitas Medii ad densitatem Globi.

Caf. 2. Ponamus quod particulæ Medii in Globum vel Cylindrum incidentes non reflectantur; & Cylindrus incidendo perpendiculariter in particulas simplicem suam velocitatem ipsis communicabit, ideoque resistentiam patitur duplo minorem quam in priore casu, & resistentia Globi erit etiam duplo minor quam prius.

Caf. 3. Ponamus quod particulæ Medii vi reflexionis neque maxima neque nulla, sed mediocri aliqua resiliant a Globo; & resistentia Globi erit in eadem ratione mediocri inter resistentiam in primo casu & resistentiam in secundo. *Q. E. I.*

Corol. 1. Hinc si Globus & particulæ sint infinite dura, & vi omni elastica & propterea etiam vi omni reflexionis destituta: resistentia Globi erit ad vim qua totus ejus motus vel auferri possit vel generari, quo tempore Globus quatuor tertias partes diametri suæ describit, ut densitas Medii ad densitatem Globi.

Corol. 2. Resistentia Globi, cæteris paribus, est in duplicata ratione velocitatis.

Corol. 3. Resistentia Globi, cæteris paribus, est in duplicata ratione diametri.


Corol. 4. Resistentia Globi, cæteris paribus, est ut densitas Medii.

Corol. 5. Resistentia Globi est in ratione quæ componitur ex duplicata ratione velocitatis & duplicata ratione diametri & ratione densitatis Medii.

PR MOTU
CORPORUM,

Corol. 6. Et motus Globi cum ejus resistentia sic exponi potest.

Sit AB tempus quo Globus per resistentiam suam uniformiter continuatam totum suum motum amittere potest. Ad AB erigantur perpendiculara AD , BC . Sitque BC motus ille totus, & per punctum C Asymptotis AD , AB describatur Hyperbola CF . Producat AB ad punctum quodvis E . Erigatur perpendicularum EF Hyperbolæ occurrens in F . Compleatur parallelogrammum $CBEF$, & agatur AF ipsi BC occurrens in H . Et si Globus tempore quovis BE , motu suo primo BC uniformiter continuato, in Medio non resistente describat spatium $CBEF$ per aream parallelogrammi expositum, idem in Medio resistente describet spatium $CBEF$ per aream Hyperbolæ expositum, & motus ejus in fine temporis illius exponetur per Hyperbolæ ordinatam EF , amissa motus ejus parte FG . Et resistentia ejus in fine temporis ejusdem exponetur per longitudinem BH , amissa resistentiæ parte CH . Patent hæc omnia per *Corol. 1. Prop. v. Lib. II.*



Corol. 7. Hinc si Globus tempore T per resistentiam R uniformiter continuatam amittat motum suum totum M : idem Globus tempore t in Medio resistente, per resistentiam R in duplicata velocitatis ratione decrefcentem, amittet motus sui M partem $\frac{tM}{T+t}$, manente parte $\frac{TM}{T+t}$, & describet spatium quod sit ad spatium motu uniformi M eodem tempore t descriptum, ut Logarithmus numeri $\frac{T+t}{T}$ multiplicatus per numerum 2,302585092994 est ad numerum $\frac{t}{T}$. Nam area Hyperbolica $BCFE$ est ad rectangulum $BCGE$ in hac proportionem.

Scholium.


In hac Propositione exposui resistentiam & retardationem Projectilium Sphæricorum in Mediis non continuis, & ostendi quod hæc resistentia sit ad vim qua totus Globi motus vel tolli possit vel generari

generari quo tempore Globus duas tertias diametri suæ partes, velocitate uniformiter continuata describat, ut densitas Medii ad densitatem Globi, si modo Globus, & particulæ Medii sint summe elastica & vi maxima reflectendi polleant: quodque hæc vis sit duplo minor ubi Globus & particulæ Medii sunt infinite dura & vi reflectendi prorsus destituta. In Mediis autem continuis qualia sunt Aqua, Oleum calidum, & Argentum vivum, in quibus Globus non incidit immediate in omnes fluidi particulas resistentiam generantes, sed premit tantum proximas particulas & hæc premunt alias & hæc alias, resistentia est adhuc duplo minor. Globus utique in huiusmodi Mediis fluidissimis resistentiam patitur quæ est ad vim qua totus ejus motus vel tolli possit vel generari quo tempore, motu illo uniformiter continuato, partes octo tertias diametri suæ describat, ut densitas Medii ad densitatem Globi. Id quod in sequentibus cobinabimur ostendere.

PROPOSITIO XXXVI. PROBLEMA VIII.

Aquæ de vase Cylindrico per foramen in fundo factum esfluentis definire motum.

Sit $ACDB$ vas cylindricum, AB ejus orificium superius, CD fundum horizonti parallelum, EF foramen circulare in medio fundi, G centrum foraminis, & GH axis cylindri horizonti perpendicularis. Et concipe cylindrum glaciei $APQB$ ejusdem esse latitudinis cum cavitate vasis, & axem eundem habere, & uniformi cum motu perpetuo descendere, & partes ejus quam primum attingunt superficiem AB liquefcere, & in aquam conversas gravitate sua defluere in vas, & cataractam vel columnam aquæ $ABNFEM$ cadendo formare, & per foramen EF transire, idemque adæquate implere. Ea vero sit uniformis velocitas glaciei descendentis ut & aquæ contiguae in circulo AB , quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IH acquirere potest; & jaceant IH & HG in directum, & per punctum I ducatur recta KL horizonti parallela lateribus glaciei.



DE MOTU
CORPORUM.

ciei occurrens in *K* & *L*. Et velocitas aquæ effluentis per foramen *EF* ea erit quam aqua cadendo ab *I* & casu suo describendo altitudinem *IG* acquirere potest. Ideoque per Theoremata *Galilei* erit *IG* ad *IH* in duplicata ratione velocitatis aquæ per foramen effluentis ad velocitatem aquæ in circulo *AB*, hoc est, in duplicata ratione circuli *AB* ad circulum *EF*; nam hi circuli sunt reciproce ut velocitates aquarum quæ per ipsos, eodem tempore & æquali quantitate, adæquate transcunt. De velocitate aquæ horizontem versus hic agitur. Et motus horizonti parallelus quo partes aquæ cadentis ad invicem accedunt, cum non oriatur a gravitate, nec motum horizonti perpendicularem a gravitate oriundum mutet, hic non consideratur. Supponimus quidem quod partes aquæ aliquantulum cohæreant, & per cohæsionem suam inter cadendum accedant ad invicem per motus horizonti parallelos, ut unicam tantum efforment cataractam & non in plures cataractas dividantur: sed motum horizonti parallelum, a cohæsione illa oriundum, hic non consideramus.

Cas. 1. Concipe jam cavitatem totam in vase, in circuitu aquæ cadentis *ABNFEM*, glacie plenam esse, ut aqua per glaciem tantum per infundibulum transeat. Et si aqua glaciem tantum non tangat vel, quod perinde est, si tangat & per glaciem propter summam ejus polituram quam liberrime & sine omni resistentia labatur; hæc defluet per foramen *EF* eadem velocitate ac prius, & pondus totum columnæ aquæ *ABNFEM* impendetur in defluxum ejus generandum uti prius, & fundum vasis sustinebit pondus glaciei columnam ambientis.

Liquefcat jam glacies in vase; & effluxus aquæ quoad velocitatem, idem manebit ac prius. Non minor erit, quia glacies in aquam resoluta conabitur descendere: non major, quia glacies in aquam resoluta non potest descendere nisi impediendo descensum aquæ alterius descensui suo æqualem. Eadem vis eandem aquæ effluentis velocitatem generare debet.


Sed foramen in fundo vasis, propter obliquos motus particularum aquæ effluentis, paulo majus esse debet quam prius. Nam particularæ aquæ jam non transcunt omnes per foramen perpendiculariter, sed a lateribus vasis undique confluentes & in foramen convergentes, obliquis transcunt motibus; & cursum suum deorsum flectentes in venam aquæ exilientis conspirant, quæ exilior est paulo infra foramen quam in ipso foramine, existente ejus diametro ad diametrum foraminis ut 5 ad 6 , vel $5\frac{1}{2}$ ad $6\frac{1}{2}$ quam proxime, si modo

DE MOTU
CORPORUM,

dem velocitatem acquirit in utroque casu, ut *Galileus* demonstravit.

Caf. 3. Eadem est aquæ velocitas effluentis per foramen in latere vasis. Nam si foramen parvum sit, ut intervallum inter superficies *AB* & *KL* quoad sensum evanescat, & vena aquæ horizontaliter exilientis figuram Parabolicam efformet: ex latere recto hujus Parabolæ colligetur, quod velocitas aquæ effluentis ea sit quam corpus ab aquæ in vase stagnantis altitudine *HG* vel *IG* cadendo acquirere potuisset. Facto utique experimento inveni quod, si altitudo aquæ stagnantis supra foramen esset viginti digitorum & altitudo foraminis supra planum horizonti parallelum esset quoque viginti digitorum, vena aquæ prosilientis incideret in planum illud ad distantiam digitorum 37 circiter a perpendiculari quod in planum illud a foramine demittebatur captam. Nam sine resistentia vena incidere debuisset in planum illud ad distantiam digitorum 40, existente venæ Parabolicæ latere recto digitorum 80.

Caf. 4. Quinetiam aqua effluens, si sursum feratur, eadem egreditur cum velocitate. Ascendit enim aquæ exilientis vena parva motu perpendiculari ad aquæ in vase stagnantis altitudinem *GH* vel *GI*, nisi quatenus ascensus ejus ab aeris resistentia aliquantulum impediatur; ac proinde ea effluit cum velocitate quam ab altitudine illa cadendo acquirere potuisset. Aquæ stagnantis particula unaquæque undique premitur æqualiter, per Prop. xix. Lib. II, & pressioni cedendo æquali impetu in omnes partes fertur, sive descendat per foramen in fundo vasis, sive horizontaliter effluat per foramen in ejus latere, sive egrediatur in canalem & inde ascendat per foramen parvum in superiore canalis parte factum. Et velocitatem qua aqua effluit, eam esse quam in hac Propositione assignavimus, non solum ratione colligitur, sed etiam per experimenta notissima jam descripta manifestum est.



Caf. 5. Eadem est aquæ effluentis velocitas sive figura foraminis sit circularis sive quadrata vel triangularis aut alia quæcunque circulari æqualis. Nam velocitas aquæ effluentis non pendet a figura foraminis sed ab ejus altitudine infra planum *KL*.

Caf. 6. Si vasis *ABDC* pars inferior in aquam stagnantem immergatur,

emergatur, & altitudo aquæ stagnantis supra fundum vasis sit GR : L I B E R
 velocitas quacum aqua quæ in vase est, effluet per foramen EF S E C U N D U S,
 in aquam stagnantem, ea erit quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IR acquirere potest. Nam pondus aquæ omnis in vase quæ inferior est superficie aquæ stagnantis, sustinebitur in æquilibrio per pondus aquæ stagnantis, ideoque motum aquæ descendens in vase minime accelerabit. Patebit etiam & hic Casus per Experimenta, mensurando scilicet tempora quibus aqua effluit.

Corol. 1. Hinc si aquæ altitudo CA producat ad K , ut sit AK ad CK in duplicata ratione areæ foraminis in quavis fundi parte facti, ad aream circuli AB : velocitas aquæ effluentis æqualis erit velocitati quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem KC acquirere potest.

Corol. 2. Et vis qua totus aquæ exilientis motus generari potest, æqualis est ponderi Cylindricæ columnæ aquæ cujus basis est foramen EF , & altitudo $\frac{1}{2} GI$ vel $\frac{1}{2} CK$. Nam aqua exiliens quo tempore hanc columnam æquat, pondere suo ab altitudine GI cadendo, velocitatem suam qua exilit, acquirere potest.

Corol. 3. Pondus aquæ totius in vase $ABDC$, est ad ponderis partem quæ in defluxum aquæ impenditur, ut summa circulorum AB & EF , ad duplum circulum EF . Sit enim IO media proportionalis inter IH & IG ; & aqua per foramen EF egrediens, quo tempore gutta cadendo ab I describere posset altitudinem IG , æqualis erit Cylindro cujus basis est circulus EF , & altitudo est $\frac{1}{2} IG$, id est, Cylindro cujus basis est circulus AB & altitudo est $\frac{1}{2} IO$, nam circulus EF est ad circulum AB in subduplicata ratione altitudinis IH ad altitudinem IG , hoc est, in simplici ratione mediæ proportionalis IO ad altitudinem IG : & quo tempore gutta cadendo ab I describere potest altitudinem IH , aqua egrediens æqualis erit Cylindro cujus basis est circulus AB & altitudo est $\frac{1}{2} IH$: & quo tempore gutta cadendo ab I per H ad G describit altitudinum differentiam HG , aqua egrediens, id est, aqua tota in solido $ABNFEM$ æqualis erit differentię Cylindrorum, id est, Cylindro cujus basis est AB & altitudo $\frac{1}{2} HO$. Et propterea aqua tota in vase $ABDC$ est ad aquam totam cadentem in solido $ABNFEM$ ut HG ad $\frac{1}{2} HO$, id est, ut $HO + OG$ ad $\frac{1}{2} HO$, seu $IH + IO$ ad $\frac{1}{2} IH$. Sed pondus aquæ totius in solido $ABNFEM$ in aquæ defluxum impenditur: ac proinde pondus

Qq 2

De Motu
Corporum,


das aquæ totius in vase est ad ponderis partem quæ in defluxum aquæ impenditur, ut $IH+IO$ ad $2 IH$, atque adeo ut summa circulorum EF & AB ad duplum circulum EF .

Corol. 4. Et hinc pondus aquæ totius in vase $ABDC$, est ad ponderis partem alteram quam fundum vasis sustinet, ut summa circulorum AB & EF , ad differentiam eorundem circulorum.

Corol. 5. Et ponderis pars quam fundum vasis sustinet, est ad ponderis partem alteram quæ in defluxum aquæ impenditur, ut differentia circulorum AB & EF , ad duplum circulum minorem EF , five ut area fundi ad duplum foramen.

Corol. 6. Ponderis autem pars qua sola fundum urgetur, est ad pondus aquæ totius quæ fundo perpendiculariter incumbit, ut circulus AB ad summam circulorum AB & EF , five ut circulus AB ad excessum dupli circuli AB supra fundum. Nam ponderis pars qua sola fundum urgetur, est ad pondus aquæ totius in vase, ut differentia circulorum AB & EF , ad summam eorundem circulorum, per *Cor. 4*; & pondus aquæ totius in vase est ad pondus aquæ totius quæ fundo perpendiculariter incumbit, ut circulus AB ad differentiam circulorum AB & EF . Itaque ex æquo perturbate, ponderis pars qua sola fundum urgetur, est ad pondus aquæ totius quæ fundo perpendiculariter incumbit, ut circulus AB ad summam circulorum AB & EF vel excessum dupli circuli AB supra fundum.

Corol. 7. Si in medio foraminis EF locetur Circellus PQ centro G descriptus & horizonti parallelus; pondus aquæ quam circellus ille sustinet, majus est pondere tertiæ partis Cylindri aquæ cujus basis est circellus ille & altitudo est GH . Sit enim $ABNFEM$ catarafta vel columna aquæ cadentis axem habens GH ut supra, & congelari intelligatur aqua omnis in vase, tam in circuitu cataraftæ quam supra circellum, cujus fluiditas ad promptissimum



& celerimum aquæ descensum non requiritur. Et sit PHQ columna aquæ supra circellum congelata, verticem habens H & altitudinem GH . Et quemadmodum aqua in circuitu cataraftæ congelata $AMEC$, $BNFD$ convexa est in superficie interna AME , BNF versus cataraftam cadentem, sic etiam hæc columna PHQ

con-

convexa erit versus cataractam, & propterea major Cono cuius basis est circellus ille PQ & altitudo GH , id est, major tertia parte Cylindri eadem base & altitudine descripti. Sustinet autem circellus ille pondus hujus columnæ, id est, pondus quod pondere Coni seu tertiæ partis Cylindri illius majus est.

Corol. 8. Pondus aquæ quam circellus valde parvus PQ sustinet, minor est pondere duarum tertiarum partium Cylindri aquæ cuius basis est circellus ille & altitudo est HG . Nam instantibus jam potitis, describi intelligatur dimidium Sphæroidis cuius basis est circellus ille & semiaxis sive altitudo est HG . Et hæc figura æqualis erit duabus tertiis partibus Cylindri illius & comprehendet columnam aquæ congelatæ PHQ cuius pondus circellus ille sustinet. Nam ut motus aquæ sit maxime directus, columnæ illius superficies externa concurret cum basi PQ in angulo nonnihil acuto, propterea quod aqua cadendo perpetuo acceleratur & propter accelerationem fit tenuior; & cum angulus ille sit recto minor, hæc columna ad inferiores ejus partes jacebit intra dimidium Sphæroidis. Eadem vero sursum acuta erit seu cuspidata, ne horizontalis motus aquæ ad verticem Sphæroidis sit infinite velocior quam ejus motus horizontem versus. Et quo minor est circellus PQ , eo acutior erit vertex columnæ; & circello in infinitum diminuto, angulus PHQ in infinitum diminuetur, & propterea columna jacebit intra dimidium Sphæroidis. Est igitur columna illa minor dimidio Sphæroidis, seu duabus tertiis partibus Cylindri cuius basis est circellus ille & altitudo GH . Sustinet autem circellus vim aquæ ponderi hujus columnæ æqualem, cum pondus aquæ ambientis in defluxum ejus impendatur.

Corol. 9. Pondus aquæ quam circellus valde parvus PQ sustinet, æquale est ponderi Cylindri aquæ cuius basis est circellus ille & altitudo est $\frac{1}{2}GH$ quamproxime. Nam pondus hocce est medium Arithmeticum inter pondera Coni & Hemisphæroidis prædictæ. At si circellus ille non sit valde parvus, sed augeatur donec æquet foramen EF : hic sustinebit pondus aquæ totius sibi perpendiculariter imminens, id est, pondus Cylindri aquæ cuius basis est circellus ille & altitudo est GH .

Corol. 10. Et (quantum sentio) pondus quod circellus sustinet, est semper ad pondus Cylindri aquæ cuius basis est circellus ille & altitudo est $\frac{1}{2}GH$, ut EFg ad EFg —: PQg , sive ut circulus EF ad excessum circuli hujus supra semissem circelli PQ quamproxime.

Qq 3

LEMMA.


Cylindri, qui secundum longitudinem suam uniformiter progreditur, resistentia ex aucta vel diminuta ejus longitudine non mutatur; ideoque eadem est cum resistentia Circuli eadem diametro descripti & eadem velocitate secundum lineam rectam plano ipsius perpendiculararem progredientis.

Nam latera Cylindri motui ejus minime opponuntur: & Cylindrus, longitudine ejus in infinitum diminuta, in Circulum vertitur.

PROPOSITIO XXXVII. THEOREMA XXIX.

Cylindri, qui in fluido compresso infinito & non elastico secundum longitudinem suam uniformiter progreditur, resistentia quæ oritur a magnitudine sectionis transversæ, est ad vim qua totus ejus motus interea dum quadruplum longitudinis suæ describit, vel tolli possit vel generari, ut densitas Medii ad densitatem Cylindri quamproxime.

Nam si vas *ABDC* fundo suo *CD* superficiem aquæ stagnantis tangat, & aqua ex hoc vase per canalem Cylindricum *EFTS* horizonti perpendicularem in aquam stagnantem effluat, locetur autem Circellus *PQ* horizonti parallelus ubivis in medio canalis, & producat *CA* ad *K*, ut sit *AK* ad *CK* in duplicata ratione quam habet excessus orificii canalis *EF* supra circellum *PQ* ad circulum *AB*: manifestum est (per Caf. 5, Caf. 6, & Cor. 1. Prop. xxxvi.) quod velocitas aquæ transeuntis per spatium annulare inter circellum & latera vasis, ea erit quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem *KC* vel *IG* acquirere potest.



Et

Et (per Cor. 10. Prop. xxxvi.) si vasis latitudo sit infinita, ut lineola HI evanescat & altitudines IG , HG æquantur: vis aquæ defluentis in circellum erit ad pondus Cylindri cuius basis est circellus ille & altitudo est IG , ut EFq ad $EFq - \frac{1}{2}PQq$ quam proxime. Nam vis aquæ, uniformi motu defluentis per totum canalem, eadem erit in circellum PQ in quacunque canalıs parte locatum.

Claudantur jam canalıs orificia EF , ST , & ascendat circellus in fluido undique compresso & ascensu suo cogat aquam superiorem descendere per spatium annulare inter circellum & latera canalıs: & velocitas circelli ascendentis erit ad velocitatem aquæ descendentis ut differentia circulorum EF & PQ ad circulum PQ , & velocitas circelli ascendentis ad summam velocitatum, hoc est, ad velocitatem relativam aquæ descendentis qua præterfluit circellum ascendentem, ut differentia circulorum EF & PQ ad circulum EF , five ut $EFq - PQq$ ad EFq . Sit illa velocitas relativa æqualis velocitati qua supra ostensum est aquam transire per idem spatium annulare dum circellus interea immotus manet, id est, velocitati quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IG acquirere potest: & vis aquæ in circellum ascendentem eadem erit ac prius, per Legum Cor. 5. id est, Resistentia circelli ascendentis erit ad pondus Cylindri aquæ cuius basis est circellus ille & altitudo est IG ut EFq ad $EFq - \frac{1}{2}PQq$ quam proxime. Velocitas autem circelli erit ad velocitatem quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IG acquirit, ut $EFq - PQq$ ad EFq .

Augeatur amplitudo canalıs in infinitum: & rationes illæ inter $EFq - PQq$ & EFq , interque EFq & $EFq - \frac{1}{2}PQq$ accedent ultimo ad rationes æqualitatis. Et propterea Velocitas circelli ea nunc erit quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IG acquirere potest, Resistentia vero ejus æqualis evadet ponderi Cylindri cuius basis est circellus ille & altitudo dimidium est altitudinis IG , a qua Cylindrus cadere debet ut velocitatem circelli ascendentis acquirat; & hac velocitate Cylindrus, tempore cadendi, quadruplum longitudinis suæ describet. Resistentia autem Cylindri, hac velocitate secundum longitudinem suam progredientis, eadem est cum resistentia circelli per Lemma IV; ideoque æqualis est Vi qua motus ejus, interea dum quadruplum longitudinis suæ describit, generari potest quamproxime.

DE MOTU
CORPORUM,

Si longitudo Cylindri augeatur vel minuatur: motus ejus ut & tempus quo quadruplum longitudinis suæ describit, augebitur vel minuetur in eadem ratione; adeoque vis illa qua motus auctus vel diminutus, tempore pariter aucto vel diminuto, generari vel tolli possit, non mutabitur; ac proinde etiamnum æqualis est resistentiæ Cylindri, nam & hæc quoque immutata manet per Lemma IV.

Si densitas Cylindri augeatur vel minuatur: motus ejus ut & Vis qua motus eodem tempore generari vel tolli potest, in eadem ratione augebitur vel minuetur. Resistentia itaque Cylindri cujuscunque erit ad Vim qua totus ejus motus, interea dum quadruplum longitudinis suæ describit, vel generari possit vel tolli, ut densitas Medii ad densitatem Cylindri quamproxime. *Q. E. D.*

Fluidum autem comprimi debet ut sit continuum, continuum vero esse & non elasticum ut pressio omnis quæ ab ejus compressione oritur propagetur in instanti &, in omnes moti corporis partes æqualiter agendo, resistentiam non mutet. Pressio utique quæ a motu corporis oritur, impenditur in motum partium fluidi generandum & Resistentiam creat. Pressio autem quæ oritur a compressione fluidi, utcunque fortis sit, si propagetur in instanti, nullum generat motum in partibus fluidi continui, nullam omnino inducit motus mutationem; ideoque resistentiam nec auget nec minuit. Certe Actio fluidi, quæ ab ejus compressione oritur, fortior esse non potest in partes posticas corporis moti quam in ejus partes anticæ, ideoque resistentiam in hac Propositione descriptam minuere non potest: & fortior non erit in partes anticæ quam in posticas, si modo propagatio ejus infinite velocior sit quam motus corporis pressi. Infinite autem velocior erit & propagabitur in instanti, si modo fluidum sit continuum & non elasticum.

Corol. 1. Cylindrorum, qui secundum longitudines suas in Mediis continuis infinitis uniformiter progrediuntur, resistentiæ sunt in ratione quæ componitur ex duplicata ratione velocitatum & duplicata ratione diametrorum & ratione densitatis Mediorum.


Corol. 2. Si amplitudo canalis non augeatur in infinitum, sed Cylindrus in Medio quiescente incluso secundum longitudinem suam progrediatur, & interea axis ejus cum axe canalis coincidat: Resistentia ejus erit ad vim qua totus ejus motus, quo tempore quadruplum longitudinis suæ describit, vel generari possit vel tolli, in ratione quæ componitur ex ratione EFq ad $EFq - \frac{1}{2}PQq$ semel

semel, & ratione EFq ad $EFq-PQq$ bis, & ratione densitatis Medii ad densitatem Cylindri. LIBER
SECUNDUS.

Corol. 3. hisdem positis, & quod longitudo L sit ad quadruplum longitudinis Cylindri in ratione quæ componitur ex ratione EFq — PQq ad EFq semel, & ratione $EFq-PQq$ ad EFq bis: resistentia Cylindri erit ad vim qua totus ejus motus, interea dum longitudinem L describit, vel tolli possit vel generari, ut densitas Medii ad densitatem Cylindri.

Scholium.

In hac Propositione resistentiam investigavimus quæ oritur a sola magnitudine transversæ sectionis Cylindri, neglecta resistentiæ parte quæ ab obliquitate motuum oriri possit. Nam quemadmodum in casu primo Propositionis xxxvi. obliquitas motuum quibus partes aquæ in vase, undique convergebant in foramen EF , impedivit effluxum aquæ illius per foramen: sic in hac Propositione, obliquitas motuum quibus partes aquæ ab anteriore Cylindri termino pressæ, cedunt pressioni & undique divergunt, retardat eorum transitum per loca in circuitu termini illius antecedentis versus posteriores partes Cylindri, efficitque ut fluidum ad majorem distantiam commoveatur & resistentiam auget, idque in ea fere ratione qua effluxum aquæ e vase diminuit, id est, in ratione duplicata 25 ad 21 circiter. Et quemadmodum, in Propositionis illius casu primo, effecimus ut partes aquæ perpendiculariter & maxima copia transirent per foramen EF , ponendo quod aqua omnis in vase quæ in circuitu cataractæ congelata fuerat, & cujus motus obliquus erat & inutilis, maneret sine motu: sic in hac Propositione, ut obliquitas motuum tollatur, & partes aquæ motu maxime directo & brevissimo cedentes facillimum præbeant transitum Cylindro, & sola maneat resistentia quæ oritur a magnitudine sectionis transversæ, quæque diminui non potest nisi diminuendo diametrum Cylindri, concipiendum est quod partes fluidi quarum motus sunt obliqui & inutilis & resistentiam creant, quiescant inter se ad utrumque Cylindri terminum, & cohæreant & Cylindro jungantur. Sit $ABCD$ rectangulum, & sint AE & BE arcus duo Parabolici axe AB descripti, latere autem recto quod sit ad spa-




R r

tium

De Motu
Corporum.

tium HG , describendum à Cylindro cadente dum velocitatem suam acquirit, ut HG ad $\frac{1}{2} AB$. Sint etiam CF & DF arcus alii duo Parabolici, axe CD & latere recto quod sit prioris lateris recti quadruplum descripti; & convolutione figuræ circum axem EF generetur solidum cujus media pars $ABDC$ sit Cylindrus de quo agimus, & partes extremæ ABE & CDF contineant partes fluidi inter se quiescentes & in corpora duo rigida concretas, quæ Cylindro utrinque tanquam caput & cauda adhæreant. Et solidi $EACFDB$, secundum longitudinem axis sui FE in partes versus E progredientis, resistentia ea erit quamproxime quam in hac Propositione descripsimus, id est, quæ rationem illam habet ad vim qua totus Cylindri motus, interea dum longitudo AC motu illo uniformiter continuato describatur, vel tolli possit vel generari, quam densitas Fluidi habet ad densitatem Cylindri quamproxime. Et hac vi Resistentia minor esse non potest quam in ratione 2 ad 3, per Corol. 7. Prop. xxxvi.



LEMMA V.

Si Cylindrus, Sphæra & Sphærois, quorum latitudines sunt æquales, in medio canalis Cylindrici ita locentur successive ut eorum axes cum axe canalis coincident: hæc corpora fluxum aquæ per canalem æqualiter impediunt.

Nam spatia inter Canalem & Cylindrum, Sphæram, & Sphæroidem per quæ aqua transit, sunt æqualia: & aqua per æqualia spatia æqualiter transit.

LEMMA VI.

Isdem positis, corpora prædicta æqualiter urgentur ab aqua per canalem fluente.

Patet per Lemma v & Motus Legem tertiam. Aqua utique & corpora in se mutuo æqualiter agunt.

LEMMA

L E M M A VII.

Si aqua quiescat in canali, & corpora in partes contrarias æquali velocitate per canalem ferantur: æquales erunt eorum resistentiæ inter se.

Constat ex Lemmate superiore, nam motus relativi iidem inter se manent.

Scholium.

Eadem est ratio corporum omnium convexorum & rotundorum, quorum axes cum axe canalis coincidunt. Differentia aliqua ex majore vel minore frictione oriri potest; sed in his Lemmatis corpora esse politissima supponimus, & Medii tenacitatem & frictionem esse nullam, & quod partes fluidi, quæ motibus suis obliquis & superfluis fluxum aquæ per canalem perturbare, impedire, & retardare possunt, quiescant inter se tanquam gelu constrictæ, & corporibus ad ipsorum partes anticæ & posticæ adhæreant, perinde ut in Scholio Propositionis præcedentis exposui. Agitur enim in sequentibus de resistentia omnium minima quam corpora rotunda, datis maximis sectionibus transversis descripta, habere possunt.

Corpora fluidis innatantia, ubi moventur in directum, efficiunt ut fluidum ad partem anticam ascendat, ad posticam subsidat, præsertim si figura sint obtusa; & inde resistentiam paulo majorem sentiunt quam si capite & cauda sint acutis. Et corpora in fluidis elasticis mota, si ante & post obrusa sint, fluidum paulo magis condensant ad anticam partem & paulo magis relaxant ad posticam; & inde resistentiam paulo majorem sentiunt quam si capite & cauda sint acutis. Sed nos in his Lemmatis & Propositionibus non agimus de fluidis elasticis, sed de non elasticis; non de insidentibus fluido, sed de alte immersis. Et ubi resistentia corporum in fluidis non elasticis innotescit, augenda erit hæc resistentia aliquantulum tam in fluidis elasticis, qualis est Aer, quam in superficiebus fluidorum stagnantium, qualia sunt maria & paludes.

DE MOTU
CORPORVM;

PROPOSITIO XXXVIII. THEOREMA XXX.

Globi, in Fluido compresso infinito & non elastico uniformiter progredientis, resistentia est ad vim qua totus ejus motus, quo tempore octo tertias partes diametri suæ describit, vel tolli possit, vel generari, ut densitas Fluidi ad densitatem Globi quamproxime.

Nam Globus est ad Cylindrum circumscriptum ut duo ad tria; & propterea Vis illa, quæ tollere possit motum omnem Cylindri interea dum Cylindrus describat longitudinem quatuor diametrorum, Globi motum omnem tollit interea dum Globus describit duas tertias partes hujus longitudinis, id est, octo tertias partes diametri propriæ. Resistentia autem Cylindri est ad hanc Vim quamproxime ut densitas Fluidi ad densitatem Cylindri vel Globi, per Prop. xxxvii.; & Resistentia Globi æqualis est Resistentiæ Cylindri, per Lem. v, vi, vii. *Q. E. D.*

Corol. 1. Globorum, in Mediis compressis infinitis, resistentiæ sunt in ratione quæ componitur ex duplicata ratione velocitatis, & duplicata ratione diametri, & ratione densitatis Mediorum.

Corol. 2. Velocitas maxima quæcum Globus, vi ponderis sui comparati, in fluido resistente potest descendere, ea est quam acquirere potest Globus idem, eodem pondere, absque resistentia cadendo & casu suo describendo spatium quod sit ad quatuor tertias partes diametri suæ ut densitas Globi ad densitatem Fluidi. Nam Globus tempore casus sui, cum velocitate cadendo acquisita, describet spatium quod erit ad octo tertias diametri suæ, ut densitas Globi ad densitatem Fluidi; & vis ponderis motum hunc generans, erit ad vim quæ motum eundem generare possit quo tempore Globus octo tertias diametri suæ eadem velocitate describit, ut densitas Fluidi ad densitatem Globi: ideoque per hanc Propositionem, vis ponderis æqualis erit vi Resistentiæ, & propterea Globum accelerare non potest.

Corol. 3. Data & densitate Globi & velocitate ejus sub initio motus, ut & densitate fluidi compressi quiescentis in qua Globus movetur; datur ad omne tempus & velocitas Globi & ejus resistentia & spatium ab eo descriptum, per Corol. 7. Prop. xxxv.

Corol.

Corol. 4. Globus in fluido compresso quiescente ejusdem secum densitatis movendo, dimidiam motus sui partem prius amittet quam longitudinem duarum ipsius diametrorum descripserit, per idem LIBER
SECUNDUS
Corol. 7.

PROPOSITIO XXXIX. THEOREMA XXXI.

Globi, per Fluidum in canali Cylindrico clausum & compressum uniformiter progredientis, resistentia est ad vim qua totus ejus motus, interea dum octo tertias partes diametri suae describit, vel generari possit vel tolli, in ratione quae componitur ex ratione orificii canalisi ad excessum hujus orificii supra dimidium circuli maximi Globi, & ratione duplicata orificii canalisi ad excessum hujus orificii supra circumulum maximum Globi, & ratione densitatis Fluidi ad densitatem Globi quamproxime.

Patet per *Corol. 2.* *Prop. xxxvii*; procedit vero demonstratio quemadmodum in Propositione præcedente.

PROPOSITIO XL. PROBLEMA IX.

Globi in Medio fluidissimo compresso progredientis, invenire resistentiam per Phenomena..

Sit A pondus Globi in vacuo, B pondus ejus in Medio resistente, D diameter Globi, F spatium quod sit ad 1 D. ut densitas Globi ad densitatem Medii, id est, ut A ad A—B, G tempus quo Globus pondere B absque resistentia cadendo describit spatium F, & H. velocitas quam Globus hocce casu suo acquirit. Et erit H velocitas maxima quacum Globus, pondere suo B, in Medio resistente potest descendere, per *Corol. 2.* *Prop. xxxviii*; & resistentia quam Globus ea cum velocitate descendens patitur, æqualis erit ejus ponderi B: resistentia vero quam patitur in alia quacunque velocitate, erit ad pondus B in duplicata ratione velocitatis hujus ad velocitatem illam maximam H, per *Corol. 1.* *Prop. xxxviii*.

DE MOTU
CURTORUM.

Hæc est resistentia quæ oritur ab inertia materiæ Fluidi. Ea vero quæ oritur ab elasticitate, tenacitate, & frictione partium ejus, sic investigabitur.

Demittatur Globus ut pondere suo B in Fluido descendat; & sit P tempus cadendi, idque in minutis secundis si tempus G in minutis secundis habeatur. Inveniatur numerus absolutus N qui congruit Logarithmo $0,4342944819 \frac{2P}{G}$, sitque L Logarithmus nu-

meri $\frac{N+1}{N}$: & velocitas cadendo acquisita erit $\frac{N-1}{N+1} H$, altitudo

autem descripta erit $\frac{2PF}{G} - 1,3862943611 F + 4,605170186 LF$.

Si Fluidum satis profundum sit, negligi potest terminus $4,605170186$

LF ; & erit $\frac{2PF}{G} - 1,3862943611 F$ altitudo descripta quamproxi-

me. Patent hæc per Libri secundi Propositionem nonam & ejus Corollaria, ex Hypothesi quod Globus nullam aliam patiatur resistentiam nisi quæ oritur ab inertia materiæ. Si vero aliam insuper resistentiam patiat, descensus erit tardior, & ex retardatione innotescet quantitas hujus resistentiæ.

Ut corporis in Fluido cadentis velocitas & descensus facilius innotescant, composui Tabulam sequentem, cujus columna prima denotat tempora descensus, secunda exhibet velocitates cadendo acquisitas existente velocitate maxima 100000000, tertia exhibet spatia temporibus illis cadendo descripta, existente $2F$ spatio quod corpus tempore G cum velocitate maxima describit, & quarta exhibet spatia iisdem temporibus cum velocitate maxima descripta.

Numeri in quarta columna sunt $\frac{2P}{G}$, & subducendo numerum

$1,3862944 - 4,6051702 L$, inveniuntur numeri in tertia columna, & multiplicandi sunt hi numeri per spatium F ut habeantur spatia cadendo descripta. Quinta his insuper adjecta est columna, quæ continet spatia descripta iisdem temporibus a corpore, vi ponderis sui comparativi B, in vacuo cadente.

Tempora

Tempora P	Velocitates cadentis in fluido.	Spatia caden- do deſcripta in fluido.	Spatia motu maximo de- ſcripta.	Spatia caden- do deſcripta in vacuo.
0,001G	999999 $\frac{1}{2}$	0,000001F	0,002F	0,000001F
0,01G	999967	0,0001F	0,02F	0,0001F
0,1G	9966799	1,0099834F	0,2F	0,01F
0,2G	19737532	0,0397361F	0,4F	0,04F
0,3G	29131261	0,0886815F	0,6F	0,09F
0,4G	37994896	0,1559070F	0,8F	0,16F
0,5G	46211716	0,2402290F	1,0F	0,25F
0,6G	53704957	0,3402706F	1,2F	0,36F
0,7G	60436778	0,4545405F	1,4F	0,49F
0,8G	66403677	0,5815071F	1,6F	0,64F
0,9G	71629787	0,7196609F	1,8F	0,81F
1G	76159416	0,8675617F	2F	1F
2G	96402758	2,6500055F	4F	4F
3G	99505475	4,6186570F	6F	9F
4G	99932930	6,6143765F	8F	16F
5G	99990920	8,6137964F	10F	25F
6G	99998771	10,6137179F	12F	36F
7G	99999834	12,6137073F	14F	49F
8G	99999980	14,6137059F	16F	64F
9G	99999997	16,6137057F	18F	81F
10G	99999999 $\frac{1}{2}$	18,6137056F	20F	100F

Scholium.

Ut reſiſtencias Fluidorum inveſtigarem per Experimenta, paravi vas ligneum quadratum, longitudine & latitudine interna digitorum novem pedis *Londinenſis*, profunditate pedum novem cum ſemiſſe, idemque implevi aqua pluviali; & globis ex cera & plumbo incluſo formatiſ, notavi tempora deſcenſus globorum, exiſtente deſcenſus altitudine 112 digitorum pedis. Pcs ſolidus cubicus *Londinenſis* continet 76 libras *Romanas* aquæ pluvialis, & pedis hujus digitus ſolidus continet $\frac{1}{2}$ uncias libræ hujus ſeu grana 253 $\frac{1}{2}$; & globus aqueus diametro digiti unius deſcriptus continet grana 332,645.

DE MOTU 132,645 in Medio aeris, vel grana 132,8 in vacuo; & globus quilibet alius est ut excessus ponderis ejus in vacuo supra pondus ejus in aqua.

Exper. 1. Globus, cujus pondus erat 156½ granorum in aere & 77 granorum in aqua, altitudinem totam digitorum 112 tempore minutorum quatuor secundorum descripsit. Et experimento repetito, globus iterum cecidit eodem tempore minutorum quatuor secundorum.

Pondus globi in vacuo est 156½ *gran.*, & excessus hujus ponderis supra pondus globi in aqua est 72½ *gran.* Unde prodit globi diameter 0,84224 partium digiti. Est autem ut excessus ille ad pondus globi in vacuo, ita densitas aquæ ad densitatem globi, & ita partes octo tertiæ diametri globi (*viz.* 2,24597 *dig.*) ad spatium 2*F*, quod proinde erit 4,4256 *dig.* Globus tempore minuti unius secundi, toto suo pondere granorum 156½, cadendo in vacuo describet digitos 193½; & pondere granorum 77, eodem tempore, absque resistantia cadendo in aqua describet digitos 95,219; & tempore *G*, quod sit ad minutum unum secundum in subduplicata ratione spatii *F* seu 2,2128 *dig.* ad 95,219 *dig.* describet 2,2128 *dig.* & velocitatem maximam *H* acquireret quacum potest in aqua descendere. Est igitur tempus *G* 0",15244. Et hoc tempore *G*, cum velocitate illa maxima *H*, globus describet spatium 2*F* digitorum 4,4256; ideoque tempore minutorum quatuor secundorum describet spatium digitorum 116,1245. Subducatur spatium 1,3862944*F* seu 3,0676 *dig.* & manebit spatium 113,0569 digitorum quod globus cadendo in aqua, in vase amplissimo, tempore minutorum quatuor secundorum describet. Hoc spatium, ob angustiam vasis lignei prædicti, minui debet in ratione quæ componitur ex subduplicata ratione orificii vasis ad excessum orificii hujus supra semicirculum maximum globi & ex simplici ratione orificii ejusdem ad excessum ejus supra circulum maximum globi, id est, in ratione 1 ad 0,9914. Quo facto, habebitur spatium 112,08 digitorum, quod Globus cadendo in aqua in hoc vase ligneo tempore minutorum quatuor secundorum per Theoriam describere debuit quamproxime. Descripsit vero digitos 112 per Experimentum.

Exper. 2. Tres Globi æquales, quorum pondera seorsim erant 76½ granorum in aere & 5½ granorum in aqua, successive demittebantur; & unusquisque cecidit in aqua tempore minutorum secundorum quindecim, casu suo describens altitudinem digitorum 112.

Com-

Computum ineundo prodeunt pondus globi in vacuo $76\frac{1}{2}$ gran., excessus hujus ponderis supra pondus in aqua $71\frac{1}{2}$ gran., diameter globi 0, 81296 dig., octo tertiæ partes hujus diametri 2, 16789 dig., spatium 2 F 2, 3217 dig., spatium quod globus pondere $5\frac{1}{2}$ gran., tempore 1", absque resistentia cadendo describat 12, 808 dig., & tempus G 0", 301056. Globus igitur, velocitate maxima quacum potest in aqua vi ponderis $5\frac{1}{2}$ gran. descendere, tempore 0", 301056 describet spatium 2, 3217 dig. & tempore 15" spatium 115, 678 dig. Subducatur spatium 1, 3862944 F seu 1, 609 dig. & manebit spatium 114, 069 dig. quod proinde globus eodem tempore in vase latissimo cadendo describere debet. Propter angustiam vasis nostri detrahi debet spatium 0, 895 dig. circiter. Et sic manebit spatium 113, 174 dig. quod globus cadendo in hoc vase, tempore 15" describere debuit per Theoriam quamproxime. Descriptis vero digitis 112. per Experimentum. Differentia est insensibilis.

Exper. 3. Globi tres æquales, quorum pondera seorsim erant 121 gran. in aere & 1 gran. in aqua, successive demittebantur; & cadebant in aqua temporibus 46", 47", & 50", describentes altitudinem digitorum 112.

Per Theoriam hi globi cadere debuerunt tempore 40" circiter. Quod tardius ceciderunt, vel bullulis nonnullis globo adhærentibus, vel rarefactioni ceræ ad calorem vel tempestatis vel manus globum demittentis, vel erroribus insensibilibus in ponderandis globis in aqua, vel denique minori proportioni resistentiæ quæ a vi inertię in tardis motibus oritur ad resistentiam quæ oritur ab aliis causis, tribuendum esse puto. Ideoque pondus globi in aqua debet esse plurimum granorum ut experimentum certum & fide dignum reddatur.

Exper. 4. Experimenta hæcenus descripta cæpi ut investigarem resistentias fluidorum antequam Theoria, in propositionibus proximè præcedentibus exposita, mihi innotesceret. Postea, ut Theoriam inventam examinarem, paravi vas ligneum latitudine interna digitorum 8½, profunditate pedum quindecim cum triente. Deinde ex cera & plumbo incluso globos quatuor formavi, singulos pondere 139½ granorum in aere & 7½ granorum in aqua. Et hos demisi ut tempora cadendi in aqua per pendulum, ad semi-minuta secunda oscillans, mensurarem. Globi, ubi ponderabantur & postea cadebant, frigidi erant & aliquamdiu frigidi manserant; quia calor ceram rarefacit, & per rarefactionem diminuit pondus globi in aqua, & cera rarefacta non statim ad densitatem pristinam per

Sf

frigus

DE MOTU
CORPORUM.

frigus reducitur. Antequam caderent, immergebantur penitus in aquam; ne pondere partis alicujus ex aqua extantis descensus eorum sub initio acceleraretur. Et ubi penitus immersi quiescebant, demittebantur quam cautissime, ne impulsus aliquem a manu demittente acciperent. Ceciderunt autem successive temporibus oscillationum $47\frac{1}{2}$, $48\frac{1}{2}$, 50 & 51 , describentes altitudinem pedum quindecim & digitorum duorum. Sed tempestas jam paulo frigidior erat quam cum globi ponderabantur, ideoque iteravi experimentum alio die, & globi ceciderunt temporibus oscillationum 49 , $49\frac{1}{2}$, 50 & 53 , ac tertio temporibus oscillationum $49\frac{1}{2}$, 50 , 51 & 53 . Et experimento sæpius capto, Globi ceciderunt maxima ex parte temporibus oscillationum $49\frac{1}{2}$ & 50 . Ubi tardius cecidere, suspicor eosdem retardatos fuisse impingendo in latera vasis.

Jam computum per Theoriam incundo, prodeunt pondus globi in vacuo $139\frac{1}{2}$ granorum. Excessus hujus ponderis supra pondus globi in aqua $132\frac{1}{2}$ gran. Diameter globi $0,99868$ dig. Octo tertiæ partes diametri $2,66315$ dig. Spatium $2\text{ f } 2,8066$ dig. Spatium quod globus pondere $7\frac{1}{2}$ granorum, tempore minuti unius secundi absque resistentia cadendo describit $9,88164$ dig. Et tempus $60''$, 376843 . Globus igitur, velocitate maxima quacum potest in aqua vi ponderis $7\frac{1}{2}$ granorum descendere, tempore $0''$, 376843 describit spatium $2,8066$ digitorum, & tempore $1''$ spatium $7,44766$ digitorum, & tempore $25''$ seu oscillationum 50 spatium $186,1915$ dig. Subducatur spatium $1,386294$ F, seu $1,9454$ dig. & manebit spatium $184,2461$ dig. quod globus eodem tempore in vase latissimo describet. Ob angustiam vasis nostri, minuatur hoc spatium in ratione quæ componitur ex subduplicata ratione orificii vasis ad excessum hujus orificii supra semicirculum maximum globi, & simplici ratione ejusdem orificii ad excessum ejus supra circulum maximum globi; & habebitur spatium 181 , 86 digitorum, quod globus in hoc vase tempore oscillationum 50 describere debuit per Theoriam quamproxime. Descripsit vero spatium 182 . digitorum tempore oscillationum $49\frac{1}{2}$ vel 50 per Experimentum.

Exper. 5. Globi quatuor pondere $154\frac{1}{2}$ gran. in aere & $21\frac{1}{2}$ gran. in aqua, sæpe demissi, cadebant tempore oscillationum $28\frac{1}{2}$, 29 , $29\frac{1}{2}$ & 30 , & nonnunquam 31 , 32 & 33 , describentes altitudinem pedum quindecim & digitorum duorum.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 29 quamproxime.

Exper.

Exper. 6. Globi quinque pondere 212 *gran.* in aere & 79½ in a-
qua, sæpe demissi, cadebant tempore oscillationum 15, 15½, 16, 17 & 18, describentes altitudinem pedum quindecim & digitorum duorum. LIBER
SECUNDUS.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 15 quamproxime.

Exper. 7. Globi quatuor pondere 293½ *gran.* in aere & 35½ *gran.* in aqua sæpe demissi, cadebant tempore oscillationum 29½, 30, 30½, 31, 32 & 33, describentes altitudinem pedum quindecim & digiti unius cum semisse.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 28 quamproxime.

Causam investigando cur globorum, ejusdem ponderis & magnitudinis, aliqui citius alii tardius caderent, in hanc incidi; quod globi, ubi primum demittebantur & cadere incipiebant, oscillarent circum centra, latere illo quod forte gravius esset, primum descendente, & motum oscillatorium generante. Nam per oscillationes suas, globus majorem motum communicat aquæ, quam si sine oscillationibus descenderet; & communicando, amittit partem motus proprii quo descendere deberet, & pro majore vel minore oscillatione, magis vel minus retardatur. Quinetiam globus recedit semper a latere suo quod per oscillationem descendit, & recedendo appropinquat lateribus vasis & in latera nonnunquam impingitur. Et hæc oscillatio in globis gravioribus fortior est, & in majoribus aquam magis agit. Quapropter, ut oscillatio globorum minor redderetur, globos novos ex cera & plumbo construxi, insigendo plumbum in latus aliquod globi prope superficiem ejus; & globum ita demissi, ut latus gravius, quoad fieri potuit, esset infimum ab initio descensus. Sic oscillationes factæ sunt multo minores quam prius, & globi temporibus minus inæqualibus ceciderunt, ut in experimentis sequentibus.

Exper. 8. Globi quatuor pondere granorum 139 in aere & 6½ in aqua, sæpe demissi, ceciderunt temporibus oscillationum non plurimum quam 52, non pauciorum quam 50, & maxima ex parte tempore oscillationum 51 circiter, describentes altitudinem digitorum 182.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 52 circiter.

Exper. 9. Globi quatuor pondere granorum 273½ in aere & 140½ in aqua, sæpius demissi, ceciderunt temporibus oscillationum
Sf 2 non

DE MOTU
CORPORUM,

non pauciorum quam 12, non plurium quam 13, describentes altitudinem digitorum 182.

Per Theoriam vero hi globi cadere debuerunt tempore oscillationum 11½ quamproxime.

Exper. 10. Globi quatuor pondere granorum 384 in aere & 119½ in aqua, sæpe demissi, cadebant temporibus oscillationum 17½, 18, 18½ & 19, describentes altitudinem digitorum 181½. Et ubi ceciderunt tempore oscillationum 19, nonnunquam audiui impulsuum eorum in latera vasis antequam ad fundum pervenerunt.

Per Theoriam vero cadere debuerunt tempore oscillationum 15½ quamproxime.

Exper. 11. Globi tres æquales, pondere granorum 48 in aere & 3½ in aqua, sæpe demissi, ceciderunt temporibus oscillationum 43½, 44, 44½, 45 & 46, & maxima ex parte 44 & 45, describentes altitudinem digitorum 182½ quamproxime.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 46½ circiter.

Exper. 12. Globi tres æquales, pondere granorum 141 in aere & 4½ in aqua, aliquoties demissi, ceciderunt temporibus oscillationum 61, 62, 63, 64 & 65, describentes altitudinem digitorum 182.

Et per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 64½ quamproxime.

Per hæc Experimenta manifestum est quod, ubi globi tarde ceciderunt, ut in experimentis secundis, quartis, quintis, octavis, undecimis ac duodecimis, tempora cadendi recte exhibentur per Theoriam: at ubi globi velocius ceciderunt, ut in experimentis sextis, nonis ac decimis, resistentia paulo major extitit quam in duplicata ratione velocitatis. Nam globi inter cadendum oscillant aliquantulum; & hæc oscillatio in globis levioribus & tardius cadentibus, ob motus languorem cito cessat; in gravioribus autem & majoribus, ob motus fortitudinem diutius durat, & non nisi post plures oscillationes ab aqua ambiente cohiberi potest. Quinetiam globi, quo velociores sunt, eo minus premuntur a fluido ad posticas suas partes; & si velocitas perpetuo augeatur, spatium vacuum tandem a tergo relinquent, nisi compressio fluidi simul augeatur. Debet autem compressio fluidi (per Prop. xxxiii & xxxiiii) augeri in duplicata ratione velocitatis, ut resistentia sit in eadem duplicata ratione. Quoniam hoc non fit, globi velociores paulo minus premuntur a tergo, & defectu pressionis, resistentia eorum fit paulo major quam in duplicata ratione velocitatis.

Con-

Congruit igitur Theoria cum phaenomenis corporum cadentium in Aqua, reliquum est ut examinemus phaenomena cadentium in Aere.

Exper. 13. A culmine Ecclesiae *Sti. Pauli*, in urbe *Londini*, globi duo virei simul demittebantur, unus argenti vivi plenus, alter aeris; & cadendo describebant altitudinem pedum *Londinensium* 220. Tabula lignea ad unum ejus terminum polis ferreis suspendebatur, ad alterum pessulo ligneo incumbebat; & globi duo huic Tabulae impositi simul demittebantur, subtrahendo pessulum, ut Tabula polis ferreis solummodo innixa super iisdem devolveretur, & eodem temporis momento pendulum ad minuta secunda oscillans, per filum ferreum a pessulo ad imam Ecclesiae partem tendens, demitteretur & oscillare inciperet. Diametri & pondera globorum ac tempora cadendi exhibentur in Tabula sequente.

Globorum mercuris plenorum.			Globorum aere plenorum.		
Pondera	Diametri	Tempora cadendi.	Pondera	Diametri	Tempora cadendi.
908 gran.	0,8 digit.	4"	510 gran.	5,1 digit.	8" $\frac{1}{2}$
983	0,8	4—	642	5,2	8
866	0,8	4	599	5,1	8
747	0,75	4+	515	5,0	8 $\frac{1}{2}$
808	0,75	4	483	5,0	8 $\frac{1}{2}$
784	0,75	4+	641	5,2	8

Cæterum tempora observata corrigi debent. Nam globi mercuriales (per Theoriam *Galilei*) minutis quatuor secundis describunt pedes *Londinenses* 257, & pedes 220 minutis tantum 3" 42". Tabula lignea utique, detracto pessulo, tardius devolvebatur quam par erat, & tarda sua devolutione impendebat descensum globorum sub initio. Nam globi incumbabant Tabulae prope medium ejus, & paulo quidem propiores erant axi ejus quam pessulo. Et hinc tempora cadendi prorogata fuerunt minutis tertiis octodecim circiter, & jam corrigi debent detrahendo illa minuta, præsertim in globis majoribus qui Tabulae devolventi paulo diutius incumbabant propter magnitudinem diametrorum. Quo facto, tempora quibus globi sex majores cecidere, evadent 8" 12", 7" 42", 7" 42", 7" 57", 8" 12", & 7" 42".

Sf 3

Glo.

DE MOYSE
CORPORUM.

Globorum igitur aere plenorum quintus, diametro digitorum quinque pondere granorum 483 constructus cecidit, tempore 8" 12", describendo altitudinem pedum 220. Pondus aquæ huic globo æqualis, est 16600 granorum; & pondus aëris eidem æqualis est $\frac{16600}{502\frac{1}{2}}$ gran. seu 19 $\frac{1}{2}$ gran.; ideoque pondus globi in vacuo est 502 $\frac{1}{2}$ gran. & hoc pondus est ad pondus aeris globo æqualis, ut 502 $\frac{1}{2}$ ad 19 $\frac{1}{2}$, & ita sunt 2 F ad octo tertias partes diametri globi, id est, ad 13 $\frac{1}{2}$ digitos. Unde 2 F prodeunt 28 ped. 11 dig. Globus cadendo in vacuo, toto suo pondere 502 $\frac{1}{2}$ granorum, tempore minuti unius secundi describit digitos 193 $\frac{1}{2}$ ut supra, & pondere 483 gran. describit digitos 185, 905, & eodem pondere 483 gran. etiam in vacuo describit spatium F seu 14 ped. 5 $\frac{1}{2}$ dig. tempore 57" 58", & velocitatem maximam acquirit quacum possit in aere descendere. Hac velocitate globus, tempore 8" 12", describit spatium pedum 245 & digitorum 5 $\frac{1}{2}$. Aufer 1, 3863 F seu 20 ped. 0 $\frac{1}{2}$ dig. & manebunt 225 ped. 5 dig. Hoc spatium igitur globus, tempore 8" 12", cadendo describere debuit per Theoriam. Descripsit vero spatium 220 pedum per experimentum. Differentia insensibilis est.

Similibus computis ad reliquos etiam globos aere plenos applicatis, confeci Tabulam sequentem.

Globorum ponderi.	Diametri	Tempora cecidendi ab altitudine pedum 220.	Spatia describenda per Theoriam,	Excessus.
510 gran.	5,1 dig.	8" 12"	226 ped. 11 dig.	6 ped. 11 dig.
642	5,2	7 42	230 9	10 9
599	5,1	7 42	227 10	7 10
515	5	7 57	224 5	4 5
483	5	8 12	225 5	5 5
641	5,2	7 42	230 7	10 7

Globorum igitur tam in Aere quam in Aqua motorum resistentia prope omnis per Theoriam nostram recte exhibetur, ac densitati fluidorum, paribus globorum velocitatibus ac magnitudinibus proportionalis est.

In Scholio quod Sectioni sexta subjunctum est, ostendimus per experimenta pendulorum quod globorum æqualium & æquivelocium in Aere, Aqua, & Argento vivo motorum resistentiæ sunt ut fluidorum densitates. Idem hic ostendimus magis accurate per experimenta corporum cadentium in Aere & Aqua. Nam pendula singulis oscillationibus motum cient in fluido motui penduli redeuntis semper contrarium, & resistentia ab hoc motu oriunda, ut & resistentia fili quo pendulum suspendebatur, totam Penduli resistentiam majorem reddiderunt quam resistentia quæ per experimenta corporum cadentium prodiit. Etenim per experimenta pendulorum in Scholio illo exposita, globus ejusdem densitatis cum Aqua, describendo longitudinem semidiametri suæ in Aere, amittere deberet motus sui partem $\frac{1}{11}$. At per Theoriam in hac septima Sectione expositam & experimentis cadentium confirmatam, globus idem describendo longitudinem eandem, amittere deberet motus sui partem tantum $\frac{1}{11}$, posito quod densitas Aquæ sit ad densitatem Aeris ut 860 ad 1. Resistentiæ igitur per experimenta pendulorum majores prodire (ob causas jam descriptas) quam per experimenta globorum cadentium, idque in ratione 4 ad 3 circiter. Attamen cum pendulorum in Aere, Aqua, & Argento vivo oscillantium resistentiæ a causis similibus similiter augeantur, proportio resistentiarum in his Mediis, tam per experimenta pendulorum, quam per experimenta corporum cadentium, satis recte exhibebitur. Et inde concludi potest quod corporum in fluidis quibuscunque fluidissimis motorum resistentiæ, cæteris paribus, sunt ut densitates fluidorum.

His ita stabilitis, dicere jam licet quamnam motus sui partem globus quilibet, in fluido quocunque projectus, dato tempore amittet quamproxime. Sit D diameter globi, & V velocitas ejus sub initio motus, & T tempus quo globus velocitate V in vacuo describet spatium quod sit ad spatium $\frac{1}{2} D$ ut densitas globi ad densitatem fluidi: & globus in fluido illo projectus, tempore quovis alio t , amittet velocitatis suæ partem $\frac{tV}{T+t}$, manente parte $\frac{TV}{T+t}$, & describet spatium quod sit ad spatium uniformi velocitate V eodem tempore descriptum in vacuo, ut logarithmus numeri $\frac{T+t}{T}$

multiplicatus per numerum 2,302585093 est ad numerum $\frac{t}{T}$. per

Corol.

DE MOTU
CORPORUM.

Corol. 7. Prop. xxxv. In motibus tardis resistentia potest esse paulo minor, propterea quod figura Globi paulo aptior sit ad motum quam figura Cylindri eadem diametro descripti. In motibus velocibus resistentia potest esse paulo major, propterea quod elasticitas & compressio fluidi non augeantur in duplicata ratione velocitatis. Sed huiusmodi minutias hic non expendo.

Et quamvis Aer, Aqua, Argentum vivum & similia fluida, per divisionem partium in infinitum, subtiliarentur & fierent Media infinite fluida; tamen globis projectis haud minus resisterent. Nam resistentia, de qua agitur in Propositionibus præcedentibus, oritur ab inertia materiæ; & inertia materiæ corporibus essentialis est & quantitati materiæ semper proportionalis. Per divisionem partium fluidi, resistentia quæ oritur a tenacitate & frictione partium, diminui quidem potest: sed quantitas materiæ per divisionem partium ejus non diminuitur; & manente quantitate materiæ, manet ejus vis inertiae cui resistentia, de qua hic agitur, semper proportionalis est. Ut hæc resistentia diminuatur, diminui debet quantitas materiæ in spatiis per quæ corpora moventur. Et propterea spatia Cœlestia, per quæ globi Planetarum & Cometarum in omnes partes liberrime & absque omni motus diminutione sensibili perpetuo moventur, fluido omni corporeo destituuntur, si forte vapores longe tenuissimos & trajectos lucis radios excipias.

Projectilia utique motum ciet in fluidis progrediendo, & hic motus oritur ab excessu pressionis fluidi ad projectilis partes anticas supra pressionem ad ejus partes posticas, & non minor esse potest in Mediis infinite fluidis quam in Aere, Aqua, & Argento vivo pro densitate materiæ in singulis. Hic autem pressionis excessus, pro quantitate sua, non tantum motum ciet in fluido, sed etiam agit in projectile ad motum ejus retardandum: & propterea resistentia in omni fluido, est motus in fluido a projectili excitatus, nec minor esse potest in Æthere subtilissimo pro densitate Ætheris, quam in Aere, Aqua, & Argento vivo pro densitatibus horum fluidorum.

S E C T I O

S E C T I O VIII.

De Motu per Fluida propagato.

PROPOSITIO XLI. THEOREMA XXXII.

Pressio non propagatur per Fluidum secundum lineas rectas, nisi ubi particule Fluidi in directum jacent.

Si jaceant particule a, b, c, d, e in linea recta, potest quidem pressio directe propagari ab a ad e ; at particula e urget particulas oblique positas f & g oblique, & particule illæ f & g non sustinebunt pressionem illatam, nisi fulciantur a particulis ulterioribus b & k ; quatenus autem fulciuntur, premunt particulas fulcientes; & hæ non sustinebunt pressionem nisi fulciantur ab ulterioribus l & m easque premant, & sic deinceps in infinitum. Pressio igitur, quam primum propagatur ad particulas quæ non in directum jacent, divaricare incipiet & oblique propagabitur in infinitum; & postquam incipit oblique propagari, si inciderit in particulas ultiores, quæ non in directum jacent, iterum divaricabit; idque toties, quoties in particulas non accurate in directum jacentes inciderit.

Q. E. D.




Corol. Si pressionis, a dato puncto per Fluidum propagatæ, pars aliqua obstaculo interceptiatur; pars reliqua, quæ non interceptiatur, divaricabit in spatia pone obstaculum. Id quod sic etiam demonstrari potest. A puncto A propagetur pressio quaquaversum, idque si fieri potest secundum lineas rectas & obstaculo $NBCK$ perforato in BC , interceptiatur ea omnis, præter partem Conformem APQ , quæ per foramen circulare BC transit. Planis transversis de, fg, hi distinguatur conus APQ in frusta; & interea dum conus ABC , pressionem propagando, urget frustum

T t

stum

DE MOTU
CORPORUM,

stum conicum ulterius *defg* in superficie *de*, & hoc frustum urget frustum proximum *fgih* in superficie *fg*, & frustum illud urget frustum tertium, & sic deinceps in infinitum; manifestum est (per motus Legem tertiam) quod frustum primum *defg*, reactione frustū secundi *fgbi*, tantum urgebitur & premetur in superficie *fg*, quantum urget & premit frustum illud secundum. Frustum igitur *degf* inter conum *Ade* & frustum *fbig* comprimitur utrinque, & propterea (per Corol. 6. Prop. XIX.) figuram suam servare nequit, nisi vi eadem comprimatur undique.



Eodem igitur impetu quo premitur in superficiebus *de*, *fg*, conabitur cedere ad latera *af*, *eg*; ibique (cum rigidum non sit, sed omnimodo Fluidum) excurret ac dilatabitur, nisi Fluidum ambiens adsit, quo conatus iste cohibeatur. Proinde conatu excurrendi, premet tam Fluidum ambiens ad latera *df*, *eg* quam frustum *fbig* eodem impetu; & propterea pressio non minus propagabitur a lateribus *df*, *eg* in spatia *NO*, *KL* hinc inde, quam propagatur a superficie *fg* versus *P*. *Q*. *Q*. *E*. *D*.

P R O-


PROPOSITIO XLII. THEOREMA XXXIII.

Motus omnis per Fluidum propagatus divergit a recto tramite in spatia immota.

Caf. 1. Propagetur motus a puncto *A* per foramen *BC* per-
gatque (si fieri potest) in spatio conico *BCQP* secundum lineas
rectas divergentes a puncto *C*. Et ponamus primo quod motus
iste sit undarum in superficie stagnantis aquæ. Sintque *de, fg, bi,*
kl, &c. undarum singularum partes altissimæ, vallibus totidem in-
termediis ab invicem distinctæ. Igitur quoniam aqua in undarum
jugis altior est quam in Fluidi partibus immotis *LK, NO*, defluet
eadem de jugorum terminis *e, g, i, l,* &c. *d, f, b, k,* &c. hinc
inde, versus *KL* & *NO*: & quoniam in undarum vallibus depres-
sior est quam in Fluidi partibus immotis *KL, NO*; defluet ead-
em de partibus illis immotis in undarum valles. Defluxu priorum
undarum juga, posteriore valles hinc inde dilatantur & propagantur
versus *KL* & *NO*. Et quoniam motus undarum ab *A* versus *PQ*
fit per continuum defluxum jugorum in valles proximos, adeoque
celerior non est quam pro celeritate descensus; & descensus aquæ,
hinc inde, versus *KL* & *NO* eadem velocitate peragi debet;
propagabitur dilatio undarum, hinc inde, versus *KL* & *NO*,
eadem velocitate qua undæ ipsæ ab *A* versus *PQ* recta progre-
diuntur. Proindeque spatium totum hinc inde, versus *KL* & *NO*,
ab undis dilatatis *rfgr, sbis, eklr, vmnv*, occupabitur.
Q. E. D. Hæc ita se habere quilibet in aqua stagnante experiri
potest.

Caf. 2. Ponamus jam quod *de, fg, bi, kl, mn*, designent pul-
sus a puncto *A*, per Medium Elasticum, successive propagatos.
Pulsus propagari concipe per successivas condensationes & rarefa-
ctiones Medii, sic ut pulsus cujusque pars densissima sphericam
occupet superficiem circa centrum *A* descriptam, & inter pulsus
successivos æqualia intercedant intervalla. Designent autem lineæ
de, fg, bi, kl, &c. densissimas pulsuum partes, per foramen *BC*
propagatas. Et quoniam Medium ibi densius est quam in spatiis
hinc inde versus *KL* & *NO*, dilatabit sese tam versus spatia illa
KL, NO utrinque sita, quam versus pulsuum rariora intervalla;
Tt 2 coque

DE MOTU eoque pacto rarius semper evadens e regione intervallo-
CORPORUM rius e regione pulsuum, participabit eorundem motum. Et quoniam pulsuum progressivus motus oritur a perpetua relaxatione partium densiorum versus antecedentia intervalla rariora; & pulsus eadem fere celeritate sese in Medii partes quiescentes *KL*, *NO* hinc inde relaxare debent; pulsus illi eadem fere celeritate sese dilatabunt undique in spatia immota *KL*, *NO*, qua propagantur directe a centro *A*; adeoque spatium totum *KLON* occupabunt. *Q. E. D.* Hoc experimur in Sonis, qui vel monte interpolito audiuntur, vel in cubiculum per fenestram admissi sese in omnes cubiculi partes dilatant, inque angulis omnibus audiuntur, non tam reflexi a parietibus oppositis, quam a fenestra directe propagati, quantum ex sensu judicare licet.



Cas. 3. Ponamus denique quod motus cujuscunque generis propagetur ab *A* per foramen *BC*: & quoniam propagatio ista non fit, nisi quatenus partes Medii centro *A* propiores urgent commoventque partes ulteriores; & partes quæ urgentur fluidæ sunt, ideoque recedunt quaquaversum in regiones ubi minus premuntur: recedent

cedent eædem versus Medii partes omnes quiescentes, tam laterales *KL* & *NO*, quam anteriores *PQ*, eoque pacto motus omnis, LINEA
SECUNDO. quam primum per foramen *BC* transiit, dilatari incipiet & abinde, tanquam a principio & centro, in partes omnes directè propagari.
Q. E. D.

PROPOSITIO XLIII. THEOREMA XXXIV.

*Corpus omne tremulum in Medio Elastico propagabit motum
pulsuum undique in directum, in Medio vero non
Elastico motum circularem excitabit.*

Caf. 1. Nam partes corporis tremuli vicibus alternis eundo & redeundo, ita suo urgebunt & propellent partes Medii sibi proximas, & urgendo compriment easdem & condensabunt, dein reditu suo sinent partes compressas recedere & sese expandere. Igitur partes Medii corpori tremulo proximæ ibunt & redibunt per vices, ad instar partium corporis illius tremuli: & qua ratione partes corporis hujus agitabant hæc Medii partes, hæc similibus tremoribus agitæ agitant partes sibi proximas, eæque similiter agitæ agitant posteriores, & sic deinceps in infinitum. Et quemadmodum Medii partes primæ eundo condensantur & redeundo relaxantur: sic partes reliquæ quoties eunt condensantur, & quoties redeunt sese expandent. Et propterea non omnes ibunt & simul redibunt (sic enim determinatas ab invicem distantias servando, non rarefient & condensarentur per vices) sed accedendo ad invicem ubi condensantur, & recedendo ubi rarefiunt, aliquæ earum ibunt dum aliæ redeunt, idque vicibus alternis in infinitum. Partes autem euntes & eundo condensatæ, ob motum suum progressivum quo feriunt obstacula, sunt pulsus; & propterea pulsus successivi a corpore omni tremulo in directum propagabuntur; idque æqualibus circiter ab invicem distantis, ob æqualia temporis intervalla, quibus corpus tremoribus suis singulis singulos pulsus excitat. Et quanquam corporis tremuli partes eant & redeant secundum plagam aliquam certam & determinatam, tamen pulsus inde per Medium propagati sese dilatabunt ad latera, per Propositionem præcedentem; & a corpore illo tremulo tanquam centro communi, secundum superficies propemodum sphericas & concentricas, undique propagabuntur. Cujus rei exemplum aliquod habemus

De Motu
Corporum,

in Undis, quæ si digito tremulo excitentur, non solum pergent hinc inde secundum plagam motus digiti, sed, in modum circulorum concentricorum, digitum statim cingent & undique propagabuntur. Nam gravitas Undarum supplet locum vis Elasticæ.

Cas. 2. Quod si Medium non sit Elasticum: quoniam ejus partes a corporis tremuli partibus vibratis pressæ condensari nequeunt, propagabitur motus in instanti ad partes ubi Medium facillime cedit, hoc est, ad partes quas corpus tremulum alioqui vacuas a tergo relinqueret. Idem est casus cum casu corporis in Medio quocunque projecti. Medium cedendo projectilibus, non recedit in infinitum; sed in circulum eundo, pergit ad spatia quæ corpus relinquit a tergo. Igitur quoties corpus tremulum pergit in partem quamcunque, Medium cedendo perget per circulum ad partes quas corpus relinquit; & quoties corpus regréditur ad locum priorem, Medium inde repelletur & ad locum suum priorem redibit. Et quamvis corpus tremulum non sit firmum, sed modis omnibus flexile, si tamen magnitudine datum maneat, quoniam tremoribus suis nequit Medium ubivis urgere, quin alibi eidem simul cedat; efficiet ut Medium, recedendo a partibus ubi premitur, pergat semper in orbem ad partes quæ eidem cedunt. *Q. E. D.*


Corol. Hallucinantur igitur qui credunt agitationem partium Flammæ ad pressionem, per Medium ambiens, secundum lineas rectas propagandam conducere. Debebit ejusmodi pressio non ab agitatione sola partium Flammæ, sed a totius dilatatione derivari.

PROPOSITIO XLIV. THEOREMA XXXV.

Si aqua in Canalis cruribus erectis KL, MN vicibus alternis ascendat & descendat; construatut autem Pendulum cujus longitudo inter punctum suspensionis & centrum oscillationis æquetur semissi longitudinis aquæ in Canalis: dico quod aqua ascendet & descendet iisdem temporibus quibus Pendulum oscillatur.

Longitudinem aquæ mensuro secundum axes canalís & crurum, eandem summæ horum axium æquando; & resiliéntiam aquæ quæ oritur

oritur ab attritu canalis, hic non confidero. Designent igitur AB , CD mediocrem altitudinem aquæ in crure utroque; & ubi aqua in crure KL ascendit ad altitudinem EF descenderit aqua in crure MN ad altitudinem GH . Sit autem P corpus pendulum, VP filum, V punctum suspensionis, $SPQR$ Cyclois quam Pendulum describat, P ejus punctum infimum, PQ arcus altitudini AE æqualis. Vis, qua motus aquæ alternis vicibus acceleratur



& retardatur, est excessus ponderis aquæ in alterutro crure supra pondus in altero, ideoque, ubi aqua in crure KL ascendit ad EF , & in crure altero descendit ad GH , vis illa est pondus duplicatum aquæ $EABF$, & propterea est ad pondus aquæ totius ut AE seu PQ ad VP seu PR . Vis etiam, qua pondus P in loco quovis Q acceleratur & retardatur in Cycloide, (per Corol. Prop. I. I.) est ad ejus pondus totum, ut ejus distantia PQ a loco infimo P , ad Cycloidis longitudinem PR . Quare aquæ & penduli, æqualia spatia AE , PQ describentium, vires motrices sunt ut pondera movenda; ideoque, si aqua & pendulum in principio quiescunt, vires illæ movebunt eadem æqualiter temporibus æqualibus, efficientque ut motu reciproco simul eant & redeant. $Q. E. D.$

Corol. 1. Igitur aquæ ascendentis & descenditis, sive motus intensior sit sive remissior, vices omnes sunt Isochronæ.

Corol. 2. Si longitudo aquæ totius in canali sit pedum *Parisensium* 6; aqua tempore minuti unius secundi descendet, & tempore minuti alterius secundi ascendet; & sic deinceps vicibus alternis in infinitum. Nam pendulum pedum $3\frac{1}{4}$ longitudinis, tempore minuti unius secundi oscillatur.

Corol.

DE MOTU
CORPORUM.

Corol. 3. Aucta autem vel diminuta longitudine aquæ, augetur vel diminuitur tempus reciprocationis in longitudinis ratione subduplicata.

PROPOSITIO XLV. THEOREMA XXXVI.

Undarum velocitas est in subduplicata ratione. latitudinum.

Consequitur ex constructione Propositionis sequentis.

PROPOSITIO XLVI. PROBLEMA X.

Invenire velocitatem Undarum.

Constituatur Pendulum cujus longitudo, inter punctum suspensionis & centrum oscillationis, æquetur latitudini Undarum: & quo tempore pendulum illud oscillationes singulas peragit, eodem Undæ progrediendo latitudinem suam propemodum conficiant.

Undarum latitudinem voco menuram transversam, quæ vel vallibus imis, vel summis culminibus interjacet. Designet *ABCDEF* superficiem aquæ stagnantis, undis successivis ascendentem ac descendentem; sintque *A, C, E*, &c. undarum culmina, & *B, D, F*, &c. valles intermediæ. Et quoniam motus undarum fit per aquæ successivum ascensum & descensum, sic ut ejus partes *A, C, E*, &c. quæ nunc altissimæ sunt, mox fiant infimæ; & vis motrix, qua partes altissimæ descendunt & infimæ ascendunt, est pondus aquæ elevatæ; alternus ille ascensus & descensus analogus erit motui reciproco aquæ in canali, easdemque temporis leges observabit: & propterea (per Prop. XLIV.) si distantia inter undarum loca altissima *A, C, E* & infima *B, D, F* æquantur duplæ penduli longitudini; partes altissimæ *A, C, E*, tempore oscillationis unius evadent infimæ, & tempore oscillationis alterius denuo ascendent. Igitur inter transitum Undarum singularum tempus erit oscillationum duarum; hoc est, Unda describat latitudinem suam, quo tempore pendulum illud bis oscillatur, sed eodem tempore pendulum, cujus longitudo quadrupla est, adeoque æquat undarum latitudinem, oscillabitur semel. Q. E. I.

Corol. 1. Igitur Undæ, quæ pedes *Parisienses* 371 latæ sunt, tempore minuti unius secundi progrediendo latitudinem suam conficiant; adeoque tempore minuti unius primi percurrent pedes 1837, & horæ spatio pedes 11000 quamproxime.


Corol. 2.

Corol. 2. Et undarum majorum vel minorum velocitas augebitur vel diminuetur in subduplicata ratione latitudinis.

Hæc ita se habent ex Hypothesi quod partes aquæ recta ascendunt vel recta descendunt; sed ascensus & descensus ille verus fit per circulum, ideoque tempus hac Propositione non nisi quamproxime definitum esse affirmo.

PROP. XLVII. THEOR. XXXVII.

Pulsibus per Fluidum propagatis, singulae Fluidi particulae, motu reciproco brevissimo euntes & redeuntes, accelerantur semper & retardantur pro lege oscillantis Penduli.



Designent AB, BC, CD , &c. pulsuum successivorum æquales distantias; ABC plagam motus pulsuum ab A versus B propagati; E, F, G puncta tria Physici Medii quiescentis, in recta AC ad æquales ab invicem distantias sita; Ee, Ff, Gg , spatia æqualia perbrevia per



quæ puncta illa motu reciproco singulis vibrationibus eunt & redeunt; ϵ, ϕ, γ loca quævis intermedia eorundem punctorum; & EF, FG lineolas Physicas seu Medii partes lineares punctis illis intersectas, & successive translatas in loca ϵ, ϕ, γ & $\epsilon\phi, \phi\gamma$. Rectæ Ee æqualis ducatur recta PS . Bifecetur eadem in O , centroque O & intervallo OP describatur circulus $SIPi$. Per hujus circumferentiam totam cum partibus suis exponatur tempus totum vibrationis unius cum ipsius partibus proportionalibus; sic ut completo tempore quovis PH vel $PHSh$, si demittatur ad PS perpendiculum HL vel hI , & capiatur E , æqualis PL vel PI , punctum Physicum E reperitur in

V

DE MOTU
CORPORUM,

in s . Hac lege punctum quodvis E , eundo ab E per s ad e , & inde redeundo per s ad E , iisdem accelerationis ac retardationis gradibus vibrationes singulas peraget cum oscillante Pendulo. Probandum est quod singula Medii puncta Physica tali motu agitari debeant. Fingamus igitur Medium tali motu a causa quacunque cieri, & videamus quid inde sequatur.

In circumferentia $PHSb$ capiantur æquales arcus HI , IK vel hi , ik , eam habentes rationem ad circumferentiam totam quam habent æquales rectæ EF , FG ad pulsuum intervallum totum BC . Et demissis perpendicularibus IM , KN vel im , kn , quoniam puncta E , F , G motibus similibus successive agitantur, & vibrationes suas integras ex itu & reditu compositas interea peragunt dum pulsus transfertur a B ad C ; si PH vel $PHSb$ sit tempus ab initio motus puncti E , erit PI vel PHS tempus ab initio motus puncti F , & PK vel $PHSk$ tempus ab initio motus puncti G ; & propterea Ei , $F\phi$, $G\gamma$ erunt ipsis PL , PM , PN in itu punctorum, vel ipsis PI , Pm , Pn in punctorum reditu, æquales respective. Unde γ seu $EG + G\gamma - Ei$ in itu punctorum æqualis erit $EG - LN$, in reditu autem æqualis $EG + Ln$. Sed γ latitudo est seu expansio partis Medii EG in loco γ ; & propterea expansio partis illius in itu, est ad ejus expansionem mediocrem, ut $EG - LN$ ad EG ; in reditu autem ut $EG + Ln$ seu $EG + LN$ ad EG . Quare cum sit LN ad KH ut IM ad radium OP , & KH ad EG ut circumferentia $PHSbP$ ad BC , id est (si ponatur V pro radio circuli circumferentiam habentis æqualem intervallo pulsuum BC) ut OP ad V ; & ex æquo LN ad EG , ut IM ad V : erit expansio partis EG punctive Physici F in loco γ , ad expansionem



panfionem mediocrem quam pars illa habet in loco suo primo EG , ut $V-IM$ ad \sqrt{V} in itu, utque $V+im$ ad V in reditu. Unde vis elastica puncti F in loco γ , est ad vim ejus elasticam me-

diocrem in loco EG , ut $\sqrt{V-IM}$ ad \sqrt{V} in itu, in reditu vero ut

$\sqrt{V+im}$ ad \sqrt{V} . Et eodem argumento vires elasticæ punctorum

Physicorum E & G in itu, sunt ut $\sqrt{V-HL}$ & $\sqrt{V-KN}$ ad

\sqrt{V} ; & virium differentia ad Medii vim elasticam mediocrem, ut

$$HL-KN$$

$\frac{VV-V \times HL - V \times KN + HL \times KN}{HL-KN}$ ad \sqrt{V} . Hoc est, ut $\frac{HL-KN}{\sqrt{V}}$ ad $\frac{1}{\sqrt{V}}$, five ut $HL-KN$ ad V , si modo (ob angustos

limites vibrationum) supponamus HL & KN indefinite minores esse quantitate V . Quare cum quantitas V detur, differentia virium est ut $HL-KN$, hoc est (ob proportionales $HL-KN$ ad HK , & OM ad OI vel OP , datasque HK & OP) ut OM ; id est, si Ff bisecetur in α , ut $\alpha\phi$. Et eodem argumento differentia virium elasticarum punctorum Physicorum ϵ & γ , in reditu lineolæ Physicæ $\epsilon\gamma$ est ut $\alpha\phi$. Sed differentia illa (id est, excessus vis elasticæ puncti ϵ supra vim elasticam puncti γ ,) est vis qua interjecta Medii lineola Physica $\epsilon\gamma$ acceleratur, & propterea vis acceleratrix lineolæ Physicæ $\epsilon\gamma$, est ut ipsius distantia a medio vibrationis loco α . Proinde tempus (per Prop. xxxviii. Lib. i.) recte exponitur per arcum PI ; & Medii pars linearis $\epsilon\gamma$ lege præscripta movetur, id est, lege oscillantis Penduli: estque par ratio partium omnium linearium ex quibus Medium totum componitur. *Q. E. D.*

Corol. Hinc patet quod numerus pulsuum propagatorum idem sit cum numero vibrationum corporis tremuli, neque multiplicatur in eorum progressu. Nam lineola Physica $\epsilon\gamma$, quamprimum ad locum suum primum redierit, quiescet; neque deinceps movebitur, nisi vel ab impetu corporis tremuli, vel ab impetu pulsuum qui a corpore tremulo propagantur, motu novo cieatur. Quiescet igitur quamprimum pulsus a corpore tremulo propagari desinunt.

Vv 2

P R O P O .

PROPOSITIO XLVIII. THEOREMA XXXVIII.

Pulsuum in Fluido Elastico propagatorum velocitates, sunt in ratione composita ex subduplicata ratione vis Elasticæ directe & subduplicata ratione densitatis inverse; si modo Fluidi vis Elasticæ ejusdem condensationi proportionalis esse supponatur.

Cas. 1. Si Media sint homogenea, & pulsuum distantiae in his Mediis æquantur inter se, sed motus in uno Medio intensior sit: contractiones & dilatationes partium analogarum erunt ut iidem motus. Accurata quidem non est hæc proportio. Verum tamen nisi contractiones & dilatationes sint valde intensæ, non errabit sensibilter, ideoque pro Physice accurata haberi potest. Sunt autem vires Elasticæ motrices ut contractiones & dilatationes; & velocitates partium æqualium simul genitæ sunt ut vires. Ideoque æquales & correspondentes pulsuum correspondentium partes, itus & reditus suos per spatia contractionibus & dilatationibus proportionalia, cum velocitatibus quæ sunt ut spatia, simul peragent: & propterea pulsus, qui tempore itus & reditus unius latitudinem suam progrediendo conficiunt, & in loca pulsuum proxime præcedentium semper succedunt, ob æqualitatem distantiarum, æquali cum velocitate in Medio utroque progredientur.

Cas. 2. Sin pulsuum distantiae seu longitudines sint majores in uno Medio quam in altero; ponamus quod partes correspondentes spatia latitudinibus pulsuum proportionalia singulis vicibus eundo & redeundo describant: & æquales erunt earum contractiones & dilatationes. Ideoque si Media sint homogenea, æquales erunt etiam vires illæ Elasticæ motrices quibus reciproco motu agitantur. Materia autem his viribus movenda, est ut pulsuum latitudo; & in eadem ratione est spatium per quod singulis vicibus eundo & redeundo moveri debent. Estque tempus itus & reditus unius in ratione composita ex ratione subduplicata materiæ & ratione subduplicata spatii, atque adeo ut spatium. Pulsus autem temporibus itus & reditus unius eundo latitudines suas conficiunt, hoc est, spatia temporibus proportionalia percurrunt; & propterea sunt æquveloces.

Cas. 3. In Mediis igitur densitate & vi Elasticæ paribus, pulsus omnes sunt æquveloces. Quod si Medii vel densitas vel vis Elasticæ intendatur, quoniam vis motrix in ratione vis Elasticæ, & materia movenda in ratione densitatis augetur; tempus quo mo-

tus

tus iidem peragantur ac prius, augebitur in subduplicata ratione densitatis, ac diminuetur in subduplicata ratione vis Elasticæ. Et propterea velocitas pulsum erit in ratione composita ex ratione subduplicata densitatis Medii inverſe & ratione subduplicata vis Elasticæ directe. *Q. E. D.*

Hæc Propoſitio ulterius patebit ex conſtructione ſequentis.

PROPOSITIO XLIX. PROBLEMA XI.

Datis Medii denſitate & vi Elatiica, invenire velocitatem pulſuum.

ſingamus Medium ab incumbente pondere, pro more Aeris noſtri comprimi; ſitque A altitudo Medii homogenei, cujus pondus adæquet pondus incumbens, & cujus denſitas eadem ſit cum denſitate Medii compreſſi, in quo pulſus propagantur. Conſlituit autem intelligatur Pendulum, cujus longitudo inter punctum ſuſpenſionis & centrum oſcillationis ſit A: & quo tempore Pendulum illud oſcillationem integram ex itu & reditu compoſitam peragit, eodem pulſus eundo conſiciet ſpatium circumferentiæ circuli radio A deſcripti æquale.

Nam ſtantiſus quæ in Propoſitione XLVII conſtructa ſunt, ſi linea quævis Phyſica EF, ſingulis vibrationibus deſcribendo ſpatium PS, urgeatur in extremis itus & reditus cujuſque locis P & S, a vi Elatiica quæ ipſius ponderi æquetur; peraget hæc vibrationes ſingulas quo tempore eadem in Cycloide, cujus perimenter tota longitudini PS æqualis eſt, oſcillari poſſet: id adeo quia vires æquales æqualia corpuscula per æqualia ſpatia ſimul impellent. Quare cum oſcillationum tempora ſint in ſubduplicata ratione longitudinis Pendulorum, & longitudo Penduli æquetur dimidio arcui Cycloidis totius; foret tempus vibrationis unius ad tempus oſcillationis Penduli cujus longitudo eſt A, in ſubduplicata ratione longitudinis PS ſeu PO ad longitudinem A. Sed vis Elatiica qua lineola Phyſica EG, in locis ſuis extremis P, S exiſtens, urgetur, erat (in demonſtratione Propoſitionis XLVII.) ad ejus vim totam Elatiicam ut HL—KN ad V, hoc eſt (cum punctum K jam incidat in P) ut HK ad V: & vi illa tota, hoc eſt pondus incumbens, quo lineola EG comprimitur, eſt ad pondus lineolæ ut ponderis incumbentis altitudo A ad lineolæ longitudinem EG; adeoque ex æquo, vi qua lineola EG in locis ſuis P & S urgetur, eſt ad lineolæ illius pondus ut HK×A ad V×EG, ſive ut PO×A ad VV, nam HK erat ad EG ut PO ad V. Quare cum tem-

V v 3

pora,

De Motu
Corporum,

pora, quibus æqualia corpora per æqualia spatia impelluntur, sint reciproce in subduplicata ratione virium, erit tempus vibrationis unius urgente vi illa Elastica, ad tempus vibrationis urgente vi ponderis, in subduplicata ratione VV ad $PO \times A$, atque adeo ad tempus oscillationis Penduli cujus longitudo est A , in subduplicata ratione VV ad $PO \times A$, & subduplicata ratione PO ad A conjunctim: id est, in ratione integra V ad A . Sed tempore vibrationis unius ex itu & reditu compositæ, pulsus progrediendo conficit latitudinem suam BC . Ergo tempus quo pulsus percurrit spatium BC , est ad tempus oscillationis unius ex itu & reditu compositæ, ut V ad A , id est, ut BC ad circumferentiam circuli cujus radius est A . Tempus autem, quo pulsus percurrit spatium BC , est ad tempus quo percurreret longitudinem huic circumferentiæ æqualem, in eadem ratione; ideoque tempore talis oscillationis pulsus percurreret longitudinem huic circumferentiæ æqualem. *Q. E. D.*

Corol. 1. Velocitas pulsuum ea est quam acquirunt Gravia, æqualiter accelerato motu cadendo, & casu suo describendo dimidium altitudinis A . Nam tempore casus hujus, cum velocitate cadendo acquisita, pulsus percurreret spatium quod erit æquale toti altitudini A , adeoque tempore oscillationis unius ex itu & reditu compositæ, percurreret spatium æquale circumferentiæ circuli radio A descripti: est enim tempus casus ad tempus oscillationis ut radius circuli ad ejusdem circumferentiam.

Corol. 2. Unde cum altitudo illa A sit ut Fluidi vis Elastica directe & densitas ejusdem inverse; velocitas pulsuum erit in ratione composita ex subduplicata ratione densitatis inverse & subduplicata ratione vis Elastice directe.

PROPOSITIO L. PROBLEMA XII.

Invenire pulsuum distantias.

Corporis, cujus tremore pulsus excitantur, inveniatur numerus Vibrationum dato tempore. Per numerum illum dividatur spatium quod pulsus eodem tempore percurrere possit, & pars inventa erit pulsus unius latitudo. *Q. E. I.*

Scholium.

Spectant propositiones novissimæ ad motum Lucis & Sonorum. Lux enim cum propagetur secundum lineas rectas, in actione sola (per

(per Prop. XLI. & XLII.) consistere nequit. Soni vero propterea quod a corporibus tremulis oriantur, nihil aliud sunt quam aeris pulsus propagati, per Prop. XLIII. Confirmatur id ex tremoribus quos excitant in corporibus objectis, si modo vehementes sint & graves, quales sunt soni Tympanorum. Nam tremores celeriores & breviores difficilius excitantur. Sed & sonos quosvis, in chordas corporibus sonoris unisonas impactos, excitare tremores notissimum est. Confirmatur etiam ex velocitate sonorum. Nam cum pondera specifica Aquæ pluvialis & Argenti vivi sint ad invicem ut 1 ad 13 $\frac{1}{2}$ circiter, & ubi Mercurius in *Barometro* altitudinem attingit digitorum *Anglicorum* 30, pondus specificum Aeris & aquæ pluvialis sint ad invicem ut 1 ad 870 circiter: erunt pondera specifica aeris & argenti vivi ut 1 ad 11890. Proinde cum altitudo argenti vivi sit 30 digitorum, altitudo aeris uniformis cuius pondus aerem nostrum subjectum comprimere posset, erit 356700 digitorum, seu pedum *Anglicorum* 29725. Estque hæc altitudo illa ipsa quam in constructione superioris Problematis nominavimus A. Circuli radio 29725 pedum descripti circumferentia est pedum 186768. Et cum Pendulum digitos 39; longum, oscillationem ex itu & reditu compositam, tempore minutorum duorum secundorum, uti notum est, absolvat; Pendulum pedes 29725, seu digitos 356700 longum, oscillationem consimilem tempore minutorum secundorum 190; absolvere debebit. Eo igitur tempore sonus progrediendo conficiet pedes 186768, adeoque tempore minuti unius secundi pedes 979.

Cæterum in hoc computo nulla habetur ratio crassitudinis solidarum particularum aeris per quam sonus utique propagatur in instanti. Cum pondus aeris sit ad pondus aquæ ut 1 ad 870, & sales sint fere duplo densiores quam aqua; si particulæ aeris ponantur esse ejusdem circiter densitatis cum particulis vel aquæ vel salium, & raritas aeris oriatur ab intervallis particularum: diameter particulæ aeris erit ad intervallum inter centra particularum, ut 1 ad 9 vel 10 circiter, & ad intervallum inter particulas ut 1 ad 8 vel 9. Proinde ad pedes 979 quos sonus tempore minuti unius secundi juxta calculum superiorem conficiet, addere licet pedes 27 $\frac{1}{2}$ seu 109 circiter, ob crassitudinem particularum aeris: & sic sonus tempore minuti unius secundi conficiet pedes 1088 circiter.

His adde quod vapores in aere latentes, cum sint alterius elateris & alterius toni, vix aut ne vix quidem participant motum aeris veri quo soni propagantur. His autem quiescentibus, motus.

tus.

DE MOTU
CORPORUM,

tus ille celerius propagabitur per solum aerem verum ; idque in subduplicata ratione minoris materiæ. Ut si Atmosphæra constet ex decem partibus aeris veri & una parte vaporum , motus sonorum celerior erit in subduplicata ratione 11 ad 10 , vel in integra circiter ratione 21 ad 20, quam si propagaretur per undecim partes aeris veri : ideoque motus sonorum supra inventus, augendus erit in hac ratione. Quo pacto sonus , tempore minuti unius secundi , conficiet pedes 1142.

Hæc ita se habere debent tempore verno & autumnali , ubi aer per calorem temperatum rarefcit & ejus vis elastica nonnihil intenditur. At hyberno tempore , ubi aer per frigus condensatur , & ejus vis elastica remittitur , motus sonorum tardior esse debet in subduplicata ratione densitatis ; & vicissim æstivo tempore debet esse velocior.

Constat autem per experimenta quod soni tempore minuti unius secundi eundo, conficiunt pedes *Londinenses* plus minus 1142, *Parisenses* vero 1070.

Cognita sonorum velocitate innotescunt etiam intervalla pulsuum. Invenit utique *D. Sauvveur* (factis a se experimentis) quod fistula aperta, cujus longitudo est pedum *Parisensium* plus minus quinque, sonum edit ejusdem toni cum sono chordæ quæ tempore minuti unius secundi centies recurrit. Sunt igitur pulsus plus minus centum in spatio pedum *Parisensium* 1070, quos sonus tempore minuti unius secundi percurrit ; adeoque pulsus unus occupat spatium pedum *Parisensium* quasi 10,7, id est, duplam circiter longitudinem fistulæ. Unde verisimile est quod latitudines pulsuum, in omnium apertarum fistularum sonis, æquantur duplis longitudinibus fistularum.

Porro cur soni cessante motu corporis sonori statim cessant, neque diutius audiuntur ubi longissime distamus a corporibus sonoris, quam cum proxime absumus, patet ex Corollario Propositionis XLVII Libri hujus. Sed & cur soni in Tubis stenterophonis valde augentur, ex allatis principiis manifestum est. Motus enim omnis reciprocus singulis recursibus a causa generante augeri solet. Motus autem in Tubis dilatationem sonorum impredientibus, tardius mittitur & fortius recurrit, & propterea a motu novo singulis recursibus impresso, magis augetur. Et hæc sunt præcipua Phænomena Sonorum.

S E C T I O

S E C T I O IX.

De Motu Circulari Fluidorum.


HYPOTHESIS.

Resistentiam, quæ oritur ex defectu lubricitatis partium Fluidi, cæteris paribus, proportionalem esse velocitati, qua partes Fluidi separantur ab invicem.

PROPOSITIO LI. THEOREMA XXXIX.

Si Cylindrus solidus infinite longus in Fluido uniformi & infinito circa axem positione datum uniformi cum motu revolvatur, & ab hujus impulsu solo agatur Fluidum in orbem, perseveret autem Fluidi pars unaquæque uniformiter in motu suo; dico quod tempora periodica partium Fluidi sunt ut ipsarum distantie ab axe Cylindri.

Sit *AFL* Cylindrus uniformiter circa axem *S* in orbem actus, & circulis concentricis *BGM*, *CHN*, *DIO*, *EKP*, &c. distinguatur Fluidum in Orbes Cylindricos innumeros concentricos solidos ejusdem crassitudinis. Et quoniam homogeneum est Fluidum, impressiones contiguorum Orbium in se mutuo factæ, erunt (per Hypothesin) ut eorum translationes ab invicem & superficies contiguæ in quibus impressiones fiunt. Si impressio in Orbem aliquem major est vel




X x

parte

DE MOTU
CORPORUM.

parte convexa; prævalebit impressio fortior, & motum Orbis vel accelerabit vel retardabit, prout in eandem regionem cum ipsius motu vel in contrariam dirigitur. Proinde ut Orbis unusquisque in motu suo uniformiter perseveret, debent impressiones ex parte utraque sibi invicem æquari, & fieri in regiones contrarias. Unde cum impressiones sunt ut contiguæ superficies & harum translationes ab invicem, erunt translationes inverse ut superficies, hoc est, inverse ut superficierum distantia ab axe. Sunt autem differentia motuum angularium circa axem ut hæ translationes applicatæ ad distantias, five ut translationes directæ & distantia inverse; hoc est (conjunctis rationibus) ut quadrata distantiarum inverse. Quare si ad infinita rectæ $SABCDE$ partes singulas erigantur perpendiculara Aa, Bb, Cc, Dd, Ee , &c. ipsarum SA, SB, SC, SD, SE , &c. quadratis reciproce proportionalia, & per terminos perpendicularium duci intelligatur linea curva Hyperbolica; erunt summæ differentiarum, hoc est, motus totius angulares, ut respondentes summæ linearum Aa, Bb, Cc, Dd, Ee : id est, si ad constituendum Medium uniformiter fluidum, Orbium numerus augeatur & latitudo minuatur in infinitum, ut areæ Hyperbolicae his summis analogæ AaQ, BbQ, CcQ, DdQ, EeQ , &c. Et tempora motibus angularibus reciproce proportionalia, erunt etiam his areis reciproce proportionalia. Est igitur tempus periodicum particulæ cujusvis D reciproce ut area DdQ , hoc est, (per notas Curvarum quadraturas) directè ut distantia SD . $Q. E. D.$



Corol. 1. Hinc motus angulares particularum fluidi sunt reciproce ut ipsarum distantia ab axe cylindri, & velocitates absolutæ sunt æquales.

Corol. 2. Si fluidum in vase cylindrico longitudinis infinitæ contineatur, & cylindrum alium interiore contineat, revolvatur autem cylindrus uterque circa axem communem, sintque revolutionum

tionum tempora ut ipsorum semidiametri, & perseveret fluidi pars unaquæque in motu suo; erunt partium singularum tempora periodica ut ipsarum distantiae ab axe cylindrorum.

Corol. 3. Si cylindro & fluido ad hunc modum motis addatur vel auferatur communis quilibet motus angularis; quoniam hoc novo motu non mutatur attritus mutuus partium fluidi, non mutabuntur motus partium inter se. Nam translationes partium ab invicem pendunt ab attritu. Pars quælibet in eo perseverabit motu, qui, attritu utrinque in contrarias partes facto, non magis acceleratur quam retardatur.

Corol. 4. Unde si toti cylindrorum & fluidi Systemati auferatur motus omnis angularis cylindri exterioris, habebitur motus fluidi in cylindro quiescente.

Corol. 5. Igitur si fluido & cylindro exteriore quiescentibus, revolvatur cylindrus interior uniformiter; communicabitur motus circularis fluido, & paulatim per totum fluidum propagabitur; nec prius desinet augeri quam fluidi partes singulæ motum Corollario quarto definitum acquirant.

Corol. 6. Et quoniam fluidum conatur motum suum adhuc latius propagare, hujus impetu circumagetur etiam cylindrus exterior nisi violenter detentus; & accelerabitur ejus motus quoad usque tempora periodica cylindri utriusque æquentur inter se. Quod si cylindrus exterior violenter detineatur, conabitur is motum fluidi retardare; & nisi cylindrus interior vi aliqua extrinsecus impressa motum illum conservet, efficiet ut idem paulatim cesset.

Quæ omnia in Aqua profunda stagnante experiri licet.

PROPOSITIO LII. THEOREMA XL.

Si Sphæra solida, in Fluido uniformi & infinito, circa axem positione datum uniformi cum motu revolvatur, & ab hujus impulsu solo agatur Fluidum in orbem; perseveret autem Fluidi pars unaquæque uniformiter in motu suo: dico quod tempora periodica partium Fluidi erunt ut quadrata distantiarum à centro Sphære.

Cas. 1. Sit *AFL* Sphæra uniformiter circa axem *S* in orbem acta, & circulis concentricis *BGM*, *CHN*, *DIO*, *EKP*, &c.

XX 2

distin-

De Motu
Corporum.

distinguatur Fluidum in Orbes innumeros concentricos ejusdem crassitudinis. Finge autem Orbes illos esse solidos; & quoniam homogeneous est Fluidum, impressiones contiguum Orbium in se mutuo factæ, erunt (per Hypothesin) ut eorum translationes ab invicem & superficies contiguæ in quibus impressiones fiunt. Si impressio in Orbem aliquem major est vel minor ex parte concava quam ex parte convexa; prævalebit impressio fortior, & velocitatem Orbis vel accelerabit vel retardabit, prout in eandem regionem cum ipsius motu vel in contrariam dirigitur. Proinde ut Orbis unusquisque in motu suo perseveret uniformiter, debent impressiones ex parte utraque sibi invicem æquari, & fieri in regiones contrarias. Unde cum impressiones sint ut contiguæ superficies & harum translationes ab invicem; erunt translationes inverse ut superficies, hoc est, inverse ut quadrata distantiarum superficialium a centro. Sunt autem differentiæ motuum angularium circa axem ut hæ translationes applicatæ ad distantias, sive ut translationes directæ & distantia inverse; hoc est (conjunctis rationibus) ut cubi distantiarum inverse. Quare si ad rectæ infinitæ $SAB CDEQ$, partes singulas erigantur perpendiculara Aa , Bb , Cc , Dd , Ee , &c. ipsarum SA , SB , SC , SD , SE , &c. cubis reciproce proportionalia, erunt summæ differentiarum, hoc est, motus toti angulares, ut respondentes summæ linearum Aa , Bb , Cc , Dd , Ee ; id est (si ad constituendum Medium uniformiter fluidum, numerus Orbium augeatur & latitudo minuatur in infinitum) ut area Hyperbolica his summis analogæ AaQ , BbQ , CcQ , DdQ , EeQ , &c. Et tempora periodica motibus angularibus reciproce proportionalia, erunt etiam his areis reciproce proportionalia. Est igitur tempus periodicum Orbis cujusvis DIO reciproce ut area DdQ , hoc est, (per notas Curvarum quadraturas) directe ut quadratum distantia SD . Id quod volui primo demonstrare.

Cas. 2. A centro Sphæræ ducantur infinitæ rectæ quam plurimæ, quæ cum axe datos contineant angulos, æqualibus differentiis se mutuo superantes, & his rectis circa axem revolutis concipie Orbes in annulos innumeros secari; & annulus unusquisque habebit annulos quatuor sibi contiguos, unum interiorem, alterum exteriorem & duos laterales. Attritu interioris & exterioris non potest annulus unusquisque, nisi in motu juxta legem casus primi facti, æqualiter & in partes contrarias urgeri. Patet hoc ex demonstratione casus primi. Et propterea annulorum series qualibet a

Globo

Globo in infinitum recta pergens, movebitur pro lege casus primi, nisi quatenus impeditur ab attritu annulorum ad latera. At in motu hac lege facto, attritus annulorum ad latera nullus est; neque adeo motum, quo minus hac lege fiat, impedit. Si annuli, qui a centro æqualiter distant, vel citius revolverentur vel tardius juxta polos quam juxta æquatorem; tardiores accelerarentur, & velociores retardarentur ab attritu mutuo, & sic vergerent semper tempora periodica ad æqualitatem, pro lege casus primi. Non impedit igitur hic attritus quæ minus motus fiat secundum legem casus primi, & propterea lex illa obtinebit: hoc est, annulorum singulorum tempora periodica erunt ut quadrata distantiarum ipsorum a centro Globi. Quod volui secundo demonstrare.

Cas. 3. Dividatur jam annulus unusquisque sectionibus transversis in particulas innumeras constituentes substantiam absolute & uniformiter fluidam, & quoniam hæ sectiones non spectant ad legem motus circularis, sed ad constitutionem Fluidi solummodo conducunt, perseverabit motus circularis ut prius. His sectionibus annuli omnes quam minimi asperitatem & vim attritus mutui aut non mutabunt aut mutabunt æqualiter. Et manente causarum proportionem manebit effectuum proportio, hoc est, proportio motuum & periodicorum temporum. *Q. E. D.* Cæterum cum motus circularis, & abinde orta vis centrifuga, major sit ad Eclipticam quam ad Polos, debeat causa aliqua adesse qua particula singula in circulis suis retineantur; ne materia quæ ad Eclipticam est, recedat semper a centro & per exteriora Vorticis migret ad Polos, indeque per axem ad Eclipticam circulatione perpetua revertatur.

Corol. 1. Hinc motus angulares partium fluidi circa axem globi, sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centro globi, & velocitates absolutæ reciproce ut eadem quadrata applicata ad distantias ab axe.

Corol. 2. Si globus in fluido quiescente simili & infinito circa axem positione datum uniformi cum motu revolvatur, communicabitur motus fluido in morem Vorticis, & motus iste paulatim propagabitur in infinitum; neque prius cessabit in singulis fluidi partibus accelerari, quam tempora periodica singularum partium sint ut quadrata distantiarum a centro globi.

Corol. 3. Quoniam Vorticis partes interiores ob majorem suam velocitatem atterunt & urgent exteriores, motumque ipsis ea actio-

De Motu ne perpetuo communicant, & exteriores illi eandem motus quanti-
Corporum, tatem in alios adhuc exteriores simul transferunt, eaque actione ser-
 vant quantitatem motus sui plane invariata; patet quod motus per-
 petuo transfertur a centro ad circumferentiam Vorticis, & per infi-
 nitatem circumferentiæ absorbetur. Materia inter sphaericas duas
 quasvis superficies Vortici concentricas nunquam accelerabitur, eo
 quod motum omnem a materia interiore acceptum transfert semper
 in exteriorem.

Corol. 4. Proinde ad conservationem Vorticis constanter in eodem
 movendi statu, requiritur principium aliquod activum, a quo globus
 eandem semper quantitatem motus accipiat, quam imprimit in ma-
 teriam Vorticis. Absque tali principio necesse est ut globus & Vor-
 tices partes interiores, propagantes semper motum suum in exterio-
 res, neque novum aliquem motum recipientes, tardescant paulatim
 & in orbem agi definant.

Corol. 5. Si globus alter huic Vortici ad certam ab ipso centro
 distantiam innataret, & interea circa axem inclinatione datum vi
 aliqua constanter revolveretur; hujus motu raperetur fluidum in
 Vorticem; & primo revolveretur hic Vortex novus & exiguus una
 cum globo circa centrum alterius, & interea latius serperet ipso
 motus, & paulatim propagaretur in infinitum, ad modum Vorticis
 primi. Et eadem ratione qua hujus globus raperetur motu Vorticis
 alterius, raperetur etiam globus alterius motu hujus, sic ut
 globi duo circa intermedium aliquod punctum revolverentur, se-
 que mutuo ob motum illum circularem fugerent, nisi per vim
 aliquam cohibiti. Postea si vires constanter impressæ, quibus
 globi in motibus suis perseverant, cessarent, & omnia legibus Me-
 chanicis permetterentur, languesceret paulatim motus globorum
 (ob rationem in Corol. 3. & 4. assignatam) & Vortices tandem con-
 quiescerent.

Corol. 9. Si globi plures datis in locis circum axes positione da-
 tos certis cum velocitatibus constanter revolverentur, fierent Vor-
 tices totidem in infinitum pergentes. Nam globi singuli, eadem
 ratione qua unus aliquis motum suum propagat in infinitum, pro-
 pagabunt etiam motus suos in infinitum, adeo ut fluidi infiniti pars
 unaquæque eo agitur motu qui ex omnium globorum actioni-
 bus resultat. Unde Vortices non definientur certis limitibus,
 sed in se mutuo paulatim excurrent; globique per actiones Vor-
 ticum in se mutuo, perpetuo movebuntur de locis suis, uti in
 Corollario superiore expositum est; neque certam quamvis inter se
 positionem

positionem servabunt, nisi per vim aliquam retenti. Cessantibus autem viribus illis quæ in globos constanter impressæ conservant hosce motus, materia ob rationem in Corollario tertio & quarto assignatam, paulatim requiescet & in Vortices agi desinet.

Corol. 7. Si fluidum simile claudatur in vase sphaerico, ac globi in centro consistentis uniformi rotatione agatur in Vorticem, globus autem & vas in eandem partem circa axem eundem revolvantur, sintque eorum tempora periodica ut quadrata semidiametrorum: partes fluidi non prius perseverabunt in motibus suis sine acceleratione & retardatione, quam sint eorum tempora periodica ut quadrata distantiarum a centro Vorticis. Alia nulla Vorticis constitutio potest esse permanens.

Corol. 8. Si vas, fluidum inclusum & globus servant hunc motum, & motu præterea communi angulari circa axem quemvis datum revolvantur; quoniam hoc motu novo non mutatur attritus partium fluidi in se invicem, non mutabuntur motus partium inter se. Nam translationes partium inter se pendent ab attritu. Pars quælibet in eo perseverabit motu, quo fit ut attritu ex uno latere non magis tardetur quam acceleretur attritu ex altero.

Corol. 9. Unde si vas quiescat ac detur motus globi, dabitur motus fluidi. Nam concipe planum transire per axem globi & motu contrario revolvi; & pone summam temporis revolutionis hujus & revolutionis globi esse ad tempus revolutionis globi, ut quadratum semidiametri vasis ad quadratum semidiametri globi: & tempora periodica partium fluidi respectu plani hujus, erunt ut quadrata distantiarum suarum a centro globi.

Corol. 10. Proinde si vas vel circa axem eundem cum globo, vel circa diversum aliquem, data cum velocitate quacunque moveatur, dabitur motus fluidi. Nam si Systemati toti auferatur vasis motus angularis, manebunt motus omnes iidem inter se qui prius, per Corol. 8. Et motus isti per Corol. 9. dabuntur.

Corol. 11. Si vas & fluidum quiescant & globus uniformi cum motu revolvatur, propagabitur motus paulatim per fluidum totum in vas, & circumagetur vas nisi violenter detentum, neque prius desinent fluidum & vas accelerari, quam sint eorum tempora periodica æqualia temporibus periodicis globi. Quod si vas vi aliqua detineatur vel revolvatur motu quovis constanti & uniformi, deveniet Medium paulatim ad statum motus in Corollariis 8. 9. & 10. definiti, nec in alio unquam statu quocunque perseverabit. Deinde vero si, viribus illis cessantibus quibus vas & globus certis motibus.

DE MOTU
CORPORUM,

motibus revolvebantur, permittatur Systema totum Legibus Mechanicis; vas & globus in se invicem agent mediante fluido, neque motus suos in se mutuo per fluidum propagare prius cessabunt, quam eorum tempora periodica æquentur inter se, & Systema totum ad instar corporis unius solidi simul revolvatur.

Scholium.

In his omnibus suppono fluidum ex materia quoad densitatem & fluiditatem uniformi constare. Tale est in quo globus idem eodem cum motu, in eodem temporis intervallo, motus similes & æquales, ad æquales semper a se distantias, ubivis in fluido constitutis, propagare possit. Conatur quidem materia per motum suum circularem recedere ab axe Vorticis, & propterea premit materiam omnem ulteriorem. Ex hac pressione fit attritus partium fortior & separatio ab invicem difficilior; & per consequens diminuitur materiæ fluiditas. Rursus si partes fluidi sunt alicubi crassiores seu majores, fluiditas ibi minor erit, ob pauciores superficies in quibus partes separantur ab invicem. In hujusmodi casibus deficientem fluiditatem vel lubricitatem partium vel lentorem aliave aliqua conditione restitui suppono. Hoc nisi fiat, materia ubi minus fluida est magis cohærebit & segnior erit, adeoque motum tardius recipiet, & longius propagabit quam pro ratione superius assignata. Si figura vasis non sit Sphærica, movebuntur particule in lineis non circularibus sed conformibus eidem vasis figuræ, & tempora periodica erunt ut quadrata mediocrium distantiarum a centro quamproxime. In partibus inter centrum & circumferentiam, ubi latiora sunt spatia, tardiores erunt motus, ubi angustiora velociores, neque tamen particule velociores petent circumferentiam. Arcus enim describent minus curvos, & conatus recedendi a centro non minus diminuetur per decrementum hujus curvaturæ, quam augebitur per incrementum velocitatis. Pergendo a spatiis angustioribus in latiora recedent paulo longius a centro, sed isto recessu tardescent, & accedendo postea de latioribus ad angustiora accelerabuntur; & sic per vices tardescent & accelerabuntur particule singulæ in perpetuum. Hæc ita se habebunt in vase rigido. Nam in fluido infinito constitutio Vorticum innotescit per Propositionis hujus Corollarium sextum.

Proprietates autem Vorticum hac Propositione investigare conatus sum, ut pertentarem siqua ratione Phænomena cœlestia per Vorti-

Vortices explicari possint. Nam Phænomenon est, quod Planetarum circa Jovem revolvendum tempora periodica sunt in ratione sesquuplicata distantiarum a centro Jovis; & eadem Regula obtinet in Planetis qui circa Solem revolvuntur. Obtinent autem hæ Regulæ in Planetis utrisque quam accuratissime, quatenus observationes Astronomicæ hætenus prodidere. Ideoque si Planetæ illi a Vorticibus circa Jovem & Solem revolventibus deferantur, debent etiam hi Vortices eadem lege revolvi. Verum tempora periodica partium Vorticis prodierunt in ratione duplicata distantiarum a centro motus; neque potest ratio illa diminui & ad rationem sesquiplicatam reduci, nisi vel materia Vorticis eo fluidior sit quo longius distat a centro, vel resistentia, quæ oritur ex defectu lubricitatis partium fluidi, ex aucta velocitate qua partes fluidi separantur ab invicem, augeatur in majori ratione quam ea est in qua velocitas augetur. Quorum tamen neutrum rationi consentaneum videtur. Partes crassiores & minus fluidæ (nisi graves sint in centrum) circumferentiam petent; & verisimile est quod, etiamsi Demonstrationum gratia Hypothesin talem initio Sectionis hujus proposuerim ut Resistentia velocitati proportionalis esset, tamen Resistentia in minori sit ratione quam ea velocitatis est. Quo concessa, tempora periodica partium Vorticis erunt in majori quam duplicata ratione distantiarum ab ipsius centro. Quod si Vortices (uti aliquorum est opinio) celerius moveantur prope centrum, dein tardius usque ad certum limitem, tum denuo celerius juxta circumferentiam; certe nec ratio sesquuplicata neque alia quævis certa ac determinata obtinere potest. Viderint itaque Philosophi quo pacto Phænomenon illud rationis sesquiplicatæ per Vortices explicari possit.

PROPOSITIO LIII. THEOREMA XLI.

Corpora quæ in Vortice delata in orbem redeunt, ejusdem sunt densitatis cum Vortice, & eadem lege cum ipsis partibus (quoad velocitatem & cursus determinationem) moventur.

Nam si Vorticis pars aliqua exigua, cujus particulæ seu puncta physica datum servant situm inter se, congelari supponatur: hæc, quoniam neque quoad densitatem suam, neque quoad vim insitam aut figuram suam mutatur, movebitur eadem lege ac prius: &

Y y

contra,

DE MOTU contra, si Vorticis pars congelata & solida ejusdem sit densitatis cum **CORPORUM**, reliquo Vortice, & resolvatur in fluidum; movebitur hæc eadem lege ac prius, nisi quatenus ipsius particulæ jam fluidæ factæ moveantur inter se. Negligatur igitur motus particularum inter se, tanquam ad totius motum progressivum nil spectans, & motus totius idem erit ac prius. Motus autem idem erit cum motu aliarum Vorticis partium a centro æqualiter distantium, propterea quod solidum in Fluidum resolutum sit pars Vorticis cæteris partibus confimilis. Ergo solidum, si sit ejusdem densitatis cum materia Vorticis, eodem motu cum ipsius partibus movebitur, in materia proxime ambiente relative quiescens. Sin densius sit, jam magis conabitur recedere a centro Vorticis quam prius; adeoque Vorticis vim illam, qua prius in Orbita sua tanquam in æquilibrio constitutum retinebatur, jam superans, recedet a centro & revolvendo describet Spiralem, non amplius in eundem Orbem rediens. Et eodem argumento si rarius sit, accedet ad centrum. Igitur non redibit in eundem Orbem nisi sit ejusdem densitatis cum fluido. Eo autem in casu ostensum est, quod revolveretur eadem lege cum partibus fluidi a centro Vorticis æqualiter distantibus. *Q. E. D.*


Corol. 1. Ergo solidum quod in Vortice revolvitur & in eundem Orbem semper redit, relative quiescit in fluido cui innatat.

Corol. 2. Et si Vortex sit quoad densitatem uniformis, corpus idem ad quamlibet a centro Vorticis distantiam revolvitur potest.

Scholium.

Hinc liquet Planetas a Vorticibus corporeis non deferri. Nam Planetæ secundum Hypothesin *Copernicæam* circa Solem delati revolvuntur in Ellipsis umbilicum habentibus in Sole, & radiis ad Solem ductis areas describunt temporibus proportionales. At partes Vorticis tali motu revolvitur nequeunt. Designent *AD, BE, CF*, Orbes tres circa Solem *S* descriptos, quorum extimus *CF* circulus sit Soli concentricus, & interiorum duorum Aphelia sint *A, B* & Perihelia *D, E*. Ergo corpus quod revolvitur in Orbe *CF*, radio ad Solem ducto areas temporibus proportionales describendo, movebitur uniformi cum motu. Corpus autem quod revolvitur in Orbe *BE*, tardius movebitur in Aphelio *B* & velocius in Perihelio *E*, secundum leges Astronomicas; cum tamen secundum leges Mechanicas materia Vorticis in spatio angustiore inter *A* & *C* velocius

velocius moveri debeat quam in spatio latiore inter *D* & *F*; id est, in Aphelio velocius quam in Perihelio. Quæ duo repugnant inter se. Sic in principio Signi Virginis, ubi Aphelium Martis jam versatur, distantia inter orbes Martis & Veneris est ad distantiam eorundem orbium in principio Signi Piscium ut tria ad duo circiter, & propterea materia Vorticis inter Orbes illos *F* in principio Piscium debet esse velocior quam in principio Virginis in ratione trium ad duo. Nam quo angustius est spatium per quod eadem Materię quantitas eodem revolutionis unius tempore transit, eo majori cum velocitate transire debet. Igitur si Terra in hac Materia cœlesti relative quiescens ab ea deferretur, & una circa Solem revolveretur, foret hujus velocitas in principio Piscium ad ejusdem velocitatem in principio Virginis in ratione sesquialtera. Unde Solis motus diurnus apparens in principio Virginis major esset quam minorum primorum septuaginta, & in principio Piscium minor quam minorum quadraginta & octo: cum tamen (experientia teste) apparens iste Solis motus major sit in principio Piscium quam in principio Virginis, & propterea Terra velocior in Principio Virginis quam in Principio Piscium. Itaque Hypothesis Vorticum cum Phenomenis Astronomicis omnino pugnat, & non tam ad explicandos quam ad perturbandos motus cœlestes conducit. Quomodo vero motus isti in spatiis liberis absque Vorticibus peragantur intelligi potest ex Libro primo, & in Mundi Systemate plenius docebitur.



Y y 2

D E

D E M U N D I S Y S T E M A T E

L I B E R T E R T I U S.

IN Libris præcedentibus principia Philosophiæ tradidi, non tamen Philologica sed Mathematica tantum, ex quibus videlicet in rebus Philosophicis disputari possit. Hæc sunt motuum & virium leges & conditiones, quæ ad Philosophiam maxime spectant. Eadem tamen, ne sterilia videantur, illustravi Scholiis quibusdam Philosophicis, ea tractans quæ generalia sunt, & in quibus Philosophia maxime fundari videtur, uti corporum densitatem & resistantiam, spatia corporibus vacua, motumque Lucis & Sonorum. Supereft ut ex iisdem principiis doceamus constitutionem Systematis Mundani. De hoc argumento composueram Librum tertium methodo populari, ut a pluribus legeretur. Sed quibus Principia posita satis intellecta non fuerint, ii vim consequentiarum minime percipient, neque præjudicia deponent quibus a multis retro annis infueverunt: & propterea ne res in disputationes trahatur, summam libri illius transtuli in Propositiones, more Mathematico, ut ab iis solis legantur qui Principia prius evolverint. Veruntamen quoniam Propositiones ibi quam plurimæ occurrunt, quæ Lectoribus etiam Mathematicè doctis moram nimiam injicere possint, auctor esse nolo ut quisquam eas omnes evolvat; suffecerit siquis Definitiones, Leges motuum & sectiones tres priores Libri primi sedulo legat, dein transeat ad hunc Librum de Mundi Systemate, & reliquas Librorum priorum Propositiones hic citatas pro lubitu consulat.

R E G U L Æ

R E G U L Æ PHILOSOPHANDI.

R E G U L A I.

*Causas rerum naturalium non plures admitti debere, quam
quæ & veræ sint & earum Phenomenis explicandis
sufficiant.*

Dicunt utique Philosophi : Natura nihil agit frustra, & frustra fit
per plura quod fieri potest per pauciora. Natura enim simplex
est & rerum causis superfluis non luxuriat.

R E G U L A II.

*Ideoquæ Effectuum naturalium ejusdem generis eadem
sunt Causæ.*

Uti respirationis in Homine & in Bestia; descensus lapidum in Eu-
ropa & in America; Lucis in Igne culinari & in Sole; reflexionis
Lucis in Terra & in Planetis.

R E G U L A III.

*Qualitates corporum quæ intendi & remitti nequeunt, quæ-
que corporibus omnibus competunt in quibus experimenta
institui licet, pro qualitatibus corporum universorum
habendæ sunt.*

Nam qualitates corporum non nisi per experimenta innotescunt,
ideoquæ generales statuendæ sunt quotquot cum experimentis ge-
neraliter quadrant; & quæ minui non possunt, non possunt auferri.
Certe contra experimentorum tenorem somnia temere confingen-
da non sunt, nec a Naturæ analogia recedendum est, cum

De Mundi
SYSTEMATE,

ea simplex esse soleat & sibi semper consona. Extensio corporum non nisi per sensus innotescit, nec in omnibus sentitur: sed quia sensibilibus omnibus competit, de universis affirmatur, Corpora plura dura esse experimur. Oritur autem durities totius a duritie partium, & inde non horum tantum corporum quæ sentiuntur, sed aliorum etiam omnium particulas indivisas esse duras merito concludimus. Corpora omnia impenetrabilia esse non ratione sed sensu colligimus. Quæ tractamus, impenetrabilia inveniuntur, & inde concludimus impenetrabilitatem esse proprietatem corporum universorum. Corpora omnia mobilia esse, & viribus quibusdam (quas vires inertiae vocamus) perseverare in motu vel quiete, ex hisce corporum visorum proprietatibus colligimus. Extensio, durities, impenetrabilitas, mobilitas & vis inertiae totius, oritur ab extensione, duritie, impenetrabilitate, mobilitate & viribus inertiae partium; & inde concludimus omnes omnium corporum partes minimas extendi & duras esse & impenetrabiles & mobiles & viribus inertiae præditas. Et hoc est fundamentum Philosophiæ totius. Porro corporum partes divisas & sibi mutuo contiguas ab invicem separari posse, ex Phænomenis novimus, & partes indivisas in partes minores ratione distingui posse ex Mathematica certum est. Utrum vero partes illæ distinctæ & nondum divisæ per vires Naturæ dividi & ab invicem separari possint, incertum est. At si vel unico constaret experimento quod particula aliqua indivisa, frangendo corpus durum & solidum, divisionem pateretur: concluderemus vi hujus Regulæ, quod non solum partes divisæ separabiles essent, sed etiam quod indivisæ in infinitum dividi possent.

Denique si corpora omnia in circuitu Terræ gravia esse in Terram, idque pro quantitate materiæ in singulis, & Lunam gravem esse in Terram pro quantitate materiæ suæ, & vicissim mare nostrum grave esse in Lunam, & Planetas omnes graves esse in se mutuo, & Cometarum similem esse gravitatem, per experimenta & observationes Astronomicas universaliter constat: dicendum erit per hanc Regulam quod corpora omnia in se mutuo gravitant. Nam & fortius erit argumentum ex Phænomenis de gravitate universali, quam de corporum impenetrabilitate: de qua utique in corporibus Cœlestibus nullum experimentum, nullam prorsus observationem habemus.

P H Æ N O.

P H Æ N O M E N A.

P H Æ N O M E N O N I.

Planetas Circumjoviales, radiis ad centrum Jovis ductis, areas describere temporibus proportionales, eorumque tempora periodica esse in ratione sesquuplicata distantiarum ab ipsius centro.

Constat ex observationibus Astronomicis. Orbes horum Planetarum non differunt sensibilibus a circulis Jovi concentricis, & motus eorum in his circulis uniformes deprehenduntur. Tempora vero periodica esse in sesquuplicata ratione semidiametrorum Orbium consentiunt Astronomi; & idem ex Tabula sequente manifestum est.

Satellitum Jovialium tempora periodica.

1^d. 18^h. 27'. 34". 3^d. 13^h. 13'. 42". 7^d. 3^h. 42'. 36". 16^d. 16^h. 32'. 9".

Distantiæ Satellitum a centro Jovis.

<i>Ex observationibus</i>	1	2	3	4	} Semidiam. Jovis.
Borelli	5½	8½	14	24½	
Townlei per Microm.	5, 52	8, 78	13, 47	24, 72	
Cassini per Telescop.	5	3	13	23	
Cassini per Eclips. Satell.	5½	9	14½	25½	
<i>Ex temporibus periodicis.</i>	5,667	9,017	14,384	25,299	

P H Æ N O M E N O N II.

Planetas Circum saturnios, radiis ad Saturnum ductis, areas describere temporibus proportionales, & eorum tempora periodica esse in ratione sesquuplicata distantiarum ab ipsius centro.

Cassinus utique ex observationibus suis distantias eorum a centro Saturni & periodica tempora hujusmodi esse statuit.

Satelli-

Satellitum Saturniorum tempora periodica.

1^d. 21^h. 19'. 2^d. 17^h. 41'. 4^d. 13^h. 47'. 15^d. 22^h. 41'. 79^d. 22^h. 4'.

Distantiæ Satellitum a centro Saturni in semidiametris Annuli.

Ex observationibus 1¹². 21. 31. 8. 24.
Ex temporibus periodicis 1,95. 2,5. 3,52. 8,09. 23,71.

PHÆNOMENON III.

Planetæ quinque primarios Mercurium, Venerem, Martem, Jovem & Saturnum Orbibus suis Solem cingere.

Mercurium & Venerem circa Solem revolvi ex eorum phasibus lunaribus demonstratur. Plena facie lucentes ultra Solem sui sunt, dimidiata e regione Solis, falcata cis Solem; per discum ejus ad modum macularum nonnunquam transeuntes. Ex Martis quoque plena facie prope Solis conjunctionem, & gibbosa in quadraturis, certum est quod is Solem ambit. De Jove etiam & Saturno idem ex eorum phasibus semper plenis demonstratur.

PHÆNOMENON IV.

Planetarum quinque primariorum, & (vel Solis circa Terram vel) Terræ circa Solem tempora periodica esse in ratione sesquuplicata mediocrium distantiarum à Sole.

Hæc a *Keplero* inventa ratio in confesso est apud omnes. Eadem utique sunt tempora periodica, eademque orbium dimensiones, si ve Sol circa Terram, si ve Terra circa Solem revolvatur. Ac de mensura quidem temporum periodicorum convenit inter Astronomos universos. Magnitudines autem Orbium *Keplerus* & *Bullialdus* omnium diligentissime ex Observationibus determinaverunt: & distantia mediocres, quæ temporibus periodicis respondent, non differunt sensibiliter a distantis quas illi invenerunt, suntque inter ipsas ut plurimum intermedia; uti in Tabula sequente videre licet.

Plane-

Planetarum ac Telluris distantiae mediocres à Sole.

	h	4	8	2	2	8
Secundum Keplerum	951000.	519650.	152350.	100000.	72400.	38506.
Secundum Bullialdum	954198.	522520.	152350.	100000.	72398.	38585.
Secundum tempora periodica	953806.	520116.	152399.	100000.	72333.	38710.

De distantii Mercurii & Veneris à Sole disputandi non est locus, cum hæ per eorum Elongationes à Sole determinentur. De distantii etiam superiorum Planetarum à Sole tollitur omnis disputatio per Eclipses Satellitum Jovis. Etenim per Eclipses illas determinatur positio umbræ quam Jupiter projicit, & eo nomine habetur Jovis longitudo Heliocentrica. Ex longitudinibus autem Heliocentrica & Geocentrica inter se collatis determinatur distantia Jovis.

PHÆNOMENON V.

Planetæ primarios, radiis ad Terram ductis, areas describere temporibus minime proportionales; at radiis ad Solem ductis, areas temporibus proportionales percurrere.

Nam respectu Terræ nunc progrediuntur, nunc stationarii sunt, nunc etiam regrediuntur: At Solis respectu semper progrediuntur, idque propemodum uniformi cum motu; sed paulo celerius tamen in Periheliis ac tardius in Apheliis, sic ut arearum æquabilis sit descriptio. Propositio est Astronomis notissima, & in Jove apprime demonstratur per Eclipses Satellitum, quibus Eclipsibus Heliocentricas Planetæ hujus longitudes & distantias à Sole determinari diximus.

PHÆNOMENON VI.

Lunam radio ad centrum Terræ ducto, aream tempori proportionalem describere.

Patet ex Lunæ motu apparente cum ipsius diametro apparente collato. Perturbatur autem motus Lunarum aliquantulum à vi Solis, sed errorum insensibiles minutias in hisce Phænomenis negligo.

Zz

P R O.

P R O P O S I T I O N E S.

PROPOSITIO I. THEOREMA I.

Vires, quibus Planetae Circumjoviales perpetuo retrabuntur à motibus rectilineis & in Orbibus suis retinentur, respicere centrum Jovis, & esse reciproce ut quadrata distantiarum locorum ab eodem centro.

Patet pars prior Propositionis per Phænomenon primum, & Propositionem secundam vel tertiam Libri primi: & pars posterior per Phænomenon primum, & Corollarium sextum Propositionis quartæ ejusdem Libri.

Idem intellige de Planetis qui Saturnum comitantur, per Phænomenon secundum.

PROPOSITIO II. THEOREMA II.

Vires, quibus Planetae primarii perpetuo retrabuntur à motibus rectilineis, & in Orbibus suis retinentur, respicere Solem, & esse reciproce ut quadrata distantiarum ab ipsius centro.

Patet pars prior Propositionis per Phænomenon quintum, & Propositionem secundam Libri primi: & pars posterior per Phænomenon quartum, & Propositionem quartam ejusdem Libri. Accuratissime autem demonstratur hæc pars Propositionis per quietem Apheliorum. Nam aberratio quam minima à ratione duplicata (per Corol. 1. Prop. xlv. Lib. I.) motum Apsidum in singulis revolutionibus notabilem, in pluribus enormem efficere deberet.

P R O-

PROPOSITIO III. PROBLEMA III.

Vim qua Luna retinetur in Orbe suo respicere Terram, & esse reciproce ut quadratum distantiae locorum ab ipsius centro.

Patet assertionis pars prior per Phænomenon sextum, & Propositionem secundam vel tertiam Libri primi: & pars posterior per motum tardissimum Lunarum Apogæi. Nam motus ille, qui singulis revolutionibus est graduum tantum trium & minorum trium in consequentia, contemni potest. Patet enim (per Corol. 1. Prop. XLV. Lib. I.) quod si distantia Lunæ a centro Terræ sit ad semidiametrum Terræ ut D ad 1; vis a qua motus talis oriatur sit reciproce ut D^2 , id est, reciproce ut ea ipsius D dignitas cujus index est 2, hoc est, in ratione distantiae paulo majore quam duplicata inverſe, sed quæ partibus 59½ propius ad duplicatam quam ad triplicatam accedit. Oritur vero ab actione Solis (uti posthac dicetur) & propterea hic negligendus est. Actio Solis quatenus Lunam distrahit a Terra, est ut distantia Lunæ a Terra quamproxime; ideoque (per ea quæ dicuntur in Corol. 2. Prop. XLV. Lib. I.) est ad Lunæ vim centripetam ut 2 ad 357,45 circiter, seu 1 ad 178½. Et neglecta Solis vi tantilla, vis reliqua qua Luna retinetur in Orbe erit reciproce ut D. Id quod etiam plenius constabit conferendo hanc vim cum vi gravitatis, ut fit in Propositione sequente.

Corol. Si vis centripeta mediocris qua Luna retinetur in Orbe, augeatur primo in ratione 177½ ad 178½, deinde etiam in ratione duplicata semidiametri Terræ ad mediocrem distantiam centri Lunæ a centro Terræ: habebitur vis centripeta Lunarum ad superficiem Terræ, posito quod vis illa descendendo ad superficiem Terræ, perpetuo augeatur in reciproca altitudinis ratione duplicata.

PROPOSITIO IV. THEOREMA IV.

Lunam gravitare in Terram, & vi gravitatis retrahi semper a motu rectilineo, & in Orbe suo retineri.

Lunæ distantia mediocris a Terra in Syzygiis est semidiametrorum terrestrium, secundum plerosque Astronomorum 59, secundum Vendelinum 60, secundum Copernicum 60½, & secundum Ty-

DE MUNDI
SYSTEMATE

chonem 56. Ast *Tycho*, & quotquot ejus Tabulas refractionum sequuntur, constituendo refractiones Solis & Lunæ (omnino contra naturam Lucis) majores quam Fixarum, idque scrupulis quasi quatuor vel quinque, auxerunt parallaxin Lunæ scrupulis totidem, hoc est, quasi duodecima vel decima quinta parte totius parallaxeos. Corrigatur ille error, & distantia evadet quasi 60 $\frac{1}{2}$ semidiametrorum terrestrium, fere ut ab aliis assignatum est. Assumamus distantiam mediocrem sexaginta semidiametrorum; & Lunarem periodum respectu Fixarum compleri diebus 27, horis 7, minutis primis 43, ut ab Astronomis statuitur; atque ambitum Terræ esse pedum Parisiensium 123249600, uti a *Gallis* mensurantibus definitum est: Et si Luna motu omni privari fingatur ac dimitti ut, urgente vi illa omni qua in Orbe suo retinetur, descendat in Terram; hæc spatio minuti unius primi cadendo describet pedes Parisienses 15 $\frac{1}{16}$. Colligitur hoc ex calculo vel per Propositionem xxxvii Libri primi, vel (quod eodem recidit) per Corollarium nonum Propositionis quariæ ejusdem Libri, confecto. Nam arcus illius quem Luna tempore minuti unius primi, medio suo motu, ad distantiam sexaginta semidiametrorum terrestrium describat, sinus versus est pedum Parisiensium 15 $\frac{1}{4}$ circiter. Unde cum vis illa accedendo ad Terram augeatur in duplicata distantiae ratione inversa, adeoque ad superficiem Terræ major sit partibus 60 \times 60 quam ad Lunam; corpus vi illa in regionibus nostris cadendo, describere deberet spatio minuti unius primi pedes Parisienses 60 \times 60 \times 15 $\frac{1}{4}$, & spatio minuti unius secundi pedes 15 $\frac{1}{16}$. Atqui corpora in regionibus nostris vi gravitatis cadendo, describunt tempore minuti unius secundi pedes Parisienses 15 $\frac{1}{16}$, uti *Hugenius* factis pendulorum experimentis & computo inde inito, demonstravit: & propterea (per Reg. i. & ii.) vis qua Luna in orbe suo retinetur, illa ipsa est quam nos Gravitatem dicere solemus. Nam si Gravitatis ab ea diversa est, corpora viribus utrisque conjunctis Terram petendo, duplo velocius descendent, & spatio minuti unius secundi cadendo describent pedes Parisienses 304: omnino contra Experimentiam.

Calculus hic fundatur in hypothefi quod Terra quiescit. Nam si Terra & Luna circum Solem moveantur, & interea quoque circum commune gravitatis centrum revolvantur: distantia centriorum Lunæ ac Terræ ab invicem erit 60 $\frac{1}{2}$ semidiametrorum terrestrium; uti computationem (per Prop. lx. Lib. I.) ineunti patebit.

P R O.

PROPOSITIO V. THEOREMA V.

LIBER
TERTIUS.

Planetas Circumjoviales gravitare in Jovem, Circumsaturnios in Saturnum, & Circumsolares in Solem, & vi gravitatis suæ retrahi semper à motibus rectilineis, & in Orbibus curvilineis retineri.

Nam revolutiones Planetarum Circumjovialium circa Jovem, Circumsaturniorum circa Saturnum, & Mercurii ac Veneris reliquorumque Circumsolarium circa Solem sunt Phenomena ejusdem generis cum revolutione Lunæ circa Terram; & propterea per Reg. 11. à causis ejusdem generis dependent: præsertim cum demonstratum sit quod vires, à quibus revolutiones illæ dependent, respiciant centra Jovis, Saturni ac Solis, & recedendo à Jove, Saturno & Sole decrescant eadem ratione ac lege, qua vis gravitatis decrescit in recessu à Terra.

Corol. 1. Gravitatis igitur datur in Planetas universos. Nam Venerem, Mercurium, cæterosque esse corpora ejusdem generis cum Jove & Saturno, nemo dubitat. Et cum attractio omnis (per motus Legem tertiam) mutua sit, Jupiter in Satellites suos omnes, Saturnus in suos, Terraque in Lunam, & Sol in Planetas omnes primarios gravitabit.

Corol. 2. Gravitatem, quæ Planetam unumquemque respicit, esse reciproce ut quadratum distantiae locorum ab ipsius centro.

Corol. 3. Graves sunt Planetæ omnes in se mutuo per Corol. 1. & 2. Et hinc Jupiter & Saturnus prope conjunctionem se invicem attrahendo, sensibilibus perturbant motus mutuos, Sol perturbat motus Lunares, Sol & Luna perturbant Mare nostrum, ut in sequentibus explicabitur.

PROPOSITIO VI. THEOREMA VI.

Corpora omnia in Planetas singulos gravitare, & pondera eorum in eundem quemvis Planetam, paribus distantis à centro Planetæ, proportionalia esse quantitati materiæ in singulis.

Descensus gravium omnium in Terram (dempta saltem inæquali retardatione quæ ex Aeris perexigua resistentia oritur) æqualibus

Zz 3

tempo-

DE MUNDI temporibus fieri, jamdudum observarunt alii ; & accuratissime qui-
SYSTEMATE, dem notare licet æqualitatem temporum in Pendulis. Rem tentavi
in Auro, Argento, Plumbo, Vitro, Arena, Sale communi, Ligno,
Aqua, Triticò. Comparabam pyxides duas ligneas rotundas &
æquales. Unam implebam Ligno, & idem Auri pondus suspende-
bam (quam potui exacte) in alterius centro oscillationis. Pyxides
ab æqualibus pedum undecim filis pendentes, constituebant Pen-
dula, quoad pondus, figuram, & aeris resistentiam omnino paria:
Et paribus oscillationibus, juxta positæ, ibant una & redibant diu-
tissime. Proinde copia materiæ in Auro (per Corol. 1. & 6. Prop.
xxiv. Lib. II.) erat ad copiam materiæ in Ligno, ut vis motricis
actio in totum Aurum ad ejusdem actionem in totum Lignum; hoc
est, ut pondus ad pondus. Et sic in cæteris. In corporibus ejus-
dem ponderis differentia materiæ, quæ vel minor esset quam pars
millelima materiæ totius, his experimentis manifesto deprehendi
potuit. Jam vero naturam gravitatis in Planetas eandem esse atque
in Terram, non est dubium. Elevari enim fingantur corpora hæc
Terrestria ad usque Orbem Lunæ, & una cum Luna motu omni
privata demitti, ut in Terram simul cadant; & per jam ante ostensa
certum est quod temporibus æqualibus describent æqualia spatia
cum Luna, adeoque quod sunt ad quantitatem materiæ in Luna, ut
pondera sua ad ipsius pondus. Porro quoniam Satellites Jovis
temporibus revolvuntur quæ sunt in ratione sesquuplicata distanti-
arum à centro Jovis, erunt eorum gravitates acceleratrices in Jo-
vem reciproce ut quadrata distantiarum à centro Jovis; & prop-
terea in æqualibus a Jove distantis, eorum gravitates acceleratrices
evaderent æquales. Proinde temporibus æqualibus ab æqualibus
altitudinibus cadendo, describerent æqualia spatia; perinde ut fit
in gravibus, in hac Terra nostra. Et eodem argumento Planetæ
circumsolares ab æqualibus à Sole distantis demissi, descensu suo
in Solem æqualibus temporibus æqualia spatia describerent. Vires
autem, quibus corpora inæqualia æqualiter accelerantur, sunt ut
corpora; hoc est, pondera ut quantitates materiæ in Planetis.
Porro Jovis & ejus Satellitum pondera in Solem proportionalia
esse quantitatibus materiæ eorum, patet ex motu Satellitum quam
maxime regulari; per Corol. 3. Prop. Lxv. Lib. I. Nam si ho-
rum aliqui magis traherentur in Solem, pro quantitate materiæ
suæ, quam cæteri: motus Satellitum (per Corol. 2. Prop. Lxv.
Lib. I.) ex inæqualitate attractionis perturbarentur. Si (paribus
à Sole distantis) Satelles aliquis gravior esset in Solem pro quan-
titate

titate materiæ suæ, quam Jupiter pro quantitate materiæ suæ, in ratione quacunque data, puta d ad e : distantia inter centrum Solis & centrum Orbis Satellitis, major semper foret quam distantia inter centrum Solis & centrum Jovis in ratione subduplicata quam proxime; uti calculis quibusdam initis inveni. Et si Satelles minus gravis esset in Solem in ratione illa d ad e , distantia centri Orbis Satellitis à Sole minor foret quam distantia centri Jovis à Sole in ratione illa subduplicata. Igitur si in æqualibus à Sole distantis, gravitas acceleratrix Satellitis cujusvis in Solem major esset vel minor quam gravitas acceleratrix Jovis in Solem, parte tantum millesima gravitatis totius; foret distantia centri Orbis Satellitis à Sole major vel minor quam distantia Jovis à Sole parte $\frac{1}{1000}$ distantiae totius, id est, parte quinta distantiae Satellitis extimi à centro Jovis: Quæ quidem Orbis eccentricitas foret valde sensibilis. Sed Orbes Satellitum sunt Jovi concentrici, & propterea gravitates acceleratrices Jovis & Satellitum in Solem æquantur inter se. Et eodem argumento pondere Saturni & Comitum ejus in Solem, in æqualibus à Sole distantis, sunt ut quantitates materiæ in ipsis: Et pondera Lunæ ac Terræ in Solem vel nulla sunt, vel earum massis accurate proportionalia. Aliqua autem sunt per Corol. 1. & 3. Prop. v.

Quinetiam pondera partium singularum Planetæ cujusque in alium quemcunque, sunt inter se ut materia in partibus singulis. Nam si partes aliquæ plus gravitarent, aliæ minus, quam pro quantitate materiæ: Planeta totus, pro genere partium quibus maxime abundet, gravitaret magis vel minus quam pro quantitate materiæ totius. Sed nec refert utrum partes illæ externæ sint vel internæ. Nam si verbi gratia corpora Terrestria, quæ apud nos sunt, in Orbem Lunæ elevari fingantur, & conferantur cum corpore Lunæ: Si horum pondera essent ad pondera partium externarum Lunæ ut quantitates materiæ in iisdem, ad pondera vero partium internarum in majori vel minori ratione, forent eadem ad pondus Lunæ totius in majori vel minori ratione: contra quam supra ostensum est.

Corol. 1. Hinc pondera corporum non pendent ab eorum formis & texturis. Nam si cum formis variari possent; forent majora vel minora, pro varietate formarum, in æquali materia: omnino contra Experientiam.

Corol.

DE MUNDI
SYSTEMATE.

Corol. 2. Corpora universa quæ circa Terram sunt, gravia sunt in Terram; & pondera omnium, quæ æqualiter à centro Terræ distant, sunt ut quantitates materiæ in iisdem. Hæc est qualitas omnium in quibus experimenta instituere licet, & propterea per Reg. III. de universis affirmanda est. Si Æther aut corpus aliud quodcunque vel gravitate omnino destitueretur, vel pro quantitate materiæ suæ minus gravitaret: quoniam id (ex mente *Aristotelis*, *Cartesii* & aliorum) non differt ab aliis corporibus nisi in forma materiæ, posset idem per mutationem formæ gradatim transmutari in corpus ejusdem conditionis cum iis quæ, pro quantitate materiæ, quam maxime gravitant, & vicissim corpora maxime gravia, formam illius gradatim induendo, possent gravitatem suam gradatim amittere. Ac proinde pondera penderent à formis corporum, possetque cum formis variari, contra quam probatum est in Corollario superiore.

Corol. 3. Spatia omnia non sunt æqualiter plena. Nam si spatia omnia æqualiter plena essent, gravitas specifica fluidi quo regio aeris impleretur, ob summam densitatem materiæ, nil cederet gravitati specificæ argenti vivi, vel auri, vel corporis alterius cujuscunque densissimi; & propterea nec aurum neque aliud quodcunque corpus in aere descendere posset. Nam corpora in fluidis, nisi specificè graviora sint, minime descendunt. Quod si quantitas materiæ in spatio dato per rarefactionem quamcunque diminui possit, quidni diminui possit in infinitum?

Corol. 4. Si omnes omnium corporum particulæ solidæ sint ejusdem densitatis, neque absque poris rarefieri possint, Vacuum datur. Ejusdem densitatis esse dico, quarum vires inertię sunt ut magnitudines.

Corol. 5. Vis gravitatis diversi est generis à vi magnetica. Nam attractio magnetica non est ut materia attracta. Corpora aliqua magis trahuntur, alia minus, plurima non trahuntur. Et vis magnetica in uno & eodem corpore intendi potest & remitti, estque nonnunquam longe major pro quantitate materiæ quam vis gravitatis, & in recessu à Magnete decrescit in ratione distantię non duplicata, sed fere triplicata, quantum ex crassis quibusdam observationibus animadvertere potui.

P R O .

PROPOSITIO VII. THEOREMA VII.

Gravitatem in corpora universa fieri, eamque proportionalem esse quantitati materiæ in singulis.

Planetæ omnes in se mutuo graves esse jam ante probavimus, ut & gravitatem in unumquemque seorsim spectatum esse reciproce ut quadratum distantie locorum à centro Planetæ. Et inde consequens est, (per Prop. LXXIX. Lib. I. & ejus Corollaria) gravitatem in omnes proportionalem esse materiæ in iisdem.

Porro cum Planetæ cujusvis *A* partes omnes graves sint in Planetam quemvis *B*, & gravitas partis cujusque sit ad gravitatem totius, ut materia partis ad materiam totius, & actioni omni reactio (per motus Legem tertiam) æqualis sit; Planeta *B* in partes omnes Planetæ *A* vicissim gravitabit, & erit gravitas sua in partem unamquamque ad gravitatem suam in totum, ut materia partis ad materiam totius. *Q. E. D.*

Corol. 1. Oritur igitur & componitur gravitas in Planetam totum ex gravitate in partes singulas. Cujus rei exempla habemus in attractionibus Magneticis & Electricis. Oritur enim attractio omnis in totum ex attractionibus in partes singulas. Res intelligitur in gravitate, concipiendo Planetas plures minores in unum Globum coire & Planetam majorem componere. Nam vis totius ex viribus partium componentium oriri debet. Siquis objiciat quod corpora omnia, quæ apud nos sunt, hac lege gravitare deberent in se mutuo, cum tamen ejusmodi gravitas neutiquam sentiatur? Respondeo quod gravitas in hæc corpora, cum sit ad gravitatem in Terram totam ut sunt hæc corpora ad Terram totam, longe minor est quam quæ sentiri possit.

Corol. 2. Gravitatio in singulas corporis particulas æquales est reciproce ut quadratum distantie locorum à particulis. Patet per Corol. 3. Prop. LXXIV. Lib. I.

PROPOSITIO VIII. THEOREMA VIII.

Si Globorum duorum in se mutuo gravitantium materia undique, in regionibus quæ a centrīs equaliter distant, homogenea sit: erit pondus Globi alterutrius in alterum reciproce ut quadratum distantie inter centra.

Postquam invenissem gravitatem in Planetam totum oriri & componi ex gravitatibus in partes; & esse in partes singulas reciproce proportionalem quadratis distantiarum à partibus: dubitabam an reciproca illa proportio duplicata obtineret accurate in vi tota ex viribus pluribus composita, an vero quam proxime. Nam fieri posset ut proportio, quæ in majoribus distantis satis accurate obtineret, prope superficiem Planetæ ob inæquales particularum distantias & situs dissimiles, notabiliter erraret. Tandem vero, per Prop. LXXV. & LXXVI. Libri primi & ipsarum Corollaria, intellexi veritatem Propositionis de qua hic agitur.

Corol. 1. Hinc inveniri & inter se comparari possunt pondera corporum in diversos Planetas. Nam pondera corporum æqualium circum Planetas in circulis revolvantium sunt (per Corol. 2. Prop. IV. Lib. I.) ut diametri circulorum directe & quadrata temporum periodicorum inverse; & pondera ad superficies Planetarum, aliasve quasvis à centro distantias, majora sunt vel minora (per hanc Propositionem) in duplicata ratione distantiarum inversa. Sic ex temporibus periodicis Veneris circum Solem dierum 224 & horarum 164, Satellitis extimi circumjovialis circum Jovem dierum 16 & horarum 16 $\frac{1}{11}$, Satellitis Hugeniani circum Saturnum dierum 15 & horarum 224, & Lunæ circum Terram dierum 27, hor. 7. min. 43, collatis cum distantia mediocri Veneris à Sole & cum elongationibus maximis heliocentricis Satellitis extimi circumjovialis à centro Jovis 8'. 21 $\frac{1}{2}$ ", Satellitis Hugeniani à centro Saturni 3'. 20", & Lunæ à Terra 10', computum incundo inveni quod corporum æqualium & à Sole, Jove, Saturno ac Terra æqualiter distantium pondera in Solem, Jovem, Saturnum ac Terram forent ad invicem ut 1, $\frac{1}{11}$, $\frac{1}{125}$, & $\frac{1}{1296}$ respective. Est enim parallaxis Solis ex observationibus novissimis quasi 10", & Hal-
leus noster per. emerfiones Jovis & Satellitum e parte obscura
Lunæ,

Lunæ, determinavit quod elongatio maxima heliocentrica Satellitis extimi Jovialis a centro Jovis in mediocri Jovis a Sole distantia sit 8'. 21", & diameter Jovis 41". Ex duratione Eclipsæon Satellitum in umbram Jovis incidentium prodit hæc diameter quasi 40", atque adeo semidiameter 20". Mensuravit autem *Hugenius* elongationem maximam heliocentricam Satellitis a se detecti 3'. 20" a centro Saturni, & hujus elongationis pars quarta, nempe 50", est diameter annuli Saturni e Sole visi, & diameter Saturni est ad diametrum annuli ut 4. ad 9, ideoque semidiameter Saturni e Sole visi est 11". Subducatur lux erratica quæ haud minor esse solet quam 2". vel 3": Et manebit semidiameter Saturni quasi 9". Ex hisce autem & Solis semidiametro mediocri 16'. 6" computum ineundo prodeunt veræ Solis, Jovis, Saturni ac Terræ semidiametri ad invicem ut 10000, 1077, 889 & 104. Unde, cum pondera æqualium corporum a centris solis, Jovis, Saturni ac Terræ æqualiter distantium, sint in Solem, Jovem, Saturnum ac Terram, ut 1, $\frac{1}{10000}$, $\frac{1}{1077}$, & $\frac{1}{104}$ respective, & auctis vel diminutis distantis pondera diminuuntur vel augeantur in duplicata ratione: pondera æqualium corporum in Solem, Jovem, Saturnum ac Terram in distantis 10000, 1077, 889, & 104 ab eorum centris, atque adeo in eorum superficiebus, erunt ut 10000, 835, 525, & 410 respective. Quanta sint pondera corporum in superficie Lunæ dicemus in sequentibus.

Corol. 2. Innotescit etiam quantitas materiæ in Planetis singulis. Nam quantitates materiæ in Planetis sunt ut eorum vires in æqualibus distantis ab eorum centris, id est, in Sole, Jove, Saturno ac Terra sunt ut 1, $\frac{1}{10000}$, $\frac{1}{1077}$, & $\frac{1}{104}$ respective. Si parallaxis Solis statuatur major vel minor quam 10", debeat quantitas materiæ in Terra augeri vel diminui in triplicata ratione.

Corol. 3. Innotescunt etiam densitates Planetarum. Nam pondera corporum æqualium & homogeneorum in Sphæras homogeneas sunt in superficiebus Sphærarum ut Sphærarum diametri, per Prop. LXXII. Lib. I. ideoque Sphærarum heterogenearum densitates sunt ut pondera illa applicata ad Sphærarum diametros: Erant autem veræ Solis, Jovis, Saturni ac Terræ diametri ad invicem ut 10000, 1077, 889, & 104, & pondera in eisdem ut 10000, 835, 525, & 410, & propterea densitates sunt ut 100, 78, 59, & 396. Densitas Terræ quæ prodit ex hoc computo non pendet a parallaxi Solis, sed determinatur per parallaxin Lunæ, & propterea

DE MUNDI SYSTEMATIS terea hic recte definitur. Est igitur Sol paulo densior quam Jupiter, & Jupiter quam Saturnus, & Terra quadruplo densior quam Sol. Nam per ingentem suum calorem Sol rarefcit. Luna vero densior est quam Terra, ut in sequentibus patebit.

Corol. 4. Densiores igitur sunt Planetæ qui sunt minores, cæteris paribus. Sic enim vis gravitatis in eorum superficiebus ad æqualitatem magis accedit. Sed & densiores sunt Planetæ, cæteris paribus, qui sunt Soli propiores; ut Jupiter Saturno, & Terra Jove. In diversis utique distantis a Sole collocandi erant Planetæ ut quilibet gradu densitatis calore Solis majore vel minore frueretur. Aqua nostra, si Terra locaretur in orbe Saturni, rigesceret, si in orbe Mercurii in vapores statim abiret. Nam lux Solis, cui calor proportionalis est, septuplo densior est in orbe Mercurii quam apud nos: & Thermometro expertus sum quod septuplo Solis æstivi calore aqua ebullit. Dubium vero non est quin materia Mercurii ad calorem accommodetur, & propterea densior sit hac nostra; cum materia omnis densior ad operationes Naturales obeundas majorem calorem requirat.

PROPOSITIO IX. THEOREMA IX.

*Gravitatem pergendo a superficiebus Planetarum deorsum de-
crescere in ratione distantiarum a centro quam proxime.*

Si materia Planetæ quoad densitatem uniformis esset, obtineret hæc Propositio accurate: per Prop. LXXIII. Lib. I. Error igitur tantus est, quantus ab inæquabili densitate oriri possit.

PROPOSITIO X. THEOREMA X.

Motus Planetarum in Cælis diutissime conservari posse:

In Scholio Propositionis XL. Lib. II. ostensum est quod globus Aquæ congelatæ in Aere nostro, libere movendo & longitudinem semidiametri suæ describendo, ex resistentia Aeris amitteret motus sui partem Obtinet autem eadem proportio quam proxime in globis utcumque magnis & velocibus. Jam vero Globum Terræ nostræ densiorem esse quam si totus ex Aqua constaret, sic colligo. Si Globus hicce totus esset aqueus, quæcunque rariora essent quam aqua, ob minorem specificam gravitatem emergerent & supernata-
rent.

rent. Eaque de Causa Globus terreus aquis undique coopertus, si rarior esset quam aqua, emergeret alicubi, & aqua omnis inde defluens congregaretur in regione opposita. Et par est ratio Terræ nostræ maribus magna ex parte circumdatæ. Hæc si densior non esset, emergeret ex maribus, & parte sui pro gradu levitatis extaret ex Aqua, maribus omnibus in regionem oppositam confluentibus. Eodem argumento maculæ Solares leviores sunt quam materia lucida Solaris cui supernant. Et in formatione qualicumque Planetarum, materia omnis gravior, quo tempore massa tota fluida erat, centrum petebat. Unde cum Terra communis suprema quasi duplo gravior sit quam aqua, & paulo inferius in todinis quasi triplo vel quadruplo aut etiam quintuplo gravior reperitur: verisimile est quod copia materiæ totius in Terra quasi quintuplo vel sextuplo maior sit quam si tota ex aqua constaret; præsertim cum Terram quasi quintuplo densiorem esse quam Jovem jam ante ostensum sit. Igitur si Jupiter paulo densior sit quam aqua, hic spatio dierum triginta, quibus longitudinem 459 semidiametrorum suarum describit, amitteret in Medio ejusdem densitatis cum Aere nostro motus sui partem fere decimam. Verum cum resistentia Mediorum minuat in ratione ponderis ac densitatis, sic ut aqua, quæ partibus 131 levior est quam argentum vivum, minus resistat in eadem ratione; & aer, qui partibus 850 levior est quam aqua, minus resistat in eadem ratione: si ascendatur in cælos ubi pondus Medii, in quo Planetæ moventur, diminuitur in immensum, resistentia prope cessabit.

L I N E R
T E R T I U S.

HYPOTHESIS I.

Centrum Systematis Mundani quiescere.

Hoc ab omnibus concessum est, dum aliqui Terram alii Solem in centro Systematis quiescere contendunt. Videamus quid inde sequatur.

PROPOSITIO XI. THEOREMA XI.

Commune centrum gravitatis Terræ, Solis & Planetarum omnium quiescere.

Nam centrum illud (per Legum Corol. 4.) vel quiescet vel progredietur uniformiter in directum. Sed centro illo semper

A a a 3.

pro-

DE MUNDI progrediente, centrum Mundi quoque movebitur contra Hypothesin.

PROPOSITIO XII. THEOREMA XII.

Solem motu perpetuo agitari, sed nunquam longe recedere a communi gravitatis centro Planetarum omnium.

Nam cum (per Corol. 2. Prop. viii.) materia in Sole sit ad materiam in Jove ut 1033 ad 1, & distantia Jovis a Sole sit ad semidiametrum Solis in ratione paulo majore; incidet commune centrum gravitatis Jovis & Solis in punctum paulo supra superficiem Solis. Eodem argumento cum materia in Sole sit ad materiam in Saturno ut 2411 ad 1, & distantia Saturni a Sole sit ad semidiametrum Solis in ratione paulo minore; incidet commune centrum gravitatis Saturni & Solis in punctum paulo infra superficiem Solis. Et ejusdem calculi vestigiis insistendo si Terra & Planetæ omnes ex una Solis parte consisterent, commune omnium centrum gravitatis vix integra Solis diametro a centro Solis distaret. Aliis in casibus distantia centrorum semper minor est. Et propterea cum centrum illud gravitatis perpetuo quiescit, Sol pro vario Planetarum situ in omnes partes movebitur, sed à centro illo nunquam longe recedet.

Corol. Hinc commune gravitatis centrum Terræ, Solis & Planetarum omnium pro centro Mundi habendum est. Nam cum Terra, Sol & Planetæ omnes gravitent in se mutuo, & propterea, pro vi gravitatis suæ, secundum leges motus perpetuo agitentur: perspicuum est quod horum centra mobilia pro Mundi centro quiescente haberi nequeunt. Si corpus illud in centro locandum esset in quod corpora omnia maxime gravitant (uti vulgi est opinio) privilegium istud concedendum esset Soli. Cum autem Sol moveatur, eligendum erit punctum quiescens, a quo centrum Solis quam minime discedit; & a quo idem adhuc minus discederet, si modo Sol densior esset & major, ut minus moveretur.

PRO.

PROPOSITIO XIII. THEOREMA XIII.

Planetae moventur in Ellipsis umbilicum habentibus in centro Solis, & radiis ad centrum illud ductis areas describunt temporibus proportionales.

Disputavimus supra de his motibus ex Phenomenis. Jam cognitis motuum principiis, ex his colligimus motus cœlestes a priori. Quoniam pondera Planetarum in Solem sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centro Solis; si Sol quiesceret & Planetæ reliqui non agerent in se mutuo; forent orbes eorum Elliptici, Solem in umbilico communi habentes, & areae describerentur temporibus proportionales (per Prop. I. & XI, & Corol. I. Prop. XIII. Lib. I.) Actiones autem Planetarum in se mutuo perexiguæ sunt (ut possint contemni) & motus Planetarum in Ellipsis circa Solem mobilem minus perturbant (per Prop. LXVI. Lib. I.) quam si motus isti circa Solem quiescentem peragerentur.

Actio quidem Jovis in Saturnum non est omnino contemnenda. Nam gravitas in Jovem est ad gravitatem in Solem (paribus distantis; ut 1 ad 1033; adeoque in conjunctione Jovis & Saturni, quoniam distantia Saturni a Jove est ad distantiam Saturni a Sole fere ut 4 ad 9, erit gravitas Saturni in Jovem ad gravitatem Saturni in Solem ut 81 ad 16 \times 1033 seu 1 ad 204 circiter. Et hinc oritur perturbatio orbis Saturni in singulis Planetæ hujus cum Jove conjunctionibus adeo sensibilis ut ad eandem Astronomi hæreant. Pro vario situ Planetæ in his conjunctionibus, Eccentricitas ejus nunc augetur nunc diminuitur, Aphelium nunc promovetur nunc forte retrahitur, & medius motus per vices acceleratur & retardatur. Error tamen omnis in motu ejus circum Solem a tanta vi oriundus (præterquam in motu medio) evitari fere potest constituendo umbilicum inferiorem Orbis ejus in communi centro gravitatis Jovis & Solis (per Prop. LXVII. Lib. I.) & propterea ubi maximus est, vix superat minuta duo prima. Et error maximus in motu medio vix superat minuta duo prima annuatim. In conjunctione autem Jovis & Saturni gravitates acceleratrices Solis in Saturnum, Jovis in Saturnum & Jovis in Solem sunt fere ut 16, 81 & $\frac{16 \times 81 \times 1033}{25}$ seu 124986, adeoque differentia gravitatum Solis in Saturnum & Jovis in Saturnum est ad gravitatem Jovis.

DE MUNDI
SYSTEMATE,

Jovis in Solem ut 65 ad 124986 seu 1 ad 1923. Huic autem differentiæ proportionalis est maxima Saturni efficacia ad perturbandum motum Jovis, & propterea perturbatio orbis Jovialis longe minor est quam ea Saturnii. Reliquorum orbium perturbationes sunt adhuc longe minores, præterquam quod Orbis Terræ sensibilibiter perturbatur a Luna. Commune centrum gravitatis Terræ & Lunæ, Ellipsin circum Solem in umbilico positum percurrit, & radio ad Solem ducto areas in eadem temporibus proportionales describit, Terra vero circum hoc centrum commune motu mensuruo revolvitur.

PROPOSITIO XIV. THEOREMA XIV.

Orbium Aphelia & Nodi quiescunt.

Aphelia quiescunt, per Prop. XI. Lib. I. ut & Orbium plana, per ejusdem Libri Prop. 1. & quiescentibus planis quiescunt Nodi. Attamen a Planetarum revolventium & Cometarum actionibus in se invicem orientur inæqualitates aliquæ, sed quæ ob parvitatem hic contemni possunt.

Corol. 1. Quiescunt etiam Stellæ fixæ, propterea quod datas ad Aphelia Nodosque positiones servant.

Corol. 2. Ideoque cum nulla sit earum parallaxis sensibilis ex Terræ motu annuo oriunda, vires earum ob immensam corporum distantiam nullos edent sensibiles effectus in regione Systematis nostri. Quinimo Fixæ in cœli partes æqualiter dispersæ contrariis attractionibus vires mutuas destruunt, per Prop. LXX. Lib. I.

Scholium.

Cum Planetæ Soli propiores (nempe Mercurius, Venus, Terra, & Mars) ob corporum parvitatem parum agant in se invicem: horum Aphelia & Nodi quiescent, nisi quatenus a viribus Jovis, Saturni, & corporum superiorum turbentur. Et inde colligi potest per theoriam gravitatis, quod horum Aphelia moventur aliquantulum in consequentia respectu fixarum, idque in proportionem sesquuplicata distantiarum horum Planetarum a Sole. Ut si Aphelium Martis in annis centum conficiat 35' in consequentia respectu fixarum; Aphelia Terræ, Veneris, & Mercurii in annis centum conficient 18', 36", 11'. 27", & 4'. 29" respective. Et hi motus, ob parvitatem, negliguntur in hac Propositione.

P R O-

PROPOSITIO XV. PROBLEMA I.

Invenire Orbium principales diametros.

Capiendæ sunt hæ in ratione subseſquuplicata temporum periodico-
rum, per Prop. xv. Lib. I. deinde ſigillatim augendæ in ratione
ſummæ maſſarum Solis & Planetæ cujuſque revolvantis ad primam
duarum medie proportionalium inter ſummam illam & Solem, per
Prop. lx. Lib. I.

PROPOSITIO XVI. PROBLEMA II.

Invenire Orbium Eccentricitates & Aphelia.

Problema conſit per Prop. xviii. Lib. I.

PROPOSITIO XVII. THEOREMA XV.

*Planetarum motus diurnos uniformes eſſe, & librationem
Lunæ ex ipſius motu diurno oriri.*

Patet per motus Legem I. & Corol. 22. Prop. lxxvi. Lib. I.
Quoniam vero Lunæ, circa axem ſuum uniformiter revolvantis,
dies menſtruus eſt; huius facies eadem ulteriorem umbilicum or-
bis ipſius ſemper reſpiciet, & propterea pro ſitu umbilici illius
deviabit hinc inde a Terra. Hæc eſt libratio in longitudinem.
Nam libratio in latitudinem orta eſt ex inclinatione axis Lunarſ ad
planum orbis. Porro hæc ita ſe habere, ex Phænomenis manifeſtum
eſt.

PROPOSITIO XVIII. THEOREMA XVI.

*Axes Planetarum diametris quæ ad eoſdem axes normaliter
ducuntur minores eſſe.*

Planetæ ſublato omni motu circulari diurno figuram Sphæricam,
ob æqualem undique partium gravitatem, affectare deberent. Per
motum illum circularem ſit ut partes ab axe recedentes juxta
æquatozem aſcendere conentur. Ideoque materia ſi fluida ſit
Bbb aſcenſu

DE MUNDO
SYSTEMATE,
ascensu suo ad æquatorem diametros adaugebit, axem vero descensu suo ad polos diminuet. Sic Jovis diameter (consentientibus Astronomorum observationibus) brevior deprehenditur inter polos quam ab oriente in occidentem. Eodem argumento, nisi Terra nostra paulo altior esset sub æquatore quam ad polos, Maria ad polos subfiderent, & juxta æquatorem ascendendo, ibi omnia inundarent.

PROPOSITIO XIX. PROBLEMA III.

Invenire proportionem axis Planetæ ad diametros eidem perpendiculares.

Picartus mensurando arcum gradus unius & 22'. 55" inter *Ambianum* & *Malvoisiam*, invenit arcum gradus unius esse hexapedarum Parisiensium 57060. Unde ambitus Terræ est pedum Parisiensium 123249600, ut supra. Sed cum error quadringentesimæ partis digiti, tam in fabrica instrumentorum quam in applicatione eorum ad observationes capiendas, sit insensibilis, & in Sectore decempedali quo *Galli* observarunt Latitudines locorum respondeat minutis quatuor secundis, & in singulis observationibus incidere possit tam ad centrum Sectoris quam ad ejus circumferentiam, & errores in minoribus arcibus sint majoris momenti: * ideo *Cassinus* jussu Regio mensuram Terræ per majora locorum intervalla aggressus est, & subinde per distantiam inter Observatorium Regium *Parisiense* & villam *Colioure* in *Rouffillon* & Latitudinum differentiam 6^{te}. 18', supponendo quod ngura Terræ sit Sphærica, invenit gradum unum esse hexapedarum 57292, prope ut *Norwoodus* noster antea invenerat. Hic enim circa annum 1635, mensurando distantiam pedum Londinensium 905751 inter *Londinum* & *Eboracum*, & observando differentiam Latitudinum 2^{te}. 18', collegit mensuram gradus unius esse pedum Londinensium 367196, id est, hexapedarum Parisiensium 57300. Ob magnitudinem intervalli a *Cassino* mensurati, pro mensura gradus unius in medio intervalli illius, id est, inter Latitudines 45^{te}. & 46^{te}. usurpabo hexapedas 57292. Unde, si Terra sit Sphærica, semidiameter ejus erit pedum Parisiensium 19695539.

* Vide Historiam Academicæ Regiæ Scientiarum anno 1700.


Penduli-

Penduli in Latitudine *Lutetiae Parisiorum* ad minuta secunda oscillantis longitudo est pedum trium Parisiensium & linearum 81. Et longitudo quod grave tempore minuti unius secundi cadendo describit, est ad dimidiam longitudinem penduli hujus, in duplicata ratione circumferentiae circuli ad diametrum ejus (ut indicavit *Hugenius*) ideoque est pedum Parisiensium 15, dig. 1, lin. $2\frac{1}{2}$, seu linearum 2174 $\frac{1}{2}$.

Corpus in circulo, ad distantiam pedum 19695539 a centro, singulis diebus sidereis horarum 23. 56'. 4" uniformiter revolvens, tempore minuti unius secundi describit arcum pedum 1436, 223, cujus sinus versus est pedum 0,05236558, seu linearum 7,54064. Ideoque vis qua gravia descendunt in Latitudine *Lutetiae*, est ad vim centrifugam corporum in *Aequatore*, a Terrae motu diurno oriundam, ut 2174 $\frac{1}{2}$ ad 7,54064.

Vis centrifuga corporum in *Aequatore*, est ad vim centrifugam qua corpora directe tendunt a Terra in Latitudine *Lutetiae* graduum 48. 50', in duplicata ratione Radii ad sinum complementi Latitudinis illius, id est, ut 7,54064 ad 3,267. Addatur hæc vis ad vim qua gravia descendunt in Latitudine *Lutetiae*, & corpus in Latitudine *Lutetiae* vi tota gravitatis cadendo, tempore minuti unius secundi describeret lineas 2177, 32, seu pedes Parisienses 15, dig. 1, & lin. 5, 32. Et vis tota gravitatis in Latitudine illa, erit ad vim centrifugam corporum in *Aequatore* Terræ, ut 2177, 32 ad 7,54064, seu 289 ad 1.


Unde si *APBQ* figuram Terræ designet jam non amplius Sphæricam sed revolutione Ellipseos circum axem minorem *PQ* genitam, sitque *ACQca* canalis aquæ plena, a polo *Qq* ad centrum *Cc*, & inde ad *Aequatorem* *Aa* pergens: debebit pondus aquæ in canalis crure *ACca*, esse ad pondus aquæ in crure altero *QCcq* ut 289 ad 288, eo quod vis centrifuga ex circulari motu orta partem unam e ponderis partibus 289 sustinebit ac detrahet, & pondus 288 in altero crure sustinebit reliquas. Porro (ex Propositionis xci. Corollario secundo, Lib. I.) computationem incundo, invenio quod si Terra constaret ex uniformi materia, motuque omni privaretur, & esset ejus axis *PQ* ad



Bbb 2

DE MUNDI
SYSTEMATE,

ad diametrum AB ut 100 ad 101 : gravitas in loco Q in Terram, foret ad gravitatem in eodem loco Q in Sphæram centro C radio PC vel QC descriptam, ut 126 ad 125. Et eodem argumento gravitas in loco A in Sphæroidem, convolutione Ellipseos $APBQ$ circa axem AB descriptam, est ad gravitatem in eodem loco A in Sphæram centro C radio AC descriptam, ut 125 ad 126. Est autem gravitas in loco A in Terram, media proportionalis inter gravitates in dictam Sphæroidem & Sphæram : propterea quod Sphæra, diminuendo diametrum PQ in ratione 101 ad 100, vertitur in figuram Terræ ; & hæc figura diminuendo in eadem ratione diametrum tertiam, quæ diametris duabus AB , PQ perpendicularis est, vertitur in dictam Sphæroidem, & gravitas in A , in casu utroque, diminuitur in eadem ratione quam proxime. Est igitur gravitas in A in Sphæram centro C radio AC descriptam, ad gravitatem in A in Terram ut 126 ad 125 ; & gravitas in loco Q in Sphæram centro C radio QC descriptam, est ad gravitatem in loco A in Sphæram centro C radio AC descriptam, in ratione diametrorum (per Prop. LXXII. Lib. I.) id est, ut 100 ad 101. Conjungantur jam hæc tres rationes, 126 ad 125, 126 ad 125, & 100 ad 101 : & fiet gravitas in loco Q in Terram, ad gravitatem in loco A in Terram, ut $126 \times 126 \times 100$ ad $125 \times 125 \times 101$, seu ut 501 ad 500.



Jam cum (per Corol. 3. Prop. xci. Lib. I.) gravitas in canalis crure utrovis $ACca$ vel $QCcq$ sit ut distantia locorum a centro Terræ ; si crura illa superficiei transversis & æquidistantibus distinguantur in partes totis proportionales, erunt pondera partium singularum in crure $ACca$ ad pondera partium totidem in crure altero, ut magnitudines & gravitates acceleratrices conjunctim ; id est, ut 101 ad 100 & 500 ad 501, hoc est, ut 505 ad 501. Ac proinde si vis centrifuga partis cujusque in crure $ACca$ ex motu diurno oriunda, fuisset ad pondus partis ejusdem ut 4 ad 505, eo ut de pondere partis cujusque, in partes 505 diviso, partes quatuor detraheret ; manerent pondera in utroque crure æqualia, & propterea fluidum consisteret in æquilibrio. Verum vis centrifuga partis cujusque est ad pondus ejusdem ut 1 ad 289, hoc est, vis centrifuga quæ deberet esse ponderis pars $\frac{1}{289}$, est tantum pars $\frac{1}{505}$. Et

Et propterea dico, secundum Regulam auream, quod si vis centrifuga $\frac{1}{100}$ faciat ut altitudo aquæ in crure *ACca* superet altitudinem aquæ in crure *QcCq* parte centesima totius altitudinis: vis centrifuga $\frac{1}{100}$ faciet ut excessus altitudinis in crure *ACca* sit altitudinis in crure altero *QcCq* pars tantum $\frac{1}{100}$. Est igitur diameter Terræ secundum æquatorem ad ipsius diametrum per polos ut 230 ad 229. Ideoque cum Terræ femidiameter mediocris, juxta mensuram *Cassini*, sit pedum Parisiensium 19695539, seu milliarium 3939 (posito quod milliare sit mensura pedum 5000) Terra altior erit ad Æquatorem quam ad Polos excessu pedum 85820, seu milliarium 17½.

Si Planeta major sit vel minor quam Terra manente ejus densitate ac tempore periodico revolutionis diurnæ, manebit proportio vis centrifugæ ad gravitatem; & propterea manebit etiam proportio diametri inter polos ad diametrum secundum æquatorem. At si motus diurnus in ratione quacunque acceleretur vel retardetur, augebitur vel minuetur vis centrifuga in duplicata illa ratione, & propterea differentia diametrorum augebitur vel minuetur in eadem duplicata ratione quamproxime. Et si densitas Planetæ augeatur vel minuatur in ratione quavis, gravitas etiam in ipsum tendens augebitur vel minuetur in eadem ratione, & differentia diametrorum vicissim minuetur in ratione gravitatis auctæ vel augebitur in ratione gravitatis diminutæ. Unde cum Terra respectu fixarum revolvatur horis 23. 56', Jupiter autem horis 9. 56', sintque temporum quadrata ut 29 ad 5, & densitates ut 5 ad 1: differentia diametrorum Jovis erit ad ipsius diametrum minorem ut $\frac{29}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{29}$ ad 1, seu 1 ad 8 quamproxime. Est igitur diameter Jovis ab oriente in occidentem ducta, ad ejus diametrum inter polos ut 9 ad 8 quamproxime, & propterea diameter inter polos est 35½". Hæc ita se habent ex hypothesi quod uniformis sit Planetarum materia. Nam si materia densior sit ad centrum quam ad circumferentiam; diameter quæ ab oriente in occidentem ducitur, erit adhuc major.

Jovis vero diametrum quæ polis ejus interjacet minorem esse diametro altera *Cassinus* dudum observavit, & Terræ diametrum inter polos minorem esse diametro altera patebit per ea quæ dicentur in Propositione sequente.

Bbb 3

PRO-

PROPOSITIO XX. PROBLEMA IV.

*Invenire & inter se comparare Pondera corporum in Terra
hujus regionibus diversis.*

Quoniam pondera inæqualium crurum canalis aqueæ *ACQqca* æqualia sunt; & pondera partium, cruribus totis proportionalium & similiter in totis sitarum, sunt ad invicem ut pondera totorum, cruribus similiter sitarum partium reciproce ut crura, id est, reciproce ut 230 ad 229. Et par est ratio homogeneorum & æqualium quorumvis & in canalis cruribus similiter sitarum corporum. Horum pondera sunt reciproce ut crura, id est, reciproce ut distantiae corporum a centro Terræ. Proinde si corpora in supremis canalium partibus, live in superficie Terræ consistent; erunt pondera eorum ad invicem reciproce ut distantiae eorum a centro. Et eodem argumento pondera, in aliis quibuscunque per totam Terræ superficiem regionibus, sunt reciproce ut distantiae locorum a centro; & propterea, ex Hypothesi quod Terra Sphærois sit, dantur proportionem.

Unde tale confit Theorema, quod incrementum ponderis perpendendo ab Æquatore ad Polos, sit quam proxime ut sinus versus Latitudinis duplicatæ, vel, quod perinde est, ut quadratum sinus recti Latitudinis. Et in eadem circiter ratione augentur arcus graduum Latitudinis in Meridiano. Ideoque cum Latitudo *Lutetiæ Parisiorum* sit $48^{\circ} 50'$, ea locorum sub Æquatore $00^{\circ} 00'$, & ea locorum ad Polos 90° & duplorum sinus versi sint 11334, 60000 & 20000, existente Radio 10000, & gravitas ad Polum sit ad gravitatem sub Æquatore ut 230 ad 229, & excessus gravitatis ad Polum ad gravitatem sub Æquatore ut 1 ad 229: erit excessus gravitatis in Latitudine *Lutetiæ* ad gravitatem sub Æquatore, ut $1 \times \frac{11334}{229}$ ad 229, seu 5667 ad 2290000. Et propterea gravitates totæ in his locis erunt ad invicem ut 2295667 ad 2290000. Quare cum longitudines pendulorum æqualibus temporibus oscillantium sint ut gravitates, & in Latitudine *Lutetiæ Parisiorum* longitudo penduli singulis minutis secundis oscillantis sit pedum trium *Parisienfium* & linearum 8½: longitudo penduli sub Æquatore superabitur a longitudine synchroni penduli *Parisienfis*, excessu lineæ unius & 87 partium millesimarum lineæ. Et simili computo confit Tabula sequens.

Latitudo

<i>Latitudo Loci</i>	<i>Longitudo Penduli</i>		<i>Mensura Gradus unius in Meridiano</i>
Gr.	Ped.	Lin.	Hexaped.
0	3 . 7,468		56909
5	3 . 7,482		56914
10	3 . 7,526		56931
15	3 . 7,596		56959
20	3 . 7,692		56996
25	3 . 7,811		57042
30	3 . 7,948		57096
35	3 . 8,099		57155
40	3 . 8,261		57218
1	3 . 8,294		57231
2	3 . 8,327		57244
3	3 . 8,361		57257
4	3 . 8,394		57270
45	3 . 8,428		57283
6	3 . 8,461		57296
7	3 . 8,494		57309
8	3 . 8,528		57322
9	3 . 8,561		57335
50	3 . 8,594		57348
55	3 . 8,756		57411
60	3 . 8,907		57470
65	3 . 9,044		57524
70	3 . 9,162		57570
75	3 . 9,258		57607
80	3 . 9,329		57635
85	3 . 9,372		57652
90	3 . 9,387		57657

Constat autem per hanc Tabulam, quod graduum inæqualitas tam parva sit, ut in rebus Geographicis figura Terræ pro Sphærica haberi possit, quodque inæqualitas diametrorum Terræ facilius & certius per experimenta pendulorum deprehendi possit vel etiam per Eclipses Lunæ, quam per arcus Geographicæ mensuratos in Meridiano.

Hæc

DE MUNDI
SYSTEMATE

Hæc ita se habent ex hypothefi quod Terra ex uniformi materia conflat. Nam fi materia ad centrum paulo denfior fit quam ad fuperficiem, differentia pendulorum & graduum Meridiani paulo majores erunt quam pro Tabula præcedente, propterea quod fi materia ad centrum redundans qua denfitas ibi major redditur, fubducatur & feorfim fpectetur, gravitas in Terram reliquam uniformiter denfam, erit reciproce ut diftantia ponderis a centro; in materiam vero redundantem reciproce ut quadratum diftantia a materia illa quamproxime. Gravitas igitur fub æquatore minor eft in materiam illam redundantem quam pro computo fuperiore: & propterea Terra ibi, propter defectum gravitatis, paulo altius afcendet, & exceffus longitudinum Pendulorum & graduum ad polos paulo majores erunt quam in præcedentibus definitum eft.

Jam vero Aftronomi aliqui in longinquas regiones ad observationes Aftronomicas faciendas miffi, invenerunt quod horologia oscillatoria tardius moverentur prope Æquatorem quam in regionibus noftris. Et primo quidem *D. Richer* hoc observavit anno 1672 in infula *Cayennæ*. Nam dum observaret tranfitum Fixarum per meridianum mense *Augufto*, reperit horologium fuum tardius moveri quam pro medio motu Solis, existente differentia 2'. 28" fingulis diebus. Deinde faciendo ut Pendulum fimplex ad minuta fingula fecunda per horologium optimum menfurata oscillaret, notavit longitudinem Penduli fimplicis, & hoc fecit fæpius fingulis feptimanis per menses decem. Tum in *Galliam* redux contulit longitudinem hujus Penduli cum longitudine Penduli *Parifienfis* (quæ erat trium pedum Parifienfium, & octo linearum cum tribus quintis partibus lineæ) & reperit breviorẽ effe, existente differentia lineæ unius cum quadrante. At ex tarditate horologii oscillatorii in *Cayenna*, differentia Pendulorum colligitur effe lineæ unius cum femiffe.

Postea *Halleius* nofter circa annum 1677 ad infulam *S^æ Hele* navigans, reperit horologium fuum oscillatorium ibi tardius moveri quam *Londini*, fed differentiam non notavit. Pendulum vero brevius reddidit plusquam octava parte digiti, feu linea una cum femiffe. Et ad hoc efficiendum, cum longitudo cochleæ in ima parte penduli non fufficeret, annulum ligneum thecæ cochleæ & ponderi pendulo interposuit.

Deinde anno 1682 *D. Varin* & *D. Des Hayes* invenerunt longitudinem Penduli fingulis minutis fecundis oscillantis in Observatorio

vatorio Regio *Parisiensis* esse ped. 3. lin. 8 $\frac{1}{2}$. Et in insula *Gorea* eadem methodo longitudinem Penduli synchroni invenerunt esse ped. 3. lin. 6 $\frac{1}{2}$, existente longitudinum differentia lin. 2. Et eodem anno ad insulas *Guadaloupam* & *Martinicam* navigantes, invenerunt longitudinem Penduli synchroni in his insulis esse ped. 3. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

LIBER
TERTIUS.

Posthac *D. Couplet* filius anno 1697 mense *Julio*, horologium suum oscillatorium ad motum Solis medium in Observatorio Regio *Parisiensis* sic aptavit, ut tempore satis longo horologium cum motu Solis congrueret. Deinde *Ulyssipponem* navigans invenit quod mense *Novembri* proximo horologium tardius iret quam prius, existente differentia 2' 13" in horis 24. Et mense *Martio* sequente *Paraibam* navigans invenit ibi horologium suum tardius ire quam *Parisis*, existente differentia 4' 12" in horis 24. Et affirmat Pendulum ad minuta secunda oscillans brevius fuisse *Ulyssipponi* lineis 21 & *Paraiba* lineis 31 quam *Parisis*. Rectius posuisset differentias esse 11 & 21. Nam hæ differentiæ differentiis temporum 2'. 13", & 4'. 12" respondent. Crassioribus hujus Observationibus minus fidendum est.

Annis proximis (1699 & 1700) *D. Des Hayes* ad *Americam* denuo navigans, determinavit quod in insulis *Cayenne* & *Granade* longitudo Penduli ad minuta secunda oscillant, esset paulo minor quam ped. 3. lin. 6 $\frac{1}{2}$, quodque in insula *S. Christophori* longitudo illa esset ped. 3. lin: 6 $\frac{1}{2}$, & quod in insula *S. Dominici* eadem esset ped. 3. lin. 7.

Annoque 1704. *P. Feuilleus* invenit in *Porto-belo* in *America* longitudinem Penduli ad minuta secunda oscillant, esse pedum trium *Parisiensium* & linearum tantum 5 $\frac{1}{2}$, id est tribus fere lineis breviorum quam *Lutetie Parisiorum*, sed errante Observatione. Nam deinde ad insulam *Martinicam* navigans, invenit longitudinem Penduli isochroni esse pedum tantum trium *Parisiensium* & linearum 5 $\frac{1}{2}$.

Latitudo autem *Paraibæ* est 6 $^{\circ}$ 38' ad austrum, & ea *Porto-beli* 9 $^{\circ}$ 33' ad boream, & Latitudines insularum *Cayenne*, *Gorea*, *Guadaloupe*, *Martinica*, *Granade*, *Sⁿⁱ. Christophori*, *Sⁿⁱ. Dominici* sunt respectivè 4 $^{\circ}$ 55', 14 $^{\circ}$ 40', 14 $^{\circ}$ 00', 14 $^{\circ}$ 44', 12 $^{\circ}$ 6', 17 $^{\circ}$ 19', & 19 $^{\circ}$ 48' ad boream. Et excessus longitudinis Penduli *Parisiensis* supra longitudes Pendulorum isochronorum in his latitudinibus observatas, sunt paulo majores quam pro Tabula longitudinum Penduli superius computata. Et propterea Terra aliquanto altior est sub *Æquatore* quam pro superiore calculo,

Ccc

culo,

DE MONDI SYSTEMATE. culo, & densior ad centrum quam in fodinis prope superficiem, nisi forte calores in Zona torrida longitudinem Pendulorum aliquantulum auxerint.

Observavit utique *D. Picartus* quod virga ferrea, quæ tempore hyberno ubi gelabant frigora erat pedis unius longitudine, ad ignem calefacta evasit pedis unius cum quarta parte lineæ. Deinde *D. de la Hire* observavit quod virga ferrea quæ tempore consimili hyberno sex erat pedum longitudinis, ubi Soli æstivo exponebatur evasit sex pedum longitudinis cum duabus tertiis partibus lineæ. In priore casu calor major fuit quam in posteriore, in hoc vero major fuit quam calor externarum partium corporis humani. Nam metalla ad Solem æstivum valde incallescunt. At virga penduli in horologio oscillatorio nunquam exponi solet calori Solis æstivi, nunquam calorem concipit calori externæ superficiei corporis humani æqualem. Et propterea virga Penduli in horologio tres pedes longa, paulo quidem longior erit tempore æstivo quam hyberno, sed excessu quartam partem lineæ unius vix superante. Proinde differentia tota longitudinis pendulorum quæ in diversis regionibus isochrona sunt, diverso calori attribui non potest. Sed neque erroribus Astronomorum è *Gallia* missorum tribuenda est hæc differentia. Nam quamvis eorum observationes non perfecte congruant inter se, tamen errores sunt adeo parvi ut contemni possint. Et in hoc concordant omnes, quod isochrona pendula sunt breviora sub Æquatore quam in Observatorio Regio *Parisiensi*, existente differentia duarum circiter linearum seu sextæ partis digiti. Per observationes *D. Richer* in *Cayenna* factas, differentia fuit lineæ unius cum semisse. Error semissis lineæ facile committitur. Et *D. des Hayes* postea per observationes suas in eadem insula factas errorem correxit, inventa differentia linearum $2\frac{1}{2}$. Sed & per observationes in insulis *Gorea*, *Guadaloupa*, *Martinica*, *Granada*, *S. Christophori*, & *S. Dominici* factas & ad Æquatorem reductas, differentia illa prodiit haud minor quam $1\frac{1}{2}$ lineæ, haud major quam $2\frac{1}{2}$ linearum. Et inter hos limites quantitas mediocris est $2\frac{1}{2}$ linearum. Propter calores locorum in Zona torrida negligamus $\frac{1}{2}$ partes lineæ, & manebit differentia duarum linearum.

Quare cum differentia illa per Tabulam præcedentem, ex hypothesis quod Terra ex materia uniformiter densa constat, sit tantum $1\frac{1}{2}$ lineæ: excessus altitudinis Terræ ad æquatorem supra altitudinem ejus ad polos, qui erat milliarium $17\frac{1}{2}$, jam auctus in ratione

ratione differentiarum, fiet milliarium 31 $\frac{1}{2}$. Nam tarditas Penduli sub *Æquatore* defectum gravitatis arguit; & quo levior est materia eo major esse debet altitudo ejus, ut pondere suo materiam sub *Po-*
lis in *æquilibrio* sustineat.

Hinc figura umbræ Terræ per *Eclipses* Lunæ determinanda, non erit omnino circularis, sed diameter ejus ab oriente in occidentem ducta major erit quam diameter ejus ab austro in boream ducta, excessu 55" circiter. Et parallaxis maxima Lunæ in Longitudinem paulo major erit quam ejus parallaxis maxima in Latitudinem. Ac Terræ semidiameter maxima erit pedum *Parisiensium* 19767630, minima pedum 19609820 & mediocris pedum 19688725 quamproxime.

Cum gradus unus mensurante *Picarto* sit hexapedarum 57060, mensurante vero *Cassino* sit hexapedarum 57292: suspicantur aliqui gradum unumquemque, pergendo per *Gallias* austrum versus majorem esse gradu præcedente hexapedis plus minus 72, seu parte octingentesima gradus unius; existente Terra Sphæroide oblonga cujus partes ad polos sunt altissimæ. Quo posito, corpora omnia ad *Polos* Terræ leviora forent quam ad *Æquatorem*, & altitudo Terræ ad polos superaret altitudinem ejus ad *æquatorem* milliaribus fere 95, & pendula isochrona longiora forent ad *Æquatorem* quam in *Observatorio Regio Parisiensi* excessu semissis digiti circiter; ut conferenti proportionibus hic positas cum proportionibus in Tabula præcedente positis, facile constabit. Sed & diameter umbræ Terræ quæ ab austro in boream ducitur, major foret quam diameter ejus quæ ab oriente in occidentem ducitur, excessu 2'. 46", seu parte duodecima diametri Lunæ. Quibus omnibus *Experientia* contrariatur. Certe *Cassinus*, definiendo gradum unum esse hexapedarum 57292, medium inter mensuras suas omnes, ex hypothesi de æqualitate graduum assumpsit. Et quamvis *Picartus* in *Gallie* limite boreali invenit gradum paulo minorem esse, tamen *Norwoodus* nolter in Regionibus magis borealibus, mensurando majus intervallum, invenit gradum paulo majorem esse quam *Cassinus* invenerat. Et *Cassinus* iple mensuram *Picarti*, ob parvitatem intervalli mensurati, non satis certam & exactam esse judicavit ubi mensuram gradus unius longe per intervallum longe majus definire aggressus est. Differentiæ vero inter mensuras *Cassini*, *Picarti*, & *Norwoodi* sunt prope insensibiles, & ab insensibilibus observationum erroribus facile oriri potuere, ut *Nutationem* axis Terræ præteream.

PROPOSITIO XXI. THEOREMA XVII.

*Puncta Æquinoctialia regredi, & axem Terræ singulis revolutionibus annuis nutando bis inclinari in Eclipticam
& bis redire ad positionem priorem.*

Patet per Corol. 20. Prop. LXVI. Lib. I. Motus tamen iste nutandi perexiguus esse debet, & vix aut ne vix quidem sensibilis.

PROPOSITIO XXII. THEOREMA XVIII.

Motus omnes Lunares, omnesque motuum inæqualitates ex allatis Principiis consequi.

Planetas majores, interea dum circa Solem feruntur, posse alios minores circum se revolventes Planetas deferre, & minores illos in Ellipsis, umbilicos in centris majorum habentibus, revolvi debere patet per Prop. LXV. Lib. I. Actione autem Solis perturbantur eorum motus multimode, iisque adficientur inæqualitatibus quæ in Luna nostra notantur. Hæc utique (per Corol. 2, 3, 4, & 5. Prop. LXVI.) velocius movetur, ac radio ad Terram ducto describit aream pro tempore majorem, Orbemque habet minus curvum, atque adeo propius accedit ad Terram, in Syzygiis quam in Quadraturis, nisi quatenus impedit motus Eccentricitatis. Eccentricitas enim maxima est (per Corol. 9. Prop. LXVI.) ubi Apogæum Lunæ in Syzygiis versatur, & minima ubi idem in Quadraturis consistit; & inde Luna in Perigæo velocior est & nobis propior, in Apogæo autem tardior & remotior in Syzygiis quam in Quadraturis. Progreditur insuper Apogæum, & regrediuntur Nodi, sed motu inæquabili. Et Apogæum quidem (per Corol. 7. & 8. Prop. LXVI.) velocius progreditur in Syzygiis suis, tardius regreditur in Quadraturis, & excessu progressus supra regressum annuatim fertur in consequentia. Nodi autem (per Corol. 11. Prop. LXVI.) quiescunt in Syzygiis suis, & velocissime regrediuntur in Quadraturis. Sed & major est Lunæ latitudo maxima in ipsius Quadraturis (per Corol. 10. Prop. LXVI.) quam in Syzygiis: & motus mediis tardior in Perihelio Terræ (per Corol. 6. Prop.

Prop. LXVI.) quam in ipsius Aphelio. Atque hæc sunt inæqualitates insigniores ab Astronomis notatæ. LIBER
TERTIUS.

Sunt etiam aliæ quædam nondum observatæ inæqualitates, quibus motus Lunares adeo perturbantur, ut nulla hæcenus lege ad Regulam aliquam certam reduci potuerint. Velocitates enim seu motus horarii Apogæi & Nodorum Lunæ, & eorundem æquationes, ut & differentia inter Eccentricitatem maximam in Syzygiis & minimam in Quadraturis, & inæqualitas quæ Variatio dicitur, augentur ac diminuuntur annuatim (per Corol. 1.4. Prop. LXVI.) in triplicata ratione diametri apparentis Solaris. Et Variatio præterea augetur vel diminuitur in duplicata ratione temporis inter quadraturas quam proxime (per Corol. 1. & 2. Lem. X. & Corol. 16. Prop. LXVI. Lib. I.) Sed hæc inæqualitas in calculo Astronomico, ad Prosthaphæresin Lunæ referri solet, & cum ea confundi.

PROPOSITIO XXIII. PROBLEMA V.

Motus inæquales Satellitum Jovis & Saturni à motibus Lunaribus derivare.

Ex motibus Lunæ nostræ motus analogi Lunarum seu Satellitum Jovis sic derivantur. Motus medius Nodorum Satellitis extimi Jovialis, est ad motum medium Nodorum Lunæ nostræ, in ratione composita ex ratione duplicata temporis periodici Terræ circa Solem ad tempus periodicum Jovis circa Solem, & ratione simplici temporis periodici Satellitis circa Jovem ad tempus periodicum Lunæ circa Terram: (per Corol. 16. Prop. LXVI.) adeoque annis centum conficit Nodus iste 8^h 24'. in antecedentia. Motus medii Nodorum Satellitum interiorum sunt ad motum hujus, ut illorum tempora periodica ad tempus periodicum hujus, per idem Corollarium, & inde dantur. Motus autem Augis Satellitis cujusque in consequentia, est ad motum Nodorum ipsius in antecedentia, ut motus Apogæi Lunæ nostræ ad hujus motum Nodorum, (per idem Corol.) & inde datur. Diminui tamen debet motus Augis sic inventus in ratione 5 ad 9 vel 1 ad 2 circiter, ob causam quam hic exponere non vacat. Equationes maximæ Nodorum & Augis Satellitis cujusque fere sunt ad æquationes maximas Nodorum & Augis Lunæ respectivæ, ut motus Nodorum & Augis Satellitum tempore unius revolutionis æquationum priorum,

De Mundi
SYSTEMATE, rum, ad motus Nodorum & Apogæi Lunæ tempore unius revolutionis æquationum posteriorum. Variatio Satellitis è Jove spectati, est ad Variationem Lunæ, ut sunt ad invicem toti motus Nodorum temporibus quibus Satelles & Luna ad Solem revolvuntur, per idem Corollarium; adeoque in Satellite extimo non superat 5". 12".

PROPOSITIO XXIV. THEOREMA XIX.

*Fluxum & refluxum Maris ab actionibus Solis ac
Lunæ oriri.*

Mare singulis diebus tam Lunaribus quam Solaribus bis intumescere debere ac bis defluere, patet per Corol. 19. Prop. LXVI. Lib. I. ut & aquæ maximam altitudinem, in maribus profundis & liberis, appulsu Luminarium ad Meridianum loci, minori quam sex horarum spatio sequi, uti fit in Maris *Atlantici & Æthiopici* tractu toto orientali inter *Galliam & Promontorium Bonæ Spei*, ut & in Maris *Pacifici* littore *Chilensi & Peruviano*: in quibus omnibus littoribus æstus in horam circiter tertiam incidit, nisi ubi motus per loca vadosa propagatus aliquantulum retardatur. Horas numero ab appulsu Luminaris utriusque ad Meridianum loci, tam infra Horizontem quam supra, & per horas dici Lunaris intelligo vigesimas quartas partes temporis quo Luna motu apparente diurno ad Meridianum loci revolvitur.

Motus autem bini, quos Luminaria duo excitant, non cernuntur distincte, sed motum quendam mixtum efficient. In Luminarium Conjunctione vel Oppositione conjunguntur eorum effectus, & componitur fluxus & refluxus maximus. In Quadraturis Sol attollet aquam ubi Luna deprimit, deprimetque ubi Sol attollit; & ex effectuum differentia æstus omnium minimus orietur. Et quoniam, experientia teste, major est effectus Lunæ quam Solis, incidet aquæ maxima altitudo in horam tertiam Lunarem. Extra Syzygias & Quadraturas, æstus maximus qui sola vi Lunari incidere semper deberet in horam tertiam Lunarem, & sola Solari in tertiam Solarem, compositis viribus incidet in tempus aliquod intermedium quod tertiæ Lunari propinquius est, adeoque in transitu Lunæ a Syzygiis ad Quadraturas, ubi hora tertia Solaris præcedit tertiam Lunarem, maxima aquæ altitudo præcedet etiam tertiam

tertiam Lunarem, idque maximo intervallo paulo post Octantes Lunæ; & paribus intervallis æstus maximus sequetur horam tertiam Lunarem in transitu Lunæ a Quadraturis ad Syzygias. Hæc ita sunt in Mari aperto. Nam in ostiis Fluviorum fluxus majores cæteris paribus tardius ad *auxilium* venient.


Pendent autem effectus Luminarium ex eorum distantii a Terra. In minoribus enim distantii majores sunt eorum effectus, in majoribus minores, idque in triplicata ratione diametrorum apparentium. Igitur Sol tempore hyberno, in Perigæo existens, majores edit effectus, efficitque ut æstus in Syzygiis paulo majores sint, & in Quadraturis paulo minores (cæteris paribus) quam tempore æstivo; & Luna in Perigæo singulis mensibus majores ciet æstus quam ante vel post dies quindecim, ubi in Apogæo versatur. Unde fit ut æstus duo omnino maximi in Syzygiis continuis se mutuo non sequantur.

Pendet etiam effectus utriusque Luminaris ex ipsius Declinatione seu distantia ab Æquatore. Nam si Luminare in polo constitueretur, traheret illud singulas aquæ partes constanter, absque actionis intensiōe & remissione, adeoque nullam motus reciprocationem cieret. Igitur Luminaria recedendo ab Æquatore polum versus, effectus suos gradatim amittent, & propterea minores ciebunt æstus in Syzygiis Solstitialibus quam in Æquinoctialibus. In Quadraturis autem Solstitialibus majores ciebunt æstus quam in Quadraturis Æquinoctialibus; eo quod Lunæ jam in Æquatore constitutæ effectus maxime superat effectum Solis. Incidunt igitur æstus maximi in Syzygiis & minimi in Quadraturis Luminarium, circa tempora Æquinoctii utriusque. Et æstum maximum in Syzygiis comitatur semper minimus in Quadraturis, ut experientia compertum est. Per minorem autem distantiam Solis a Terra, tempore hyberno quam tempore æstivo, fit ut æstus maximi & minimi sæpius præcedant Æquinoctium vernum quam sequantur, & sæpius sequantur autumnale quam præcedant.

Pendent etiam effectus Luminarium ex locorum latitudine. Designet *A p E P* Tellurem aquis profundis undique coopertam; *C* Centrum ejus; *P, p* polos; *AE* Æquatore; *F* locum quemvis extra Æquatore; *Ff* parallelum loci; *Dd* parallelum ei respondentem ex altera parte Æquatoris; *L* locum quem Luna tribus ante horis occupabat; *H* locum Telluris ei perpendiculariter subiectum

DE MUNDI
SYSTEMATE,

subiectum; b locum huic oppositum; K, k loca inde gradibus 90 distantia, CH, Cb Maris altitudines maximas mensuratas a centro Telluris; & CK, Ck altitudines minimas: & si axibus Hb, Kk describatur Ellipsis, deinde Ellipseos hujus revolutione circa axem majorem Hb describatur Sphærois $H'P K b p k$; designabit hæc figuram Maris quam proxime, & erunt CF, Cf, CD, Cd altitudines Maris in locis F, f, D, d . Quinetiam si in præfata Ellipsis revolutione punctum quodvis N describat circulum NM , secantem parallelos Ff, Dd in locis quibuscvis R, T , & æquatorem AE in S ; erit CN altitudo Maris in locis omnibus R, S, T , sitis in hoc circulo. Hinc in revolutione diurna loci cujuscvis F , affluxus erit maximus in F , hora tertia post appulsum Lunæ ad Meridianum supra Horizontem; postea defluxus maximus in Q hora tertia post occasum Lunæ; dein affluxus maximus in f hora tertia post appulsum Lunæ ad Meridianum infra Horizontem; ultimo defluxus maximus in Q hora tertia post ortum Lunæ; & affluxus posterior in f erit minor quam affluxus prior in F . Distinguitur enim Mare totum in duos omnino fluctus Hemisphæricos, unum in Hemisphærio $KHkC$ ad Boream vergentem, alterum in Hemisphærio opposito $Kb k C$; quos igitur fluctum Borealem & fluctum Australem nominare licet. Hi fluctus semper sibi mutuo oppositi, veniunt per vices ad Meridianos locorum singulorum, interposito intervallo horarum Lunarium duodecim. Cumque regiones Boreales magis participant fluctum Borealem, & Australes magis Australem, inde oriuntur æstus alternis vicibus majores & minores, in locis singulis extra Æquatorem, in quibus Luminaria oriuntur & occidunt. Æstus autem major, Luna in verticem loci declinante, incidit in horam circiter tertiam post appulsum Lunæ ad Meridianum supra Horizontem, & Luna declinationem mutante vertetur in minorem. Et fluxuum differentia maxima incidit in tempora Solstitiorum; præsertim si Lunæ Nodus ascendens versatur in principio Arietis. Sic experientia compertum est, quod æstus matutini tempore hyberno superent vespertinos & vespertini tempore



pore æstivo matutinos, ad *Plymuthum* quidem altitudine quasi pedis unius, ad *Bristoliam* vero altitudine quindecim digitorum: observantibus *Colepreffio* & *Sturmio*. LIBER
TERTIUS

Motus autem hæcenus descripti mutantur aliquantulum per vim illam reciprocationis aquarum, qua Maris æstus, etiam cessantibus Luminarium actionibus, posset aliquamdiu perseverare. Conservatio hæcæ motus impressi minuit differentiam æstuum alternorum; & æstus proxime post Syzygias majores reddit, eosque proxime post Quadraturas minuit. Unde fit ut æstus alterni ad *Plymuthum* & *Bristoliam* non multo magis differant ab invicem quam altitudine pedis unius vel digitorum quindecim; utque æstus omnium maximi in iisdem portubus, non sint primi a Syzygiis, sed tertii. Retardantur etiam motus omnes in transitu per vada, adeo ut æstus omnium maximi, in fretis quibusdam & Fluviorum ostiis, sint quarti vel etiam quinti a Syzygiis.

Porro fieri potest ut æstus propagetur ab Oceano per freta diversa ad eundem portum, & citius transeat per aliqua freta quam per alia: quo in casu æstus idem, in duos vel plures successively advenientes divisus, componere possit motus novos diversorum generum. Fingamus æstus duos æquales a diversis locis in eundem portum venire, quorum prior præcedat alterum spatio horarum sex, incidatque in horam tertiam ab appulsu Lunæ ad Meridianum portus. Si Luna in hocce suo ad Meridianum appulsu versabatur in Æquatore, venient singulis horis senis æquales affluxus, qui in mutuos refluxus incidendo eosdem affluxibus æquabunt, & sic spatio diei illius efficient ut aqua tranquille stagnet. Si Luna tunc declinabat ab Æquatore, sient æstus in Oceano vicibus alternis majores & minores, uti dictum est; & inde propagabuntur in hunc portum affluxus bini majores & bini minores, vicibus alternis. Affluxus autem bini majores component aquam altissimam in medio inter utrumque, affluxus major & minor faciet ut aqua ascendat ad mediocrem altitudinem in Medio ipsorum, & inter affluxus binos minores aqua ascendet ad altitudinem minimam. Sic spatio viginti quatuor horarum, aqua non bis ut fieri solet, sed semel tantum perveniet ad maximam altitudinem & semel ad minimam; & altitudo maxima, si Luna declinat in polum supra Horizontem loci, incidet in horam vel sextam vel tricesimam ab appulsu Lunæ ad Meridianum, atque Luna declinationem mutante mutabitur in defluxum. Quorum omnium exemplum, in portu regni *Tunquini* ad *Batsham* sub latitudine

D d d

Boreali


De Mundi Boreali 20⁵. 50'. *Halleius* ex Nautarum Observationibus patefecit. Ibi aqua die transitum Lunæ per Æquatorem sequente stagnat, dein Luna ad Boream declinante incipit fluere & refluxere, non bis, ut in aliis portubus, sed semel singulis diebus, & æstus incidit in occasum Lunæ, defluxus maximus in ortum. Cum Lunæ declinatione augetur hic æstus, usque ad diem septimum vel octavum, dein per alios septem dies iisdem gradibus decrescit, quibus antea creverat; & Luna declinationem mutante cessat, ac mox mutatur in defluxum. Incidit enim subinde defluxus in occasum Lunæ & affluxus in ortum, donec Luna iterum mutet declinationem. Aditus ad hunc portum fretaque vicina duplex patet, alter ab Oceano *Sinenfi* inter Continentem & Insulam *Luconiam*, alter a Mari *Indico* inter Continentem & Insulam *Borneo*. An æstus spatio horarum duodecim a Mari *Indico*, & spatio horarum sex a Mari *Sinenfi* per freta illa venientes, & sic in horam tertiam & nonam Lunarem incidentes, componant huiusmodi motus; sitne alia Marium illorum conditio, observationibus vicinorum littorum determinandum relinquo.

Hactenus causas motuum Lunæ & Marium reddidi. De quantitate motuum jam convenit aliqua subungere.

PROPOSITIO XXV. PROBLEMA VI.

Invenire vires Solis ad perturbandos motus Lunæ.

Designet *S* Solem, *T* Terram, *P* Lunam, *PADB* orbem Lunæ. In *SP* capiatur *SK* æqualis *ST*; sitque *SL* ad *SK*



in duplicata ratione *SK* ad *SP*, & ipsi *PT* agatur parallela *LM*; & si gravitas acceleratrix Terræ in Solem exponatur per distantiam *ST* vel *SK*, erit *SL* gravitas acceleratrix Lunæ in Solem.

Solem: Ea componitur ex partibus SM , LM , quarum LM & ipsius SM pars TM perturbat motum Lunæ, ut in Libri primi Prop. LXVI. & ejus Corollariis expositum est. Quatenus Terra & Luna circum commune gravitatis centrum revolvuntur, perturbabitur etiam motus Terræ circa centrum illud a viribus consimilibus; sed summas tam virium quam motuum referre licet ad Lunam, & summas virium per lineas ipsis analogas TM & ML designare. Vis ML (in mediocri sua quantitate) est ad vim centripetam, qua Luna in Orbe suo circa Terram quiescentem ad distantiam PT revolvi posset, in duplicata ratione temporum periodicorum Lunæ circa Terram & Terræ circa Solem, (per Corol. 17. Prop. LXVI. Lib. I.) hoc est, in duplicata ratione dierum 27. hor. 7. min. 43. ad dies 365. hor. 6. min. 9. id est, ut 1000. ad 178725, seu 1 ad 178725. Invenimus autem in Propositione quarta quod, si Terra & Luna circum commune gravitatis centrum revolvantur, earum distantia mediocri ab invicem erit 60; semidiametrorum mediocrium Terræ quamproxime. Et vis qua Luna in Orbe circa Terram quiescentem, ad distantiam PT semidiametrorum terrestrium 60; revolvi posset, est ad vim, qua eodem tempore ad distantiam semidiametrorum 60 revolvi posset, ut 60; ad 60; & hæc vis ad vim gravitatis apud nos ut 1 ad 60 \times 60 quamproxime. Ideoque vis mediocri ML est ad vim gravitatis in superficie Terræ, ut 1 \times 60; ad 60 \times 60 \times 178725, seu 1 ad 638092,6. Unde ex proportionem linearum TM , ML , datur etiam vis TM : & hæc sunt vires Solis quibus Lunæ motus perturbantur. *Q. E. I.*

PROPOSITIO XXVI. PROBLEMA VII.

Invenire incrementum horarium areæ quam Luna, radio ad Terram ducto, in Orbe circulari describit.


Diximus aream, quam Luna radio ad Terram ducto describit, esse temporis proportionalem, nisi quatenus motus Lunaribus ab actione Solis turbatur. Inæqualitatem momenti (vel incrementi horarii) hic investigandam proponimus. Ut computatio facilius reddatur, fingamus orbem Lunæ circula rem esse, & inæqualitates omnes negligamus, ea sola excepta, de qua hic agitur. Ob ingentem vero Solis distantiam, ponamus etiam lineas SP , ST sibi invicem parallelas esse. Hoc pacto vis LM reducetur semper ad

Ddd 2

me-

DE MUNDI
SYSTEMATE.

mediocrem suam quantitatem TP , ut & vis TM ad mediocrem suam quantitatem $3PK$. Hæ vires, per Legum Corol. 2. componunt vim TL ; & hæc vis, si in radium TP demittatur perpendiculum LE , resolvitur in vires TE , EL , quarum TE , agendo semper secundum radium TP , nec accelerat nec retardat descriptionem areæ TPC radio illo TP factam; & EL agendo secundum perpendiculum, accelerat vel retardat ipsam, quantum accelerat vel retardat Lunam. Acceleratio illa Lunæ, in transitu ipsius a Quadratura C ad Conjunctionem A , singulis temporis momentis facta, est ut ipsa vis accelerans EL , hoc est, ut $\frac{3PK \times TK}{TP}$. Exponatur tempus per motum medium Lunarem, vel (quod eodem fere recidit) per angulum CTP , vel



etiam per arcum CP . Ad CT erigatur normalis CG ipsi CT æqualis. Et diviso arcu quadrantali AC in particulas innumeras æquales Pp , &c. per quas æquales totidem particule temporis exponi possunt, ductaque pk perpendiculari ad CT , jungatur TG ipsis KP , kp productis occurrens in F & f ; & erit Kk ad PK ut Pp ad Tp , hoc est in data ratione, adeoque $FK \times Kk$ seu area $FKkf$, ut $\frac{3PK \times TK}{TP}$, id est, ut EL ; & composite, area tota $GCKF$ ut summa omnium virium EL tempore toto CP impressarum in Lunam, atque adeo etiam ut velocitas hac
summa

summa genita, id est, ut acceleratio descriptionis areæ CTP , seu incrementum momenti. Vis qua Luna circa Terram quiescentem ad distantiam TP , tempore suo periodico $CADBC$ dierum 27. hor. 7. min. 43. revolvi posset, efficeret ut corpus, tempore CT cadendo, describeret longitudinem CT , & velocitatem simul acquireret æqualem velocitati, qua Luna in Orbe suo movetur. Patet hoc per Corol. 9. Prop. 1v. Lib. I. Cum autem perpendicularum Kd in TP demissum sit ipsius EL pars tertia, & ipsius TP seu ML in Octantibus pars dimidia, vis EL in Octantibus, ubi maxima est, superabit vim ML in ratione 3 ad 2, adeoque erit ad vim illam, qua Luna tempore suo periodico circa Terram quiescentem revolvi posset, ut 100 ad 3×17372 ; seu 11915, & tempore CT velocitatem generare deberet quæ esset pars $\frac{100}{11915}$ velocitatis Lunaris, tempore autem CPA velocitatem majorem generaret in ratione CA ad CT seu TP . Exponatur vis maxima EL in Octantibus per aream $FK \times Kk$ rectangulo $TP \times Pp$ æqualem. Et velocitas, quam vis maxima tempore quovis CP generare posset, erit ad velocitatem quam vis omnis minor EL eodem tempore generat, ut rectangulum $TP \times CP$ ad aream $KCGF$; tempore autem toto CPA , velocitates genitæ erunt ad invicem ut rectangulum $TP \times CA$ & triangulum TCG , sive ut arcus quadrantalibus CA & radius TP . Ideoque (per Prop. 1x. Lib. V. Elem.) velocitas posterior, toto tempore genita, erit pars $\frac{100}{11915}$ velocitatis Lunæ. Huic Lunæ velocitati, quæ areæ momento mediocri analoga est, addatur & auferatur dimidium velocitatis alterius; & si momentum mediocre exponatur per numerum 11915, summa 11915 + 50, seu 11965 exhibebit momentum maximum areæ in Syzygia A , ac differentia 11915 - 50 seu 11865 ejusdem momentum minimum in Quadraturis. Igitur areæ temporibus æqualibus in Syzygiis & Quadraturis descriptæ, sunt ad invicem ut 11965 ad 11865. Ad momentum minimum 11865 addatur momentum, quod sit ad momentorum differentiam 100 ut Trapezium $EKCG$ ad triangulum TCG (vel quod perinde est, ut quadratum Sinus PK ad quadratum Radii TP , id est, ut Pa ad TP) & summa exhibebit momentum areæ, ubi Luna est in loco quovis intermedio P .

Hæc omnia ita se habent, ex Hypothesi quod Sol & Terra quiescunt, & Luna tempore Synodico dierum 27. hor. 7. min. 43. revolvitur. Cum autem periodus Synodica Lunaris vere sit. die-
 Ddd 3. rum.

DE MUNDI
SYSTEMATE,

rum 29. hor. 12. & min. 44. augeri debent momentorum incrementa in ratione temporis, id est, in ratione 1080853 ad 1000000. Hoc pacto incrementum totum, quod erat pars $\frac{1080853}{1000000}$ momenti mediocris, jam fiet ejusdem pars $\frac{1080853}{1000000}$. Ideoque momentum areae in Quadratura Lunæ erit ad ejus momentum in Syzygia ut 11023 — 50 ad 11023 + 50, seu 10973 ad 11073, & ad ejus momentum, ubi Luna in alio quovis loco intermedio P versatur, ut 10973 ad 10973 + $P4$, existente videlicet TP æquali 100.

Area igitur, quam Luna radio ad Terram ducto singulis temporis particulis æqualibus describit, est quam proxime ut summa numeri 219, 46 & sinus versii duplicatae distantiae Lunæ a Quadratura proxima, in circulo cujus radius est unitas. Hæc ita se habent ubi Variatio in Octantibus est magnitudinis mediocris. Sin Variatio ibi major sit vel minor, augeri debet vel minui Sinus ille versus in eadem ratione.

PROPOSITIO XXVII. PROBLEMA VIII.

Ex motu horario Lunæ invenire ipsius distantiam a Terra.

Area, quam Luna radio ad Terram ducto, singulis temporis momentis, describit, est ut motus horarius Lunæ & quadratum distantiae Lunæ a Terra conjunctim; & propterea distantia Lunæ a Terra est in ratione composita ex subduplicata ratione Areae directæ & subduplicata ratione motus horarii inverse. *Q. E. I.*

Corol. 1. Hinc datur Lunæ diameter apparens: quippe quæ sit reciproce ut ipsius distantia a Terra. Tentent Astronomi quam probe hæc Regula cum Phænomenis congruat.

Corol. 2. Hinc etiam Orbis Lunaris accuratius ex Phænomenis quam antehac definiri potest.

PROPOSITIO XXVIII. PROBLEMA IX.

Invenire diametros Orbis in quo Luna, absque eccentricitate, moveri deberet.

Curvatura Trajectoriæ, quam mobile, si secundum Trajectoriæ illius perpendiculum trahatur, describit, est ut attractio directæ & quadratum velocitatis inverse. Curvaturas linearum pono esse inter

ter se in ultima proportionē Sinuum vel Tangentium angulorum contactuum ad radios æquales pertinentium ubi radii illi in infinitum diminuuntur. Attractio autem Lunæ in Terram in Syzygiis est excessus gravitatis ipsius in Terram supra vim Solarem 2 PK (Vide *Figur. pag. 394.*) qua gravitas acceleratrix Lunæ in Solem superat gravitatem acceleratricem Terræ in Solem. In Quadraturis autem attractio illa est summa gravitatis Lunæ in Terram & vis Solaris KT, qua Luna in Terram trahitur. Et hæc attractiones, si $\frac{AT+CT}{2}$ dicatur N, sunt ut $\frac{178725}{ATq} - \frac{2000}{CT \times N}$ &

$\frac{178725}{CTq} \times \frac{1000}{AT \times N}$ quam proxime; seu ut $178725 N \times CTq$

$- 2000 ATq \times CT$ & $178725 N \times ATq + 1000 CTq \times AT$. Nam si gravitas acceleratrix Lunæ in Terram exponatur per numerum 178725, vis mediocris ML, quæ in Quadraturis est PT vel TK,

& Lunam trahit in Terram, erit 1000, & vis mediocris TM in Syzygiis erit 3000; de qua, si vis mediocris ML subducatur, manebit vis 2000 qua Luna in Syzygiis distrahitur a Terra, quamque jam ante nominavi 2 PK. Velocitas autem Lunæ in Syzygiis

A & B est ad ipsius velocitatem in Quadraturis C & D, ut CT ad AT & momentum

aræ quam Luna radio ad Terram ducto describit in Syzygiis ad momentum ejusdem


aræ in Quadraturis conjunctum; id est, ut 11073 CT ad 10973 AT. Sumatur hæc ratio bis inverse & ratio prior

femel directe, & fiet curvatura Orbis Lunariorum in Syzygiis ad ejusdem curvaturam in Quadraturis ut 120406729 \times 178725 ATq \times CTq \times N

$- 120406729 \times 2000 ATq \times CT$ ad 122611329 \times 178725 ATq \times CTq \times N + 122611329 \times 1000 CTq \times AT, i.e. ut 2151969 AT \times CT \times N

$- 24081 AT cub.$ ad 2191371 AT \times CT \times N + 12261 CT cub.

CT cub.



Quoniam

anguli CTP ad angulum CTP . Quæ quidem rationes ex sinibus LIBER
TERTIUS.
angulorum contactus ac differentiarum angularum facile colliguntur. His autem inter se collatis, prodit curvatura Figuræ Cpa in a ad ipsius curvaturam in C , ut $AT cub + \frac{16834}{100000} CTq \times AT$ ad $CT cub. + \frac{16834}{100000} ATq \times CT$, ubi numerus $\frac{16834}{100000}$ designat differentiam quadratorum angularum CTP & CTp applicatam ad quadratum anguli minoris CTP seu (quod perinde est) differentiam quadratorum temporum $27^d 7^h 43'$, & $29^d 12^h 44'$ applicatam ad quadratum temporis $27^d 7^h 43'$.

Igitur cum a designet Syzygiam Lunæ, & C ipsius Quadraturam, proportio jam inventa eadem esse debet cum proportionem curvaturæ Orbis Lunæ in Syzygiis ad ejusdem curvaturam in Quadraturis, quam supra invenimus. Proinde ut inveniatur proportio CT ad AT , duco extrema & media in se invicem. Et termini prodeuntes ad $AT \times CT$ applicati, fiunt $2062, 79 CTq - 2151969 N \times CT cub. + 368676 N \times AT \times CTq + 36342 ATq \times CTq - 362047 N \times ATq \times CT + 2191371 N \times AT cub. \times 4051, 4 ATq = 0$. Hic pro terminorum AT & CT semisumma N scribo 1 , & pro eorundem semidifferentia ponendo x , fit $CT = 1 + x$, & $AT = 1 - x$: quibus in æquatione scriptis, & æquatione prodeunte retoluta, obtinetur x æqualis $0,00719$, & inde semidiameter CT fit $1,00719$, & semidiameter AT $0,99281$, qui numeri sunt ut $70\frac{1}{2}$ & $69\frac{1}{2}$ quam proxime. Est igitur distantia Lunæ a Terra in Syzygiis ad ipsius distantiam in Quadraturis (seposita scilicet Eccentricitatis consideratione) ut $69\frac{1}{2}$ ad $70\frac{1}{2}$, vel numeris rotundis ut 69 ad 70 .


PROPOSITIO XXIX. PROBLEMA X.

Invenire Variationem Lunæ.

Oritur hæc inæqualitas partim ex forma Elliptica orbis Lunaris, partim ex inæqualitate momentorum areæ, quam Luna radio ad Terram ducto describit. Si Luna P in Ellipsi $DBCA$ circa Terram in centro Ellipseos quiescentem moveretur, & radio TP ad Terram ducto describeret aream CTP tempori proportionalem; esset autem Ellipseos semidiameter maxima CT ad semidiametrum minimam TA ut 70 ad 69 : foret tangens anguli CTP ad tangentem anguli motus medii a Quadratura C computati, ut Ellipseos semidiameter TA ad ejusdem semidiametrum Ecc
TC

DE MUNDE
SYSTEMATE,

TC seu 69 ad 70. Debet autem descriptio areæ *CTP*, in progressu Lunæ a Quadratura ad Syzygiam, ea ratione accelerari, ut ejus momentum in Syzygia Lunæ sit ad ejus momentum in Quadratura ut 11073 ad 10973, utque excessus momenti in loco quovis intermedio *P* supra momentum in Quadratura sit ut quadratum sinus anguli *CTP*. Id quod satis accurate fiet, si tangens anguli *CTP* diminuat in subduplicata ratione numeri 10973 ad numerum 11073, id est, in ratione numeri 68, 6877 ad numerum 69. Quo pacto tangens anguli *CTP* jam erit ad tangentem motus medii ut 68, 6877 ad 70, & angulus *CTP* in Octantibus, ubi motus medius est 45^{8^{te}} invenietur 44^{8^{te}} 27'. 28". qui subductus de angulo motus medii 45^{8^{te}} relinquit Variationem maximam 32'. 32". Hæc ita se haberent si Luna, pergendo a Quadratura ad Syzygiam, describeret angulum *CTA* graduum tantum nonaginta. Verum ob motum Terræ, quo Sol in consequentia motu apparente transfertur, Luna, priusquam Solem assequitur, describit angulum *CTa* angulo recto majorem in ratione temporis revolutionis Lunaræ Synodicæ ad tempus revolutionis Periodicæ, id est, in ratione 29^{d.} 12^{h.} 44'. ad 27^{d.} 7^{h.} 43'. Et hoc pacto anguli omnes circa centrum *T* dilatantur in eadem ratione, & Variatio maxima quæ secus esset 32'. 32", jam aucta in eadem ratione fit 35'. 10".



Hæc est ejus magnitudo in mediocri distantia Solis a Terra, neglectis differentiis quæ a curvatura Orbis magni majorique Solis actione in Lunam falcata & novam quam in gibbosam & plenam, oriri possint. In aliis distantiiis Solis a Terra, Variatio maxima est in ratione quæ componitur ex duplicata ratione temporis revolutionis Synodicæ Lunaræ (dato anni tempore) directæ, & triplicata ratione distantie Solis a Terra inverse. Ideoque in Apogæo


Apogæo Solis, Variatio maxima est $33'. 14''$, & in ejus Perigæo $37'. 11''$, si modo Eccentricitas Solis sit ad Orbis magni semidiametrum transversam ut $16\frac{1}{2}$ ad 1000.

Hactenus Variationem investigavimus in Orbe non eccentrico, in quo utique Luna in Octantibus suis semper est in mediocri sua distantia a Terra. Si Luna propter eccentricitatem suam, magis vel minus distat a Terra quam si locaretur in hoc Orbe, Variatio paulo major esse potest vel paulo minor quam pro Regula hic allata: sed excessum vel defectum ab Astronomis per Phænomena determinandum relinquo.

PROPOSITIO XXX. PROBLEMA XI.

Invenire motum horarium Nodorum Lunæ in Orbe circulari.

Designet S Solem, T Terram, P Lunam, NP Orbem Lunæ, Np vestigium Orbis in plano Eclipticæ; N , n Nodos, $nTNm$



lineam Nodorum infinite productam; PI , PK perpendiculara demissa in lineas ST , Qq ; Pp perpendicularum demissum in planum Eclip.
Ecc 2

Designet jam PM arcum, quem Luna dato tempore quam minimo describit, & ML lineolam quam Luna, impellente vi præfata 3 IT , eodem tempore describere posset. Jungantur PL , MP , & producantur eæ ad m & l , ubi secant planum Eclipticæ; inque Tm demittatur perpendicularum PH . Et quoniam recta ML parallela est plano Eclipticæ, ideoque cum recta ml quæ in plano illo jacet concurrere non potest, & tamen jacent hæ rectæ in plano communi $LMPml$; parallelæ erunt hæ rectæ, & propterea similia erunt triangula LMP , Lmp . Jam cum MPm sit in plano Orbis, in quo Luna in loco P movebatur, incidet punctum m in lineam Nn per Orbis illius Nodos N , n ductam. Et quoniam vis qua lineola LM generatur, si tota simul & semel in loco P impressa esset, efficeret ut Luna moveretur in arcu, cujus chorda esset LP , atque adeo transferret Lunam de plano $MPmT$ in planum $LPIT$; motus angularis Nodorum a vi illa genitus, æqualis erit angulo mTl . Est autem ml ad mP ut ML ad MP , adeoque cum MP ob datum tempus data sit, est ml ut rectangulum $ML \times mP$, id est, ut rectangulum $IT \times mP$. Et angulus

mTl , si modo angulus Tml rectus sit, est ut $\frac{ml}{Tm}$ & propterea ut

$\frac{IT \times mP}{Tm}$, id est, (ob proportionales Tm & mP , TP & PH) ut

$\frac{IT \times PH}{TP}$, adeoque ob datam TP , ut $IT \times PH$. Quod si

angulus Tml , seu STN obliquus sit, erit angulus mTl adhuc minor, in ratione sinus anguli STN ad Radium. Est igitur velocitas Nodorum ut $IT \times PH \times AZ$, sive ut contentum sub sinubus trium angulorum TPl , PTN & STN .

Si anguli illi, Nodis in Quadraturis & Luna in Syzygia existentibus, recti sint, lineola ml abibit in infinitum, & angulus mTl evadet angulo mPl æqualis. Hoc autem in casu, angulus mPl est ad angulum PTM , quem Luna eodem tempore motu suo apparente circa Terram describit ut 1 ad 59, 575. Nam angulus mPl æqualis est angulo LPm , id est, angulo deflexionis Lunæ a recto tramite, quem sola vis præfata Solaris 3 IT si tum cessaret Lunæ gravitas dato illo tempore generare posset; & angulus PTM æqualis est angulo deflexionis Lunæ a recto tramite, quem vis illa, qua Luna in Orbe suo retinetur, si tum cessaret vis Solaris 3 IT eodem tempore generaret. Et hæ vires, ut supra dixi-


Eee 3

mus,

DE MUNDI
SYSTEMATE,

mus, sunt ad invicem ut 1 ad 59, 575. Ergo cum motus medius horarius Lunæ (respectu fixarum) sit $32'. 56''. 27'''$. $12''\frac{1}{2}$, motus horarius Nodi in hoc casu erit $33''. 10''$. $33'''$. $12''$. Aliis autem in casibus motus iste horarius erit ad $33''. 10''$. $33'''$. $12''$. ut contentum sub sinubus angulorum trium TPI , PTN , & STN (scilicet distantiarum Lunæ a Quadratura, Lunæ a Nodo, & Nodi a Sole) ad cubum Radii. Et quoties signum anguli alicujus de affirmativo in negativum, deque negativo in affirmativum mutatur, debet motus regressivus in progressivum & progressivus in regressivum mutari. Unde fit ut Nodi progrediantur quoties Luna inter Quadraturam alterutram & Nodum Quadraturæ proximum versatur. Aliis in casibus regrediuntur, & per excessum regressus supra progressum, singulis mensibus feruntur in antecedentia.

Corol. 1. Hinc si a dati arcus quam minimè PM terminis P & M ad lineam Quadraturas jungentem Qq demittantur perpendiculara PK , Mk , eademque producantur donec secent lineam Nodorum Nn in D & d ; erit motus horarius Nodorum ut area $MPDd$ & quadratum lineæ AZ conjunctim. Sunt enim



PK , PH & AZ prædicti tres sinus. Nempe PK sinus distantiae Lunæ a Quadratura, PH sinus distantiae Lunæ a Nodo, & AZ sinus distantiae Nodi a Sole: & erit velocitas Nodi ut contentum $PK \times PH \times AZ$. Est autem PT ad PK ut PM ad Kk , adeoque ob datas PT & PM est Kk ipsi PK proportionalis. Est & AT ad PD ut AZ ad PH , & propterea PH rectangulo $PD \times AZ$

$PD \times AZ$ proportionalis, & conjunctis rationibus, $PK \times PH$ est ut contentum $Kk \times PD \times AZ$, & $PK \times PH \times AZ$ ut $Kk \times PD \times AZ$ qu. id est, ut area $PDdM$ & AZ qu. conjunctim $Q.E.D.$


Corol. 2. In data quavis Nodorum positione, motus horarius mediocris est semissis motus horarii in Syzygiis Lunæ, ideoque est ad $16''. 35'''. 16''.$ $36''.$ ut quadratum sinus distantiae Nodorum a Syzygiis ad quadratum Radii, sive ut AZ qu. ad AT qu. Nam si Luna uniformi cum motu perambulet semicirculum $Q.Aq$, summa omnium arearum $PDdM$, quo tempore Luna pergit a Q ad M , erit area $Q.M.d.E$ quæ ad circuli tangentem $Q.E$ terminatur; & quo tempore Luna attingit punctum n , summa illa erit area tota $E.Q.An$ quam linea PD describit, dein Luna pergente ab n ad g , linea PD cadet extra circulum, & aream $ng.e$ ad circuli tangentem ge terminatam describet; quæ, quoniam Nodi prius regrediebantur, jam vero progrediuntur, subduci debet de area prior, & cum æqualis sit area $Q.EN$, relinquet semicirculum $N.Q.An$. Igitur summa omnium arearum $PDdM$, quo tempore Luna semicirculum describit, est area semicirculi; & summa omnium quo tempore Luna circulum describit est area circuli totius. At area $PDdM$, ubi Luna versatur in Syzygiis, est rectangulum sub arcu PM & radio MT ; & summa omnium huic æqualium arearum, quo tempore Luna circulum describit, est rectangulum sub circumferentia tota & radio circuli; & hoc rectangulum, cum sit æquale duobus circulis, duplo majus est quam rectangulum prius. Proinde Nodi, ea cum velocitate uniformiter continuata quam habent in Syzygiis Lunaribus, spatium duplo majus describerent quam revera describunt; & propterea motus mediocris quocum, si uniformiter continuareur, spatium a se inæquabili cum motu revera confectum describere possent, est semissis motus quem habent in Syzygiis Lunæ. Unde cum motus horarius maximus, si Nodi in Quadraturis versantur, sit $33''. 10''.$ $33''.$ $12''.$ motus mediocris horarius in hoc casu erit $16''. 35'''. 16''.$ $36''.$ Et cum motus horarius Nodorum semper sit ut AZ qu. & area $PDdM$ conjunctim, & propterea motus horarius Nodorum in Syzygiis Lunæ ut AZ qu. & area $PDdM$ conjunctim, id est (ob datam aream $PDdM$ in Syzygiis descripiam) ut AZ qu. erit etiam motus mediocris ut AZ qu. atque adeo hic motus, ubi Nodi extra Quadraturas versantur, erit ad $16''. 35'''. 16''.$ $36''.$ ut AZ qu. ad AT qu., $Q.E.D.$

PRO-

PROPOSITIO XXXI. PROBLEMA XII.

Invenire motum horarium Nodorum Lunæ in Orbe Elliptico.

Designet $Qpmaq$ Ellipsin, axe majore Qq , minore ab descriptam, QAq Circulum circumscriptum, T Terram in utriusque centro communi, S Solem, p Lunam in Ellipsi motam, & pm arcum quem data temporis particula quam minima describit, N & n Nodos linea Nn junctos, pK & mk perpendicularia in axem Qq demissa & hinc inde producta, donec occurrant Circulo in P & M ,



& lineæ Nodorum in D & d . Et si Luna, radio ad Terram ducto, aream describat temporis proportionalem, erit motus Nodi in Ellipsi ut area $pDdm$.

Nam si PF tangat Circulum in P , & producta occurrat TN in F , & pf tangat Ellipsin in p & producta occurrat eidem TN in n .

in f , convenient autem hæc tangentes in axe TQ ad T ; & si LM designet spatium quod Luna in Circulo revolvens, interea dum describit arcum PM , urgente & impellente vi prædicta $3IT$, motu transverso describere posset, & ml designet spatium quod Luna in Ellipsi revolvens eodem tempore, urgente etiam vi $3IT$, describere posset; & producantur LP & lp donec occurrant plano Eclipticæ in G & g ; & jungantur FG & fg , quarum FG producta secet pf , pg & TQ in e , e & R respective, & fg producta secet TQ in r : Quoniam vis $3IT$ seu $3PK$ in Circulo est ad vim $3IT$ seu $3pK$ in Ellipsi, ut PK ad pK , seu AT ad at ; erit spatium ML vi priore genitum, ad spatium ml vi posteriore genitum, ut PK ad pK , id est, ob similes figuras $PTKp$ & $FTRe$, ut FR ad eR . Est autem ML ad FG (ob similia triangula PLM , PGF) ut PL ad PG , hoc est (ob parallelas Lk , PK , GR) ut pl ad pe , id est, (ob similia triangula plm , cpe) ut lm ad ce ; & inverse ut LM est ad lm , seu FR ad eR , ita est FG ad ce . Et propterea si fg esset ad ce ut ft ad ct , id est, ut fr ad cr (hoc est, ut fr ad FR & FR ad cr conjunctim, id est, ut ft ad FT & FG ad ce conjunctim,) quoniam ratio FG ad ce utrinque ablata relinquit rationes fg ad FG & ft ad FT , foret fg ad FG ut ft ad FT ; atque adeo anguli, quos FG & fg subtenderent ad Terram T , æquarentur inter se. Sed anguli illi (per ea quæ in præcedente Propositione exposuimus) sunt motus Nodorum, quo tempore Luna in Circulo arcum PM , in Ellipsi arcum pm percurrit: & propterea motus Nodorum in Circulo & Ellipsi æquarentur inter se. Hæc ita se haberent, si modo fg esset ad ce ut ft ad ct , id est, si gf æqualis esset $\frac{ce \times ft}{ct}$. Verum ob similia triangula fgp , cep , est fg ad ce ut fp ad cp ; ideoque fg æqualis est $\frac{ce \times fp}{cp}$; & propterea angulus, quem fg revera subtendit, est ad angulum priorem, quem FG subtendit, hoc est, motus Nodorum in Ellipsi ad modum Nodorum in Circulo, ut hæc fg seu $\frac{ce \times fp}{cp}$ ad priorem fg seu $\frac{ce \times ft}{ct}$, id est, ut $fp \times ct$ ad $ft \times cp$, seu fp ad ft & ct ad cp , hoc est, si pb ipsi TN parallela occurrat FP in b , ut Fb ad FT & FT ad FP , hoc est; ut Fb ad FP seu Dp ad DP , adeoque

Fff ut

DE MONDI
SYSTEMATE

ut area $DPmd$ ad aream $DPMd$. Et propterea, cum area posterior proportionalis sit motui Nodorum in Circulo, erit area prior proportionalis motui Nodorum in Ellipsi. $Q. E. D.$

Carol. Igitur cum, in data Nodorum positione, summa omnium arearum $pDdm$, quo tempore Luna pergit a Quadratura ad locum quemvis m , sit area $mpQEd$, quæ ad Ellipticos tangentem QE terminatur; & summa omnium arearum illarum, in revolutione integra, sit area Ellipseos totius: motus mediocris Nodorum in Ellipsi erit ad motum mediocrem Nodorum in Circulo, ut Ellipsis ad Circulum; id est, ut Ta ad TA , seu 69 ad 70. Et propterea, cum motus mediocris horarius Nodorum in Circulo sit ad $16''.35'''.16'''.36''$. ut $AZqu.$ ad $ATqu.$ si capiatur angulus $16''.21'''.3'''.30''$. ad angulum $16''.35'''.16'''.36''$. ut 69 ad 70, erit motus mediocris horarius Nodorum in Ellipsi ad $16''.21'''.3'''.30''$. ut AZq ad ATq ; hoc est, ut quadratum sinus distantie Nodi a Sole ad quadratum Radii.

Cæterum Luna, radio ad Terram ducto, aream velocius describit in Syzygiis quam in Quadraturis, & eo nomine tempus in Syzygiis contrahitur, in Quadraturis producitur; & una cum tempore motus Nodorum augetur ac diminuitur. Erat autem momentum areæ in Quadraturis Lunæ ad ejus momentum in Syzygiis ut 10973 ad 11073, & propterea momentum mediocre in Octantibus est ad excessum in Syzygiis, defectumque in Quadraturis, ut numerorum semisumma 11023 ad eorundem semidifferentiam 50. Unde cum tempus Lunæ in singulis Orbis particulis æqualibus sit reciproce ut ipsius velocitas, erit tempus mediocre in Octantibus ad excessum temporis in Quadraturis, ac defectum in Syzygiis, ab hac causa oriundum, ut 11023 ad 50 quam proxime. Pergendo autem a Quadraturis ad Syzygias, invenio quod excessus momentorum areæ in locis singulis, supra momentum minimum in Quadraturis, sit ut quadratum sinus distantie Lunæ a Quadraturis quam proxime; & propterea differentia inter momentum in loco quocumque & momentum mediocre in Octantibus, est ut differentia inter quadratum sinus distantie Lunæ a Quadraturis & quadratum sinus graduum 45, seu semissem quadrati Radii; & incrementum temporis in locis singulis inter Octantes & Quadraturas, & decrementum ejus inter Octantes & Syzygias, est in eadem ratione. Motus autem Nodorum, quo tempore Luna percurrit singulas Orbis particulas æquales, acceleratur vel retardatur in duplicata ratione temporis. Est enim motus iste, dum Luna per-

percurrit PM , (cæteris paribus) ut ML , & ML est in duplicata ratione temporis. Quare motus Nodorum in Syzygiis, eo tempore confectus quo Luna datas Orbis particularis percurrit, diminuitur. In duplicata ratione numeri 11073 ad numerum 11023; estque decrementum ad motum reliquum ut 100 ad 10973, ad motum vero totum ut 100 ad 11073 quam proxime. Decrementum autem in locis inter Octantes & Syzygias, & incrementum in locis inter Octantes & Quadraturas, est quam proxime ad hoc decrementum, ut motus totus in locis illis ad motum totum in Syzygiis & differentia inter quadratum sinus distantiae Lunæ a Quadratura & semissem quadrati Radii ad semissem quadrati Radii, conjunctum. Unde si Nodi in Quadraturis versentur, & capiantur loca duo æqualiter ab Octante hinc inde distantia, & alia duo a Syzygia & Quadratura iisdem intervallis distantia, deque decrementis motuum in locis duobus inter Syzygiam & Octantem, subducantur incrementa motuum in locis reliquis duobus, quæ sunt inter Octantem & Quadraturam; decrementum reliquum æquale erit decremento in Syzygia: uti rationem ineuntj facile constabit. Proindeque decrementum mediocre, quod de Nodorum motu mediocri subdaci debet, est pars quarta decrementi in Syzygia. Motus totus horarius Nodorum in Syzygiis (ubi Luna radio ad Terram ducto aream tempori proportionalem describere supponebatur) erat $32''. 42'''. 7^{iv}$. Et decrementum motus Nodorum, quo tempore Luna jam velocior describit idem spatium, diximus esse: ad hunc motum ut 100 ad 11073; adeoque decrementum illud est $17'''. 43^{iv}. 11^{v}$, cujus pars quarta $4'''. 25^{iv}. 48^{v}$, motui horario mediocri superius invento $16''. 16'''. 37^{iv}. 42^{v}$ subducta, relinquit $16''. 16'''. 37^{iv}. 42^{v}$ motum medicrem horarium correctum.


Si Nodi versantur extra Quadraturas, & spectantur loca bina a Syzygiis hinc inde æqualiter distantia; summa motuum Nodorum, ubi Luna versatur in his locis, erit ad summam motuum, ubi Luna in iisdem locis & Nodi in Quadraturis versantur, ut $AZqu.$ ad $ATqu.$ Et decremента motuum, a causis jam expositis oriunda, erunt ad invicem ut ipsi motus, adeoque motus reliqui erunt ad invicem ut $AZqu.$ ad $ATqu.$ & motus mediocres ut motus reliqui. Est itaque motus mediocris horarius correctus, in dato quocunque Nodorum situ, ad $16''. 16'''. 37^{iv}. 42^{v}$ ut $AZqu.$ ad $ATqu.$; id est, ut quadratum sinus distantiae Nodorum a Syzygiis ad quadratum Radii.

Fff 2

PRO-

Invenire motum medium Nodorum Lunæ.

Motus medius annuus est summa motuum omnium horariorum mediocrium in anno. Concipe Nodum versari in N , & singulis horis completis retrahi in locum suum priorem, ut non obstante motu suo proprio, datum semper fervet situm ad Stellas Fixas. Interea vero Solem S , per motum Terræ, progredi a Nodo, & cursum annum apparentem uniformiter complere. Sit autem Aa arcus datus quam minimus, quem recta TS ad Solem semper ducta, intersectione sui & circuli NaN , dato tempore quam minimo defcribit: & motus horarius mediocris (per jam ostensa) erit ut AZq , id est (ob proportionales AZ , ZT) ut rectangulum sub AZ & ZT , hoc est ut area $AZTa$. Et summa omnium horariorum motuum mediocrium ab initio, ut summa omnium arearum $aTZA$, id est, ut area NAZ . Est autem maxima



AZ γ aequalis rectangulo sub arcu *Aa* & radio circuli; & propterea summa omnium rectangulorum in circulo toto ad summam totidem maximorum, ut area circuli totius ad rectangulum sub circumferentia tota & radio; id est, ut 1 ad 2. Motus autem huius, rectangulo maximo respondens, erat 16". 16". 37". 42". Et hic motus, anno toto sidereo dierum 365. hor. 6. min. 9. fit 39". 38". 7". 50". Ideoque huius dimidium 19". 49' 3". 55". est motus

tus medius Nodorum circulo toti respondens. Et motus Nodorum, LIPSE
TERTIUS
quo tempore Sol pergit ab N ad A , est ad $19^{\text{or}} 49'. 3''. 55''$. ut area NAZ ad circumulum totum.

Hæc ita se habent, ex Hypothesi quod Nodus horis singulis in locum priorem retrahitur, sic ut Sol anno toto completo ad Nodum eundem redeat a quo sub initio digressus fuerat. Verum per motum Nodi fit ut Sol citius ad Nodum revertatur, & computanda jam est abbreviatio temporis. Cum Sol anno toto conficiat 360 gradus, & Nodus motu maximo eodem tempore conficeret $39^{\text{or}} 38'. 7''. 50''$, seu 39,6355 gradus; & motus mediocris Nodi in loco quovis N sit ad ipsius motum mediocrem in Quadraturis suis, ut AZq ad ATq : erit motus Solis ad motum Nodi in N , ut $360 \cdot ATq$ ad $39,6355 \cdot AZq$; id est, ut $9,0827646 \cdot ATq$ ad AZq . Unde si circuli totius circumferentia NaN dividatur in particulas æquales Aa , tempus quo Sol percurrat particulam Aa , si circulus quiesceret, erit ad tempus quo percurrit eandem particulam, si circulus una cum Nodis circa centrum T revolvatur, reciproce ut $9,0827646 \cdot ATq$ ad $9,0827646 \cdot ATq + ZAz$. Nam tempus est reciproce ut velocitas qua particula percurritur, & hæc velocitas est summa velocitatum Solis & Nodi. Igitur si tempus, quo Sol absque motu Nodi percurreret arcum NA , exponatur per Sektorem NTA , & particula temporis quo percurreret arcum quam minimum Aa , exponatur per Sektoris particulam ATa ; & (perpendiculari aT in Nn demisso) si in AZ capiatur dZ , ejus longitudinis ut sit rectangulum dZ in ZT ad Sektoris particulam ATa ut AZq ad $9,0827646 \cdot ATq + AZq$, id est, ut sit dZ ad AZ ut ATq ad $9,0827646 \cdot ATq + AZq$; rectangulum dZ in ZT designabit decrementum temporis ex motu Nodi oriundum, tempore toto quo arcus Aa percurritur. Et si punctum d tangit Curvam $NdGn$, area curvilinea NdZ erit decrementum totum, quo tempore arcus totus NA percurritur; & propterea excessus Sektoris NAT supra aream NdZ erit tempus illud totum. Et quoniam motus Nodi tempore minore minor est in ratione temporis, debet etiam area $AaTZ$ diminui in eadem ratione. Id quod fiet si capiatur in AZ longitudo eZ , quæ sit ad longitudinem AZ ut AZq ad $9,0827646 \cdot ATq + AZq$. Sic enim rectangulum eZ in ZT erit ad aream $AZTa$ ut decrementum temporis quo arcus Aa percurritur, ad tempus totum quo percurreretur si Nodus quiesceret: Et propterea rectangulum illud respondebit decremento motus Nodi. Et si punctum e tangat

Eff 3.

Curvam.

DE MUNDI
SYSTEMATE

Curvam $NeFn$, area tota NeZ , quæ summa est omnium decrementorum, respondebit decremento toti, quo tempore arcus AN percurritur; & area reliqua NAe respondebit motui reliquo, qui verus est Nodi motus quo tempore arcus totus NA , per Solis & Nodi conjunctos motus, percurritur. Jam vero area semicirculi est ad aream Figuræ $NeFnT$, per methodum Serierum infinitarum quasitam, ut 793 ad 60 quamproxime. Motus autem qui respondet Circulo toti erat $19^{\text{h}}. 49'. 3''. 55'''$; & propterea motus qui Figuræ $NeFnT$ duplicatæ respondet, est $1^{\text{h}}. 29'. 58''. 2'''$. Qui de motu priore subductus relinquit $18^{\text{h}}. 19'. 5''. 53'''$ motum totum Nodi inter sui ipsius Conjunctiones cum Sole; & hic motus de Solis motu annuo graduum 360 subductus, relinquit $341^{\text{h}}. 40'. 54''. 7'''$ motum Solis inter easdem Conjunctiones. Iste autem motus est ad motum annum 360 $^{\text{h}}$ ut Nodi motus jam inventus $18^{\text{h}}. 19'. 5''. 53'''$ ad ipsius motum annum, qui propterea erit $19^{\text{h}}. 18'. 1''. 23'''$. Hic est motus medius Nodorum in anno Sidereo. Idem per Tabulas Astronomicas est $19^{\text{h}}. 21'. 21''. 50'''$. Differentia minor est parte trecentesima motus totius, & ab Orbis Lunaris Eccentricitate & Inclinatione ad planum Eclipticæ oriri videtur. Per Eccentricitatem Orbis motus Nodorum nimis acceleratur, & per ejus Inclinationem vicissim retardatur aliquantulum, & ad justam velocitatem reducitur.


PROPOSITIO XXXIII. PROBLEMA XIV.

Invenire motum verum Nodorum Luna.

In tempore quod est ut area $NTA - NdZ$, (in Fig. præced.) motus iste est ut area $NAeN$, & inde datur. Verum ob nimiam calculi difficultatem, præstat sequentem Problematis constructionem adhibere. Centro C , intervallo quovis CD , describatur circulus $BEFD$. Producat DC ad A , ut sit AB ad AC ut motus medius ad semissem motus veri mediocris, ubi Nodi sunt in Quadraturis, (id est, ut $19^{\text{h}}. 18'. 1''. 23'''$ ad $19^{\text{h}}. 49'. 3''. 55'''$, atque adeo BC ad AC ut motuum differentia $0^{\text{h}}. 31'. 2''. 32'''$, ad motum posteriorem $19^{\text{h}}. 49'. 3''. 55'''$) hoc est, ut 1 ad $38\frac{1}{2}$, dein per punctum D ducatur infinita Gg , quæ tangat circulum in D ; & si capiatur angulus BCE vel BCF æqualis duplæ distantie Solis a loco Nodi, per motum medium invento;

&

& agatur AE vel AF secans perpendicularum DG in G ; & capiatur angulus qui sit ad motum totum Nodi inter ipsius Syzygias (id est, ad $9^{\text{h}}. 11'. 3''.$) ut tangens DG ad circuli $BE'D$ circumferentiam totam; atque angulus iste (pro quo angulus DAG usurpari potest) ad motum medium Nodorum addatur ubi Nodi



transeunt a Quadraturis ad Syzygias, & ab eodem motu medio subducatur ubi transeunt a Syzygiis ad Quadraturas, habebitur eorum motus verus. Nam motus verus sic inventus congruet quam proxime cum motu vero qui prodit exponendo tempus per aream $NTA - NdZ$, & motum Nodi per aream $NAeN$; ut rem perpendenti & computationes instituenti constabit. Hæc est æquatio semestris motus Nodorum. Est & æquatio menstrua, sed quæ ad inventionem Latitudinis Lunæ minime necessaria est. Nam cum Variatio Inclinationis Orbis Lunaris ad planum Eclipticæ duplici inæqualitati obnoxia sit, alteri semestri, alteri autem menstruæ; hujus menstrua inæqualitas & æquatio menstrua Nodorum ita se mutuo contemperant & corrigunt, ut ambæ in determinanda Latitudine Lunæ negligi possint.


Corol. Ex hac & præcedente Propositione liquet quod Nodi in Syzygiis suis quiescunt, in Quadraturis autem regrediuntur motu horario $16''.$ $19'''.$ 26^{iv} . Et quod æquatio motus Nodorum in Ostantibus sit $1^{\text{h}}. 30'$. Quæ omnia cum Phænomenis cœlestibus probe quadrant.

P. R. O.

PROPOSITIO XXXIV. PROBLEMA XV.

*Invenire Variationem horariam Inclinationis Orbis Lunaris
ad planum Eclipticæ.*

Designent A & a Syzygias; Q & q Quadraturas; N & n Nodos; P locum Lunæ in Orbe suo; p velligium loci illius in plano Eclipticæ, & mTl motum momentaneum Nodorum ut supra. Et si ad lineam Tm demittatur perpendicularum PG , jungatur pG , & producat eam donec occurrat Tl in g , & jungatur etiam Pg : erit angulus PGp Inclinationis orbis Lunaris ad planum Eclipticæ,



ubi Luna versatur in P ; & angulus $Pg p$ Inclinationis ejusdem post momentum temporis completum; adeoque angulus $G P g$ Variatio momentanea Inclinationis. Est autem hic angulus $G P g$ ad angulum GTg , ut TG ad PG & Pp ad PG conjunctim. Et propterea si pro momento temporis substituat hora; cum angulus GTg (per Proposit. xxx.) sit ad angulum $33''$. $10'''$, $33'''$. ut

ITX

$IT \times PG \times AZ$ ad AT cub, erit angulus GPg (seu Inclinationis horaria Variatio) ad angulum $33^\circ 10'$. $33''$, ut $IT \times AZ \times TG$

$\times \frac{Pp}{PG}$ ad AT cub. $\mathcal{Q}. E. I.$

Hæc ita se habent ex Hypothesi quod Luna in Orbe Circulari uniformiter gyatur. Quod si Orbis ille Ellipticus sit, motus mediocris Nodorum minuetur in ratione axis minoris ad axem majorem; uti supra expositum est. Et in eadem ratione minuetur etiam Inclinationis Variatio.

Corol. 1. Si ad Nn erigatur perpendiculum TF , sitque pM motus horarius Lunæ in plano Eclipticæ; & perpendicula pK, Mk in QT demissa & utrinque producta occurrant TF in H & b : erit IT ad AT ut Kk ad Mp , & TG ad Hp ut TZ ad AT , ideoque $IT \times TG$ æquale $\frac{Kk \times Hp \times TZ}{Mp}$, hoc est, æquale areae

$Hp Mb$ ductæ in rationem $\frac{TZ}{Mp}$: & propterea Inclinationis Variatio horaria ad $33^\circ, 10', 33''$, ut $Hp Mb$ ducta in $AZ \times \frac{TZ}{Mp} \times \frac{Pp}{PG}$

ad AT cub.

Corol. 2. Ideoque si Terra & Nodi singulis horis completis retraherentur à locis suis novis, & in loca priora in instanti semper reducerentur, ut situs eorum, per mensem integrum periodicum, datus maneret; tota Inclinationis Variatio tempore mensis illius foret ad $33^\circ 10', 33''$, ut aggregatum omnium arcuum $Hp Mb$, in revolutione puncti p genitarum, & sub signis propriis + & —

conjunctarum, ductum in $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$ ad $Mp \times AT$ cub. id

est, ut circulus totus $\mathcal{Q}Aqa$ ductus in $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$ ad $Mp \times$

AT cub. hoc est, ut circulus totus $\mathcal{Q}Aqa$ ductus in $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$

ad $2 Mp \times AT$ quad.

Corol. 3. Proinde in dato Nodorum situ, Variatio mediocris horaria, ex qua per mensem uniformiter continuata Variatio illa menstrua generari posset, est ad $33^\circ, 10', 33''$, ut $AZ \times TZ$

$\times \frac{Pp}{PG}$ ad $2 ATq$, sive ut $Pp \times \frac{AZ \times TZ}{AT}$ ad $PG \times 4 AT$, id

Ggg est

DE MUNDO
SYSTEMATE

est (cum Pp sit ad PG ut sinus Inclinationis prædictæ ad radium, & $\frac{AZ \times TZ}{AT}$ sit ad $4 AT$ ut sinus duplicati anguli ATn ad radium quadruplicatum) ut Inclinationis ejusdem sinus ductus in sinum duplicatæ distantiae Nodorum a Sole, ad quadruplum quadratum radii.

Corol. 4. Quoniam Inclinationis horaria Variatio, ubi Nodi in Quadraturis versantur, est (per hanc Propositionem) ad angulum $33''. 10'''. 33''$. ut $IT \times AZ \times IG \times \frac{Pp}{PG}$ ac $AT \text{ cub.}$ id est, ut $\frac{IT \times TG}{AT} \times \frac{Pp}{PG}$ ad $2 AT$, hoc est, ut sinus duplicatæ distantiae Lunæ à Quadraturis ductus in $\frac{Pp}{PG}$ ad radium duplicatum: summa omnium Variationum horariarum, quo tempore Luna in hoc situ Nodorum transit à Quadratura ad Syzygiam, (id est, spatio horarum 177 $\frac{1}{2}$;) erit ad summam totidem angulorum $33''. 10'''. 33''$, seu $5878''$, ut summa omnium sinuum duplicatæ distantiae Lunæ à Quadraturis ducta in $\frac{Pp}{PG}$, ad summam totidem diametrorum; hoc est, ut diameter ducta in $\frac{Pp}{PG}$ ad circumferentiam: id est, si Inclination sit $56'. 1'$, ut $7 \times \frac{374}{10000}$ ad 22, seu 278 ad 10000. Proindeque Variatio tota, ex summa omnium horariarum Variationum tempore prædicto conflata, est $163''$, seu $2'. 43''$.

PROPOSITIO XXXV. PROBLEMA XVI


Dato tempore invenire Inclinationem Orbis Lunaris ad planum Eclipticæ.

Sit AD sinus Inclinationis maximæ, & AB sinus Inclinationis minimæ. Bifecetur BD in C , & centro C , intervallo BC , describatur Circulus BGD . In AC capiatur CE in ea ratione ad EB quam EB habet ad $2BA$; Et si dato tempore constitutur angulus AEG æqualis duplicatæ distantiae Nodorum à Qua-

DE MONDI
SYSTEMATE;

arcum Gg ; id est, ut diameter BD ad semicircumferentiam BGD & tempus horarum 2079¹/₂, quo Nodus pergit à Quadraturis ad Syzygias, ad horam unam conjunctim; hoc est, ut 7 ad 11 & 2079¹/₂ ad 1. Quare si rationes omnes conjungantur, fiet Variatio tota BD ad 33". 10". 33^{iv}/₁₀. ut $224 \times 7 \times 2079\frac{1}{2}$ ad 110000, id est, ut 29645 ad 1000, & inde Variatio illa BD prodibit 16'. 23¹/₂".

Hæc est Inclinationis Variatio maxima quatenus locus Lunæ in Orbe suo non consideratur. Nam Inclination, si Nodi in Syzygiis versantur, nil mutatur ex vario situ Lunæ. At si Nodi in Quadraturis consistunt, Inclination minor est ubi Luna versatur in Syzygiis, quam ubi ea versatur in Quadraturis, excessu 2'. 43"; uti in Propositionis superioris Corollario quarto indicavimus. Et hujus excessus dimidio 1'. 21¹/₂". Variatio tota mediocris BD in Quadraturis Lunaribus diminuta fit 15". 2", in ipsius autem Syzygiis aucta fit 17'. 45". Si Luna igitur in Syzygiis constituitur, Variatio tota, in transitu Nodorum à Quadraturis ad Syzygias, erit 17'. 45": adeoque si Inclination, ubi Nodi in Syzygiis versantur, sit 58¹/₂". 17'. 20"; eadem, ubi Nodi sunt in Quadraturis, & Luna in Syzygiis, erit 48¹/₂". 59' 35". Atque hæc ita se habere confirmatur ex Observationibus.



Si jam desideretur Orbis Inclination illa, ubi Luna in Syzygiis & Nodi ubivis versantur; fiat AB ad AD ut sinus graduum 4. 59'. 35". ad sinus graduum 5. 17'. 20", & capiatur angulus AEG æqualis duplicatæ distantiae Nodorum à Quadraturis; & erit AH sinus Inclinationis quæsitæ. Huic Orbis Inclinationi æqualis est ejusdem Inclination, ubi Luna distat 90¹/₂" à Nodis. In aliis Lunæ locis inæqualitas mensura, quam inclinationis variatio admittit, in calculo Latitudinis Lunæ compensatur & quodammodo tollitur per inæqualitatem mensuram motus Nodorum, (ut supra diximus) adeoque in calculo Latitudinis illius negligi potest.

Scho-

*Scholium.*LIBRA
TERTIA

Hicce motuum Lunarum computationibus ostendere volui, quod motus Lunares, per Theoriam Gravitatis, a causis suis computari possint. Per eandem Theoriam inveni præterea quod Æquatio Annua mediæ motus Lunæ oriatur a varia dilata-tione Orbis Lunæ per vim Solis, juxta Corol. 6. Prop. LXVI. Lib. I. Hæc vis in Perigæo Solis major est, & Orbem Lunæ dilatat; in Apogæo ejus minor est, Orbem illum contrahi permittit. In Orbe dilatato Luna tardius revolvitur, in contracto citius; & Æquatio Annua per quam hæc inæqualitas compensatur, in Apogæo & Perigæo Solis nulla est, in mediocri Solis a Terra distantia ad $11'. 50''$. circiter ascendit, in aliis locis Æquationi centri Solis proportionalis est; & additur medio motui Lunæ ubi Terra pergit ab Aphelio suo ad Perihelium, & in opposita Orbis parte subducitur. Assumendo radium Orbis magni 1000 & Eccentricitatem Terræ 16 $\frac{1}{2}$, hæc Æquatio ubi maxima est, per Theoriam Gravitatis prodit $11'. 49''$. Sed Eccentricitas Terræ paulo major esse videtur, & aucta Eccentricitate hæc Æquatio augeri debet in eadem ratione. Sit Eccentricitas 16 $\frac{1}{4}$, & Æquatio maxima erit $11'. 52''$.

Inveni etiam quod in Perihelio Terræ, propter majorem vim Solis, Apogæum & Nodi Lunæ velocius moventur quam in Aphelio ejus, idque in triplicata ratione distantie Terræ a Sole inverse. Et inde oriuntur Æquationes Annuæ horum motuum Æquationi centri Solis proportionales. Motus autem Solis est in duplicata ratione distantie Terræ a Sole inverse, & maxima centri Æquatio quam hæc inæqualitas generat, est $1^{\text{ra}} 56'. 26''$ prædictæ Solis Eccentricitati 16 $\frac{1}{4}$ congruens. Quod si motus Solis esset in triplicata ratione distantie inverse, hæc inæqualitas generaret Æquationem maximam $2^{\text{ta}} 56'. 9''$. Et propterea Æquationes maximæ quas inæqualitates motuum Apogæi & Nodorum Lunæ generant, sunt ad $2^{\text{ta}} 56'. 9''$, ut motus medius diurnus Apogæi & motus medius diurnus Nodorum Lunæ sunt ad motum medium diurnum Solis. Unde prodit Æquatio maxima mediæ motus Apogæi $19'. 52''$: & Æquatio maxima mediæ motus Nodorum $9'. 27''$. Additur vero Æquatio prior & subducitur posterior, ubi Terra pergit a Perihelio suo ad Aphelium: & contrarium fit in opposita Orbis parte.

Ggg 3

Per

DE MUNDI
SYSTEMATE.


Per Theoriam Gravitatis constitit etiam quod actio Solis in Lunam paulo major sit ubi transversa diameter Orbis Lunaris transit per Solem, quam ubi eadem ad rectos est angulos cum linea Terram & Solem jungente: & propterea Orbis Lunaris paulo major est in priore calu quam in posteriore. Et hinc oritur alia Aequatio motus medii Lunaris, pendens a situ Apogæi Lunæ ad Solem, quæ quidem maxima est cum Apogæum Lunæ versatur in Ostante cum Sole; & nulla cum illud ad Quadraturas vel Syzygias pervenit: & motui medio additur in transitu Apogæi Lunæ a Solis Quadratura ad Syzygiam, & subducitur in transitu Apogæi a Syzygia ad Quadraturam. Hæc Aequatio quam Semestrem vocabo, in Ostantibus Apogæi quando maxima est, ascendit ad $3'.45''$ circiter, quantum ex Phænomenis colligere potui. Hæc est ejus quantitas in mediocri Solis distantia a Terra. Augetur vero ac diminuitur in triplicata ratione distantiae Solis inverse, adeoque in maxima Solis distantia est $3'.34''$, & in minima $3'.56''$ quamproxime: ubi vero Apogæum Lunæ situm est extra Ostantes, evadit minor; estque ad Aequationem maximam, ut sinus duplæ distantiae Apogæi Lunæ a proxima Syzygia vel Quadratura ad radium.

Per eandem Gravitatis Theoriam actio Solis in Lunam paulo major est ubi linea recta per Nodos Lunæ ducta transit per Solem, quam ubi linea ad rectos est angulos cum recta Solem ac Terram jungente. Et inde oritur alia medii motus Lunaris Aequatio, quam Semestrem secundam vocabo, quæque maxima est ubi Nodi in Solis Ostantibus versantur, & evanescit ubi sunt in Syzygiis vel Quadraturis, & in aliis Nodorum positionibus proportionalis est sinui duplæ distantiae Nodi alterutrius a proxima Syzygia aut Quadratura: additur vero medio motui Lunæ dum Nodi transcut a Solis Quadraturis ad proximas Syzygias, & subducitur in eorum transitu a Syzygiis ad Quadraturas; & in Ostantibus ubi maxima est, ascendit ad $47'$ in mediocri Solis distantia a Terra, uti ex Theoria Gravitatis colligo. In aliis Solis distantiiis hæc Aequatio, in Ostantibus Nodorum, est reciproce ut cubus distantiae Solis a Terra, ideoque in Perigæo Solis ad $45'$ in Apogæo ejus ad $49'$ circiter ascendit.

Per eandem Gravitatis Theoriam Apogæum Lunæ progreditur quam maxime ubi vel cum Sole conjungitur vel eidem opponitur, & regreditur ubi cum Sole Quadraturam facit. Et Eccentricitas sit maxima in priore calu & minima in posteriore, per Corol.

7, 8 & 9

7, 8 & 9. Prop. LXVI. Lib. I. Et hæ inæqualitates per eadem Corollaria permagnæ sunt, & Æquationem principalem Apogæi generant, quam Semestrem vocabo. Et Æquatio maxima Semestris est $12^{\text{æ}} 18'$ circiter, quantum ex Observationibus colligere potui. *Horroxius* noster Lunam in Ellipsi circum Terram, in ejus umbilico inferiore constitutam, revolvi primus statuit. *Halleius* centrum Ellipseos in Epicyclo locavit, cujus centrum uniformiter revolvitur circum Terram. Et ex motu in Epicyclo oriuntur inæqualitates jam dictæ in progressu & regressu Apogæi & quantitate Eccentricitatis. Dividi intelligatur distantia mediocris Lunæ a Terra in partes 100000, & referat T Terram & TC Eccentricitatem mediocrem Lunæ partium 5505. Producat TC ad B , ut sit CB sinus Æquationis maximæ Semestris $12^{\text{æ}} 18'$ ad radium TC , & circulus BDA centro C intervallo CB descriptus, erit Epicyclus ille in quo centrum Orbis Lunarisi locatur & secundum ordinem litterarum BDA revolvitur. Capiatur angulus BCD æqualis duplo Argumento annuo, seu duplæ distantie veri loci Solis ab Apogæo Lunæ semel æquato, & erit CTD Æquatio




Semestris Apogæi Lunæ & TD Eccentricitas Orbis ejus in Apogæum secundo æquatum tendens. Habitis autem Lunæ motu medio & Apogæo & Eccentricitate, ut & Orbis axe majore partium 100000; ex his eruetur verus Lunæ locus in Orbe & distantia ejus a Terra, idque per Methodos notissimas.

In Perihelio Terræ, propter majorem vim Solis, centrum Orbis Lunæ velocius movetur circum centrum C quam in Aphelio, idque in triplicata ratione distantie Terræ a Sole inverse. Ob Æquationem centri Solis in Argumento annuo comprehensam, centrum Orbis Lunæ velocius movetur in Epicyclo BDA in duplicata ratione distantie Terræ a Sole inverse. Ut idem adhuc velocius moveatur in ratione simplici distantie inverse; ab Orbis centro D agatur recta DE versus Apogæum Lunæ, seu rectæ TC parallela, & capiatur angulus EDC æqualis excessui Argumenti

DE MUNDI
SYSTEMATE

menti anni prædicti supra distantiam Apogæi Lunæ a Perigæo Solis in consequentia; vel quod perinde est, capiatur angulus CDF æqualis complemento Anomalix veræ Solis ad gradus 360. Et sit DF ad DC ut dupla Eccentricitas Orbis magni ad distantiam mediocrem Solis a Terra, & motus medius diurnus Solis ab Apogæo Lunæ ad motum medium diurnum Solis ab Apogæo proprio conjunctim, id est, ut 33, ad 1000 & 52'. 27". 16" ad 59' 8". 10" conjunctim, sive ut 3 ad 100. Et concipe centrum Orbis Lunæ locari in puncto F , & in Epicyclo cujus centrum est D & radius DF interea revolvi dum punctum D progreditur in circumferentia circuli $DABD$. Hac enim ratione velocitas qua centrum Orbis Lunæ in linea quadam curva circum centrum C descripta movebitur, erit reciproce ut cubus distantix Solis a Terra quamproxime, ut oportet.

Computatio motus hujus difficilis est, sed facilior reddetur per approximationem sequentem. Si distantia mediocris Lunæ a Terra sit partium 100000, & Eccentricitas TC sit partium 5505 ut supra: recta CB vel CD invenietur partium 1172½, & recta DF



partium 354. Et hæc recta ad distantiam TC subten dit angulum ad Terram quem translatio centri Orbis a loco D ad locum F generat in motu centri hujus: & eadem recta duplicata in situ parallelo ad distantiam superioris umbilici Orbis Lunæ a Terra, subten dit eundem angulum, quem utique translatio illa generat in motu umbilici, & ad distantiam Lunæ a Terra subten dit angulum quem eadem translatio generat in motu Lunæ, quique propterea Æquatio centri Secunda dici potest. Et hæc Æquatio in mediocri Lunæ distantia a Terra, est ut sinus anguli quem recta illa DF cum recta a puncto F ad Lunam ducta continet quamproxime, & ubi maxima est evadit 2'. 25". Angulus autem quem recta DF & recta a puncto F ad Lunam ducta comprehendunt, invenitur vel subducendo angulum EDF ab Anomalia media Lunæ, vel addendo distantiam Lunæ a Sole ad distantiam Apogæi Lunæ ab Apogæo Solis

Solis. Et ut radius est ad sinum anguli sic inventi, ita $2'. 25''$ LIBRA
sunt ad Æquationem centri Secundam, addendam si summa illa TERTIO
sit minor semicirculo, subducendam si major. Sic habebitur ejus
Longitudo in ipsis Luminarium Syzygiis.

Si computatio accuratior desideretur, corrigendus est locus
Lunæ in Orbe ut supra inventus per Variationem duplicem. De
Variatione Prima & principali diximus supra, hæc maxima est
in Octantibus Lunæ. Variatio altera maxima est in Quadrantibus,
& oritur a varia Solis actione in Orbem Lunæ pro varia positione
Apogæi Lunæ ad Solem, computatur vero in hunc modum.
Ut radius ad sinum versum distantie Apogæi Lunæ a Perigæo
Solis in consequentia, ita angulus quidam P ad quartum propor-
tionalem. Et ut radius ad sinum distantie Lunæ a Sole, ita sum-
ma hujus quarti proportionalis & anguli cujusdam alterius Q ad
Variationem Secundam, subducendam si Lunæ lumen augetur, ad-
dendam si diminuitur. Sic habebitur locus verus Lunæ in Orbe,
& per Reductionem loci hujus ad Eclipticam habebitur Longi-
tudo Lunæ. Anguli vero P & Q ex Observationibus determi-
nandi sunt. Et interea si pro angulo P usurpentur $2'$, & pro
angulo Q $1'$, non multum errabitur.


Cum Atmosphæra Terræ ad usque altitudinem milliarium 35
vel 40 refringat lucem Solis, & refringendo spargat eandem in
Umbram Terræ, & spargendo lucem in confinio Umbræ dilatat
Umbram: ad diametrum Umbræ quæ per Parallaxim prodit,
addo minutum unum primum in Eclipsibus Lunæ, vel minutum
unum cum triente.

Theoria vero Lunæ primo in Syzygiis, deinde in Quadraturis,
& ultimo in Octantibus per Phænomena examinari & stabiliri de-
bet. Et opus hocce aggressurus motus medios Solis & Lunæ ad
tempus meridianum in Observatorio Regio *Grenovicensi*, die ul-
timo mensis *Decembris* anni 1700. st. vet. non incommode se-
quentes adhibebit: nempe motum medium Solis $\approx 20^{\text{h}}. 43'. 40''$, &
Apogæi ejus $\approx 7^{\text{h}}. 44'. 30''$, & motum medium Lunæ $\approx 15^{\text{h}}. 20'. 00''$,
& Apogæi ejus $\approx 8^{\text{h}}. 20'. 00''$, & Nodi ascendentis
 $\approx 27^{\text{h}}. 24'. 20''$; & differentiam meridianorum Observatorii hu-
jus & Observatorii Regii *Parisiensis* $0^{\text{h}}. 9^{\text{m}}. 20^{\text{s}}$.

PROPOSITIO XXXVI. PROBLEMA XVII.

Invenire vim Solis ad Mare movendum.

Solis vis ML seu PT , in Quadraturis Lunaribus, ad perturbandos motus Lunares, erat (per Prop. xxv. hujus) ad vim gravitatis apud nos, ut 1 ad 638092,6. Et vis $TM-LM$ seu 2 PK in Syzygiis Lunaribus, est duplo major. Hæ autem vires, si descendatur ad superficiem Terræ, diminuuntur in ratione distantiarum a centro Terræ, id est, in ratione 601 ad 1; adeoque vis prior in superficie Terræ, est ad vim gravitatis, ut 1 ad 38604600. Hac vi Mare deprimitur in locis quæ 90 gradibus distant



a Sole. Vi altera quæ dupla major est, Mare elevatur & sub Sole & in regione Soli opposita. Summa virium est ad vim gravitatis ut 1 ad 12868200. Et quoniam vis eadem eundem ciet motum, sive ea deprimat Aquam in regionibus quæ 90 gradibus distant à Sole, sive elevet eandem in regionibus sub Sole & Soli oppositis, hæc summa erit tota Solis vis ad Mare agitandum; & eundem habebit effectum ac si tota in regionibus sub Sole & Soli oppositis Mare elevaret, in regionibus autem quæ 90 gradibus distant a Sole nil ageret.

Hæc est vis Solis ad Mare ciendum in loco quovis dato, ubi Sol tam in vertice loci versatur quam in mediocri sua distantia a Terra. In aliis Solis positionibus vis ad Mare attollendum, est ut sinus versus duplæ altitudinis Solis supra horizontem loci directe & cubus distantie Solis a Terra iaverse.

Corol. Cum vis centrifuga partium Terræ à diurno Terræ motu oriunda, quæ est ad vim gravitatis ut 1 ad 289, efficiat ut altitudo

tudo Aquæ sub Æquatore superet ejus altitudinem sub Polis mensura pedum Parisiensium 85820; vis Solaris de qua egimus, cum sit ad vim gravitatis ut 1 ad 12868200, atque adeo ad vim illam centrifugam ut 289 ad 12868200 seu 1 ad 44527, efficiet ut altitudo Aquæ in regionibus sub Sole & Soli oppositis, superet altitudinem ejus in locis quæ 90 gradibus distant a Sole, mensura tantum pedis unius Parisiensis & digitorum undecim cum octava parte digiti. Est enim hæc mensura ad mensuram pedum 85820 ut 1 ad 44527.

PROPOSITIO XXXVII. PROBLEMA XVIII.

Invenire vim Lunæ ad Mare movendum.

Vis Lunæ ad Mare movendum colligenda est ex ejus proportionem ad vim Solis, & hæc proportio colligenda est ex proportionem motuum Maris, qui ab his viribus oriuntur. Ante ostium fluvii *Avone* ad lapidem tertium infra *Bristoliam*, tempore verno & autumnali totus Aquæ ascensus in Conjunctione & Oppositione Luminarium (observante *Samuele Sturmio*) est pedum plus minus 45, in Quadraturis autem est pedum tantum 25. Altitudo prior ex summa virium, posterior ex earundem differentia oritur. Solis igitur & Lunæ in Æquatore versantium & mediocriter a Terra distantium sunt vires S & L, & erit $L + S$ ad $L - S$ ut 45 ad 25, seu 9 ad 5.

In portu *Plymuthi* Æstus maris (ex observatione *Samuelis Colepreffi*) ad pedes plus minus sexdecim altitudine mediocri attollitur, ac tempore verno & autumnali altitudo Æstus in Syzygiis superare potest altitudinem ejus in Quadraturis, pedibus plus septem vel octo. Si maxima harum altitudinum differentia sit pedum novem, erit $L + S$ ad $L - S$ ut 20 ad 11 seu 41 ad 23. Quæ proportio fati congruit cum prior. Ob magnitudinem Æstus in portu *Bristolie*, observationibus *Sturmii* magis fidendum esse videtur, ideoque donec aliquid certius constiterit, proportionem 9 ad 5 usurpabimus.

Cæterum ob aquarum reciprocos motus, Æstus maximi non incidunt in ipsas Luminarium Syzygias, sed sunt tertii a Syzygiis ut dictum fuit, seu proxime sequuntur tertium Lunæ post Syzygias appulsum ad meridianum loci, vel potius (ut a *Sturmio* notatur) sunt tertii post diem novilunii vel plenilunii, seu post ho-

Hhh 2

ram

DE MUNDI
SYSTEMATE.

ram a novilunio vel plenilunio plus minus duodecimam, adeoque incidunt in horam a novilunio vel plenilunio plus minus quadragessimam tertiam. Incidunt vero in hoc portu in horam septimam circiter ab appulsu Lunæ ad meridianum loci; ideoque proxime sequuntur appulsus Lunæ ad meridianum, ubi Luna distat a Sole vel ab oppositione Solis gradibus plus minus octodecim vel novemdecim in consequentia. Æstas & Hyems maxime vigent, non in ipsis Solstitiis, sed ubi Sol distat a Solstitiis decima circiter parte totius circuitus, seu gradibus plus minus 36 vel 37. Et similiter maximus Æstus maris oritur ab appulsu Lunæ ad meridianum loci, ubi Luna distat a Sole decima circiter parte motus totius ab Æstu ad Æstum. Sit distantia illa graduum plus minus 18½. Et vis Solis in hac distantia Lunæ a Syzygiis & Quadraturis, minor erit ad augendum & ad minuendum motum maris a vi Lunæ oriundum, quam in ipsis Syzygiis & Quadraturis, in ratione radii ad sinum complementi distantiae hujus duplicatæ seu anguli graduum 37, hoc est, in ratione 10000000 ad 7986355. Ideoque in analogia superiore pro S scribi debet 0, 7986355 S.

Sed & vis Lunæ in Quadraturis, ob declinationem Lunæ ab Æquatore, diminui debet. Nam Luna in Quadraturis, vel potius in gradu 18½ post Quadraturas, in declinatione graduum plus minus 22. 13' versatur. Et Luminaris ab Æquatore declinantis vis ad Mare movendum diminuitur in duplicata ratione sinus complementi declinationis quamproxime. Et propterea vis Lunæ in his Quadraturis est tantum 0,8570327 L. Est igitur $L + 0,7986355 S$ ad 0,8570327 L — 0,7986355 S ut 9 ad 5.

Præterea diametri Orbis in quo Luna absque Eccentricitate moveri deberet, sunt ad invicem ut 69 ad 70; ideoque distantia Lunæ a Terra in Syzygiis est ad distantiam ejus in Quadraturis, ut 69 ad 70, cæteris paribus. Et distantiae ejus in gradu 18½ a Syzygiis ubi Æstus maximus generatur, & in gradu 18½ a Quadraturis ubi Æstus minimus generatur, sunt ad mediocrem ejus distantiam, ut 69,098747 & 69,897345 ad 69½. Vires autem Lunæ ad Mare movendum sunt in triplicata ratione distantiarum inverse, ideoque vires in maxima & minima harum distantiarum sunt ad vim in mediocri distantia, ut 0,9830427 & 1,017522 ad 1. Unde fit $1,017522 L + 0,7986355 S$ ad $0,9830427 \times 0,8570327 L - 0,7986355 S$ ut 9 ad 5. Et S ad L ut 1 ad 44815. Itaque cum vis Solis sit ad vim gravitatis ut 1 ad 12868200, vis Lunæ erit ad vim gravitatis ut 1 ad 2871400.

Corol.

Corol. 1. Cum Aqua vi Solis agitata ascendat ad altitudinem pedis unius & undecim digitorum cum octava parte digiti, eadem vi Lunæ ascendet ad altitudinem octo pedum & digitorum octo, & vi utraque ad altitudinem pedum decem cum semisse, & ubi Luna est in Perigæo ad altitudinem pedum duodecim cum semisse & ultra, præsertim ubi Æstus ventis spirantibus adjuvatur. Tanta autem vis ad omnes Maris motus excitandos abunde sufficit, & quantitati motuum probe respondet. Nam in maribus quæ ab Oriente in Occidentem late patent, uti in Mari *Pacífico*, & Maris *Atlantici* & *Æthiopici* partibus extra Tropicos, aqua attolli solet ad altitudinem pedum sex, novem, duodecim vel quindecim. In Mari autem *Pacífico*, quod profundius est & latius patet, Æstus dicuntur esse majores quam in *Atlantico* & *Æthiopico*. Etenim ut plenus sit Æstus, latitudo Maris ab Oriente in Occidentem non minor esse debet quam graduum nonaginta. In Mari *Æthiopico*, ascensus aquæ intra Tropicos minor est quam in Zonis temperatis, propter angustiam Maris inter *Africam* & Australem partem *Americæ*. In medio Mari aqua nequit ascendere, nisi ad littus utrumque & orientale & occidentale simul descendat: cum tamen vicibus alternis ad littora illa in Maribus nostris angustis descendere debeat. Ea de causa fluxus & refluxus in Insulis, quæ à littoribus longissime absunt, perexiguus esse solet. In Portubus quibusdam, ubi aqua cum impetu magno per loca vadosa, ad Sinus alternis vicibus implendos & evacuandos, influere & effluere cogitur, fluxus & refluxus debent esse solito majores, uti ad *Phymuthum* & pontem *Chepstowæ* in *Anglia*; ad montes *S. Michaelis* & urbem *Abrincatuorum* (vulgo *Avanches*) in *Normania*; ad *Cambaïam* & *Pegu* in *India* orientali. His in locis mare, magna cum velocitate accedendo & recedendo, littora nunc inundat nunc arida relinquit ad multa milliaria. Neque impetus influendi & remeandi prius frangi potest, quam aqua attollitur vel deprimitur ad pedes 30, 40, vel 50 & amplius. Et par est ratio fretorum oblongorum & vadosorum, uti *Magellanicæ* & ejus quo *Anglia* circumdatur. Æstus in hujusmodi portubus & fretis, per impetum cursus & recursus supra modum augetur. Ad littora vero quæ descensu præcipiti ad mare profundum & apertum spectant, ubi aqua sine impetu effluendi & remeandi attolli & subidere potest, magnitudo Æstus respondet viribus Solis & Lunæ.

DE MUNDI
DESCRPTIONE

Corol. 2. Cum vis Lunæ ad Mare movendum, sit ad vim gravitatis ut 1 ad 2871400, perspicuum est quod vis illa sit longe minor quam quæ vel in experimentis Pendulorum, vel in Staticis aut Hydrostaticis quibuscunque sentiri possit. In Æstu solo marino hæc vis sensibilem edit effectum.

Corol. 3. Quoniam vis Lunæ ad Mare movendum, est ad Solis vim confimilem ut 4,4815 ad 1, & vires illæ (per Corol. 14. Prop. LXVI. Lib. I.) sunt ut densitates corporum Lunæ & Solis & cubi diametrorum apparentium conjunctim; densitas Lunæ erit ad densitatem Solis, ut 4,4815 ad 1 directe & cubus diametri Lunæ ad cubum diametri Solis inverse: id est (cum diametri mediocres apparentes Lunæ & Solis sint 31'. 16" & 32'. 12") ut 4891 ad 1000. Densitas autem Solis erat ad densitatem Terræ, ut 100 ad 396; & propterea densitas Lunæ est ad densitatem Terræ, ut 4891 ad 3960 seu 21 ad 17. Est igitur corpus Lunæ densius & magis terrestre quam Terra nostra.

Corol. 4. Et cum verâ diameter Lunæ (ex Observationibus Astronomicis) sit ad veram diametrum Terræ, ut 100 ad 365; erit massa Lunæ ad massam Terræ, ut 1 ad 39,371.

Corol. 5. Et gravitas acceleratrix in superficie Lunæ, erit quasi triplo minor quam gravitas acceleratrix in superficie Terræ.

Corol. 6. Et distantia centri Lunæ a centro Terræ, erit ad distantiam centri Lunæ a communi gravitatis centro Terræ & Lunæ, ut 40,371 ad 39,371.

Corol. 7. Et mediocris distantia centri Lunæ a centro Terræ, erit semidiametrorum maximarum Terræ 60; quamproxime. Nam semidiameter maxima Terræ fuit pedum Parisiensium 19767630, & mediocris distantia centrorum Terræ & Lunæ ex hujusmodi semidiametris 60; constans, æqualis est pedibus 1190999707. Et hæc distantia (per Corollarium superius) est ad distantiam centri Lunæ a communi gravitatis centro Terræ & Lunæ, ut 40,371 ad 39,371, quæ proinde est pedum 1161498340. Et cum Luna revolvatur respectu Fixarum, diebus 27, horis 7 & minutis primis 43, sinus versus anguli quem Luna, tempore minuti unius primi motu suo medio, circa commune gravitatis centrum Terræ & Lunæ describit, est 1275235, existente radio 100, 000000, 000000. Et ut radius est ad hunc sinum versum, ita sunt pedes 1161498340 ad pedes 14,811833. Luna igitur vi illa qua retinetur in Orbe, cadendo in Terram, tempore minuti unius primi describet pedes 14,811833. Et si hæc vis augeatur in ratione 177¹/₂ ad 178¹/₂, habebitur

bebitur vis tota gravitatis in Orbe Lunæ, per Corol. Prop. III. LIBER
TRIGESIMUS;
Et hac vi Luna cadendo, tempore minuti unius primi describere deberet pedes 14,89517. Et ad sexagesimam partem hujus distantiae, id est, ad distantiam pedum 19849995 a centro Terræ, corpus grave cadendo, tempore minuti unius secundi describere deberet etiam pedes 14,89517. Diminuat hęc distantia in subduplicata ratione pedum 14,89517 ad pedes 15,12028, & habebitur distantia pedum 19701678 a qua grave cadendo, eodem tempore minuti unius secundi describet pedes 15,12028, id est, pedes 15, dig. 1, lin. 5,32. Et hac vi gravia cadunt in superficie Terræ, in Latitudine urbis *Lutetiae Parisiorum*, ut supra ostensum est. Est autem distantia pedum 19701678 paulo minor quam semidiameter globi huic Terræ æqualis, & paulo major quam Terræ hujus semidiameter mediocris, ut oportet. Sed differentiae sunt insensibiles. Et propterea vis qua Luna retinetur in Orbe suo, ad distantiam maximarum Terræ semidiametrorum 60½, ea est quam vis Gravitatis in superficie Terræ requirit.

Corol. 8. Distantia mediocris centrorum Terræ & Lunæ, est mediocrium Terræ semidiametrorum 60½ quamproxime. Nam semidiameter mediocris, quæ erat pedum 19688725, est ad semidiametrum maximam pedum 19767630, ut 60½ ad 60½ quamproxime.

In his computationibus Attractionem magneticam Terræ non consideravimus, cujus utique quantitas perparva est & ignoratur. Siquando vero hæc Attractio investigari poterit, & mensuræ graduum in Meridiano, ac longitudines Pendulorum isochronorum in diversis parallelis, legesque motuum Maris, & parallaxis Lunæ cum diametris apparentibus Solis & Lunæ ex Phænomenis accuratius determinatæ fuerint: licebit calculum hunc omnem accuratius repetere.

PROPOSITIO XXXVIII. PROBLEMA XIX.

Invenire Figuram corporis Lunæ.

Si corpus Lunare fluidum esset ad instar Maris nostri, vis Terræ ad fluidum illud in partibus & citimis & ultimis elevandum, esset ad vim Lunæ, quæ Mare nostrum in partibus & sub Luna & Lunæ oppositis attollitur, ut gravitas acceleratrix Lunæ in Terram ad gravitatem acceleratricem Terræ in Lunam & diametrum Lunæ ad diame-

DE MUNDI
STATU

diametrum Terræ conjunctim; id est, ut 39,371 ad 1 & 100 ad 365 conjunctim, seu 1079 ad 100. Unde cum Mare nostrum vi Lunæ attollatur ad pedes 81, fluidum Lunare vi Terræ attolli deberet ad pedes 93½. Eaque de causa Figura Lunæ Sphærois esset, cujus maxima diameter producta transiret per centrum Terræ, & superaret diametros perpendiculares excessu pedum 187. Talem igitur Figuram Luna affectat, eamque sub initio induere debuit.

§. E. 1.

Corol. Inde vero fit ut eadem semper Lunæ facies in Terram obvertatur. In alio enim situ corpus Lunare quiescere non potest, sed ad hunc situm oscillando semper redibit. Attamen oscillationes, ob parvitatem virium agitantium, essent longè tardissimæ: adeo ut facies illa, quæ Terram semper respicere deberet, possit alterum orbis Lunarum umbilicum. ob rationem in Prop. XVII. allatam respicere, neque statim abinde retrahi & in Terram converti.

LEMMA I.

Si APEP Terram designet uniformiter densam, centroque C & Polis P, p & Æquatore AE delineatam; & si centro C radio CP describi intelligatur Sphæra Pape; sit autem QR planum, cui recta a centro Solis ad centrum Terræ ducta normaliter insistit; & Terræ totius exterioris PapePE, quæ Sphæra modo descripta altior est, particula singule contentur recedere hinc inde a plano QR, sitque conatus particule cujusque ut ejusdem distantia a plano: Dico primo, quod tota particularum omnium, in Æquatoris circulo AE, extra globum uniformiter per totum circuitum in morem annuli dispositarum, vis & efficacia ad Terram circum centrum ejus rotandam, sit ad totam particularum totidem in Æquatoris puncto A, quod a plano QR maxime distat, consistentium vim & efficaciam, ad Terram consimili motu circulari circum centrum ejus movendam, ut unum ad duo. Et motus iste circularis circum axem, in communi sectione Æquatoris & plani QR jacentem, peragetur.

Nam centro C diametro BD describatur semicirculus BAFDC. Dividi intelligatur semicircumferentia BAD in partes

$-NM \times mC$: & harum differentia $LN \times Mm - NM \times MC + mC$,
 est vis particularum ambarum simul sumptarum ad Terram
 rotandam. Hujus differentiae pars affirmativa $LN \times Mm$ seu
 $2 LN \times NX$, est ad particularum duarum ejusdem magnitudi-
 nis in A consistentium vim $2 AH \times HC$, ut LXq ad ACq .
 Et pars negativa $NM \times MC + mC$ seu $2 XY \times CT$, ad parti-
 cularum earundem in A consistentium vim $2 AH \times HC$, ut
 CXq ad ACq . Ac proinde partium differentia, id est, parti-
 cularum duarum L & l simul sumptarum vis ad Terram rotan-
 dam, est ad vim particularum duarum iisdem æqualium & in loco
 A consistentium, ad Terram itidem rotandam, ut $LXq - CXq$
 ad ACq . Sed si circuli IK circumferentia IK dividatur in par-
 ticulas innumeras æquales L , erunt omnes LXq ad totidem IXq
 ut 1 ad 2, (per Lem. I.) atque ad totidem ACq , ut IXq ad
 $2 ACq$; & totidem CXq ad totidem ACq ut $2 CXq$ ad $2 ACq$.
 Quare vires conjunctæ particularum omnium in circuitu circuli
 IK , sunt ad vires conjunctas particularum totidem in loco A , ut
 $IXq - 2 CXq$ ad $2 ACq$; & propterea (per Lem. I.) ad vires
 conjunctas particularum totidem in circuitu circuli AE , ut
 $IXq - 2 CXq$ ad ACq .

Jam vero si Sphaeræ diameter Pp dividatur in partes innume-
 ras æquales, quibus insistant circuli totidem IK ; materia in peri-
 metro circuli cujusque IK erit ut IXq ; ideoque vis materiæ
 illius ad Terram rotandam, erit ut IXq in $IXq - 2 CXq$. Et
 vis materiæ ejusdem, si in circuli AE perimetro consisteret, esset
 ut IXq in ACq . Et propterea vis particularum omnium mate-
 riæ totius, extra globum in perimetris circulorum omnium con-
 sistentis, est ad vim particularum totidem in perimetro circuli
 maximè AE consistentis, ut omnia IXq in $IXq - 2 CXq$ ad
 totidem IXq in ACq , hoc est, ut omnia $ACq - CXq$ in
 $ACq - 3 CXq$ ad totidem $ACq - CXq$ in ACq , id est, ut
 omnia $ACqq - 4 ACq \times CXq + 3 CXqq$ ad totidem $ACqq$
 $- ACq \times CXq$, hoc est, ut tota quantitas fluens cujus fluxio
 est $ACqq - 4 ACq \times CXq + 3 CXqq$, ad totam quantitatem flu-
 entem cujus fluxio est $ACqq - ACq \times CXq$; ac proinde per Me-
 thodum Fluxionum, ut $ACqq \times CX - \frac{1}{2} ACq \times CX^2 + \frac{1}{3} CXqc$
 ad $ACqq \times CX - \frac{1}{2} ACq \times CX^2$, id est, si pro CX scribatur
 tota Cp vel AC , ut $\frac{1}{2} ACqc$ ad $\frac{1}{2} ACq c$, hoc est, ut duo ad
 quinq. Q. E. D.

Iii 2

LEMMA.

L E M M A III.

Iisdem positis: Dico tertio quod motus Terræ totius circum axem jam ante descriptum, ex motibus particularum omnium compositus, erit ad motum annuli prædicti circum axem eundem in ratione quæ componitur ex ratione materiæ in Terra ad materiam in annulo, & ratione trium quadratorum ex arcu quadranti circuli cujuscunque ad duo quadrata ex diametro; id est, in ratione materiæ ad materiam & numeri 925275 ad numerum 1000000.

Est enim motus Cylindri circum axem suum immotum revolventis, ad motum Sphæræ inscriptæ & simul revolventis, ut quælibet quatuor æqualia quadrata ad tres ex circulis sibi inscriptis: & motus Cylindri ad motum annuli tenuissimi, Sphæram & Cylindrum ad communem eorum contractum ambientis, ut duplum materiæ in Cylindro ad triplum materiæ in annulo; & annuli motus iste circum axem Cylindri uniformiter continuatus, ad ejusdem motum uniformem circum diametrum propriam, eodem tempore periodico factum, ut circumferentia circuli ad duplum diametri.

HYPOTHESIS II.

Si annulus prædictus Terra omni reliqua sublata, solus in Orbe Terræ, motu annuo circa Solem ferretur, & interea circa axem suum, ad planum Eclipticæ in angulo graduum $23\frac{1}{2}$ inclinatum, motu diurno revolveretur: idem foret motus Puntorum Æquinoctialium sive annulus iste fluidus esset, sive is ex materia rigida & firma constaret.

PRO.

PROPOSITIO XXXIX. PROBLEMA XX.

Invenire Præcessionem Æquinoctiorum.

Motus mediocris horarius Nodorum Lunæ in Orbe circulari, ubi Nodi sunt in Quadraturis, erat $16'. 35''$. $16''$. $36''$. & hujus dimidium $8''$. $17''$. $38''$. $18''$. (ob rationes supra explicatas) est motus medius horarius Nodorum in tali Orbe; fitque anno toto sidereo 20^h . $11'$. $46''$. Quoniam igitur Nodi Lunæ in tali Orbe conficerent annuatim 20^h . $11'$. $46''$. in antecedentia; & si plures essent Lunæ motus Nodorum cujusque, per Corollar. 16. Prop. LXVI. Lib. I. forent ut tempora periodica; si Luna spatio diei siderei juxta superficiem Terræ revolveretur, motus annuus Nodorum foret ad 20^h . $11'$. $46''$. ut dies sidereus horarum 23. $56'$. ad tempus periodicum Lunæ dierum 27. 7 hor. $43'$; id est, ut 1436 ad 39343. Et par est ratio Nodorum annuli Lunarum Terram ambientis; siue Lunæ illæ se mutuo non contingant, siue liquecant & in anulum continuum formentur, siue denique annulus ille rigeat & inflexibilis reddatur.

Fingamus igitur quod annulus iste, quoad quantitatem materiæ, æqualis sit Terræ omni *PapAPePe* quæ globo *Pape* superior est; (Vid. Fig. pag. 434.) & quoniam globus iste est ad Terram illam superiorem ut *aCqu.* ad *ACqu.* — *aCqu.* id est (cum Terræ diameter minor *PC* vel *aC* sit ad diametrum majorem *AC* ut 229 ad 230,) ut 52441 ad 459; si annulus iste Terram secundum Æquatorem cingeret & uterque simul circa diametrum annuli revolveretur; motus annuli esset ad motum globi interioris (per hujus Lem. III.) ut 459 ad 52441 & 1000000 ad 925275 conjunctim, hoc est, ut 4590 ad 485223; ideoque motus annuli esset ad summam motuum annuli ac globi, ut 4590 ad 489813. Unde si annulus globo adhæreat, & motum suum quo ipsius Nodi seu puncta Æquinoctialia regrediuntur, cum globo communicet: motus qui restabit in annulo erit ad ipsius motum priorem, ut 4590 ad 489813; & propterea motus punctorum Æquinoctialium diminuetur in eadem ratione. Erit igitur motus annuus punctorum Æquinoctialium corporis ex annulo & globo compositi, ad motum

DE MUNDI
SYSTEMATE,

20^{et}. 11'. 46", ut 1436 ad 39343 & 4590 ad 489813 conjunctim, id est, ut 100 ad 292369. Vires autem quibus Nodi Lunarum (ut supra explicui) atque adeo quibus puncta Æquinoctialia annuli regrediuntur (id est vires 317, in Fig. pag. 403 & 404.) sunt in singulis particulis ut distantiae particularum à plano *QR*, & his viribus particulæ illæ planum fugiunt; & propterea (per Lem. II.) si materia annuli per totam globi superficiem, in morem figuræ *PapApepe*, ad superiorem illam Terræ partem constituendam spargeretur, vis & efficacia tota particularum omnium ad Terram circa quamvis Æquatoris diametrum rotandam, atque adeo ad movenda puncta Æquinoctialia, evaderet minor quam prius in ratione 2 ad 5. Ideoque annuus Æquinoctiorum regressus jam esset ad 20^{et}. 11'. 46", ut 10 ad 73092: ac proinde fieret 9". 56". 50".

Cæterum hic motus, ob inclinationem plani Æquatoris ad planum Eclipticæ, minuendus est, idque in ratione sinus 91706 (qui sinus est complementi graduum 23½) ad Radium 100000. Quia ratione motus iste jam fiet 9". 7". 20". Hæc est annua Præcessio Æquinoctiorum a vi Solis oriunda.

Vis autem Lunæ ad Mare movendum erat ad vim Solis, ut 4, 4815 ad 1 circiter. Et vis Lunæ ad Æquinoctia movenda, est ad vim Solis in eadem proportionem. Indeque prodit annua Æquinoctiorum Præcessio a vi Lunæ oriunda 40". 52". 52"; ac tota Præcessio annua a vi utraque oriunda 50". 00". 12". Et hic motus cum Phenomenis congruit. Nam Præcessio Æquinoctiorum ex Observationibus Astronomicis est minutorum secundorum plus minus quinquaginta.

Si altitudo Terræ ad Æquatorem superet altitudinem ejus ad Polos, milliaribus pluribus quam 174, materia ejus rarior erit ad circumferentiam quam ad centrum: & Præcessio Æquinoctiorum ob altitudinem illam augeri, ob raritatem diminui debet.

Descripsimus jam Systema Solis, Terræ, Lunæ, & Planetarum: superest ut de Cometis nonnulla adjiciantur.


LEMMA

L E M M A IV.

LIBER
TERTIUS

Cometas esse Luna superiores & in regione Planetarum versari.


Ut defectus Parallaxeos diurnæ extulit Cometas supra regiones sublunares, sic ex Parallaxi annua convincitur eorum descensus in regiones Planetarum. Nam Cometæ qui progrediuntur secundum ordinem signorum sunt omnes, sub exitu apparitionis, aut solito tardiores aut retrogradi, si Terra est inter ipsos & Solem; at justo celeriores si Terra vergit ad oppositionem. Et e contra, qui pergunt contra ordinem signorum sunt justo celeriores in fine apparitionis, si Terra versatur inter ipsos & Solem; & justo tardiores vel retrogradi si Terra sita est ad contrarias partes. Contingit hoc maxime ex motu Terræ in vario ipsius situ, perinde ut fit in Planetis, qui, pro motu Terræ vel conspirante vel contrario, nunc retrogradi sunt, nunc tardius progredi videntur, nunc vero celerius. Si Terra pergit ad eandem partem cum Cometa, & motu angulari circa Solem tanto celerius fertur, ut recta per Terram & Cometam perpetuo ducta convergat ad partes ultra Cometam, Cometa e Terra spectatus, ob motum suum tardiozem, apparet esse retrogradus; sin Terra tardius fertur, motus Cometæ,



(detracto motu Terræ) fit saltem tardior. At si Terra pergit in contrarias partes, Cometa exinde velocior apparet. Ex acceleratione autem vel retardatione vel motu retrogrado distantia Cometæ in hunc modum colligitur. Sunt $\angle Q A$, $\angle Q B$, $\angle Q C$ observatæ tres longitudines Cometæ, sub initio motus, sitque $\angle Q F$ longitudo ultimo observata, ubi Cometa videri definit. Agatur

DE MUNDI
SYSTEMATIS

Agatur recta ABC , cujus partes AB , BC rectis QA & QB , QB & QC interjectæ, sint ad invicem ut tempora inter observationes tres primas. Producat AC ad G , ut sit AG ad AB ut tempus inter observationem primam & ultimam, ad tempus inter observationem primam & secundam, & jungatur QG . Et si Cometa moveretur uniformiter in linea recta, atque Terra vel quiesceret, vel etiam in linea recta, uniformi cum motu, progresseretur; foret angulus $\angle QG$ longitudo Cometæ tempore Observationis ultimæ. Angulus igitur $\angle FQG$, qui longitudinum differentia est, oritur ab inæqualitate motuum Cometæ ac Terræ. Hic autem angulus, si Terra & Cometa in contrariis partes moverentur, additur angulo $\angle QG$, & sic motum apparentem Cometæ velociorem reddit: Sin Cometa pergit in easdem partes cum Terra, eidem subducitur, motumque Cometæ vel tardiorum reddit, vel forte retrogradum, uti modo exposui. Oritur igitur hic angulus præcipue ex motu Terræ, & idcirco pro parallaxi Cometæ merito habendus est, neglecto videlicet ejus incremento vel decremento nonnullo, quod a Cometæ motu inæquabili in Orbe proprio oriri possit. Distantia vero Cometæ ex hac parallaxi sic colligitur. Designet S Solem, acT Orbem magnum, a locum Terræ in observatione prima, c locum Terræ in observatione tertia, T locum Terræ in observatione ultima, & TV lineam rectam versus principium Arietis ductam. Sumatur angulus $\angle TV$ æqualis angulo $\angle QF$, hoc est, æqualis longitudini Cometæ ubi Terra versatur in T . Jungatur ac , & producat ac ad g , ut sit ag ad ac ut AG ad AC , & erit g locus quem Terra tempore observationis ultimæ, motu in recta ac uniformiter continuato, attingeret. Ideoque si ducatur gV ipsi TV parallela, & capiatur angulus $\angle gV$ angulo $\angle QG$ æqualis, erit hic angulus $\angle gV$ æqualis longitudini Cometæ e loco g spectati; & angulus $\angle TVg$ parallaxis erit, quæ oritur a translatione Terræ de loco g in locum T : ac proinde V locus erit Cometæ in plano Eclipticæ. Hic autem locus V Orbe Jovis inferior esse solet.



Idem

Idem colligitur ex curvatura viæ Cometarum. Pergunt hæc corpora propemodum in circulis maximis quamdiu moventur celestius; at in fine cursus, ubi motus apparentis pars illa quæ à parallaxi oritur, majorem habet proportionem ad motum totum apparentem, deflectere solent ab his circulis, & quoties Terra movetur in unam partem, abire in partem contrariam. Oritur hæc deflexio maxime ex Parallaxi, propterea quod respondet motui Terræ; & insignis ejus quantitas, meo computo, collocavit disparantes Cometas satis longe infra Jovem. Unde consequens est quod in Perigæis & Periheliis, ubi propius adsunt, descendunt sæpius infra orbem Martis & inferiorum Planetarum.

Confirmatur etiam propinquitas Cometarum ex luce capitum. Nam corporis celestis a Sole illustrati & in regiones longinquas abeuntis, diminuitur splendor in quadruplicata ratione distantiae: in duplicata ratione videlicet ob auctam corporis distantiam a Sole, & in alia duplicata ratione ob diminutam diametrum apparentem. Unde si detur & lucis quantitas & apparens diameter Cometæ, dabitur distantia, dicendo quod distantia sit ad distantiam Planetæ, in ratione diametri ad diametrum directe & ratione subduplicata lucis ad lucem inverse. Sic minima capillitii Cometæ anni 1682 diameter, per Tubum opticum sexdecim pedum a *Flamstedio* observata & Micrometro mensurata, æquabat 2'. 0". Nucleus autem seu stella in medio capitis vix decimam partem latitudinis hujus occupabat, adeoque lata erat tantum 11" vel 12". Luce vero & claritate capitis superabat caput Cometæ anni 1680, stellasque primæ vel secundæ magnitudinis æmulabatur. Ponamus Saturnum cum annulo suo quasi quadruplo lucidiorem fuisse: & quoniam lux annuli propemodum æquabat lucem globi intermedii, & diameter apparens globi sit quasi 21", adeoque lux globi & annuli conjunctim æquaret lucem globi, cujus diameter esset 30": erit distantia Cometæ ad distantiam Saturni ut 1 ad $\sqrt{4}$ inverse, & 12" ad 30" directe, id est, ut 24 ad 30 seu 4 ad 5. Rursus Cometa anni 1665 mense *Aprili*, ut auctor est *Hevelius*, claritate sua pene Fixas omnes superabat, quin etiam ipsum Saturnum, ratione coloris videlicet longe vividioris. Quippe lucidior erat hic Cometa altero illo, qui in fine anni præcedentis apparuerat & cum stellis primæ magnitudinis conferebatur. Latitudo capillitii erat quasi 6', at nucleus cum Planetis ope Tubi optici collatus, plane minor erat Jove, & nunc minor corpore intermedio

DE MUNDI
SYSTEMATIS

dio Saturni, nunc ipsi æqualis judicabatur. Porro cum diameter capillitii Cometarum raro superet 8' vel 12', diameter vero nuclei seu stellæ centralis sit quasi decima vel forte decima quinta pars diametri capillitii, patet Stellas hæc ut plurimum ejusdem esse apparentis magnitudinis cum Planetis. Unde cum lux earum cum luce Saturni non raro conferri possit, eamque aliquando superet; manifestum est quod Cometæ omnes in Periheliis vel infra Saturnum collocandi sint, vel non longe supra. Errant igitur toto cœlo qui Cometæ in regionem Fixarum prope ablegant: quæ certe ratione non magis illustrari deberent a Sole nostro, quam Planetæ, qui hic sunt, illustrantur a Stellis fixis.

Hæc disputavimus non considerando obscurationem Cometarum per fumum illum maxime copiosum & crassum, quo caput circumdatur, quasi per nubem obtuse semper lucens. Nam quanto obscurius redditur corpus per hunc fumum, tanto propius ad Solem accedat necesse est, ut copia lucis a se reflexa Planetas æmuletur. Inde verisimile fit Cometæ longe infra spheram Saturni descendere, uti ex Parallaxi probavimus. Idem vero quam maxime confirmatur ex Caudis. Hæ vel ex reflexione fumi sparsi per Æthera, vel ex luce capitis oriuntur. Priore casu minuenda est distantia Cometarum, ne fumus a capite semper ortus per spatia nimis ampla incredibili cum velocitate & expansione propagetur. In posteriore referenda est lux omnis tam caudæ quam capillitii ad nucleum capitis. Igitur si concipiamus lucem hanc omnem congregari & intra discum nuclei coarctari, nucleus ille jam certe, quoties caudam maximam & fulgentissimam emittit, Jovem ipsum splendore suo multum superabit. Minore igitur cum diametro apparente plus lucis emittens, multo magis illustrabitur a Sole, adeoque erit Soli multo propior. Quinetiam capita sub Sole delitescunt, & caudas cum maximas tum fulgentissimas instar trabium ignitarum nonnunquam emittentia, eodem argumento infra orbem Veneris collocari debent. Nam lux illa omnis si in stellam congregari supponatur, ipsam Venerem ne dicam Veneres plures conjunctas quandoque superaret.

Idem denique colligitur ex luce capitem crescente in recessu Cometarum a Terra Solem versus, ac decrecente in eorum recessu a Sole versus Terram. Sic enim Cometa posterior Anni 1665 (observante *Hevelio*,) ex quo conspici cœpit, remittebat semper
de

de motu suo apparente, adeoque præterierat Perigæum; Splendor vero capitis nihilominus indies crescebat, usque dum Cometa radiis Solaribus obtektus desinit apparere. Cometa Anni 1683, observante eodem *Hevelio*, in fine Mensis *Julii* ubi primum conspectus est, tardissime movebatur, minuta prima 40 vel 45 circiter singulis diebus in Orbe suo conficiens. Ex eo tempore motus ejus diurnus perpetuo augebatur usque ad *Sept.* 4. quando evasit graduum quasi quinque. Igitur toto hoc tempore Cometa ad Terram appropinquabat. Id quod etiam ex diametro capitis Micrometro mensurata colligitur: quippe quam *Hevelius* reperit *Aug.* 6. esse tantum 6'. 5". inclusa coma, at *Sept.* 2. esse 9'. 7". Caput igitur initio longe minus apparuit quam in fine motus, at initio tamen in vicinia Solis longe lucidius extitit quam circa finem, ut refert idem *Hevelius*. Proinde toto hoc tempore, ob recessum ipsius a Sole, quoad lumen decrevit, non obstante accessu ad Terram. Cometa Anni 1618 circa medium Mensis *Decembris*, & iste Anni 1680 circa finem ejusdem Mensis, celerissime movebantur, adeoque tunc erant in Perigæis. Verum splendor maximus caput contigit ante duas fere septimanas, ubi modo exierant de radiis Solaribus; & splendor maximus caudarum paulo ante, in majore vicinitate Solis. Caput Cometæ prioris, juxta observationes *Cysati*, *Decemb.* 1. majus videbatur stellis primæ magnitudinis, & *Decemb.* 16. (jam in Perigæo existens) magnitudine parum, splendore seu claritate luminis plurimum defecerat. *Jan.* 7. *Keplerus* de capite incertus finem fecit observandi. Die 12 mensis *Decemb.* conspectum & a *Flamstedio* observatum est caput Cometæ posterioris, in distantia novem graduum a Sole; id quod stellæ tertiæ magnitudinis vix concessum fuisset. *Decemb.* 15 & 17 apparuit idem ut stella tertiæ magnitudinis, diminutum utique splendore Nubium juxta Solem occidentem. *Decemb.* 16. velocissime motus, inque Perigæo propemodum existens, cedebat ori Pegasi, Stellæ tertiæ magnitudinis. *Jan.* 3. apparebat ut Stella quartæ, *Jan.* 9. ut Stella quintæ, *Jan.* 13. ob splendorem Lunæ crescentis disparuit. *Jan.* 25. vix æquabat Stellas magnitudinis septimæ. Si sumantur æqualia a Perigæo hinc inde tempora, capita quæ temporibus illis in longinquis regionibus posita, ob æquales a Terra distantias, æqualiter lucere debuissent, in plaga Solis maxime splendere, ex altera Perigæi parte evanescere. Igitur ex magna lucis in utroque situ differentia, concluditur magna Solis & Cometæ vicinitas in situ priore. Nam lux Cometarum

DE MONDI regularis esse solet, & maxima apparere ubi capita velocissime SYSTEMATIS, moventur, atque adeo sunt in Perigæis; nisi quatenus ea major est in vicina Solis.

Corol. 1. Splendent igitur Cometæ luce Solis a se reflexa.

Corol. 2. Ex dictis etiam intelligitur cur Cometæ tantopere frequentant regionem Solis. Si cernerentur in regionibus longe ultra Saturnum, deberent sæpius apparere in partibus Soli oppositis. Forent enim Terræ viciniore qui in his partibus versarentur, & Sol interpositus obscuraret cæteros. Verum percurrendo historias Cometarum, reperi quod quadruplo vel quintuplo plures detecti sunt in Hemisphærio Solem versus, quam in Hemisphærio opposito, præter alios procul dubio non paucos quos lux Solaris obtexit. Nimirum in descensu ad regiones nostras neque caudas emittunt, neque adeo illustrantur a Sole, ut nudis oculis se prius detegendos exhibeant, quam sint ipso Jove propiores. Spatii autem tantillo intervallo circa Solem descripti pars longe major sita est a latere Terræ quod Solem respicit; inque parte illa majore Cometæ, Soli ut plurimum viciniore, magis illuminari solent.

Corol. 3. Hinc etiam manifestum est, quod Cœli resistentia destituuntur. Nam Cometæ vias obliquas & nonnunquam cursui Planetarum contrarias secuti, moventur omnifariam liberrime, & motus suos etiam contra cursum Planetarum, diutissime conservant. Fallor ni genus Planetarum sint, & motu perpetuo in orbem redeant. Nam quod Scriptores aliqui Meteora esse volunt, argumentum a capitum perpetuis mutationibus ducentes, fundamento carere videtur. Capita Cometarum Atmosphæris ingentibus cinguntur; & Atmosphærae inferne densiores esse debent. Unde nubes sunt, non ipsa Cometarum corpora, in quibus mutationes illæ visuntur. Sic Terra si e Planetis spectaretur, luce nubium suarum proculdubio splenderet, & corpus firmum sub nubibus prope delitesceret. Sic cingula Jovis in nubibus Planetæ illius formata sunt, quæ situm mutant inter se, & firmum Jovis corpus per nubes illas difficiliter cernitur. Et multo magis corpora Cometarum sub Atmosphæris & profundioribus & crassioribus abscondi debent.

PRO-

PROPOSITIO XL. THEOREMA XX.

LIBER
TERTIUS

Cometas in Sectionibus Conicis umbilicos in centro Solis habentibus moveri, & radiis ad Solem ductis areas temporibus proportionales describere.

Patet per Corol. 1. Propof. XIII. Libri primi, collatum cum Prop. VIII, XII & XIII. Libri tertii.

Corol. 1. Hinc si Cometæ in orbem redeunt: Orbes erunt Ellipses, & tempora periodica erunt ad tempora periodica Planetarum in axium principalium ratione sesquuplicata. Ideoque Cometæ maxima ex parte supra Planetas versantes, & eo nomine Orbes axibus majoribus describentes, tardius revolvuntur. Ut si axis Orbis Cometæ sit quadruplo major axe Orbis Saturni, tempus revolutionis Cometæ erit ad tempus revolutionis Saturni, id est, ad annos 30, ut $4\sqrt{4}$ (seu 8) ad 1, ideoque erit annorum 240.

Corol. 2. Orbes autem erunt Parabolæ adeo finitimi, ut eorum vice Parabolæ, absque erroribus sensibilibus, adhiberi possint.

Corol. 3. Et propterea, per Corol. 7. Prop. XVI. Lib. I. velocitas Cometæ omnis, erit semper ad velocitatem Planetæ cujuscunque circa Solem in circulo revolventis, in subduplicata ratione duplicæ distantiae Planetæ a centro Solis, ad distantiam Cometæ a centro Solis quamproxime. Ponamus radium Orbis magni, seu Ellipseos in qua Terra revolvitur semidiametrum maximam, esse partium 100000000: & Terra motu suo diurno mediocri describet partes 1720212, & motu horario partes 71675½. Ideoque Cometa in eadem Telluris a Sole distantia mediocri, ea cum velocitate quæ sit ad velocitatem Telluris ut $\sqrt{2}$ ad 1, describet motu suo diurno partes 2432747, & motu horario partes 101364½. In majoribus autem vel minoribus distantiiis, motus tum diurnus tum horarius erit ad hunc motum diurnum & horarium in subduplicata ratione distantiarum reciproce, ideoque datur.

Corol. 4. Unde si Latus rectum Parabolæ quadruplo majus sit radio Orbis magni, & quadratum radii illius ponatur esse partium 100000000: area quam Cometa radio ad Solem ducto singulis diebus describit, erit partium 1216373½, & singulis horis area illa erit partium 50682½. Sin latus rectum majus sit vel minus in ratione quavis, erit area diurna & horaria major vel minor in eadem ratione subduplicata.


Kkk 3

LEMMA

*Invenire lineam curvam generis Parabolici, quæ per data
quotcunque puncta transibit.*

Sunto puncta illa A, B, C, D, E, F , &c. & ab iisdem ad rectam
quamvis positione datam HN demitte perpendiculara quotcunque
 AH, BI, CK, DL, EM, FN .

Cas. 1. Si punctorum H, I, K, L, M, N æqualia sunt inter-
valla HI, IK, KL , &c. collige perpendicularorum $AH, BI,$
 CK , &c. differentias primas $b, 2b, 3b, 4b, 5b$, &c. secundas $c, 2c,$
 $3c, 4c$, &c. tertias $d, 2d, 3d$, &c. id est, ita ut sit $AH - BI = b,$
 $BI - CK = 2b, CK - DL = 3b, DL + EM = 4b, -EM + FN = 5b,$



&c. dein $b - 2b = c$, &c.
& sic pergatur ad diffe-
rentiam ultimam quæ hic
est f . Deinde erecta qua-
cunque perpendiculari RS ,
quæ fuerit ordinatim ap-
plicata ad curvam quæli-
tam: ut inveniatur hujus
longitudo, pone intervalla
 HI, IK, KL, LM , &c.
unitates esse, & dic AH
 $= a$, $-HS = p$, $\frac{1}{2}p$ in
 $-IS = q$, $\frac{1}{2}q$ in $+SK$

$= r$, $\frac{1}{2}r$ in $+SL = s$, $\frac{1}{2}s$ in $+SM = t$; pergendo videlicet ad usque
penultimum perpendicularum ME , & præponendo signa negativa
terminis HS, IS , &c. qui jacent ad partes puncti S versus A ,
& signa affirmativa terminis SK, SL , &c. qui jacent ad alteras
partes puncti S . Et signis probe observatis, erit $RS = a + bp$
 $+ cq + dr + es + ft$, &c.

Cas. 2. Quod si punctorum H, I, K, L &c. inæqualia sint inter-
valla HI, IK , &c. collige perpendicularorum AH, BI, CK , &c.
differentias primas per intervalla perpendicularorum divisas $b, 2b,$
 $3b, 4b, 5b$; secundas per intervalla bina divisas $c, 2c, 3c, 4c$, &c.
tercias per intervalla terna divisas $d, 2d, 3d$, &c. quartas per inter-

intervalla quaterna divisas e , $2e$, &c. & sic deinceps: id est, ita LESSIN
TANTIVS
 ut sit $b = \frac{AH-BI}{HI}$, $2b = \frac{BI-CK}{IK}$, $3b = \frac{CK-DL}{KL}$, &c. dein

$c = \frac{b-2b}{HK}$, $2c = \frac{2b-3b}{IL}$, $3c = \frac{3b-4b}{KM}$, &c. Postea $d = \frac{c-2c}{HL}$

$2d = \frac{2c-3c}{IM}$, &c. Inventis differentiis, dic $AH=a$, $-HS=p$,

p in $-IS=q$, q in $+SK=r$, r in $+SL=s$, s in $+SM=t$; pergendo scilicet ad usque perpendiculum penultimum ME , & erit ordinatim applicata $RS=a+bp+cq+dr+es+ft$, &c.

Corol. Hinc aræ curvarum omnium inveniri possunt quamproxime. Nam si curvæ cujuscvis quadrandæ inveniantur puncta aliquot, & Parabola per eadem duci intelligatur: erit area Parabolæ hujus eadem quam proxime cum area curvæ illius quadrandæ. Potest autem Parabola, per Methodos notissimas, semper quadrari Geometricè.

L E M M A VI.

Ex observatis aliquot locis Cometæ invenire locum ejus ad tempus quodvis intermedium datum.

Designent HI , IK , KL , LM tempora inter observationes, (in Fig. præced.) HA , IB , KC , LD , ME observatas quinque longitudoines Cometæ, HS tempus datum inter observationem primam & longitudinem quæsitam. Et si per puncta A , B , C , D , E duci intelligatur curva regularis $ABCDE$; & per Lemma superius inventiatur ejus ordinatim applicata RS , erit RS longitudo quæsitæ.

Eadem methodo ex observatis quinque latitudinibus invenitur latitudo ad tempus datum.


Si longitudinum observatarum parvæ sint differentiæ, puta graduum tantum 4 vel 5; suffecerint observationes tres vel quatuor ad inveniendam longitudinem & latitudinem novam. Sin majores sint differentiæ, puta graduum 10 vel 20, debebunt observationes quinque adhiberi.

L E M M A

L E M M A VII.


Per datum punctum P ducere rectam lineam BC, cujus partes PB, BC, rectis duabus positione datis AB, AC abscisse, datam habeant rationem ad invicem.

A puncto illo P ad rectarum alterutram AB ducatur recta quævis PD, & producat eadem versus rectam alteram AC usque ad E, ut sit PE ad PD in data illa ratione. Ipsi AD parallela sit EC; & si agatur CPB, erit PC ad PB ut PE ad PD.
Q. E. F



L E M M A VIII.

Sit ABC Parabola umbilicum habens S. Chorda AC bisecta in I abscondatur segmentum ABCI, cujus diameter sit Iμ & vertex μ. In Iμ producta capiatur μO equalis dimidio ipsius



Iμ. Jungatur OS, & producat eam ad ξ, ut sit Sξ equalis 2SO. Et si Cometa B moveatur in arcu CBA, & agatur ξB secans AC in E: dico quod punctum E abscondet de chorda AC segmentum AE tempori proportionale quamproxime.

Junga.

Jungatur enim EO secans arcum Parabolicum ABC in T , & agatur μX quæ tangat eundem arcum in vertice μ & aëta EO occurrat in X ; & erit area curvilinea $AEX\mu A$ ad aream curvilineam $ACT\mu A$ ut AE ad AC . Ideoque cum triangulum ASE sit ad triangulum ASC in eadem ratione, erit area tota $ASEX\mu A$ ad aream totam $ASCT\mu A$ ut AE ad AC . Cum autem ξO sit ad SO ut 3 ad 1, & EO ad XO in eadem ratione, erit SX ipsi EB parallela: & propterea si jungatur BX , erit triangulum SEB triangulo XEB æquale. Unde si ad aream $ASEX\mu A$ addatur triangulum EXB , & de summa auferatur triangulum SEB , manebit area $ASBX\mu A$ areæ $ASEX\mu A$ æqualis, atque adeo ad aream $ASCT\mu A$ ut AE ad AC . Sed areæ $ASBX\mu A$ æqualis est area $ASBT\mu A$, quamproxime, & hæc area $ASBT\mu A$ est ad aream $ASCT\mu A$, ut tempus descripti arcus AB , ad tempus descripti arcus totius AC . Ideoque AE est ad AC in ratione temporum quamproxime. *Q.E.D.*

Corol. Ubi punctum B incidit in Parabolæ verticem μ , est AE ad AC in ratione temporum accurate.

Scholium.

Si jungatur $\mu \xi$ secans AC in δ , & in ea capiatur ξn quæ sit ad μB ut 27 MI ad 16 $M\mu$: aëta Bn secabit chordam AC in ratione temporum magis accurate quam prius. Jaceat autem punctum n ultra punctum ξ , si punctum B magis distat a vertice principali Parabolæ quam punctum μ ; & citra, si minus distat ab eodem vertice.

L E M M A IX.

Rectæ $I\mu \oslash \mu M \oslash$ *longitudo* $\frac{AIC}{4S\mu}$ *æquantur inter se.*

Nam $4S\mu$ est latus rectum Parabolæ pertinens ad verticem μ .


LII

LEMMA

LEMMA X.

Si producat^{ur} $S\mu$ ad N & P , ut μN sit pars tertia ipsius μI , & SP sit ad SN ut SN ad $S\mu$. Cometa, quo tempore describit arcum $A\mu C$, si progredere^{etur} ea semper cum velocitate quam habet in altitudine ipsi SP æquali, describeret longitudinem æqualem chordæ AC .

Nam si Cometa velocitate quam habet in μ , eodem tempore progredere^{etur} uniformiter in recta quæ Parabolam tangit in μ ; area quam radio ad punctum S ducto describeret, æqualis esset areæ Parabolicæ $ASC\mu$. Ideoque contentum sub longitudine in tangente descripta & longitudine $S\mu$, esset ad contentum sub longitudinibus AC & SM , ut area $ASC\mu$ ad triangulum $ASC M$, id est, ut SN ad SM . Quare AC est ad longitudinem in tangente descriptam, ut $S\mu$ ad SN . Cum autem velocitas



Cometæ in altitudine SP sit (per Corol. 6. Prop. xvi. Lib. I.) ad velocitatem in altitudine $S\mu$, in subduplicata ratione SP ad $S\mu$ inverse, id est, in ratione $S\mu$ ad SN ; longitudo hac velocitate eodem tempore descripta, erit ad longitudinem in tangente descriptam, ut $S\mu$ ad SN . Igitur AC & longitudo hac nova velocitate descripta, cum sint ad longitudinem in tangente descriptam tam in eadem ratione, æquantur inter se. *Q. E. D.*

Corol. Cometa igitur ea cum velocitate, quam habet in altitudine $S\mu$ & $I\mu$, eodem tempore describeret chordam AC quamproxime.

LEMMA

L E M M A X I.

LIBER
TERTIUS.

Si Cometa motu omni privatus de altitudine SN seu $S\mu + \frac{1}{2}I\mu$ demitteretur, ut caderet in Solem, & ea semper vi uniformiter continuata urgeretur in Solem, qua urgetur sub initio; idem semisse temporis quo in Orbe suo describat arcum AC , descensa suo describeret spatium longitudini $I\mu$ æquale.

Nam Cometa quo tempore describat arcum Parabolicum AC , eodem tempore ea cum velocitate quam habet in altitudine SP (per Lemma novissimum) describet chordam AC , adeoque (per Corol. 7. Prop. xvi. Lib. I.) eodem tempore in Circulo cujus semidiameter esset SP , vi gravitatis suæ revolvendo, describeret arcum cujus longitudo esset ad arcus Parabolici chordam AC , in subdupplicata ratione unius ad duo. Et propterea eo cum pondere quod habet in Solem in altitudine SP , cadendo de altitudine illa in Solem, describeret semisse temporis illius (per Corol. 9. Prop. iv. Lib. I.) spatium æquale quadrato semissis chordæ illius applicato ad quadruplum altitudinis SP , id est, spatium $\frac{AIq}{4SP}$. Unde cum pondus Cometæ in Solem in altitudine SN , sit ad ipsius pondus in Solem in altitudine SP , ut SP ad $S\mu$: Cometa pondere quod habet in altitudine SN eodem tempore; in Solem cadendo, describet spatium $\frac{AIq}{4S\mu}$, id est, spatium longitudini $I\mu$ vel $M\mu$ æquale. *Q. E. D.*

PROPOSITIO XLI. PROBLEMA XXL

Cometæ in Parabola moti Trajectoriam ex datis tribus Observationibus determinare.

Problema hocce longe difficillimum multimode aggressus, composui Problemata quadam in Libro Primo quæ ad ejus solutionem spectant. Postea solutionem sequentem paulo simpliciorẽ excogitavi.

Seligantur tres observationes æqualibus temporum intervallis ab invicem quamproxime distantes. Sit autem temporis intervallum illud ubi Cometa tardius movetur paulo majus altero, ita videlicet

LII 2

ut

Et per punctum E agatur (per hujus Lem. vii.) recta AEC , LIBER
TERTIUS.
cujus partes AE , EC ad rectas TA & τC terminatæ, sint ad invicem ut tempora V & W : & erunt A & C loca Cometæ in plano Eclipticæ in observatione prima ac tertia quamproxime, si modo B sit locus ejus recte assumptus in observatione secunda.

Ad AC bisectam in I erige perpendicularum Ii . Per punctum B age occultam Bi ipsi AC parallelam. Junge occultam Si secantem AC in λ , & comple parallelogrammum $iI\lambda\mu$. Cape $I\sigma$ æqualem $3 I\lambda$, & per Solem S age occultam $\sigma\xi$ æqualem $3 S\sigma + 3 i\lambda$. Et deletis jam literis A , E , C , I , a puncto B versus punctum ξ duc occultam novam BE , quæ sit ad priorem BE in duplicata ratione distantie BS ad quantitatem $S\mu + i\lambda$. Et per punctum E iterum duc rectam AEC eadem lege ac prius, id est, ita ut ejus partes AE & EC sint ad invicem, ut tempora inter observationes V & W . Et erunt A & C loca Cometæ magis accurate.

Ad AC bisectam in I erigantur perpendiculara AM , CN , IO , quarum AM & CN sint tangentes latitudinum in observatione prima ac tertia ad radios TA & τC . Jungatur MN secans IO in O . Constituaturs rectangulum $iI\lambda\mu$ ut prius. In IA producta capiatur ID æqualis $S\mu + i\lambda$, & agatur occulta OD . Deinde in MN versus N capiatur MP , quæ sit ad longitudinem supra inventam X , in subduplicata ratione mediocris distantie Telluris a Sole (seu semidiametri Orbis magni) ad distantiam OD . Si punctum P incidat in punctum N ; erunt A , B , C tria loca Cometæ, per quæ Orbis ejus in plano Eclipticæ describi debet. Sin punctum P non incidat in punctum N ; in recta AC capiatur CG ipsi NP æqualis, ita ut puncta G & P ad easdem partes rectæ NC jaceant.

Eadem methodo qua puncta E , A , C , G , ex assumpto puncto B inventa sunt, inveniantur ex assumptis utcumque punctis aliis b & β puncta nova e , a , c , g , & ϵ , a , x , γ . Deinde si per G , g , γ ducatur circumferentia circuli $Gg\gamma$, secans rectam τC in Z : erit Z locus Cometæ in plano Eclipticæ. Et si in AC , ac , ax capiuntur AF , af , $a\phi$ ipsis CG , cg , $x\gamma$ respectivè æquales, & per puncta F , f , ϕ ducatur circumferentia circuli $Ff\phi$, secans rectam AT in X : erit punctum X alius Cometæ locus in plano Eclipticæ. Ad puncta X & Z erigantur tangentes latitudinum Cometæ ad radios TX & τZ ; & habebuntur loca duo Cometæ in Orbe proprio. Denique (per Prop. xix. Lib. I.) umbilico S , per loca illa duo describatur Parabola, & hæc erit Trajectoria Cometæ. *Q. E. I.*

LII 3

Con-

inventa infuper longitudine MP ; in rB capiatur punctum b , ^{LIBER TERTIUS}
 ea lege, ut si TA , τC se mutuo fecerint in T , sit distantia Tb
 ad distantiam TB , in ratione composita ex ratione MP ad MN
 & ratione subduplicata SB ad Sb . Et eadem methodo inveni-
 endum erit punctum tertium β , si modo operationem tertio repe-
 tere lubet. Sed hac methodo operationes duæ ut plurimum suf-
 fecerint. Nam si distantia Bb perexigua obvenerit; postquam
 inventa sunt puncta F, f & G, g , actæ rectæ Ff & Gg secabunt
 TA & τC in punctis quæsitis X & Z .

Exemplum.

Proponatur Cometa anni 1680. Hujus motum a *Flamstedio*
 observatum Tabula sequens exhibet.


		Tem. appar.		Temp. verum		Long. Solis		Long. Cometæ		Lat. Cometæ	
		h.	/'	h.	/'	gr.	/'	gr.	/'	gr.	/'
1680 Dec.	12	4.46		4.46.	0	♊	1.51.23	♊	6.31.21	8.26.	0
	21	6.32½		6.36.	59		11.6.44	♋	5.7.38	21.45.	30
	24	6.12		6.17.	52		14.9.26		18.49.10	25.23.	24
	26	5.14		5.20.	44		16.9.22		28.24.6	27.0.	57
	29	7.55		8.3.	2		19.19.43	♌	13.11.45	28.10.	5
1681 Jan.	30	8.2		8.10.	26		20.21.9		17.39.5	28.11.	12
	5	5.51		6.1.	38		26.22.18	♍	8.49.10	26.15.	26
	9	6.49		7.0.	53	♋	0.29.2		18.43.18	24.12.	42
	10	5.54		6.6.	10		1.27.43		20.40.57	23.44.	0
	13	6.56		7.8.	55		4.33.20		25.59.34	22.17.	36
Feb.	25	7.44		7.58.	42		16.45.36	♎	9.35.48	17.56.	54
	30	8.7		8.21.	53		21.49.58		13.19.36	16.40.	57
	2	6.20		6.34.	51		24.46.59		15.13.48	16.2.	2
	5	6.50		7.4.	41		27.49.51		16.59.52	15.27.	22

His adde Observationes quasdam e nostris.

		Temp. appar.		Cometæ Longit.		Com. Lat.	
		h.	/'	gr.	/'	gr.	/'
Febr.	25	8h.	30'	♊	168.18.17"	128.	46½
	27	8.	15		27.4.24	12.	36½
Mart.	1	11.	0		27.53.0	12.	24½
	2	8.	0		28.12.27	11.	20
	5	11.	30		29.20.51	12.	3½
	9	8.	30	♋	0.43.4	11.	45½

Hæ Observationes Telescopio septupedali, & Micrometro filif-
 que in foco Telescopii locatis peractæ sunt: quibus instrumentis-
 &

DE MUNDI SYSTEMATE. & positiones fixarum inter se & positiones Cometæ ad fixas determinavimus. Designet *A* stellam in sinistro calcaneo Persei (*Bayero* α) *B* stellam sequentem in sinistro pede (*Bayero* ζ) & *C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O* stellas alias minores in eodem pede. Sintque *P, Q, R, S, T* loca Cometæ in observationibus supra descriptis: & existente distantia *AB* partium 80 $\frac{1}{2}$, erat *AC* partium 52 $\frac{1}{2}$, *BC* 58 $\frac{1}{2}$, *AD* 57 $\frac{1}{2}$, *BD* 82 $\frac{1}{2}$, *CD* 23 $\frac{1}{2}$, *AE* 29 $\frac{1}{2}$, *CE* 57 $\frac{1}{2}$, *DE* 49 $\frac{1}{2}$, *AI* 27 $\frac{1}{2}$, *BI* 52 $\frac{1}{2}$, *CI* 36 $\frac{1}{2}$,



DI 53 $\frac{1}{2}$, *AK* 38 $\frac{1}{2}$, *BK* 43, *CK* 31 $\frac{1}{2}$, *FK* 29, *FB* 23, *FC* 36 $\frac{1}{2}$, *AH* 18 $\frac{1}{2}$, *DH* 50 $\frac{1}{2}$, *BN* 46 $\frac{1}{2}$, *CN* 31 $\frac{1}{2}$, *BL* 45 $\frac{1}{2}$, *NL* 31 $\frac{1}{2}$. *HO* erat ad *HI* ut 7 ad 6 & producta transibat inter stellas *D* & *E*, sic ut distantia stellæ *D* ab hac recta esset $\frac{1}{2}$ *CD*. *LM* erat ad *LB* ut 2 ad 9 & producta transibat per stellam *H*. His determinabantur positiones fixarum inter se.

Die Veneris Feb. 25. St. vet. Hor. 8 $\frac{1}{2}$ P. M. Cometæ in *p* existentis distantia a stella *E* erat minor quam $\frac{1}{2}$ *AE*, major quam $\frac{1}{4}$ *AE*, adeoque æqualis $\frac{3}{4}$ *AE* proxime; & angulus *ApE* non-nihil obtusus erat, sed fere rectus. Nempe si demitteretur ad *pE* perpendiculum ab *A*, distantia Cometæ a perpendiculo illo erat $\frac{1}{2}$ *pE*.

Eadem nocte, hora 9 $\frac{1}{2}$, Cometæ in *P* existentis distantia a stella *E* erat major quam $\frac{1}{4}$ *AE*, minor quam $\frac{1}{5}$ *AE*, adeoque æqualis

lis

lis $4\frac{1}{2}$ AE , seu $\frac{1}{2} AE$ quamproxime. A perpendiculari autem a LIBER
TERTIUS;
 stella A ad rectam PE demisso, distantia Cometæ erat $\frac{1}{2} PE$.

Die \odot^a , Feb. 27. hor. $8\frac{1}{2}$ P. M. Cometæ in Q existentis distantia a stella O æquabat distantiam stellarum O & H , & recta QO producta transibat inter stellas K & B . Positionem hujus rectæ ob nubes intervenientes, magis accurate definire non potui.

Die \odot^a , Mart. 1. hor. 11. P. M. Cometæ in R existens, stellis K & C accurate interjacebat, & rectæ CRK pars CR paulo major erat quam $\frac{1}{2} CK$, & paulo minor quam $\frac{1}{2} CK + \frac{1}{2} CR$, adeoque æqualis $\frac{1}{2} CK + \frac{1}{2} CR$ seu $\frac{1}{2} CK$.

Die \odot^a , Mart. 2. hor. 8. P. M. Cometæ existentis in S , distantia a stella C erat FC quamproxime. Distantia stellæ F a recta CS producta erat $\frac{1}{2} FC$; & distantia stellæ B ab eadem recta, erat quintuplo major quam distantia stellæ F . Item recta NS producta transibat inter stellas H & I , quintuplo vel sextuplo propior existens stellæ H quam stellæ I .

Die \odot^a , Mart. 5. hor. 11. P. M. Cometa existente in T , recta MT æqualis erat $\frac{1}{2} ML$, & recta LT producta transibat inter B & F , quadruplo vel quintuplo propior F quam B , auferens a BF quintam vel sextam ejus partem versus F . Et MT producta transibat extra spatium BF ad partes stellæ B , quadruplo propior existens stellæ B quam stellæ F . Erat M stella perexigua quæ per Telescopium videri vix potuit, & L stella major quali magnitudinis octavæ.

Ex hujusmodi observationibus per constructiones figurarum & computationes (posito quod stellarum A & B distantia esset $2^h 6'. 46''$, & stellæ A longitudo $\varpi 26^h 41'. 50''$ & latitudo borealis $12^g 8'$, stellæque B longitudo $\varpi 28^h 40'. 24''$ & latitudo borealis $11^g 17'$;) derivabam longitudes & latitudes Cometæ. Micrometro parum affabre constructo usus sum, sed longitudinum tamen & latitudinum errores (quatenus ab observationibus nostris oriantur) dimidium minuti unius primi vix superant; præterquam in observatione ultima Mart. 9. ubi positiones stellarum minus accurate determinare potui. *Cassinus* qui ascensionem rectam Cometæ eodem tempore observavit, declinationem ejus tanquam invariata manentem parum diligenter definiivit. Nam Cometa (juxta observationes nostras) in fine
Mmm
motus

DE MUNDO: motus sui notabiliter deflectere cœpit boream versus, a paral-
 LELO quem in fine Mensis *Februarii* tenuerat.

Jam ad Orbem Cometæ determinandum; selegi ex observatio-
 nibus hactenus descriptis tres, quas *Flamstedius* habuit *Dec. 21*,
Jan. 5, & *Jan. 25*. Ex his inveni *S* & partium 9842, 1 & *V* & partium
 455, quales 10000 sunt semidiameter Orbis magni. Tum
 ad operationem primam assumendo *t B* partium 5657, inveni
SB 9747, *BE* prima vice 412, *Sμ* 9503, *ix* 413: *BE* secun-
 da vice 421, *OD* 10186, *X* 8528, 4, *MP* 8450, *MN* 8475,
NP 25. Unde ad operationem secundam collegi distantiam
t b 5640. Et per hanc operationem inveni tandem distantias
TX 4775 & *τ Z* 11322. Ex quibus Orbem definiendo, inveni
 Nodos ejus descendentem in \oslash & ascendentem in ψ 1st 53';
 Inclinationem plani ejus ad planum Eclipticæ 61st 20 $\frac{1}{2}$ '; verti-
 cem ejus (seu Perihelium Cometæ) distare a Nodo 8st 38', &
 esse in τ 27st 43' cum latitudine australi 7st 34'; & ejus latus
 rectum esse 236,8, areamque radio ad Solem ducto singulis diebus
 descriptam 93585, quadrato semidiametri Orbis magni posito
 100000000; Cometam vero in hoc Orbe secundum seriem signo-
 rum processisse, & *Decemb. 8^a. o^h. 4' P. M.* in vertice Orbis seu
 Perihelio fuisse. Hæc omnia per scalam partium æqualium &
 chordas angulorum ex Tabula sinuum naturalium collectas, deter-
 minavi Graphice: construendo Schema satis amplum, in quo vide-
 licet semidiameter Orbis magni (partium 10000) æqualis esset
 digitis 16 $\frac{1}{2}$ pedis Anglicani.

Tandem ut constaret an Cometa in Orbe sic invento vere mo-
 veretur, collegi per operationes partim Arithmeticas partim Gra-
 phicas, loca Cometæ in hoc Orbe ad observationum quarundam
 tempora: uti in Tabula sequente videre licet.

	Distant. Co- metæ a Sole.	Long. Collect.	Lat. Collect.	Long. Obs.	Lat. Obs.	Differ. Long.	Differ. Lat.
<i>Dec. 12</i>	2792	8 st . 6. 32	8 st . 18 $\frac{1}{2}$	8 st . 6. 31 $\frac{1}{2}$	8 st . 26	+	1 — 7 $\frac{1}{2}$
29	8403	13. 13 $\frac{1}{2}$	28. 0	13. 11 $\frac{1}{2}$	28. 10 $\frac{1}{2}$	+	2 — 10 $\frac{1}{2}$
<i>Febr. 5</i>	16669	17. 0	15. 29 $\frac{1}{2}$	16. 59 $\frac{1}{2}$	15. 27 $\frac{1}{2}$	+	0 + 2 $\frac{1}{2}$
<i>Mar. 5</i>	21737	29. 19 $\frac{1}{2}$	12. 4	29. 20 $\frac{1}{2}$	12. 3 $\frac{1}{2}$	—	1 + $\frac{1}{2}$

Postea vero *Halleus* noſter Orbitam, per calculum Arithmeti-
 cum, accuratius determinavit quam per descriptiones linearum
 fieri licuit; & retinuit quidem locum Nodorum in \oslash & ψ 1st 53',
 & Inclinationem plani Orbitæ ad Eclipticam 61st 20 $\frac{1}{2}$ ', ut & tem-
 pus Perihelii Cometæ *Decemb. 8^a. o^h. 4'*: distantiam vero Peri-
 helii

helii a Nodo ascendente, in Orbita Cometæ mensuratum, invenit esse $9^{\text{h}} 20'$, & Latus rectum Parabolæ esse 243 partium, existente mediocri Solis a Terra distantia partium 10000. Et ex his datis, calculo itidem Arithmetico accurate instituto, loca Cometæ ad observationum tempora computavit, ut sequitur.

LIBRA
TERTIUS

Tempus verum					Distantia Cometæ a ☉	Long. comp.					Lat. comp.					Errores in				
																Long.		Lat.		
d. h. m. s.						g. l. p. s.					g. l. p. s.					l. s.		l. s.		
Dec.	12.	4.	46.	0	28028	♊	6.	29.	25	8.	26.	0	Bor.	-	1.	56	+	0.	1	
	11.	6.	16.	19	61076	♊	5.	6.	10	11.	41.	10		-	1.	3	-	2.	31	
	14.	6.	17.	51	70008		12.	43.	20	15.	21.	40		-	0.	50	+	0.	44	
	16.	1.	20.	44	71576		12.	12.	45	17.	1.	16		-	1.	21	+	0.	23	
	19.	2.	1.	3	84021	♋	13.	12.	40	21.	30.	10		+	0.	55	+	0.	5	
Jan.	10.	2.	10.	24	26663		17.	40.	5	28.	31.	10		+	1.	0	+	0.	8	
	5.	6.	2.	31	301440	♌	1.	49.	49	26.	35.	15		+	0.	39	-	0.	1	
	9.	7.	0.	53	130059		12.	44.	16	24.	12.	14		+	1.	13	+	0.	12	
	10.	6.	6.	10	113162		20.	41.	0	23.	44.	10		+	0.	1	+	0.	11	
	11.	7.	2.	51	120000		26.	0.	21	31.	17.	30		+	0.	47	-	0.	6	
Feb.	15.	7.	58.	43	145370	♍	2.	33.	40	17.	57.	53		-	2.	3	+	3.	1	
	10.	2.	21.	53	251303		31.	37.	41	16.	43.	7		-	1.	55	+	1.	10	
	2.	6.	24.	53	260913		15.	31.	11	16.	4.	15		-	2.	37	+	2.	33	
	5.	7.	4.	41	165016		16.	58.	25	15.	29.	18		-	3.	27	+	1.	50	
	15.	2.	19.	0	203570		16.	35.	48	12.	48.	0		-	2.	37	+	1.	3	
Mar.	5.	11.	21.	0	216205		29.	12.	35	12.	5.	40		-	2.	10	+	2.	10	

Apparuit etiam hic Cometa mense *Novembri* præcedente, & die undecimo hujus mensis stylo veteri, ad horam quintam matutinam, *Cantuarie* in *Anglia*, visus fuit in $\approx 12^{\text{h}}$ cum latitudine boreali 2^{h} circiter. Crassissima fuit hæc Observatio: meliores sunt quæ sequuntur.

Nov. 17, st. vet. Pontheus & focii hora sexta matutina *Romæ* (id est, hora 5, $10'$ *Londini*) filis ad fixas applicatis Cometam observarunt in $\approx 8. 30'$, cum latitudine australi $0^{\text{h}} 40'$. Extant eorum Observationes in tractatu quem *Pontheus*, de hoc Cometa, in lucem edidit. *Cellius* qui aderat & observationes suas in Epistola ad *D. Cassinum* misit, Cometam eadem hora vidit in $\approx 8^{\text{h}} 30'$ cum latitudine australi $0^{\text{h}} 30'$. Eadem hora *Galletius* etiam Cometam vidit in $\approx 8^{\text{h}}$ sine latitudine.

Nov. 18. hora matutina 6. 30' Romæ (id est, hora 5, $40'$ *Londini*) *Pontheus* Cometam vidit in $\approx 13^{\text{h}} 30'$ cum latitudine australi $1^{\text{h}} 20'$. *Cellius* in $\approx 13^{\text{h}} 00'$, cum latitudine australi $1^{\text{h}} 00'$. *Galletius* autem hora matutina 5. 30' *Romæ*, Cometam vidit in $\approx 13^{\text{h}} 00'$, cum latitudine australi $1^{\text{h}} 00'$. Et *R. P. Ango* in Academia *Flexiensis* apud *Gallor*, hora quinta matutina (id est, hora 5, $9'$ *Londini*) Cometam vidit in medio inter stellas

Mmm 2

duas

DE MUNDI
SYSTEMATE,

duas parvas, quarum una media est trium in recta linea in Virginis australi manu, & altera est extrema alæ. Unde Cometa tunc fuit in $\approx 12. 46'$, cum latitudine australi $50'$. Eodem die *Bostonie* in *Nova-Anglia* in Latitudine $42\frac{1}{2}$ graduum, hora quinta matutina, (id est *Londini* hora matutina $9. 44'$) Cometa visus est prope ≈ 14 , cum latitudine australi $1^{\circ} 30'$, uti a *Cl. Halley* accepti.

Nov. 19. hora mat. $4\frac{1}{2}$ *Cantabrigie*, Cometa (observante juvene quodam) distabat a Spica \approx quasi 2° Boreazephyrum versus. Eodem die hor. $5.$ mat. *Bostonie* in *Nova-Anglia*, Cometa distabat a Spica \approx gradu uno, differentia latitudinum existente $40'$. Eodem die in Insula *Jamaica*, Cometa distabat a Spica intervallo quasi gradus unius. Et ex his observationibus inter se collatis colligo, quod hora $9. 44'$ *Londini*, Cometa erat in $\approx 18^{\circ} 40'$, cum latitudine australi $1^{\circ} 18'$ circiter. Eodem die *D. Arthurus Storer* ad fluvium *Patuxent*, prope *Hunting-Creek* in *Mary-Land*, in confinio *Virginie* in Lat. $38\frac{1}{2}^{\circ}$ hora quinta matutina (id est, hora 10° *Londini*) Cometam vidit supra Spicam \approx , & cum Spica propemodum conjunctum, existente distantia inter eosdem quasi $\frac{1}{2}^{\circ}$. Observator idem, eadem hora dici sequentis, Cometam vidit quasi 2° inferiorem Spica. Congruent hæ observationes cum observationibus in *Nova-Anglia* & *Jamaica* factis, si modo distantie (pro motu diurno Cometæ) nonnihil augeantur, ita ut Cometa die priore superior esset Spica \approx , altitudine 1° circiter, ac die posteriore inferior eadem stella, altitudine perpendiculari $3^{\circ} 40'$.

Nov. 20. *D. Montenarus* Astronomiæ Professor *Paduensis*, hora sexta matutina *Venetis* (id est, hora $5. 10'$ *Londini*) Cometam vidit in $\approx 23^{\circ}$, cum latitudine australi $1^{\circ} 30'$. Eodem die *Bostonie*, distabat Cometa a Spica \approx , 4° longitudinis in orientem, adeoque erat in $\approx 23^{\circ} 24'$ circiter.

Nov. 21. *Ponthaus* & socii hor. mat. $7\frac{1}{2}$ Cometam observant in $\approx 27^{\circ} 50'$, cum latitudine australi $1^{\circ} 16'$; *Ango* hora quinta matutina in $\approx 27^{\circ} 45'$, *Montenarus* in $\approx 27^{\circ} 51'$. Eodem die in Insula *Jamaica*, Cometa visus est prope principium *Scorpii*, eandemque circiter latitudinem habuit cum Spica *Virginis*, id est, $2^{\circ} 2'$.

Nov. 22. Cometa visus est a *Montenaro* in $\approx 2. 33'$. *Bostonie* autem in *Nova-Anglia* apparuit in $\approx 3^{\circ}$ circiter, eadem fere cum latitudine ac prius, id est, $1^{\circ} 30'$. Eodem die *Londini*,
hora

hora mat. 6i *Hookius* noster Cometam vidit in $m\ 3^{\text{h}}\ 30'$ circiter, idque in linea recta quæ transit per Spicam Virginis & Cor Leonis, non exacte quidem, sed a linea illa paululum deflectentem ad boream. *Montenarus* itidem notavit quod linea a Cometa per Spicam ducta, hoc die & sequentibus transibat per australe latus Cordis Leonis, interposito perparvo intervallo inter Cor Leonis & hanc lineam. Linea recta per Cor Leonis & Spicam Virginis transiens, Eclipticam secuit in $m\ 3^{\text{h}}\ 46'$, in angulo $2^{\text{h}}\ 51'$. Et si Cometa locatus fuisset in hac linea in $m\ 3^{\text{h}}$, ejus latitudo fuisset $2^{\text{h}}\ 26'$. Sed cum Cometa consentientibus *Hookio* & *Montenaro*, nonnihil distaret ab hac linea boream versus, latitudo ejus fuit paulo minor. Die 20. ex observatione *Montenari*, latitudo ejus propemodum æquabat latitudinem Spicæ m , eratque $1^{\text{h}}\ 30'$ circiter, & consentientibus *Hookio*, *Montenaro*, & *Angone* perpetuo augebatur, ideoque jam sensibilibiter major erat quam $1^{\text{h}}\ 30'$. Inter limites autem jam constitutos $2^{\text{h}}\ 26'$ & $1^{\text{h}}\ 30'$, magnitudine mediocri latitudo erit $1^{\text{h}}\ 58'$ circiter. Cauda Cometæ, consentientibus *Hookio* & *Montenaro*, dirigebatur ad Spicam m , declinans aliquantulum a Stella ista, juxta *Hookium* in austrum, juxta *Montenarum* in boream; ideoque declinatio illa vix fuit sensibilis, & Cauda Æquatori fere parallela existens, aliquantulum deflectebatur ab oppositione Solis boream versus.

Nov. 24. Ante ortum Solis Cometa visus est a *Montenaro* in $m\ 12^{\text{h}}\ 52'$, ad boreale latus rectæ quæ per Cor Leonis & Spicam Virginis ducebatur, ideoque latitudinem habuit paulo minorem quam $2^{\text{h}}\ 38'$. Hæc latitudo, uti diximus, ex observationibus *Montenari*, *Angonis* & *Hookii*, perpetuo augebatur; ideoque jam paulo major erat quam $1^{\text{h}}\ 58'$; & magnitudine mediocri, absque notabili errore, statui potest $2^{\text{h}}\ 18'$. Latitudinem *Ponthæus* & *Galletius* jam decrevisse volunt, & *Cellius* & *Observator* in *Nova-Anglia* eandem fere magnitudinem retinuisse, scilicet gradus unius vel unius cum semisse. Crailliores sunt observationes *Ponthæi* & *Cellii*, eæ præsertim quæ per Azimuthos & Altitudines capiebantur, ut & eæ *Galletii*: meliores sunt eæ quæ per positiones Cometæ ad fixas a *Montenaro*, *Hookio*, *Angone* & *Observatore* in *Nova-Anglia*, & nonnunquam a *Ponthæo* & *Cellio* sunt factæ.

Jam collatis Observationibus inter se, colligere videor quod Cometa hoc mense circulum fere maximum delcripit, secantem Eclipticam in $m\ 25. 12'$, idque in angulo $3^{\text{h}}\ 12'$ quamproxime. Nam & *Montenarus* Orbitam ab Ecliptica in austrum, tribus sal-

Mmm 3

tem.

DE MUNDI
SYSTEMATE

tem gradibus declinasse dicit. Et cognita cursus positione, longitudines Cometæ ex observationibus collectæ, ad incudem jam revocari possunt & melius nonnunquam determinari, ut sit in sequentibus. *Cellius* Novemb. 17. observavit distantiam Cometæ a Spica μ , æqualem esse distantie ejus a stella lucida in dextra ala Corvi: & hinc locandus est Cometa in intersectione hujus circuli quem Cometa motu apparente descripsit, cum circulo maximo qui a fixis illis duabus æqualiter distat, atque adeo in $7^{\circ} 54'$, cum latitudine australi $43'$. Præterea *Montenarus*, Novemb. 20. hora sexta matutina *Venetiis*, Cometam vidit non totis quatuor gradibus distantem a Spica; dicitque hanc distantiam, vix æquasse distantiam stellarum duarum lucidarum in alis Corvi, vel duarum in juba Leonis, hoc est 3° & $30'$ vel $32'$. Sit igitur distantia Cometæ a Spica $3^{\circ} 30'$, & Cometa locabitur in $22^{\circ} 48'$, cum latitudine australi $1^{\circ} 30'$. Adhæc *Montenarus*, Novemb. 21, 22, 24 & 25 ante ortum Solis, Sextante æneo quintupedali ad minuta prima & semiminuta diviso & vitris Telescopicis armato, distantias mensuravit Cometæ a Spica $8^{\circ} 28'$, $13^{\circ} 10'$, $23^{\circ} 30'$, & $28^{\circ} 13'$: & has distantias, per refractionem nondum correctas, addendo longitudini Spicæ, collegit Cometam his temporibus fuisse in $27^{\circ} 51'$, $2^{\circ} 33'$, $12^{\circ} 52'$ & $17^{\circ} 45'$. Si distantie illæ per refractiones corrigantur, & ex distantis correctis differentie longitudinum inter Spicam & Cometam probe deriventur, locabitur Cometa his temporibus in $27^{\circ} 52'$, $2^{\circ} 36'$, $12^{\circ} 58'$ & $17^{\circ} 53'$ circiter. Latitudines autem ad has longitudes in via Cometæ captas, prodeunt $1^{\circ} 45'$, $1^{\circ} 58'$, $2^{\circ} 22'$ & $2^{\circ} 31'$. Harum quatuor observationum horas matutinas *Montenarus* non posuit. Priores duæ ante horam sextam, posteriores (ob viciniam Solis) post sextam factæ videntur. Die 22, ubi Cometa ex observatione *Montenari* locatur in $2^{\circ} 36'$, *Hookius* noster eundem locavit in $3^{\circ} 30'$ ut supra. *Montenarus* in defectu, *Hookius* in excessu errasse videntur. Nam Cometa, ex serie observationum, jam fuit in $2^{\circ} 56'$ vel 3° circiter.

Observationum suarum ultimam inter vapores & diluculum captam, *Montenarus* suspectam habebat. Et *Cellius* eodem tempore (id est, Novem. 25.) Cometam per ejus Altitudinem & Azimuthum locavit in $15^{\circ} 47'$, cum latitudine australi quasi gradus unius. Sed *Cellius* observavit etiam eodem tempore, quod Cometa erat in linea recta cum stella lucida in dextro femore Vir-

Virginis & cum Lance australi Libræ, & hæc linea secat viam
 Cometæ in $m\ 18^{\text{gr}}\ 36'$. *Ponthaus* etiam eodem tempore obser-
 vavit, quod Cometa erat in recta transeunte per Chelam austri-
 nam Scorpii & per stellam quæ Lancem borealem sequitur: &
 hæc recta secat viam Cometæ in $m\ 16^{\text{gr}}\ 34'$. Observavit etiam,
 quod Cometa erat in recta transeunte per stellam supra Lancem
 australem Libræ & stellam in principio pedis secundi Scorpii: &
 hæc recta secat viam Cometæ in $m\ 17^{\text{gr}}\ 55'$. Et inter longitu-
 dines ex his tribus Observationibus sic derivatas, longitudo me-
 diocris est $m\ 17^{\text{gr}}\ 42'$, quæ cum observatione *Montenari* satis
 congruit.

Erravit igitur *Cellius* jam locando Cometam in $m\ 15^{\text{gr}}\ 47'$,
 per ejus Azimuthum & Altitudinem. Et similibus Azimuthorum
 & Altitudinum observationibus, *Cellius* & *Ponthaus* non minus
 erraverunt locando Cometam in $m\ 20$ & $m\ 24$ diebus duobus
 sequentibus, ubi stellæ fixæ ob diluculum vix aut ne vix quidem
 apparere. Et corrigendæ sunt hæ observationes per additionem
 duorum graduum, vel duorum cum semisse.

Ex omnibus autem Observationibus inter se collatis & ad meri-
 dianum *Londini* reductis, colligo Cometam hujusmodi cursum
 quamproxime descripsisse.

Temp. med. st. vet.			Long. Cometæ		Lat. Cometæ	
d.	h.	l.	gr.	l.	gr.	l.
Nov. 16.	17.	10	8.	0	0.44	Aust.
	17.	17 . 10	12.	52	1.	0
	18.	21 . 44	18.	40	1.18	
	19.	17 . 10	22.	48	1.30	
	20.	17 fere	27.	52	1.45	
	21.	17 fere	m 2.	56	1.58	
	23.	17½ fere	12.	58	2.20	
	24.	17½ fere	17.	53	2.29	
	26.	18 . 00	26 vel 27 gr.		2.42	


Loca autem Cometæ in Orbe Parabolico computata, ita se habent.

Temp. verum		Dist. Com. a ☉	Long. comp.		Lat. comp.	
d.	h.		gr.	l.	gr.	l.
Nov. 16.	17. 0	83920	8.	0.25	0.43.	20 Aust.
	18. 21. 34	78020	18.	41.50	1.17.	30
	20. 16. 50	73012	27.	59.40	1.44.	25
	23. 17. 5	64206	m 13.	19.15	2.21.	8
	26. 17. 0	54799	26.	46.30	2.42.	30

Con:

DE MUNDI
SYSTEMATIS.

Congruunt inter Observationes Astronomicæ, tam mense *Novembri* quam mensibus quatuor sequentibus, cum motu Cometæ circum Solem in Trajectoria hacce Parabolica, atque adeo unum & eundem Cometam fuisse, qui mense *Novembri* ad Solem descendit, & mensibus sequentibus ab eodem ascendit, abunde confirmant, ut & hunc Cometam in Trajectoria hacce Parabolica delatum fuisse quamproxime. Mensibus *Decembri*, *Januario*, *Februario* & *Martio*, ubi Observationes hujus Cometæ sunt satis accuratæ, congruunt eadem cum motu ejus in hac Trajectoria, non minus accurate quam observationes Planetarum congruere solent cum eorum Theoriis. Mense *Novembri*, ubi observationes sunt crassæ, errores non sunt majores quam qui crassitudini observationum tribuantur. Trajectoria Cometæ bis secuit planum Eclipticæ, & propterea non fuit reſilinea. Eclipticam secuit non in oppositis cœli partibus, sed in fine Virginis & principio Capricorni, intervallo graduum 98 circiter; ideoque cursus Cometæ plurimum defleſtebatur a Circulo maximo. Nam & mense *Novembri* cursus ejus tribus saltem gradibus ab Ecliptica in austrum declinabat, & postea mense *Decembri* gradibus 29 vergebat ab Ecliptica in septentrionem, partibus duabus Orbitæ in quibus Cometa tendebat in Solem & redibat a Sole, angulo apparente graduum plus triginta ab invicem declinantibus, ut observavit *Montenarus*. Pergebat hic Cometa per signa fere novem, a Virginis scilicet duodecimo gradu ad principium Geminorum, præter signum Leonis per quod pergebat antequam videri cœpit: & nulla alia extat Theoria, qua Cometa tantam Cœli partem motu regulari percurrat. Motus ejus fuit maxime inæquabilis. Nam circa diem vigesimum *Novembris*, descripsit gradus circiter quinque singulis diebus; dein motu retardato inter *Novemb.* 26. & *Decemb.* 12, spatio scilicet dierum quindecim cum semisse, descripsit gradus tantum 40; postea vero motu iterum accelerato, descripsit gradus fere quinque singulis diebus, antequam motus iterum retardari cœpit. Et Theoria quæ motui tam inæquabili per maximam cœli partem probe respondet, quæque easdem observat leges cum Theoria Planetarum, & cum accuratis observationibus Astronomicis accurate congruit, non potest non esse vera. Cometa tamen sub finem motus deviabatur aliquantulum ab hac Trajectoria Parabolica versus axem Parabolæ, ut ex erroribus minuti unius primi duorumve in latitudinem mense *Februario* & *Martio* conspirantibus, colligere videor; & propterea in Orbe Ecliptico



liptico circum Solem movebatur, spatio annorum plusquam quingentorum, quantum ex erroribus illis judicare licuit, revolutionem peragens.

Cæterum Trajectoriam quam Cometa descripsit, & Caudam veram quam singulis in locis projecit, visum est annexo schemate in plano Trajectoriæ optice delineatas exhibere: Observationibus sequentibus in Cauda definienda adhibitis.

Nov. 17. Cauda gradus amplius quindecim longa *Ponthæo* apparuit. *Nov. 18.* Cauda 30° longa, Solique directè opposita in *Nova-Anglia* cernebatur, & protendebatur usque ad stellam δ , quæ tunc erat in $\pi 9^{\circ} 54'$. *Nov. 19.* in *Mary-Land* cauda visa fuit gradus 15 vel 20 longa. *Dec. 10.* Cauda (observante *Flamstedio*) transibat per medium distantiae inter caudam serpentis Ophiuchi & stellam δ in Aquilæ australi ala, & definebat prope stellas *A*, α , β in Tabulis *Bayeri*. Terminus igitur erat in $\nu 19^{\circ}$ cum latitudine boreali $33\frac{1}{2}^{\circ}$ circiter. *Dec. 11.* surgebat ad usque caput Sagittæ (*Bayero*, α , β) definens in $\nu 26^{\circ} 43'$, cum latitudine boreali $38^{\circ} 34'$. *Dec. 12.* transibat per medium Sagittæ, nec longe ultra protendebatur, definens in $\pi 4^{\circ}$, cum latitudine boreali $42\frac{1}{2}^{\circ}$ circiter. Intelligenda sunt hæc de longitudine caudæ clarioris. Nam luce obscuriore, in cælo forsan magis sereno, cauda *Dec. 12*, hora 5, 40' *Rome* (observante *Ponthæo*) supra Cygni Uropygium ad gradus 10 sese extulit; atque ab hac stella ejus latus ad occasum & boream min. 45. deslitit. Lata autem erat cauda his diebus gradus 3, juxta terminum superiorem, ideoque medium ejus distabat a Stella illa $2^{\circ} 15'$ austrum versus, & terminus superior erat in $\pi 22^{\circ}$ cum latitudine boreali 61° . *Dec. 21.* surgebat fere ad cathedram *Cassiopeiæ*, æqualiter distans a β & *Schedir*, & distantiam ab utraque distantiae earum ab invicem æqualem habens, adeoque definens in $\pi 24^{\circ}$ cum latitudine $47\frac{1}{2}^{\circ}$. *Dec. 29.* tangebatur *Scheat* sitam ad sinistram, & intervallum stellarum duarum in pede boreali *Andromedæ* accurate complebat, & longa erat 54° adeoque definebat in $\nu 19^{\circ}$ cum latitudine 35° . *Jan. 5.* tetigit stellam π in pectore *Andromedæ*, ad latus suum dextrum, & stellam μ in ejus cingulo, ad latus sinistrum; & (juxta Observationes nostras) longa erat 40° ; curva autem erat & convexo latere spectabat ad austrum. Cum circulo per Solem & caput Cometæ transeunte angulum confecit graduum 4 juxta caput Cometæ; at juxta terminum alterum inclinabatur ad circulum illum in angulo 10 vel 11 graduum & chorda caudæ cum circulo illo continebat angulum graduum

Nnn

octo.

Da MUNDI
DISTINCTA: octo. Jan. 13. Cauda luce satis sensibili terminabatur inter *Ala-*
mech & *Algol*, & luce tenuissima delinebat e regione stellæ α in
latere *Persei*. Distantia termini caudæ a circulo Solem & Come-
tam jungente erat $3^{\text{h}} 50'$, & inclinatio chordæ caudæ ad circu-
lum illum 81^{h} . Jan. 25 & 26 luce tenui micabat ad longitu-
dinem graduum 6 vel 7; & ubi cœlum valde serenum erat, luce
tenuissima & agerrime sensibili attingebat longitudinem graduum
duodecim & paulo ultra. Dirigebatur autem ejus axis ad Luci-
dam in humero orientali Aurigæ accurate, adeoque declinabat ab
oppositione Solis boream versus in angulo graduum decem. De-
nique Feb. 10. Caudam oculis armatis aspexi gradus duos long-
gam. Nam lux prædicta tenuior per vitra non apparuit. *Pon-*
thæus autem Feb. 7. se caudam ad longitudinem graduum 12
vidisse scribit.

Orbem jam descriptum spectanti & reliqua Cometæ hujus Phæ-
nomena in animo revolventi, haud difficulter constabit quod cor-
pora Cometarum sunt solida, compacta, fixa ac durabilia ad in-
star corporum Planetarum. Nam si nihil aliud essent quam vapo-
res vel exhalationes Terræ, Solis & Planetarum, Cometa hicce in
transitu suo per viciniam Solis statim dissipari debuisset. Est enim
calor Solis ut radiorum densitas, hoc est, reciproce ut quadratum
distantiæ locorum a Sole. Ideoque cum distantia Cometæ a cen-
tro Solis Decemb. 8. ubi in Perihelio versabatur, esset ad distan-
tiam Terræ a centro Solis ut 6 ad 1000 circiter, calor Solis apud
Cometam eo tempore erat ad calorem Solis æstivi apud nos ut
1000000 ad 36, seu 28000 ad 1. Sed calor aquæ ebullientis est
quasi triplo major quam calor quem terra arida concipit ad æsti-
vum Solem, ut expertus sum: & calor ferri candentis (si recte
conjector) quasi triplo vel quadruplo major quam calor aquæ ebul-
lientis; adeoque calor quem terra arida apud Cometam in Peri-
helio versantem ex radiis Solaribus concipere posset, quasi 2000
vicibus major quam calor ferri candentis. Tanto autem calore
vapores & exhalationes, omnisque materia volatilis statim consumi
ac dissipari debuissent.

Cometa igitur in Perihelio suo calorem immensum ad Solem
concepit, & calorem illum diuissime conservare potest. Nam
globus ferri candentis digitum unum latus, calorem suum omnem
spatio horæ unius in aere consistens vix amitteret. Globus autem
major calorem diutius conservaret in ratione diametri, propterea
quod superficies (ad cujus mensuram per contactum aeris ambi-
entis

entis refrigeratur) in illa ratione minor est pro quantitate materiæ suæ calidæ inclusæ. Ideoque globus ferri candentis huic Terræ æqualis, id est, pedes plus minus 40000000 latus, diebus totidem, & idcirco annis 50000, vix refrigeraret. Suspicio tamen quod duratio Caloris, ob causas latentes, augeatur in minore ratione quam ea diametri: & optatim rationem veram per experimenta investigari.

Porro notandum est quod Cometa Mense *Decembri*, ubi ad Solem modo incaluerat, caudam emittebat longe majorem & splendidiorē quam antea mense *Novembri*, ubi Perihelium nondum attigerat. Et universaliter caudæ omnes maximæ & fulgentissimæ e Cometis oriuntur, statim post transitum eorum per regionem Solis. Conducit igitur calefactio Cometæ ad magnitudinem caudæ. Et inde colligere videor quod cauda nihil aliud sit quam vapor longe tenuissimus, quem caput seu nucleus Cometæ per calorem suum emittit.

Cæterum de Cometarum caudis triplex est opinio; eas vel jubar esse Solis per translucida Cometarum capita propagatum, vel oriri ex refractione lucis in progressu ipsius a capite Cometæ in Terram, vel denique nubem esse seu vaporem a capite Cometæ jugiter surgentem & abeuntem in partes a Sole averfas. Opinio prima eorum est qui nondum imbuti sunt scientia rerum Opticarum. Nam jubar Solis in cubiculo tenebroso non cernitur, nisi quatenus lux reflectitur e pulverum & fumorum particulis per aerem semper volitantibus: adeoque in aere fumis crassioribus infecto splendidius est, & sensum fortius ferit; in aere clariore tenuius est, & ægrius sentitur: in coelis autem absque materia reflectente nullum esse potest. Lux non cernitur quatenus in jubare est, sed quatenus inde reflectitur ad oculos nostros. Nam visio non fit nisi per radios qui in oculos impingunt. Requiritur igitur materia aliqua reflectens in regione caudæ, ne cælum totum luce Solis illustratum uniformiter splendeat. Opinio secunda multis premitur difficultatibus. Caudæ numquam variegantur coloribus: qui tamen refractionum solent esse comites inseparabiles. Lux Fixarum & Planetarum distincte ad nos transmissa, demonstrat medium cœleste nulla vi refractiva pollere. Nam quod dicitur Fixas ab *Aegyptiis* comatas nonnunquam visas fuisse, id quoniam rarissime contingit, adscribendum est nubium refractioni fortuitæ. Fixarum quoque radiatio & scintillatio ad refractiones tum Oculorum tum Aeris tremuli referendæ sunt: quippe quæ admotis oculo Telescopiis

DE MUNDI
SYSTEMATE,

evanescunt. Aëris & ascendentium vaporum tremore fit ut radii facile de angusto pupillæ spatio per vices detorqueantur, de latiore autem vitri objectivi apertura neutiquam. Inde est quod scintillatio in priori casu generetur, in posteriore autem cesset: & cessatio in posteriore casu demonstrat regularem transmissionem lucis per cœlos absque omni refractione sensibili. Nequis contendat quod caudæ non soleant videri in Comētis cum eorum lux non est satis fortis, quia tunc radii secundarii non habent satis virium ad oculos movendos, & propterea caudas Fixarum non cerni: sciendum est quod lux Fixarum plus centum vicibus augeri potest mediantibus Telescopiis, nec tamen caudæ cernuntur. Planetarum quoque lux copiosior est, caudæ vero nullæ: Cometæ autem sæpe caudatissimi sunt, ubi capitum lux tenuis est & valde obtusa: sic enim Cometa Anni 1680, Mense *Decembri*, quo tempore caput luce sua vix æquabat stellas secundæ magnitudinis, caudam emittebat splendore notabili usque ad gradus 40, 50, 60 longitudinis & ultra: postea *Jan.* 27 & 28 caput apparebat ut stella septimæ tantum magnitudinis, cauda vero luce quidem pertenui sed satis sensibili longa erat 6 vel 7 gradus, & luce obscurissima, quæ cerni vix posset, porrigebatur ad gradum usque duodecimum vel paulo ultra: ut supra dictum est. Sed & *Feb.* 9 & 10 ubi caput nudis oculis videri desierat, caudam gradus duos longam per Telescopium contemplatus sum. Porro si cauda oriretur & refractione materiæ cœlestis, & pro figura cœlorum deflecteretur de Solis oppositione, deberet deflexio illa in iisdem cœli regionibus in eandem semper partem fieri. Atqui Cometa Anni 1680 *Decemb.* 28. hora 8: P. M. *Londini*, versabatur in $\times 8^{\circ} 41'$ cum latitudine boreali $28^{\circ} 6'$, Sole existente in $\psi 18^{\circ} 26'$. Et Cometa Anni 1577, *Dec.* 29. versabatur in $\times 8^{\circ} 41'$ cum latitudine boreali $28^{\circ} 40'$, Sole etiam existente in $\psi 18^{\circ} 26'$ circiter. Utroque in casu Terra versabatur in eodem loco, & Cometa apparebat in eadem cœli parte: in priori tamen casu cauda Cometæ (ex meis & aliorum Observationibus) declinabat angulo graduum 4: ab oppositione Solis aquilonem versus; in posteriore vero (ex Observationibus *Tychonis*) declinatio erat graduum 21 in austrum. Igitur repudiata cœlorum refractione, superest ut Phænomena Caudarum ex materia aliqua reflectente deriventur.

Caudas autem a capitibus oriri & in regiones a Sole averfas ascendere confirmatur ex legibus quas observant. Ut quod in
planis

planis Orbium Cometarum per Solem transeuntibus jacentes, deviant ab oppositione Solis in eas semper partes, quas capita in Orbibus illis progredientia relinquunt. Quod spectatori in his planis constituto apparent in partibus a Sole directe averfis; digrediente autem spectatore de his planis, deviatio paulatim sentitur, & indies apparet major. Quod deviatio cæteris paribus minor est ubi cauda obliquior est ad Orbem Cometæ, ut & ubi caput Cometæ ad Solem propius accedit; præsertim si spectetur deviationis angulus juxta caput Cometæ. Præterea quod caudæ non deviantes apparent rectæ, deviantes autem incurvantur. Quod curvatura major est ubi major est deviatio, & magis sensibilis ubi cauda cæteris paribus longior est: nam in brevioribus curvatura ægre animadvertitur. Quod deviationis angulus minor est juxta caput Cometæ, major juxta caudæ extremitatem alteram, atque adeo quod cauda convexo sui latere partes respicit a quibus fit deviatio, quæque in recta sunt linea a Sole per caput Cometæ in infinitum ducta. Et quod caudæ quæ prolixiores sunt & latiores, & luce vegetiore micant, sint ad latera convexa paulo splendidiore & limite minus indistincto terminatæ quam ad concava. Pendent igitur Phænomena caudæ a motu capitis, non autem a regione cæli in qua caput conspicitur; & propterea non fiunt per refractionem cælorum, sed a capite suppeditante materiam oriuntur. Etenim ut in Aere nostro fumus corporis cujusvis igniti petit superiora, idque vel perpendiculariter si corpus quiescat, vel oblique si corpus moveatur in latus: ita in Cælis ubi corpora gravitant in Solem, fumi & vapores ascendere debent a Sole (ui jam dictum est) & superiora vel recta petere, si corpus fumans quiescit; vel oblique, si corpus progrediendo loca semper deserit a quibus superiores vaporis partes ascenderant. Et obliquitas ista minor erit ubi ascensus vaporis velocior est: nimirum in vicinia Solis & juxta corpus fumans. Ex obliquitatis autem diversitate incurvabitur vaporis columna: & quia vapor in columnæ latere præcedente paulo recentior est, ideo etiam is ibidem aliquanto densior erit, lucemque propterea copiosius reflectet, & limite minus indistincto terminabitur. De Caudarum agitationibus subitaneis & incertis, deque earum figuris irregularibus, quas nonnulli quandoque describunt, hic nihil adjicio; propterea quod vel a mutationibus Aeris nostri, & motibus nubium caudas aliqua ex parte obscurantium oriuntur; vel forte a partibus Viæ Lactææ, quæ cum caudis prætereuntibus confundi possint, ac tanquam earum partes spectari.

Non 3.

Vapo-

DE MUNDI
STATU.

Vapores autem, qui spatiis tam immensis implendis sufficiant, ex Cometarum Atmosphæris oriri posse, intelligitur ex raritate Aeris nostri. Nam Aer juxta superficiem Terræ spatium occupat quasi 850 partibus majus quam Aqua ejusdem ponderis, ideoque Aeris columna cylindrica pedes 850 alta, ejusdem est ponderis cum Aquæ columna pedali latitudinis ejusdem. Columna autem Aeris ad summitatem Atmosphæræ assurgens æquat pondere suo columnam Aquæ pedes 33 altam circiter; & propterea si columnæ totius Aeræ pars inferior pedum 850 altitudinis dematur, pars reliqua superior æquabit pondere suo columnam Aquæ altam pedes 32. Inde vero (ex Hypothesi multis experimentis confirmata, quod compressio Aeris sit ut pondus Atmosphæræ incumbens, quodque gravitas sit reciproce ut quadratum distantiae locorum a centro Terræ) computationem per Corol. Prop. xxii. Lib. II. ineundo, inveni quod Aer, si ascendatur a superficie Terræ ad altitudinem semidiametri unius terrestris, rarior sit quam apud nos in ratione longe majori, quam spatii omnis infra Orbem Saturni ad globum diametro digiti unius descriptum. Ideoque globus Aeris nostri digitum unum latus, ea cum raritate quam haberet in altitudine semidiametri unius terrestris, impleret omnes Planetarum regiones ad usque spheram Saturni & longe ultra. Proinde cum Aer adhuc altior in immensum rarecat; & coma seu Atmosphæra Cometæ, ascendendo ab illius centro, quasi decuplo altior sit quam superficies nuclei, deinde cauda adhuc altius ascendat, debet cauda esse quam rarissima. Et quamvis, ob longe crassiorem Cometarum Atmosphæram, magnamque corporum gravitationem Solem versus, & gravitationem particularum Aeris & vaporum in se mutuo, fieri possit ut Aer in spatiis cœlestibus inque Cometarum caudis non adeo rarecat; perexiguam tamen quantitatem Aeris & vaporum, ad omnia illa caudarum Phænomena abunde sufficere, ex hac computatione perspicuum est. Nam & caudarum insignis raritas colligitur ex astris per eas transluentibus. Atmosphæra terrestris luce Solis splendens, crassitudine sua paucorum milliarum, & astra omnia & ipsam Lunam obscurat & extinguit penitus: per immensam vero caudarum crassitudinem, luce pariter Solari illustratam, astra minima absque claritatis detrimento translucere noscuntur. Neque major esse solet caudarum plurimarum splendor, quam Aeris nostri in tenebroso cubiculo latitudine digiti unius duorumve, lucem Solis in jubaræ reflectentis.

Quo

Quo temporis spatium vapor a capite ad terminum caudæ ascendit, cognosci fere potest ducendo rectam a termino caudæ ad Solem, & notando locum ubi recta illa Trajectoriam secat. Nam vapor in termino caudæ, si recta ascendat a Sole, ascendere coepit a capite quo tempore caput erat in loco intersectionis. At vapor non recta ascendit à Sole, sed motum Cometæ, quem ante ascensum suum habebat, retinendo, & cum motu ascensus sui eundem componendo, ascendit oblique. Unde verior erit Problematis solutio, ut recta illa quæ Orbem secat, parallela sit longitudini caudæ, vel potius (ob motum curvilineum Cometæ) ut eadem a linea caudæ divergat. Hoc pacto inveni quod vapor qui erat in termino caudæ Jan. 25, ascendere coeperat a capite ante Dec. 11, adeoque ascensu suo toto dies plus 45 consumpserat. At cauda illa omnis quæ Dec. 10. apparuit, ascenderat spatium dierum illorum duorum, qui a tempore Perihelii Cometæ elapsi fuerant. Vapor igitur sub initio in vicinia Solis celerrime ascendebat, & postea cum motu per gravitatem suam semper retardato ascendere pergebat; & ascendendo augebat longitudinem caudæ: cauda autem quamdiu apparuit ex vapore fere omni constabat qui a tempore Perihelii ascenderat; & vapor, qui primus ascendit, & terminum caudæ composuit, non prius evanuit quam ob nimiam suam tam a Sole illustrante quam ab oculis nostris distantiam videri desiit. Unde etiam caudæ Cometarum aliorum quæ breves sunt, non ascendunt motu celeri & perpetuo à capitibus & mox evanescent, sed sunt permanentes vaporum & exhalationum columnæ, a capitibus lentissimo multorum dierum motu propagatæ, quæ, participando motum illum capitum quem habuere sub initio, per coelos una cum capitibus moveri pergunt. Et hinc rursus colligitur spatia cœlestia vi resistendi destitui; utpote in quibus non solum solida Planetarum & Cometarum corpora, sed etiam rarissimi caudarum vapores motus suos velocissimos liberrime peragunt ac diutissime conservant.

Ascensum caudarum ex Atmosphæris capitum & progressum in partes a Sole averfas *Keplerus* adscribit actioni radiorum lucis materiam caudæ secum rapientium. Et auram longe tenuissimam in spatiis liberrimis actioni radiorum cedere, non est a ratione prorsus alienum, non obstant quod substantiæ crassæ, impedimentis in regionibus nostris, a radiis Solis sensibilibus propelli nequeant. Alius particulas tam leves quam graves dari posse existimat, & materiam caudarum levitare, perque levitatem suam a Sole ascendere.

DE MUNDI ^{SYSTEMATE} dere. Cum autem gravitas corporum terrestrium sit ut materia in corporibus, ideoque servata quantitate materiæ intendi & remitti nequeat, suspicor ascensum illum ex rarefactione materiæ caudarum potius oriri. Ascendit fumus in camino impulsu Aeris cui innatat. Aer ille per calorem rarefactus ascendit, ob diminutam suam gravitatem specificam, & fumum implicatum rapit secum. Quidni cauda Cometæ ad eundem modum ascenderit a Sole? Nam radii Solares non agitant Media quæ permeant, nisi in reflexione & refractione. Particulæ reflectentes ea actione calefactæ calefacient auram ætheream cui implicantur. Illa calore sibi communicato rarefiet, & ob diminutam ea raritatem gravitatem suam specificam quæ prius tendebat in Solem, ascendet & secum rapiet particulas reflectentes ex quibus cauda componitur: Ad ascensum vaporum conducit etiam quod hi gyranur circa Solem & ea actione conantur a Sole recedere, at Solis Atmosphæra & materia cœlorum vel plane quiescit, vel motu solo quem a Solis rotatione acceperint, tardius gyatur. Hæ sunt causæ ascensus caudarum in vicinia Solis, ubi Orbes curviores sunt, & Cometæ intra densiorem & ea ratione graviorem Solis Atmosphæram consistunt, & caudas quam longissimas mox emittunt. Nam caudæ quæ tunc nascuntur, conservando motum suum & interea versus Solem gravitando, movebuntur circa Solem in Ellipsis pro more capitum, & per motum illum capita semper comitabuntur & iis liberrime adhærebunt. Gravitas enim vaporum in Solem non magis efficiet ut caudæ postea decendant a capitibus Solem versus, quam gravitas capitum efficere possit ut hæc decendant a caudis. Communi gravitate vel simul in Solem cadunt, vel simul in ascensu suo retardabuntur; adeoque gravitas illa non impedit, quo minus caudæ & capita positionem quamcunque ad invicem a causis jam descriptis, aut aliis quibuscunque, facillime accipiant & postea liberrime servant.

Caudæ igitur quæ in Cometarum Periheliis nascuntur, in regiones longinquas cum eorum capitibus abibunt, & vel inde post longam annorum seriem cum iisdem ad nos redibunt, vel potius ibi rarefactæ paulatim evanescent. Nam postea in descensu capitum ad Solem caudæ novæ breviusculæ lento motu a capitibus propagari debent, & subinde, in Periheliis Cometarum illorum qui adusque Atmosphæram Solis descendunt, in immensum augeri. Vapor enim in spatiis illis liberrimis perpetuo rarefit ac dilatatur. Qua ratione sit ut cauda omnis ad extremitatem superiorem

riorem latior sit quam juxta caput Cometæ. Ea autem rarefactione vaporum perpetuo dilatatum diffundi tandem & spargi per cœlos universos, deinde paulatim in Planetas per gravitatem suam attrahi & cum eorum Atmosphæris misceri, rationi consentaneum videtur. Nam quemadmodum Mariæ ad constitutionem Terræ hujus omnino requiruntur, idque ut ex iis per calorem Solis vapores copiose facti excitentur, qui vel in nubes coacti decendant in pluviis, & terram omnem ad procreationem vegetabilium irrigent & nutrant; vel in frigidis montium verticibus condensati (ut aliqui cum ratione philosophantur) decurrant in fontes & flumina: sic ad conservationem marium & humorum in Planetis, requiri videntur Cometæ, ex quorum exhalationibus & vaporibus condensatis, quicquid liquoris per vegetationem & putrefactionem consumitur & in terram aridam convertitur, continuo suppleri & refici possit. Nam vegetabilia omnia ex liquoribus omnino crescunt, dein magna ex parte in terram aridam per putrefactionem abeunt, & limus ex liquoribus putrefactis perpetuo decedit. Hinc moles Terræ aridæ indies augetur, & liquores, nisi aliunde augmentum sumerent, perpetuo decrescere deberent, ac tandem deficere. Porro suspicor Spiritum illum, qui Aeris nostri pars minima est sed subtilissima & optima, & ad rerum omnium vitam requiritur, ex Cometis præcipue venire.

Atmosphæræ Cometarum in descensu eorum in Solem, excurrando in caudas, diminuuntur, & (ea certe in parte quæ Solem respicit) angustiores redduntur: & vicissim in recessu eorum a Sole, ubi jam minus excurrunt in caudas, ampliantur si modo Phænomena eorum *Hevelius* recte notavit. Minimæ autem apparent ubi capita jam modo ad Solem calefacta in caudas maximas & fulgentissimas abiere, & nuclei fumo forsan crassiore & nigriore in Atmosphærarum partibus infimis circundantur. Nam fumus omnis ingenti calore excitatus, crassior & nigrior esse solet. Sic caput Cometæ de quo egimus, in æqualibus a Sole ac Terra distantiiis, obscurius apparuit post Perihelium suum quam antea. Mense enim *Decembri* cum stellis tertiæ magnitudinis conferri solebat, at Mense *Novembri* cum stellis primæ & secundæ. Et qui utrumque viderant, majorem describunt Cometam priorem. Nam Juveni cuidam *Cantabrigiensi*, *Novemb.* 19, Cometa hicce luce sua quantumvis plumbea & obtusa, æquabat Spicam Virginis, & clarius micabat quam postea. Et *D. Storer* literis quæ in manus nostras incidere, scripsit caput ejus Mense *Decembri*, ubi caudam

Ooo

maxi-

DE MONDI
SITUATIONE

maximam & fulgentissimam emittebat, parvum esse & magnitudine visibili longe cedere Cometæ, qui Mense *Novembri* ante Solis ortum apparuerat. Cujus rei rationem esse conjectabatur, quod materia capitis sub initio copiosior esset, & paulatim consumeretur.

Eodem spectare videtur quod capita Cometarum aliorum, qui caudas maximas & fulgentissimas emisserunt, apparuerint subobscura & exigua. Nam Anno 1668. *Mart. 5.* St. nov. hora septima vespertina *R. P. Valentinus Esplanus, Brasiliæ* agens, Cometam vidit Horizonti proximum ad occasum Solis brumalem, capite minimo & vix conspicuo, cauda vero supra modum fulgente, ut stantes in littore speciem ejus e mari reflexam facile cernerent. Speciem utique habebat trabis splendentis longitudine 23 graduum, ab occidente in austrum vergens, & Horizonti fere parallela. Tantus autem splendor tres solum dies durabat, subinde notabiliter decrescens; & interea decrescente splendore aucta est magnitudine cauda. Unde etiam in *Portugallia* quartam fere cœli partem (id est, gradus 45) occupasse dicitur, ab occidente in orientem splendore cum insigni protensa; nec tamen tota apparuit, capite semper in his regionibus infra Horizontem delitescente. Ex incremento caudæ & decremento splendoris manifestum est quod caput a Sole recessit, eique proximum fuit sub initio, pro more Cometæ anni 1680. Et similis legitur Cometa anni 1106, *cujus Stella erat parva & obscura* (ut ille anni 1680) *sed splendor qui ex ea exiit valde clarus & quasi ingens trabs ad Orientem & Aquilonem tendebat*, ut habet *Hevelius* ex *Simeone Dunelmensi Monacho*. Apparuit initio Mensis *Februarii*, circa vesperam, ad occasum Solis brumalem. Inde vero & ex situ caudæ colligitur caput fuisse Soli vicinum. *A Sole*, inquit *Matthæus Parisiensis*, *distabat quasi cubito uno, ab hora tertia* [rectius *texta*] *usque ad horam nonam radium ex se longum emittens*. Talis etiam erat ardentissimus ille Cometa ab *Aristotele* descriptus *Ljb. I. Meteor. 6. cujus caput primo die non conspectum est, eo quod ante Solem vel saltem sub radiis solaribus occidisset, sequente vero die quantum potuit visum est. Nam quam minima fieri potest distantia Solem reliquit, & mox occubuit. Ob nimium ardorem* [caudæ scilicet] *nondum apparebat capitis sparsus ignis, sed procedente tempore* (ait *Aristoteles*) *cum* [cauda] *jam minus flagraret, reddita est* [capiti] *Cometæ sua facies. Et splendorem suum ad tertiam usque cœli partem* [id est, ad 60^{ta}] *extendit. Apparuit autem tempore*

tempore hyberno, & ascendens usque ad cingulum Orionis ibi evanuit. LIBER
TERTIUS.
Cometa ille anni 1618, qui è radiis Solaribus caudatissimus emerfit, stellas primæ magnitudinis æquare vel paulo superare videbatur, sed majores apparuere Cometæ non pauci qui caudas breviores habuere. Horum aliqui Jovem, alii Venerem vel etiam Lunam æquasse traduntur.

Diximus Cometæ esse genus Planetarum in Orbibus valde eccentricis circa Solem revolvendum. Et quemadmodum e Planetis non caudatis, minores esse solent qui in Orbibus minoribus & Soli propioribus gyantur, sic etiam Cometæ, qui in Periheliis suis ad Solem propius accedunt, ut plurimum minores esse, ne Solem attractione sua nimis agitent, rationi consentaneum videtur. Orbium vero transversas diametros & revolutionum tempora periodica, ex collatione Cometarum in iisdem Orbibus post longa temporum intervalla redeuntium, determinanda relinquo. Interea huic negotio Propositio sequens lumen accendere potest.

PROPOSITIO XLII. PROBLEMA XXII.

Trajectoriam Cometæ Graphice inventam corrigere.

Oper. 1. Assumatur positio plani Trajectoriæ, per Propositionem superiorem Graphice inventa; & seligantur tria loca Cometæ observationibus accuratissimis definita, & ab invicem quam maxime distantia; sitque A tempus inter primam & secundam, ac B tempus inter secundam ac tertiam. Cometam autem in eorum aliquo in Perigæo versari convenit, vel saltem non longe a Perigæo abesse. Ex his locis apparentibus inveniantur, per operationes Trigonometricas, loca tria vera Cometæ in assumpto illo plano Trajectoriæ. Deinde per loca illa inventa, circa centrum Solis seu umbilicum, per operationes Arithmeticas, ope Prop. XXI. Lib. I. institutas, describatur Sectio Conica: & ejus aræa, radiis a Sole ad loca inventa ductis terminata, sunt D & E; nempe D aræa inter observationem primam & secundam, & E aræa inter secundam ac tertiam. Sitque T tempus totum quo aræa tota D+E, velocitate Cometæ per Prop. XVI. Lib. I. inventa, describi debet.

Oper. 2. Augeatur longitudo Nodorum Plani Trajectoriæ, additis ad longitudinem illam 20' vel 30', quæ dicantur P; & servetur plani illius inclinatio ad planum Eclipticæ. Deinde ex

72 MUNDI
SYSTEMATÆ,

prædictis tribus Cometæ locis observatis, inveniantur in hoc novo plano loca tria vera (ut supra:) deinde etiam Orbis per loca illa transiens, & ejusdem areæ duæ inter observationes descriptæ, quæ sint d & e , nec non tempus totum t quo area tota $d + e$ describi debeat.

Oper. 3. Scrvetur Longitudo Nodorum in operatione prima, & augeatur inclinatio Plani Trajectoriæ ad planum Eclipticæ, additis ad inclinationem illam $20'$ vel $30'$, quæ dicantur Q . Deinde ex observatis prædictis tribus Cometæ locis apparentibus, inveniantur in hoc novo Plano loca tria vera, Orbisque per loca illa transiens, ut & ejusdem areæ duæ inter observationes descriptæ, quæ sint δ & ϵ , & tempus totum τ quo area tota $\delta + \epsilon$ describi debeat.

Jam sit C ad 1 ut A ad B , & G ad 1 ut D ad E , & g ad 1 ut d ad e , & γ ad 1 ut δ ad ϵ ; sitque S tempus verum inter observationem primam ac tertiam; & signis $+$ & $-$ probe observatis quærantur numeri m & n , ea lege, ut sit $2G - 2C = mG - mg + nG - n\gamma$, & $2T - 2S$ æquale $mT - m\tau + nT - n\tau$. Et si, in operatione prima, I designet inclinationem plani Trajectoriæ ad planum Eclipticæ, & K longitudinem Nodi alterutrius, erit $I + nQ$ vera inclinatio Plani Trajectoriæ ad Planum Eclipticæ, & $K + mP$ vera longitudo Nodi. Ac denique si in operatione prima, secunda ac tertia, quantitates R , r & ρ designent Latera recta Trajectoriæ, & quantitates $\frac{1}{L}$, $\frac{1}{l}$, $\frac{1}{\lambda}$ ejusdem Latera transversa respective: erit $R + mr - mR + n\rho - nR$ verum Latus rectum, & $\frac{1}{L + ml - mL + n\lambda - nL}$ verum Latus transversum Tra-

jectoriæ quam Cometa describit. Dato autem Latere transverso datur etiam tempus periodicum Cometæ. *Q. E. I.*

Cæterum Cometarum revolvantium tempora periodica, & Orbium latera transversa, haud satis accurate determinabuntur, nisi per collationem Cometarum inter se, qui diversis temporibus apparent. Si plures Cometæ, post æqualia temporum intervalla, eundem Orbem descripsisse reperiantur, concludendum erit hos omnes esse unum & eundem Cometam, in eodem Orbe revolventem. Et tum demum ex revolutionum temporibus, dabuntur Orbium latera transversa, & ex his lateribus determinabuntur Orbes Elliptici.

In

In hunc finem computandæ sunt igitur Cometarum plurimum Trajectoriæ, ex hypothesi quod sint Parabolicae. Nam hujusmodi Trajectoriae cum Phænomenis semper congruent quamproxime. Id liquet, non tantum ex Trajectoria Parabolica Cometæ anni 1680, quam cum observationibus supra contuli, sed etiam ex ea Cometæ illius insignis, qui annis 1664 & 1665 apparuit, & ab *Hevelio* observatus fuit. Is ex observationibus suis longitudes & latitudes hujus Cometæ computavit, sed minus accurate. Ex iisdem observationibus, *Halleus* nosse loca Cometæ hujus denuo computavit, & tum demum ex locis sic inventis Trajectoriam Cometæ determinavit. Invenit autem ejus Nodum ascendentem in π $21^{\circ} 13' 55''$, Inclinationem Orbitæ ad planum Eclipticæ $21^{\circ} 18' 40''$, distantiam Perihelii a Nodo in Orbita $49^{\circ} 27' 30''$. Perihelium in Ω $8^{\circ} 40' 30''$ cum Latitudine austrina heliocentrica $16^{\circ} 1' 45''$. Cometam in Perihelio *Novemb.* 24^{d.} 11^{h.} 52' P.M. tempore æquato *Londini*, vel 13^{h.} 8' *Gedani*, flylo veteri, & Latus rectum Parabolæ 410186, exiliente mediocri Terræ a Sole distantia 100000. Quam probe loca Cometæ in hoc Orbe computata, congruunt cum observationibus, patebit ex Tabula sequente ab *Halleio* supputata.

Temp. Appar. <i>Gedani</i>	Observata Cometæ distantia	Loca observata.	Loca computata in Orbe.
<i>Decemb.</i> 3 ^{d.} 11 ^{h.} 29 ^{1/2}	a Corde Leonis a Spica Virginis	Long. ϵ 7. 1. 0 Lat. austr. 21. 39. 0	ϵ 7. 1. 29 21. 38. 50
4. 21. 13	a Corde Leonis a Spica Virginis	Long. ϵ 6. 15. 0 Lat. a. 22. 24. 0	ϵ 6. 16. 5 22. 24. 0
7. 17. 48	a Corde Leonis a Spica Virginis	Long. ϵ 3. 6. 0 Lat. a. 23. 23. 0	ϵ 3. 7. 31 23. 23. 40
17. 14. 49	a Corde Leonis ab Humero Orionis dextr.	Long. Ω 2. 56. 0 Lat. a. 49. 23. 0	Ω 2. 56. 0 49. 23. 0
19. 9. 25	a Procyone a Lucid. Mandib. Ceti	Long. Π 12. 40. 30 Lat. a. 45. 48. 0	Π 12. 41. 0 45. 45. 0
20. 9. 13 1/2	a Procyone a Lucid. Mandib. Ceti	Long. Π 12. 3. 0 Lat. a. 39. 54. 0	Π 12. 5. 0 39. 53. 0
22. 9. 9 1/2	ab Hum. dextr. Orionis a Lucid. Mandib. Ceti	Long. Π 2. 16. 0 Lat. a. 38. 47. 0	Π 2. 18. 50 38. 59. 40
22. 9. 0	ab Hum. dextr. Orionis a Lucid. Mandib. Ceti	Long. ϵ 24. 24. 0 Lat. a. 27. 45. 0	ϵ 24. 27. 0 27. 46. 0
26. 7. 18	a Lucida Arietis ab Aldebaran	Long. ϵ 9. 0. 0 Lat. a. 32. 56. 0	ϵ 9. 2. 23 32. 54. 11

Uoo 3

Temp.

DE MUNDI
SYSTEMATE,

Temp. Appar. <i>Gedani</i>			Observata Cometæ distantia			Loca observata			Loca computata in Orbe.		
d.	h.	l.		gr.	l.	ll		gr.	l.	ll	
17.	6.	45	a Lucida Arietis ab Aldebaran	20. 45. 0	28. 20. 0		Long. Lat. s.	γ 10. 5. 40	γ 10. 23. 0		γ 7. 5. 44 10. 23. 13
18.	7.	19	a Lucida Arietis a Falcione	18. 29. 0	29. 27. 0		Long. Lat. s.	γ 5. 24. 45	γ 8. 22. 50		γ 5. 27. 13 8. 23. 37
31.	6.	45	a Cing. Androm. a Falcione	30. 46. 30	32. 51. 30		Long. Lat. s.	γ 2. 17. 40	γ 4. 11. 0		γ 2. 8. 20 4. 16. 25
Jan.			a Cing. Androm. a Falcione	25. 24. 0	27. 22. 25		Long. Lat. bor.	γ 28. 24. 45	γ 0. 54. 0		γ 28. 24. 0 0. 58. 0
25.	7.	29	a Palladio a Cing. Androm.	40. 5. 0	20. 21. 15		Long. Lat. bor.	γ 26. 39. 15	γ 5. 25. 50		γ 26. 38. 50 5. 26. 0
Mar.			Cometa ab Hekeo prope secundam Arietis observatus, Mar. 1 ^a , 70. 0'						Long.	γ 19. 17. 20	γ 19. 18. 20
1.	8.	6	Londæ, cum						Lat. bor.	γ 8. 27. 10	γ 8. 28. 12

Apparuit hic Cometa per menses tres, signaque fere sex descriptis, & uno die gradus fere viginti confecit. Cursus ejus a circulo maximo plurimum deflexit, in boream incurvatus; & motus ejus sub finem ex retrogrado factus est directus. Et non obstante cursu tam insolito, Theoria a principio ad finem cum observationibus non minus accurate congruit, quam Theoriæ Planetarum cum eorum observationibus congruere solent, ut inspicienti Tabulam patebit. Subducenda tamen sunt minuta duo prima circiter, ubi Cometa velocissimus fuit; id quod fiet auferendo duodecim minuta secunda ab angulo inter Nodum ascendentem & Perihelium, seu constituendo angulum illum 49^{gr}. 27'. 18". Cometæ utriusque (& hujus & superioris) parallaxis annua insignis fuit, & inde demonstratur motus annuus Terræ in Orbe magno.

Confirmatur etiam Theoria per motum Cometæ qui apparuit anno 1683. Hic fuit retrogradus in Orbe cujus planum cum plano Eclipticæ angulum fere rectum continebat. Hujus Nodus ascendens (computante *Halleio*) erat in π 23^{gr}. 23'; Inclinator Orbitæ ad Eclipticam 83^{gr}. 11'; Perihelium in π 25^{gr}. 29'. 30"; Distantia perihelia a Sole 56020, existente radio Orbis magni 100000, & tempore Perihelii *Julii* 2^a. 3^h. 50'. Loca autem Cometæ in hoc Orbe ab *Halleio* computata, & cum locis a *Flamstedio* observatis collata, exhibentur in Tabula sequente.

1683 Temp.

L I N E A
T A B U L A

1683	Locus Solis.	Cometæ Long. Comp.	Lat. Sol. Comp.	Cometæ Long. Obs.	Lat. Sol. Obs.	Differ. Long.	Differ. Lat.
Temp. Equat.	d. h. m.	gr. / /	gr. / /	gr. / /	gr. / /	gr. / /	gr. / /
Jul. 15. 14. 55	1. 2. 30	13. 1. 42	29. 28. 15	13. 6. 43	29. 28. 20	+1. 0	+0. 7
15. 11. 15	2. 13. 18	11. 37. 48	29. 14. 0	11. 39. 43	29. 24. 50	+1. 55	+0. 50
17. 10. 20	4. 45. 45	10. 7. 6	29. 31. 50	10. 8. 40	29. 24. 0	+1. 54	+0. 50
21. 11. 40	10. 11. 21	5. 10. 27	28. 51. 42	5. 11. 30	28. 50. 38	+1. 1	+1. 14
25. 14. 5	12. 15. 28	4. 27. 53	24. 24. 47	4. 27. 0	28. 23. 40	-0. 53	-1. 7
28. 9. 41	18. 9. 21	27. 55. 3	26. 22. 12	27. 54. 24	26. 22. 31	-0. 19	-0. 37
31. 14. 15	18. 21. 53	27. 41. 7	24. 16. 57	27. 41. 1	26. 14. 50	+0. 1	-2. 7
Aug. 3. 14. 56	20. 17. 16	25. 29. 32	25. 16. 19	25. 28. 46	25. 27. 21	-0. 46	+1. 9
4. 10. 49	22. 2. 50	23. 18. 20	24. 10. 49	23. 16. 55	24. 12. 19	+2. 25	+1. 50
6. 10. 9	23. 58. 45	20. 42. 21	22. 47. 1	20. 40. 32	22. 49. 5	+1. 31	+2. 0
9. 10. 26	26. 50. 52	16. 7. 37	20. 6. 37	16. 5. 55	20. 6. 10	-2. 2	-0. 27
15. 14. 1	2. 47. 13	8. 30. 48	11. 37. 33	8. 26. 18	11. 31. 1	-4. 50	-5. 33
16. 15. 10	4. 48. 2	0. 49. 7	9. 14. 16	0. 41. 53	9. 34. 13	-1. 12	-0. 1
18. 15. 44	5. 45. 23	4. 54. 53	5. 11. 35	4. 49. 5	5. 9. 13	-8. 48	-2. 4
22. 14. 44	9. 35. 49	31. 7. 14	3. 16. 21	31. 7. 33	5. 16. 50	-0. 2	-0. 3
23. 15. 28	10. 26. 48	7. 2. 18	8. 17. 9	7. 1. 37	8. 16. 41	-1. 1	-0. 11
26. 16. 2	13. 31. 10	24. 45. 51	16. 58. 0	24. 44. 0	16. 58. 20	-2. 31	+0. 20

Confirmatur etiam Theoria per motum Cometæ retrogradi qui apparuit anno 1682. Hujus Nodus ascendens (computante *Halleio*) erat in γ 21st 16'. 30". Inclination Orbitæ ad planum Eclipticæ 17st 56' 0". Perihelium in π 2st 52'. 50". Distantia perihelii a Sole 58328. Et tempus æquatum Perihelii *Sept.* 4^d 7^h 39'. Loca vero ex observationibus *Flamstedii* computata, & cum locis per Theoriam computatis collata, exhibentur in Tabula sequente.

1682	Locus Solis.	Cometæ Long. Comp.	Lat. Sol. Comp.	Cometæ Long. Obs.	Lat. Sol. Obs.	Differ. Long.	Differ. Lat.
Temp. Apul.	d. h. m.	gr. / /	gr. / /	gr. / /	gr. / /	gr. / /	gr. / /
Aug. 19. 16. 31	7. 0. 7	18. 14. 21	25. 50. 7	18. 14. 40	25. 49. 53	-0. 18	+0. 12
20. 11. 38	7. 31. 52	24. 46. 23	26. 14. 41	24. 46. 28	26. 12. 58	+0. 1	+1. 50
23. 8. 21	8. 36. 14	19. 17. 15	26. 20. 3	19. 38. 3	26. 17. 37	-0. 47	-2. 26
28. 8. 8	9. 33. 55	6. 29. 53	26. 8. 41	6. 30. 3	26. 7. 12	-0. 10	+1. 30
32. 8. 20	16. 22. 40	22. 37. 54	18. 37. 47	22. 37. 49	18. 34. 1	+0. 5	+1. 43
30. 7. 45	17. 19. 41	15. 16. 3	17. 26. 43	15. 31. 28	17. 27. 17	+0. 43	-0. 34
1. 7. 33	19. 18. 4	20. 10. 13	15. 13. 0	20. 17. 4	15. 9. 49	+1. 49	+1. 41
4. 7. 22	22. 11. 28	25. 42. 0	12. 33. 48	25. 40. 18	12. 22. 0	+1. 2	+1. 43
5. 7. 32	23. 10. 59	27. 0. 48	11. 33. 8	26. 59. 14	11. 33. 51	+1. 22	+0. 41
8. 7. 16	26. 5. 58	29. 58. 44	9. 26. 46	29. 58. 45	9. 26. 41	-0. 8	+0. 3
9. 7. 26	27. 5. 9	0. 44. 10	8. 49. 10	0. 44. 4	8. 48. 25	+0. 6	+0. 41

His exemplis abunde satis manifestum est, quod motus Cometarum per Theoriam a nobis expositam non minus accurate exhibentur,

DE MUNDI
SYSTEMATE

hinentur, quam solent motus Planetarum per eorum Theorias. Et propterea Orbes Cometarum per hanc Theoriam enumerari possunt, & tempus periodicum Cometæ in quolibet Orbe revolventis tandem sciri, & tum demum Orbium Ellipticorum latera transversa & Apheliorum altitudines innotescant.

Cometa retrogradus qui apparuit anno 1607, descripsit Orbem cujus Nodus ascendens (computante *Halleio*) erat in γ 20th 21'. Inclinatio plani Orbis ad planum Eclipticæ erat 17th 2'. Perihelium erat in π 2th 16', & distantia perihelia a Sole erat 58680, existente radio Orbis magni 100000. Et Cometa erat in Perihelio *Octob.* 16^d. 3^h. 50'. Congruit hic Orbis quamproxime cum Orbe Cometæ qui apparuit anno 1682. Si Cometæ hi duo fuerint unus & idem, revolvetur hic Cometa spatio annorum 75, & axis major Orbis ejus erit ad axem majorem Orbis magni, ut $\sqrt{c} : 75 \times 75$ ad 1, seu 1778 ad 100 circiter. Et distantia aphelia Cometæ hujus a Sole, erit ad distantiam mediocrem Terræ a Sole, ut 35 ad 1 circiter. Quibus cognitis, haud difficile fuerit Orbem Ellipticum Cometæ hujus determinare. Atque hæc ita se habebunt si Cometa spatio annorum septuaginta quinque, in hoc Orbe posthac redierit. Cometæ reliqui majori tempore revolvi videntur & altius ascendere.

Cæterum Cometæ, ob magnum eorum numerum, & magnam Apheliorum a Sole distantiam, & longam moram in Apheliis, per gravitates in se mutuo nonnihil turbari debent, & eorum eccentricitates & revolutionum tempora nunc augeri aliquantulum, nunc diminui. Proinde non est expectandum ut Cometa idem, in eodem Orbe & iisdem temporibus periodicis, accurate redeat. Sufficit si mutationes non majores obvenierint, quam quæ a causis prædictis oriantur.

Et hinc ratio redditur cur Cometæ non comprehendantur Zodiaco (more Planetarum) sed inde migrent & motibus variis in omnes cælorum regiones ferantur. Scilicet eo fine, ut in Apheliis suis ubi tardissime moventur, quam longissime distent ab invicem & se mutuo quam minime trahant. Qua de causa Cometæ qui altius descendunt, adeoque tardissime moventur in Apheliis, debent altius ascendere.

Cometa qui anno 1680 apparuit, minus distabat a Sole in Perihelio suo quam parte sexta diametri Solis; & propter summam velocitatem in vicinia illa, & densitatem aliquam Atmosphæræ Solis, resistantiam nonnullam sentire debuit, & aliquantulum retardari,

dari & propius ad Solem accedere : & singulis revolutionibus accedendo ad Solem, incidet is tandem in corpus Solis. Sed & in Aphelio ubi tardissime movetur, aliquando per attractionem aliorum Cometarum retardari potest & subinde in Solem incidere. Sic etiam Stellæ fixæ quæ paulatim expirant in lucem & vapores, Cometis in ipsas incidentibus refici possunt, & novo alimento accensæ pro Stellis Novis haberi. Vapores autem qui ex Sole & Stellis fixis & caudis Cometarum oriuntur, incidere possunt per gravitatem suam in Atmosphæras Planetarum, & ibi condensari & converti in aquam & spiritus humidos, & subinde per lentum calorem in sales, & sulphura, & tincturas, & limum, & lutum, & argillam, & arenam, & lapides, & coralla, & substantias alias terreitres paulatim migrare. Decrescente autem corpore Solis motus medii Planetarum circum Solem paulatim tardescunt, & crescente Terra motus medius Lunæ circum Terram paulatim augebitur. Et collatis quidem observationibus Eclipsium *Babylonicis* cum iis *Albatignis* & cum hodiernis, *Halleus* noster motum medium Lunæ cum motu diurno Terræ collatum, paulatim accelerari, primus omnium quod sciamprehendit.

SCHOLIUM GENERALE.

Hypothesis Vorticum multis premitur difficultatibus. Ut Planeta unusquisque radio ad Solem ducto areas describat tempori proportionales, tempora periodica partium Vorticis deberent esse in duplicata ratione distantiarum a Sole. Ut periodica Planetarum tempora sint in proportionem sesquuplicata distantiarum a Sole, tempora periodica partium Vorticis deberent esse in eadem distantiarum proportionem. Ut Vortices minores circum Saturnum, Jovem & alios Planetas gyratione conserventur & tranquille natent in Vortice Solis, tempora periodica partium Vorticis Solaris deberent esse æqualia. Revolutiones Solis & Planetarum circum axes suos ab omnibus hisce proportionibus discrepant. Motus Cometarum sunt summe regulares, & easdem leges cum Planetarum motibus observant, & per Vortices explicari nequeunt. Feruntur Cometæ motibus valde eccentricis in omnes cœlorum partes, quod fieri non potest nisi Vortices tollantur.

Projectilia, in aere nostro, solam aeris resistantiam sentiunt. Sublato aere, ut fit in Vacuo *Boyleano*, resistentia cessat, siquidem pluma tenuis & aurum solidum æquali cum velocitate in hoc

Ppp

Vacuo

DE MONDI
SYSTEMATE.

Vacuo cadunt. Et par est ratio spatiorum cœlestium quæ sunt supra atmosphæram Terræ. Corpora omnia in istis spatiis liberrime moveri debent; & propterea Planetæ & Cometæ in orbibus specie & positione datis, secundum leges supra expositas, perpetuo revolvi. Perseverabunt quidem in orbibus suis per leges gravitatis, sed regularem orbium situm primitus acquirere per leges hæc minime potuerunt.

Planetæ sex principales revolvuntur circum Solem in circulis Soli concentricis, eadem motus directione, in eodem plano quamproxime. Lunæ decem revolvuntur circum Terram, Jovem & Saturnum in circulis concentricis, eadem motus directione, in planis orbium Planetarum quamproxime. Et hi omnes motus regulares originem non habent ex causis Mechanicis; siquidem Cometæ in Orbibus valde eccentricis, & in omnes cœlorum partes libere feruntur. Quo motus genere Cometæ per Orbes Planetarum celerissime & facillime transeunt, & in Apheliis suis ubi tardiores sunt & diutius morantur, quam longiilime distant ab invicem, & se mutuo quam minime trahunt. Elegantissima hæc Solis, Planetarum & Cometarum compages non nisi consilio & dominio Entis intelligentis & potentis oriri potuit. Et si Stellæ fixæ sint centra similium systematum; hæc omnia simili consilio constructa, suberunt *Unius* dominio: præsertim cum lux Fixarum sit ejusdem naturæ ac lux Solis, & systemata omnia lucem in omnia invicem immittant.

Hic omnia regit, non ut Anima mundi, sed ut univerforum Dominus; & propter dominium suum Dominus Deus minus; & propter dominium suum Dominus Deus * *παντοκράτωρ* dici solet. Nam *Deus* est vox relativa & ad servos refertur: & *Deitas* est dominatio Dei non in corpus proprium, (uti sentiunt quibus Deus est Anima Mundi) sed in servos. *Deus summus* est Ens æternum, infinitum, absolute perfectum; sed Ens utcumque perfectum sine dominio, non est *Dominus Deus*. Dicimus enim *Deus meus*, *Deus vester*, *Deus Israelis*: sed non dicimus *Æternus meus*, *Æternus vester*, *Æternus Israelis*; non dicimus *Infinitus meus*, *Infinitus vester*, *Infinitus Israelis*; non dicimus *Perfectus meus*, *Perfectus vester*, *Perfectus Israelis*. Hæ appellationes relationem non habent ad servos. Vox *Deus* passim significat *Dominum*, sed omnis Dominus non est Deus. Dominatio Entis spiritualis *Deum* constituit, vera verum, summa summum, ficta fictum. Et ex dominatione vera sequitur, Deum verum esse vivum, intelligentem & potentem; ex reliquis perfectionibus summum esse.

* Id est, Imperator universalis.

esse vel summe perfectum. *Aeternus est & Infinitus, Omnipotens & Omnisiciens*, id est, durat ab æterno in æternum & adest ab infinito in infinitum, omnia regit & omnia cognoscit quæ fiunt aut sciri possunt. Non est æternitas vel infinitas, sed æternus & infinitus; non est duratio vel spatium, sed durat & adest. Durat semper & adest ubique, & existendo semper & ubique durationem & spatium, æternitatem & infinitatem constituit. Cum unaquæque spatii particula sit *semper*, & unumquodque durationis indivisibile momentum *ubique*; certe rerum omnium Fabricator ac Dominus non erit *nunquam nusquam*. Omnipræsens est non per *virtutem* solam, sed etiam per *substantiam*; nam virtus sine substantia subsistere non potest. In ipso * continentur & moventur universa, sed abique mutua *passione*. Deus nihil patitur ex corporum motibus: illa nullam sentiunt resistentiam ex omnipræsentia Dei. Deum summum necessario existere in confesso est: Et eadem necessitate *semper* est & *ubique*. Unde etiam totus est sui similis, totus oculus, totus auris, totus cerebrum, totus brachium, totus vis sentiendi, intelligendi & agendi; sed more minime humano, more minime corporeo, more nobis prorsus incognito. Ut cæcus ideam non habet colorum, sic nos ideam non habemus modorum quibus Deus sapientissimus sentit & intelligit omnia. Corpore omni & figura corporea prorsus destituitur, ideoque videri non potest, nec audiri, nec tangi, nec sub specie rei alicujus corporeæ coli debet. Ideas habemus attributorum ejus, sed quid sit rei alicujus Substantia minime cognoscimus. Videmus tantum corporum figuras & colores, audimus tantum sonos, tangimus tantum superficies externas, olfacimus odores solos, & gustamus sapes; Intimas substantias nullo sensu, nulla actione reflexa cognoscimus, & multo minus ideam habemus substantiæ Dei. Hunc cognoscimus solummodo per proprietates suas & attributa, & per sapientissimas & optimas rerum structuras, & causas finales; veneramur autem & colimus ob dominium. Deus enim sine dominio, providentia, & causis finalibus, nihil aliud est quam Fatum & Natura. Et hæc de Deo; de quo utique ex Phænomenis disserere, ad *Philosophiam Experimentalem* pertinet.

Hactenus Phænomena cælorum & maris nostri per Vim gravitatis exposui, sed causam Gravitatis nondum assignavi. Oritur utique hæc Vis a causa aliqua quæ penetrat ad usque centra Solis

* Ita sentiebant veteres, *Atræus* in *Phænom.* sub *Intitio*, *Paulus* in *A.R.* 7. 27. 28. *Moses* *Deut.* 4. 39. & 10. 14. *David* *Psal.* 139. 7. 8. *Salomon* 1. *Reg.* 8. 27. *Job.* 23. 12. *Jeremias* *Propheta* 23. 23. 24.

& Planetarum, sine virtutis diminutione; quæque agit non pro quantitate *superficierum* particularum in quas agit (ut solent causæ Mechanicæ,) sed pro quantitate materiæ *solidæ*; & cujus actio in immensas distantias undique extenditur, decrescendo semper in duplicata ratione distantiarum. Gravitas in Solem componitur ex gravitatibus in singulas Solis particulas, & recedendo a Sole decrescit accurate in duplicata ratione distantiarum ad usque orbem Saturni, ut ex quiete Apheliorum Planetarum manifestum est, & ad usque ultima Cometarum Aphelia, si modo Aphelia illa quiescant. Rationem vero harum Gravitatis proprietatum ex Phænomenis nondum potui deducere, & Hypotheses non fingo. Quicquid enim ex Phænomenis non deducitur, *Hypothesis* vocanda est; & Hypotheses seu Metaphysicæ, seu Physicæ, seu Qualitatum occultarum, seu Mechanicæ, in *Philosophia Experimentalis* locum non habent. In hac Philosophia Propositiones deducuntur ex Phænomenis, & redduntur generales per Inductionem. Sic impenetrabilitas, mobilitas, & impetus corporum & leges motuum & gravitatis innotuerunt. Et satis est quod Gravitas revera existat, & agat secundum leges a nobis expositas, & ad corporum cœlestium & maris nostri motus omnes sufficiat.

Adjicere jam liceret nonnulla de Spiritu quodam subtilissimo corpora crassa pervadente, & in iisdem latente, cujus vi & actionibus particulae corporum ad minimas distantias se mutuo attrahunt, & contiguæ factæ cohærent; & corpora Electrica agunt ad distantias majores, tam repellendo quam attrahendo corpuscula vicina; & Lux emittitur, reflectitur, refringitur, inflectitur, & corpora calefacit; & Sensatio omnis excitatur, & membra Animalium ad voluntatem moventur, vibrationibus scilicet hujus Spiritus per solida nervorum capillamenta ab externis sensuum organis ad cerebrum & a cerebro in musculos propagatis. Sed hæc paucis exponi non possunt; neque adest sufficiens copia Experimentorum, quibus leges actionum hujus Spiritus accurate determinari & monstrari debent.

F I N I S.

I N-

INDEX RERUM

ALPHABETICUS.

N. B. Citationes factæ sunt ad normam sequentis Exempli. III, 102: 444, 20: 471, 28 designant Libri tertii Propositionem decimam: Paginae 444^a lineam 20^{am}. Paginae 471^a lineam 28^{am}.

A.

Æ Quinquehorum præcessio
causæ hujus motus indicantur III, 21

quantitas motus ex causis computatur III, 39

Aeris
densitas ad quamlibet altitudinem colligitur
ex Prop. 32. Lib. II. quanta sit ad altitudinem unius semidiametri Terrestris ostenditur 470, 11

elastica vis quali causæ tribui possit II, 33.
gravitas cum Aquæ gravitate collata 470, 3
resistentia quanta sit, per Experimenta Pendulorum colligitur 486, 28; per Experimenta corporum cadentium & Theoriam accuratius invenitur 327, 13

Anguli contactus non sunt omnes ejusdem generis, sed alii aliis infinite minores p. 32

Apud motus expenditur I, Sect. 9.

Aeræ quas corpora in gyros acta, radiis ad centrum virium ductis, describunt, conferuntur cum temporibus descriptionum I, 1, 2, 3, 58, 65

Attractio corporum universorum demonstratur III, 7; qualis sit hujus demonstrationis certitudo ostenditur 358, 28; 484, 11

Attractionis causam vel modum nullibi definit Auctor 5, 17: 147, 31: 172, 31: 483, 34

C.

Calore virga ferrea comperta est augeri longitudine 386, 4

Calor Solis quantus sit in diversis Sole distantibus 466, 20

quantus apud Mercurium 372, 12
quantus apud Cometam anni 1680 in Perihelio versantem 466, 22

Centrum commune gravitatis corporum plurimum, ab actionibus corporum inter se, non mutat statum suum vel motus vel quietis p. 17

Centrum commune gravitatis Terræ, Solis & Planetarum omnium quiescere III, 11; confirmatur ex Cor. 2. Prop. 14. Lib. III.

Centrum commune gravitatis Terræ & Lunæ motu annuo percurrit Orbem magnum 376, 6
quibus intervallis distat a Terra & Luna 430, 22

Centrum Virium quibus corpora revolvuntur in Orbibus retinentur

quali Aræarum indicio invenitur 38, 14
qua ratione ex datis revolvuntur velocitatibus invenitur I, 5

Circuli circumferentia, qua lege vis centripetæ tendentis ad punctum quodcumque datum describi potest a corpore revolvente I, 4, 2, 8

Cæli
resistentia desinituntur III, 10: 444, 20: 471, 28; & propterea Fluido omni corporeo 328, 18
transitus Luci præbent absque ulla refractione 467, 32

Cometæ
Genus sunt Planetarum, non Meteororum 444, 24: 466, 15

Luna superiores sunt, & in regione Planetarum versantur p. 439

Distantia eorum qua ratione per Observationes colligi potest quamproxime 439, 21

Plures observati sunt in hemisphærio Solem versus, quam in hemisphærio opposito; & unde hoc fiat 444, 5

Splendent luce Solis a se reflexa 444, 4; Lux illa quanta esse solet 441, 12

Cinguntur Atmosphæris ingentibus 442, 22: 444, 27

Qui ad Solem propius accedunt ut plurimum minores esse existimantur 475, 7

Quo fine non comprehenduntur Zodiaco (more Planetarum) sed in omnibus colorum regiones varie feruntur 480, 30

Posunt aliquando in Solem incidere & novum illi alimentum ignis præbere 480, 37

Usus eorum suggeritur 473, 4: 487, 7

Ppp 3. Come-

INDEX RERUM.

Cometarum casum
avertuntur a Sole 468, 39
maximæ sunt & fulgentissimæ statim post
transitum per viciniam Solis 467, 8
inignis earum raritas 470, 32
origo & natura earundem 442, 19: 467, 13
quo temporis spatio a capite ascendunt 471, 1

Cometæ

Movetur in Sectionibus Conicis umbilicis
in centro Solis habentibus, & radiis ad So-
lem ductis describunt areæ temporibus pro-
portionales. Et quidem in Ellipsis mo-
ventur si in Orbem redeunt, hæc tamen
Parabolis erant maxime finitimæ III, 49

Trajectoria Parabolica ex datis tribus Obser-
vationibus invenitur III, 41; inventa cor-
rigitur III, 42

Locus in Parabola invenitur ad tempus da-
tum 445, 30: I, 30

Velocitas cum velocitate Planetarum confer-
tur 445, 17

Cometa annorum 1664 & 1665

Hujus motus observatus expenditur, & cum
Theoria accurate congruere deprehenditur
p. 477.

Cometa annorum 1680 & 1681

Hujus motus observatus cum Theoria accu-
rate congruere invenitur p. 455 & seqq.

Videbatur in Ellipsi revolvi spatio annorum
plurimum quingentorum 464, 37

Trajectoria illius & Cauda singulis in locis
delineantur p. 465

Cometa anni 1682

Hujus motus accurate respondet Theoriæ
p. 479

Comparuisse visus est anno 1607, iterumque re-
diturus videtur periodo 75 annorum 480, 6

Cometa anni 1683

Hujus motus accurate respondet Theoriæ
p. 478

Curvæ distinguuntur in Geometricæ rationales &
Geometricæ irrationales t.c.o, 5

Curvatura figurarum qua ratione æstimanda sit
235, 28: 308, 33

Cycloidis seu Epicycloidis
rectificatio I, 48, 49: 143, 18

Evoluta I, 50: 143, 21

Cylindri attractio ex particulis trahentibus com-
positi quarum vires sunt reciproce ut qua-
drata distantiarum 198, 1

D.

Dei Natura p. 482 & 483

Descensus gravium in vacuo quantum sit, ex lon-
gitudine Penduli colligitur 379, 1

Descensus vel Ascensus rectilinei spatia descrip-
ta, tempora descriptionum & velocitates ac-

quiditæ conferuntur, posita cujuscunque ge-
neris vi centripetæ I, Sect. 1.
Descensus & Ascensus corporum in Mediis res-
sistentibus II, 3, 8, 9, 40, 13, 14

E.

Ellipsis

qua lege vis centripetæ tendentis ad centrum
figuræ describitur a corpore revolvente
I, 10, 64

qua lege vis centripetæ tendentis ad umbili-
cum figuræ describitur a corpore revol-
vente I, 11

F.

Fluidi definitio p. 269

Fluidorum densitas & compressio quas leges ha-
bent, ostenditur II, Sect. 5

Fluidorum per foramen in vase factum effluen-
tium determinatur motus II, 36

Fumi in camino ascensus obiter explicatur 472, 4

G.

Graduum in Meridiano Terrestris mensura exhi-
betur, & quam sit exigua inæqualitas ostendit-
ur ex Theoria III, 10

Gravitas

diversi est generis a vi Magnetica 368, 29
mutua est inter Terram & ejus partes 12, 18

ejus causa non assignatur 483, 34

datur in Planetas universos 365, 15, & per-
gendo a superficiibus Planetarum sursum

decrevit in duplicata ratione distantiarum
a centro III, 8, deorsum decrevit in sim-
plici ratione quamproxime III, 9

datur in corpora omnia, & proportionalis est
quantitati materiæ in singulis III, 7

Gravitatem esse vim illam qua Luna retinetur
in Orbe III, 4, computo accuratiori com-
probatur 430, 25

Gravitatem esse vim illam qua Planetæ primarii
& Satellites Jovis & Saturni retinentur in
Orbitis III,

H.

Hydrostaticæ principia traduntur II, Sect. 5.

Hyperbola

qua lege vis centrifugæ tendentis a figuræ cen-
tro describitur a corpore revolvente 47, 26

qua lege vis centrifugæ tendentis ab umbilico
figuræ describitur a corpore revolvente 51, 6

qua lege vis centripetæ tendentis ad umbilicum
figuræ describitur a corpore revolvente I, 12

Hypothesæ cujuscunque generis rejiciuntur ab
hac Philosophia 484, 8

L. Iner-

L
Inertia vis definitur p. 2
Jovis
distantia a Sole 361, 2
semidiameter apparet 372, 3
semidiameter vera 372, 24
attractiva vis quanta sit 370, 33
pondus corporum in ejus superficie 372, 19
densitas 372, 37
quantitas materiae 372, 22
perturbatio a Saturno quanta sit 375, 33
diameterum proportio computo exhibetur 381, 22
conversio circum axem quo tempore absolvitur 381, 25
cingulae causa subindicatur 444, 32.

L

Locus definitur, & distinguitur in absolutum & relativum 6, 12

Loca corporum in Sectionibus conicis motuum inveniuntur ad tempus assignatum 1, 52, 6

Lacus
propagatio non est instantanea 207, 5; non fit per agitationem Medii alicujus /Etheris 342, 36
velocitas in diversis Mediis diversa 1, 95
reflexio quaedam explicatur 1, 96
refractio explicatur 1, 94; non fit in puncto solum incidentiae 207, 29
inturbatio prope corporum terminos Experimentis observata 207, 8

Lunae
corporis figura computo colligitur III, 38
inde causa parafacta, cur eandem semper faciem in Terram obvertat 412, 9
& librationes explicatur III, 17
diameter mediocrius apparet 430, 12
diameter vera 430, 17
pondus corporum in ejus superficie 430, 20
densitas 430, 15
quantitas materiae 430, 19
distantia mediocrius a Terra quot continet maxima Terrae semidiametros 430, 25
quot mediocrius 431, 18
parallax maxima in longitudinem paulo major est quam parallax maxima in latitudinem 387, 8
vis ad Mare movendum quanta sit III, 37; non sentiri potest in Experimentis pendulorum, vel in Staticis aut Hydrostaticis quibusvisque 430, 1
tempus periodicum 430, 32
tempus revolutionis synodicae 398, 1
motus medius cum diurno motu Terrae col-

latus paulatim accelerari deprehenditur ab Halley 481, 16
Lunae motus & motuum inaequalitates a causis suis derivantur III, 22: p. 421 & seqq.
tardius revolvitur Luna dilatato Orbe, in perihelio Terrae; citius in aphelio, contracto Orbe III, 22: 421, 6
tardius revolvitur, dilatato Orbe, in Apogaei Syzygii cum Sole; citius in Quadraturis Apogaei, contracto Orbe 421, 1
tardius revolvitur, dilatato Orbe, in Syzygia Nodi cum Sole; citius in Quadraturis Nodi, contracto Orbe 422, 21
tardius movetur in Quadraturis suis cum Sole, citius in Syzygiis; & radio ad Terram ducto describit aream pro tempore minore in prior casu, majorem in posteriore III, 22: Inaequalitas harum Aream computatur III, 16. Orbem insuper habet magis curvum & longius a Terra recedit in prior casu, minus curvum habet Orbem & propius ad Terram accedit in posteriore III, 22. Orbis hujus figura & proportio diameterum ejus computo colligitur III, 28. Et subinde proponitur methodus inveniendi distantiam Lunae a Terra ex motu ejus horario III, 27
Apogaeum tardius movetur in Aphelio Terrae, velocius in Perihelio III, 22: 421, 21
Apogaeum ubi est in Solis Syzygiis, maxime progreditur; in Quadraturis regreditur III, 22: 422, 37
Eccentricitas maxima est in Apogaei Syzygia cum Sole, minima in Quadraturis III, 22: 422, 39
Nodi tardius moventur in Aphelio Terrae, velocius in Perihelio III, 22: 421, 21
Nodi quiescunt in Syzygiis suis cum Sole, & velocissime regrediuntur in Quadraturis III, 22. Nodorum motus & inaequalitates motuum computantur ex Theoria Gravitatis III, 30, 31, 32, 33
Inclinatio Orbis ad Eclipticam maxima est in Syzygiis Nodorum cum Sole, minima in Quadraturis 1, 66 Cor. 10. Inclinationis variationes computantur ex Theoria Gravitatis III, 34, 35
Lunatum motuum /Equationes ad usus Astronomicos p. 421 & seqq.
Motus medii Lunae
/Equatio annua 421, 4
/Equatio semestris prima 422, 1
/Equatio semestris secunda 422, 21
/Equatio centri prima 423, 20: p. 101 & seqq.
/Equatio centri secunda 424, 15
Variatio prima III, 39
Variatio secunda 425, 5

Motus

INDEX RERUM.

- Motus mediæ Apogæ**
Æquatio annua 421, 21
Æquatio semestris 421, 37
- Eccentricitatis**
Æquatio semestris 421, 37
- Motus mediæ Nodorum**
Æquatio annua 421, 21
Æquatio semestris 420, 33
- Inclinationis Orbitæ ad Eclipticam**
Æquatio semestris 420, 33
- Lunarium motuum Theoria, qua Methodo stabilienda sit per Observationes** 425, 33.
- M.**
- Magnetica vis** 22, 11; 271, 25; 368, 25;
421, 13
- Mars æstus a causis suis derivatur** III, 24, 36, 37
- Martis**
distantia a Sole 361, 1
Aphelii motus 376, 33
- Materiæ**
quantitas definitur p. 1
vis insita seu vis inertie definitur p. 2
vis impressa definitur p. 2
extensio, durities, impenetrabilitas, mobilitas, vis inertie, gravitas, qua ratione innoscunt 357, 16; 484, 10
divisibilitas nondum constat 358, 18
- Materia subtilis Cartesianorum ad examen quoddam revocatur** 193, 12
- Materia vel subtilissima Gravitate non destituitur** 368, 1
- Mechanicæ, quæ dicuntur, Potentiæ explicantur & demonstrantur** p. 14 & 15; p. 23
- Mercurii**
distantia a Sole 361, 1
Aphelii motus 376, 33
- Methodus**
Rationum primarum & ultimarum I. Sect. 1
Transmutandi figuræ in alias quæ sunt ejusdem Ordinis Analytici I. Lem. 22 pag. 79
Fluxionum II. Lem. 2 p. 124
Differentialis III. Lemm. 5 & 6 pagg. 436 & 447
Inveniendi Curvarum omnium quadraturas proximè veras 447, 8
Særitum convergentium adhibetur ad solutionem Problematum difficiliorum p. 127, 128; 102; 135; 414
- Motus quantitas definitur** p. 1
- Motus absolutus & relativus** p. 6; 7; 8; 9 ab invicem secerari possunt, exemplo demonstratur p. 10
- Motus Leges** pag. 12 & seqq.
- Motuum compositio & resolutio** p. 14
- Motus corporum congregantium post reflexionem, quali Experimento recte colligi possunt, ostenditur** 19, 21
- Motus corporum**
in Conicis sectionibus eccentricis I. Sect. 3
in Orbibus mobilibus I. Sect. 9
in Superficiebus datis & Funependulorum motus reciprocus I. Sect. 10.
- Motus corporum viribus centripetis se mutuo petentium** I. Sect. 12
- Motus corporum Minimorum, quæ viribus centripetis ad singulas Magni alicujus corporis partes tendentibus agitantur** I. Sect. 14
- Motus corporum quibus resistitur**
in ratione velocitatis II. Sect. 1
in duplicata ratione velocitatis II. Sect. 2 partim in ratione velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata II. Sect. 3
- Motus**
corporum sola vi insita progredientium in Mediis resistentibus II. 1, 2, 5, 6; 7, 11, 12; 302, 1
corporum recta ascendentium vel descendendum in Mediis resistentibus, agente vi Gravitatis uniformi II. 3, 8, 9, 40, 13, 14
corporum projectorum in Mediis resistentibus, agente vi Gravitatis uniformi II. 4, 19
corporum circumgyrantium in Mediis resistentibus II. Sect. 4
corporum Funependulorum in Mediis resistentibus II. Sect. 6
- Motus & resistentia Fluidorum** II. Sect. 7
- Motus per Fluida propagatus** II. Sect. 8
- Motus circularis seu Vorticofus Fluidorum** II. Sect. 9
- Mundus originem non habet ex causis Mechanicis** p. 482, 12.
- N.**
- Navium constructioni Propositio non inutilis** 300, 4
- O.**
- Opticarum ovalium inventio quam Cartesius celebraverat** I. 97; Cartesiani Problematis generalior solutio I. 98
- Orbitalium inventio**
quas corpora describunt, de loco dato data cum velocitate, secundum datam rectam egressa; ubi vis centripeta vel reciproce ut quadratum distantie & vis illius quantitas absoluta cognoscitur I. 17
quas corpora describunt ubi vires centripetæ sunt reciproce ut cubi distantiarum 45, 18, 118, 27; 125, 25
quas corpora viribus quibuscunque centripetis agitata describunt I. Sect. 8.
- P. Para-**

P.

Parabola, qua lege vis centripetæ tendentis ad umbilicum figuræ, describitur a corpore revolvente I, 13

Pendulorum affectiones explicantur I, 50, 51, 52, 53; II, Sect. 6.

Pendulorum isochronorum longitudines diversæ in diversis locorum Latitudinibus inter se conferuntur, tum per Observationes, tum per Theoriam Gravitatis III, 20

Philosophandi Regulae p. 357.

Planetæ

non deferuntur a Vorticibus corporeis 352, 37: 354, 25: 481, 21

Primarii

Solem cingunt 360, 7

moventur in Ellipsis umbilicum habentibus in centro Solis III, 13

radii ad Solem ductis describunt areas temporibus proportionales 361, 15; III, 13

temporibus periodicis revolvuntur quæ sunt in sesquialtera ratione distantiarum a Sole 360, 17; III, 13 & I, 15

retinentur in Orbibus suis a vi Gravitatis quæ respicit Solem, & est reciproce ut quadratum distantie ab ipsius centro III, 2, 5

Secundarii

moventur in Ellipsis umbilicum habentibus in centro Primariorum III, 22

radii ad Primarios suos ductis describunt areas temporibus proportionales 359, 3, 22: 361, 27: III, 22

temporibus periodicis revolvuntur quæ sunt in sesquialtera ratione distantiarum a Primariis suis 359, 3, 22: III, 22, & I, 15

retinentur in Orbibus suis a vi Gravitatis quæ respicit Primarios, & est reciproce ut quadratum distantie ab eorum centrâ III, 1, 3, 4, 5

Planetarum

distantie a Sole 361, 1

Orbium Aphelia & Nodi prope quiescunt III, 14

Orbes determinantur III, 15, 16

loci in Orbibus inveniuntur I, 31

densitas calori quem a Sole recipiunt, accommodatur 372, 7

conversionis diurnæ sunt æquabiles III, 17

axes sunt minores diametris quæ ad eosdem axes normaliter ducuntur III, 18

Pondera corporum

in Terram vel Solem vel Planetam quævis, paribus distantis ab eorum centrâ sunt ut quantitates materiæ in corporibus III, 6

non pendunt ab eorum formis & texturis 367: 35

in diversis Terræ regionibus inveniuntur & inter se comparantur III, 20

Problematis

Keppleri solutio per Trochoidem & per Approximationes I, 31

Vetorum de quatuor lineis, a Pappo memoratis, a Cartesio per calculum Analyticum tentati, compolitio Geometrica 70, 19

Projectilia, lapsa Media Resistentia, moveri in Parabola colligitur 47, 23: 202, 23: 236, 29

Projectilium motus in Media Resistentia II, 4, 10

Pulsuum Aeris, quibus Soni propagantur, determinantur intervalia seu latitudines II, 50: 344, 18

Hæc intervalia in aperturarum Fistularum Sonis æquari duplis latitudinibus Fistularum verosimile est 344, 26

Q.

Quadratura generalis Ovalium dari non potest per finitos terminos I, Lem. 28. p. 98

Qualitates corporum quæ ratione innotescunt & admittuntur 357, 16

Quies vera & relativa p. 6, 7, 8, 9.

R.

Resistentiæ quantitates

in Mediis non continuis II, 35

in Mediis continuis II, 38

in Mediis cujuscunque generis 301, 32

Resistentiarum Theoria confirmatur

per Experimenta Pendulorum II, 30, 31, 38.

Gen. p. 284

per Experimenta corporum cadentium II, 40,

Sch. p. 319

Resistentia Mediorum

est ut eorumdem densitas, cæteris paribus 290, 29: 291, 35: II, 33, 35, 38: 327, 14

est in duplicata ratione velocitatis corporum quibus resistitur, cæteris paribus 219, 24: 284, 33: II, 33, 35, 38: 324, 23

est in duplicata ratione diametri corporum Sphæricorum quibus resistitur, cæteris paribus 288, 4: 289, 11: II, 33, 35, 38:

Sch. p. 319

non minuitur ab actione Fluidi in partes-pollas corporis moti 312, 23

Resistentia Fluidorum duplex est: ortuque vel ab Inertia materiæ fluidæ, vel ab Elasticitate, Tenacitate & Frictione partium ejus 318, 1.

Resistentia quæ sentitur in Fluidis fere tota est prioris generis 326, 32, & minui non potest per subtilitatem partium Fluidi, manente densitate 328, 7

Resistentiæ Globi ad resistentiam Cylindri proportio, in Mediis non continuis II, 34

Qqq

Resisten-

INDEX RERUM.

Resistentia quam patitur a Fluido frustum Conicum, qua ratione fiat minima 199, 30
Resistentiæ minimæ solidum 300, 15.

S.

Satellitibus
Jovialis extimi elongatio maxima heliocentrica a centro Jovis 370, 35
Hugeniani elongatio maxima heliocentrica a centro Saturni 371, 5

Satellitum
Jovialium tempora periodica & distantia a centro Jovis 359, 12
Saturniorum tempora periodica & distantia a centro Saturni 360, 1
Jovialium & Saturniorum inæquales motus a motibus Lunæ derivari posse ostenditur III, 23

Saturni
distantia a Sole 361, 1
semidiameter apparens 371, 9
semidiameter vera 371, 14
vis attractiva quanta sit 370, 33
pondus corporum in ejus superficie 371, 19
densitas 371, 37
quantitas materiæ 371, 27
perturbatio a Jove quanta sit 375, 16
diameter apparens Annuli quo cingitur 371, 8

Sectiones Conicæ, qua lege vis centripetæ tendentis ad punctum quodcumque datum, describuntur a corporibus revolvantibus 58, 20
Sectionum Conicarum descriptio Geometrica ubi dantur Umbilici I, Sect. 4.
ubi non dantur Umbilici I, Sect. 5. ubi dantur Centra vel Aplyptoti 87, 6

Sesquuplicata ratio. definitur 31, 40

Sol

circum Planetarum omnium commune gravitatis centrum movetur III, 12
semidiameter ejus mediocris apparens 371, 12
semidiameter vera 371, 14
parallaxis ejus horizontalis 370, 33
parallaxis mensura 376, 4
vis ejus attractiva quanta sit 370, 33
pondus corporum in ejus superficie 371, 19
densitas ejus 371, 27
quantitas materiæ 371, 27
vis ejus ad perturbandos motus Lunæ 363, 35: III, 25
vis ad Mare movendum III, 36

Sonorum

natura explicatur II, 43, 47, 48, 49, 50
propagatio divergit a recto tramite 332, 9;
fit per agitationem Aeris 343, 1
velocitas computo colligitur 343, 8, paululum major esse debet Æthivo quam Hyberno tempore, per Theoriam 344, 11
gestatio fit statim ubi cessat motus corporis sonori 344, 22

augmentatio per tubos sientorophonicos 344, 32

Spatium
absolutum & relativum p. 6, 7
non est æqualiter plenum 368, 16

Sphæroidis attractio, cujus particularum vires sunt reciproce ut quadrata distantiarum 198, 21

Spiralis quæ secat radios suos omnes in angulo dato, qua lege vis centripetæ tendentis ad centrum Spiralis describi potest a corpore revolvente, ostenditur I, 9: II, 25, 16

Spiritum quandam corpora pervadentem & in corporibus latentem, ad plurima naturæ phenomenon solvenda, requiri suggeritur 484, 17

Stellarum fixarum
quies demonstratur 376, 18
radiatio & scintillatio quibus causis referendæ sint 467, 38

Stellæ Novæ nnde oriri possint 481, 5
Substantiæ rerum omnium occultæ sunt 483, 22

T.

Tempus absolutum & relativum p. 5, 7

Temporis Æquatio Astronomica per Horologium oscillatorium & Eclipses Satellitum Jovis comprobatur 7, 15

Tempora periodica corporum revolvantium in ellipsis, ubi vires centripetæ ad umbilicum tendunt I, 15

Terræ
dimensio per *Picatum* 378, 11, per *Cassinum* 378, 21, per *Norwoodum* 378, 28

signa inveniuntur, & proportio diametrorum, & mensura graduum in Meridiano III, 19, 20

altitudinis ad Æquatorem supra altitudinem ad Polos quantus sit excessus 381, 7: 387, 1

semidiameter maxima, minima & mediocris 387, 10

globus densior est quam si totus ex Aqua constaret 372, 31

globus densior est ad centrum quam ad superficiem 386, 1

molem indies augeri verosimile est 473, 18: 481, 13

axis natus III, 21
motus annuus in Orbe magno demonstratur III, 12, 13: 478, 26

Eccentricitas quanta sit 421, 15
Aphelii motus quantus sit 376, 33: 7

V.

Vacuum datur, vel spatia omnia (si dicantur esse plena) non sunt æqualiter plena 328, 18, 368, 25

Velocit;

INDEX RERUM.

Velocitas maxima quam Globus, in Medio resistente cadendo, potest acquirere II, [38](#), Cor. 1

Velocitates corporum in Sectionibus conicis motorum, ubi vires centripetæ ad umbilicum tendunt I, [16](#)

Veneris
distantia a Sole [361](#), 1
tempus periodicum [370](#), [23](#)
Aphelii motus [375](#), [33](#)

Virium compositio & resolutio p. 14

Vires attractivæ corporum
sphaericorum ex particulis quacunque legē trahentibus compositorum, expenduntur I, Sect. [12](#)
non sphaericorum ex particulis quacunque legē trahentibus compositorum, expenduntur I, Sect. [13](#)

Vires centrifugæ corporum in Æquatore Terræ quanta sit [379](#), [22](#)

Vires centripetæ definiuntur p. 1
quantitas ejus absoluta definitur p. [4](#)
quantitas acceleratrix definitur p. [4](#)
quantitas motrix definitur p. [4](#)
proportio ejus ad vim quamlibet notam, qua ratione colligenda sit, ostenditur [40](#), 1

Virium centripetarum inventio, ubi corpus in spatio non resistente, circa centrum immobile, in Orbe quocunque revolvitur I, [6](#): I, Sect. 1 & [3](#)

Viribus centripetis datis ad quodcunque punctum tendentibus, quibus Figura quævis a

corpore revolvente describi potest; dantur vires centripetæ ad aliud quodvis punctum tendentes, quibus eadem Figura eodem tempore periodico describi potest [41](#), 3

Viribus centripetis datis quibus Figura quævis describitur a corpore revolvente; dantur vires quibus Figura nova describi potest, si Ordinatio augeatur vel minuantur in ratione quacunque data, vel angulus Ordinationis utcumque mutetur, manente tempore periodico [47](#), 18

Viribus centripetis in duplicata ratione distantiarum decrecentibus, quænam Figuræ describi possunt, ostenditur [53](#), 1: [150](#), 8

Vi centripeta
quæ sit reciproce ut cubus ordinatim applicatæ tendentis ad centrum virium maxime longinquum, corpus movebitur in data quavis con sectione [45](#), 1

quæ sit ut cubus ordinatim applicatæ tendentis ad centrum virium maxime longinquum, corpus movebitur in Hyperbola [201](#), 16

Umbra Terrestris in Eclipsibus Lunæ augenda est, propter Atmosphæræ refractionem [42](#), 17

Umbrae Terrestris diametri non sunt æquales; quanta sit differentia ostenditur [387](#), 8

Undarum in aquæ stagnantis superficie proprietates, quæ sit differentia ostenditur [387](#), 8

Undarum in aquæ stagnantis superficie proprietates, quæ sit differentia ostenditur [387](#), 8

Verticem naturæ & constitutio ad examen revocatur II, Sect. [9](#): [481](#), 11

U. Hujus voculæ significatio Mathematica desinitur [30](#), 19

F. I. N. I. S.





ANALYSIS

Per Quantitatum

SERIES, FLUXIONES,

A C

DIFFERENTIALS:

CUM

Enumerationem Linearum
TERTII ORDINIS.



AMSTÆLODAMI,
SUMPTIBUS SOCIETATIS.

M. D. CCXXIII.

54.67



PRÆFATIO EDITORIS.

Traſſatus aliquot Mathematicos Viri Illuſtriſſimi D. Newtoni in lucem edimus, quorum primus & ultimus nunc primum prodeunt, reliqui vero vel à ſe vel ab aliis ante hac publici juris facti ſunt. Hæc autem Editio caſui, ſed tamen non ſine ipſius conſenſu prius impetrato, ortum acceptionem refert.

Etenim ſecundus jam agitur annus ex quo ſcrinia D. Colliſii (qui, uti notum eſt, ampliſſimum cum ſui ſeculi Mathematicis commercium habuit) meas in manus inciderunt; & in illis plurima reperi à cunctis fere totius Europæ erudiſtis ipſi communicata; & inter ea non pauca, quæ à Viro Cl. D. Newtono ſcripta fuerunt; quæ cum tantæ molis eſſent, ut ſimul Traſſatum breviusculum poſſent conficere, cæpi de iis edendis cogitare. Quum autem animadvertiſſem ſcripta ejus quæ jam in lucem prodierunt ſerme idem cum hiſce argumentum habere, haud operæ pretium me facturum, ſi typis mandarem, exiſtimavi.

Unus tamen erat brevis de Curvarum Quadratura Traſſatus adeo luculenter & concinne ſcriptus, atque ita accomodatus ad inſtituendos eos, qui nondum totam iſtam Metho-

PRÆFATIO.

dum perspectam habeant, ut abstinere non potuerim, quominus Auctoris licentiam eundem edendi peterem. Quam Ille non solum summa cum humanitate concessit; sed & insuper veniam dedit reliqua ipsius colligendi, quæ ad idem argumentum spectabant.

Hicce Tractatus, quem D. Collinsii manu exaratum comperi, inscriptus fuit De Analyfi per Æquationes Infinitas, & licet neque Auctoris nomen, neque tempus quo scriptus fuerat ullibi comparuerit; multa tamen continere ad D. Newtoni Methodos spectantia statim agnovi, uspotè Epistolarum autographo illi ad amussim respondentia, quod antea ipse D. Newtonus ad D. Oldenburgum miserat. Unde suspicabar totum ex eodem fonte emanasse; nihilo minus suspensio eram animo, usque dum inventis, inter eadem chartas, Epistolis aliquot D. Barrovii ad D. Collinsium scriptis; tres reperi ad hunc Tractatum immediate spectantes; ex quibus facile intellexi quomodo D. Collinsius eum obtinuerat.

In una Epistolarum e Collegio S. S. Tr. data 20 Julii 1669, versus finem D. Barrovius hæc scribit.

* Amicus quidam apud nos commorans, qui eximio in
 „ his rebus pollet ingenio, nudiustertius chartas quas-
 „ dam mihi tradidit, in quibus Magnitudinum dimensio-
 „ nes supputandi Methodos, Mercatoris methodo simi-
 „ les, maxime vero Generales, descripsit, simulque Æ-
 „ qua-

* A Friend of mine here, that hath an excellent Genius to these things, brought me the other Day, some Papers, wherein he hath set down Methods of Calculating the Dimensions of Magnitudes, like that of Mr. Mercator, but very general, as also of Resolving Equations, which I suppose will please you, and I shall send you them by the next.

„ quationes resolvendi, quæ, ut opinor, tibi place-
 „ bunt, quas una cum proximis literis ad te mittam.

*In hac Epistola narrat argumentum chartarum Amici
 sui fuisse Computationem dimensionum Magnitudinum, &
 Æquationum resolutionem, quod cum Tractatus hujus argu-
 mento quadrat.*

*Versus finem alterius Epistolæ ad D. Collinsium e Col-
 legio S. S. Tr. data ult. Julii 1669, D. Barrovius ita scribit.*

† Mitto quas pollicitus eram Amici chartas, quæ uti
 „ spero haud parum te oblectabunt. Remittas, quæso,
 „ quum eas quantum tibi visum fuerit perlegeris; id enim
 „ postulavit Amicus meus, cum primum eum rogavi, ut
 „ eas tecum communicare mihi liceret. Quantocyus igi-
 „ tur, obsecro, te eas recepisse fac me certiozem, quod
 „ illis metuo, quippe qui eas per Veredarium publicum
 „ ad te mittere non dubitaverim, quo tibi morem gere-
 „ rem quam citissime.

*Ex hac Epistola constat D. Barrovium dictum Librum mi-
 sisse, ea lege, ut sibi remitteretur. Unde manifestum est,
 quare Tractatus, quem inveni, D. Collinsii manu scriptus
 fuit, autographo nempe ipsi Auctori restituto.*

In tertia a D. Barrovio ad D. Collinsium Epistola da-

a 3

ta

† I send you the Papers of my Friend I promis'd, which I presume will give you much satis-
 faction; I pray, having perus'd them so much as you think good, remand them to me, accord-
 ing to his desire when I ask'd him the liberty to impart them to you; I pray give me notice of
 your receiving them, with your soonest convenience, that I may be satisfied of their reception;
 because I am afraid of them, venturing them by the Post, that I may not longer delay to cor-
 respond with your desire.

P R Æ F A T I O.

ta 20 Augusti 1669, constat D. Newtonum fuisse, Amicum illum, de quo D. Barrovius in duabus prioribus Epistolis mentionem fecerat, quod his verbis consignat.

* Amici chartas tibi placuisse gaudeo; est illi nomen „ *Newtonus*, Collegii nostri Socius, & juvenis, (secundus enim, ex quo Artium Magistri gradum cepit, jam „ agitur annus,) & qui, eximio quo est acumine, per „ magnos in hac re progressus fecit. Illas, si vis, cum „ Nobili Domino Vicecomite *Brounkero* communica.

Perspecto jam D. Newtonum hujus Tractatus Auctorem esse; ab eo sciscitatus sum num penes se adhuc esset autographum, quod quidem ille exquirens invenit, & mihi tradidit, cum exemplari Collinsiano ad verbum usque conveniens.

Etiam si vero hic Tractatus ad D. Collinsium missus fuisset mense Julii 1669, quod aliquantulum erat posteaquam D. Mercator Logarithmotechniam suam in lucem ediderat; manifestum est ex quibusdam aliis Epistolis, (quæ itidem inter D. Collinsii chartas fuerunt,) quod antea scriptus esset, imo quod D. Newtonus invenisset Methodum investigandi Magnitudinum Dimensiones per Infinitas Series vel aliquot annos antequam D. Mercator Librum suum in vulgus edidit; ut liquet ex Epistola a Collinsio ad D. Jacobum Gregorium data 25. Novemb. 1669, ubi hæc sunt verba.

* *Bar-*

* I am glad my Friend's Paper gives you so much satisfaction: his Name is Mr. *Newton*, a Fellow of our College, and very young, (being but the second Year Master of Arts,) but of an extraordinary Genius and Proficiency in these things; you may impart the Papers, if you please, to my Lord *Brouncker*.

P R Æ F A T I O.

* *Barrovius* Provinciam suam Publice prælegendi remi-
fit cuidam nomine *Newtono Cantabrigiensi*, quem tan-
quam Virum acutissimi ingenii, in Præfatione Prælec-
tionum Opticarum memorat, & qui, antequam
ederetur *Mercatoris* Logarithmotechnia, Methodum
invenerat eandem, camque ad omnes Curvas generali-
ter, & ad Circulum diversimode applicârat.

Quinetiam D. Collinſius in Epistola ad D. Strode, data
26. Julii 1672, sic scribit.

† Mense *Septembri* 1668, *Mercator* Logarithmotech-
niam edidit suam, quæ specimen hujus Methodi (i. e.
Serierum Infinitarum) in unica tantum Figura, nempe,
Quadratura Hyperbolæ continet. Haud multo post-
quam in publicum prodiret liber, exemplar unum Cl.
Wallisio Oxoniam misi, qui suum de eo judicium in *Ac-
tis Philosophicis* statim fecit: alterum *Barrovio Canta-
brigiam*, qui quasdam *Newtoni* chartas, qui jam *Bar-
rovium* in Mathematicis Prælectionibus publicis excipit,
extemplo remisit: Ex quibus & aliis, quæ olim ab
,, Auc-

* Mr. Barrow hath resign'd his Lecture's Place to one Mr. Newton of Cambridge, whom he mentions in his Optic Preface as a very ingenious Person; one who hath, before Mr. Mercator's Logarithmotechnia was extant, invented the same Method, and applied it generally to all Curves, and divers ways to the Circle.

† In September 1668. Mr. Mercator publish'd his Logarithmotechnia, containing a Specimen of this Method, (that is, of Infinite Series) in one only Figure, to wit in the Quadrature of the Hyperbola. Not long after the Book came out, I sent one of them to Dr. Wallis at Oxford, who forthwith gave his sense of it in the Philos. Transactions: another of them I sent to Dr. Barrow at Cambridge, who forthwith sent me up some Papers of Mr. Newton, who is since become the Doctor's Successor in the Mathematical Lectures there. By which, and former communications made thereof from the Author to the Doctor, it appears that the said Method was invented some Years before by the said Mr. Newton, and generally applied: so that thereby in any Curvilinear Figure propos'd, that is determin'd by one or more common Properties, by the same Method. may be obtain'd the Quadrature or Area of the said Figure, accurately when it can be done, but always infinitely near; the Evolution, or Length of the said Curve Line; the Centre of the Figure; its round Solids made by Rotation, and their Surfaces; and all perform'd without any Extraction of Roots.

P R Æ F A T I O.

„ Auctore cum *Barrovia* communicata fuerant, patet il-
 „ lam Methodum a dicto *Newtono* aliquot annis ante ex-
 „ cogitatam, & modo generali applicatam fuisse: ita ut
 „ ejus ope in quavis Figura Curvilinea proposita, quæ
 „ una vel pluribus Proprietatibus definitur, Quadratura
 „ vel Area dictæ Figuræ, accurata si possibile sit, sin mi-
 „ nus infinite propinqua; Evolutio vel Longitudo lineæ
 „ Curvæ; Centrum gravitatis Figuræ; Solida ejus rota-
 „ tione genita, & eorum Superficies; sine ulla Radicum
 „ Extractione obtineri queant.

*Ubi obiter notemus in hac Collinsii historiola, methodum
 argumentandi usurpatam a D. Newtono in Tractatu suo De
 Quadratura Curvarum, quasi digito monstrari, dum dicit
 hanc Methodum exhibere Quadraturam Figurarum accura-
 tam, si modo fieri possit, sin minus in infinitum approximan-
 tem, atque ista omnia fieri sine ulla Extractione Radicum;
 Hæc enim ipsa est argumentatio in dicto Tractatu observata:
 Et propterea hanc Methodum saltem Anno 1672 coætaneam
 extitisse non est dubitandum.*

*Inveni etiam in exemplari Epistolæ, à D. Collinsio ad
 D. Davidem Gregorium prædicti Jacobi fratrem, datæ 11
 Aug. 1676, præter eadem fere quæ D. Strobe scripserat,
 etiam verba sequentia.*

* „ Supradicta Serierum Infinitarum doctrina, a *Newtono*
 „ biennium ante excogitata fuit, quam ederetur *Mercato-
 ris*

* The said Doctrine of Infinite Series was invented by Mr. *Newton*, about two Years before
 the Publication of Mr. *Mercator's* Logarithmotechnia, and generally applied to all Curves.

P R Æ F A T I O.

„ *ris* Logarithmotechnia, & generaliter omnibus Figuris
„ applicata.

Simulque affirmat se olim cum quibusdam Academicis Parisiensibus hæc eadem scripto communicasse.

Quapropter, cum D. Mercator Librum suum Anno 1668 in lucem ediderit, sequitur eandem Doctrinam Infinitarum Serierum Figuris omnibus generaliter applicatam fuisse Anno 1666.

Denique in Epistola, circa idem tempus ad D. Oldenburgum scripta, asserit Collinsius, Jacobum Gregorium non nisi conspecta aliqua e Seriebus Newtoni, quam illi imperierat, in eandem Serierum Methodum incidisse.

Ex Newtoni autem Schedis quibusdam a me visis intellexi, quod is Quadraturam Circuli, Hyperbolæ, & aliarum quarundam Curvarum per Series Infinitas ex Wallisii nostri Arithmetica Infinitorum, per Interpolationem Serierum ejus, primo deduxit, idque Anno 1665; deinde Methodum excogitavit easdem Series per Divisiones & Extractiones Radicum inveniendi, quam Anno sequente generalem reddidit.

Es cum scriptus fuerit hic Tractatus, quo tempore hæc recens inventa essent, ideo Cl. Auctor dignatus est multa in eo dilucidare, ad Resolutionem Aequationum per Infinitas Series spectantia, quæ in aliis Libris frustra queras.

His subjunximus diversa Epistolarum Auctoris fragmenta, quæ ad easdem Doctrinas pertinent, quæque olim inter Cl.

b

Wal-

P R Æ F A T I O.

Wallisii Opera in lucem prodire. Epistolas haud dedi integras, ut evitarem repetitionem non necessariam multarum rerum, quæ supra in Tractatu De Analyfi per Equationes Infinitas traditæ sunt: Quinimo Exempla quædam in iis Epistolis prætermisi ipsius Cl. Auctoris monitu; Regulas suas per se satis claras esse credentis, neque ullam dilucidationem desiderare.

Inter D. Collinsii schedas reperi autographum Epistolæ datæ 8. Novemb. 1676, cujus fragmentum sub finem adjeci, & dignum luce putavi; quoniam in eo memoratur solutio Problematis admodum generalis in Comparatione Curvarum usus, quæ perficitur in Cor. 2. Prop. 10. Tract. De Quadratura Curvarum: Unde Lector intelligat solutionem illam Auctori jam tum innotuisse.

Hiscæ Fragmentis annexus est ille ipse Tractatus De Quadratura Curvarum; una cum altero De Enumeratione Linearum Tertii Ordinis; quorum uterque primum typis mandatus est Anno 1704, ad finem Optices eximie ejusdem Cl. Auctoris.

Coronidis loco subjicitur Tractatulus, cui titulo est, Methodus Differentialis, quem Cl. Auctoris permisso ex ejus autographo descripsi; Complectitur autem Doctrinam describendi Curvas ex datis Differentiis differentiarum Ordinarum. Hæc Methodus Differentialis innititur Problemati ducendi Curvam Parabolici generis per data quocunque puncta; de quo Cl. Auctor olim mentionem fecerat in Epistola sua ad D. Oldenburgum 1676 missa; & cujus solutionem dedit in Lem. 5. Lib. 3. Princip. Philos. non tamen prorsus eandem quoad

P R Æ F A T I O.

quoad Constructionem cum ea quam impræsentiarum tradimus.

Hujus Geometriæ Newtonianæ non minimam esse laudem duco, quod dum per limites Rationum Primarum & Ultimarum argumentatur, æque demonstrationibus Apodicticis ac illa Veterum munitur; utpote quæ haud innititur duriuscule illi Hypothesi quantitatum Infinite parvarum vel Indivisibilium, quarum Evanescentia obstat quominus eas tanquam quantitates speculemur. Neque parum præcellere videtur, quod tam paucis innixa Propositionibus tam late sese extendat hæc Mathesis, intra se omnia Problemata difficiliora vulgaris Methodos eludentia complectens; siquidem quicquid proponitur poterit Geometrice per alicujus Curvæ Aream effingi; vel per Methodum Universalem Extrahendi Radices ex Æquatione quavis erui; vel ad summum, ducendo Curvam per terminos quantitatum datarum solvi.

W. JONES.

INDEX

INDEX OPUSCULORUM

Quae in hoc Libro continentur.

	<i>Pag.</i>
D E Analyfi per <i>Æquationes Infinitas</i>	1
<i>Fragmenta</i>	
<i>Epiftolarum.</i> { <i>Ad D. Oldenburgum</i> 12 Jun. 1676.	23
{ <i>Ad D. Oldenburgum</i> 24 Octob. 1676.	32
{ <i>Ad D. Wallifium Anno</i> 1692.	35
{ <i>Ad D. Collinfium</i> Nov. 8. 1676.	39
De Quadratura Curvarum.	41
Enumeratio Linearum Tertii Ordinis.	71
Methodus Differentialis.	99




DE ANALYSI

Per Aequationes Numero Terminorum

INFINITAS.

Methodum generalem quam de Curvarum quantitate per Infinitam terminorum Seriem mensuranda, olim excogitaveram, in sequentibus breviter explicatam potius quam accuratè demonstratam habes.

BASI AB Curvæ alicujus AD, sit Applicata BD perpendicularis: Et vocetur $AB = x$, $BD = y$, & sint a, b, c , &c. Quantitates datæ, & m, n , Nûmeri Integri. Deinde,



Curvarum Simplicium Quadratura.

REGULA I.

Si $ax^{\frac{m}{n}} = y$; Erit $\frac{ax^{\frac{m}{n}}}{\frac{m}{n}} \times \frac{m+1}{n} = \text{Area ABD.}$

A

Res

Res Exemplo patebit.

1. Si $x' (=1x^1) = y$, hoc est, $a=1=n$, & $m=2$; Erit $\frac{1}{2}x^1 = ABD$.

2. Si $\frac{1}{4}x^1 (=4x^1) = y$; Erit $\frac{1}{4}x^1 (=1\frac{1}{4}x^1) = ABD$.


3. Si $\frac{1}{2}x^1 (=x^1) = y$; Erit $\frac{1}{2}x^1 (=1\frac{1}{2}x^1) = ABD$.

4. Si $\frac{1}{n}x^1 (=x^1) = y$, id est, si $a=1=n$, & $m=-2$;

Erit $(-\frac{1}{2}x^1) = -x^1 (= -\frac{1}{2}) = aBD$,
infinite versus a protensa, quam Calculus
ponit negativam, propterea quod jacet ex al-
tera parte Lineæ BD.

5. Si $\frac{1}{\sqrt{n}}x^1 (=x^1) = y$; Erit $(-\frac{1}{2}x^1) = \frac{1}{\sqrt{n}}$
 $= BDa$.

6. Si $\frac{1}{x} (=x^{-1}) = y$; Erit $\frac{1}{2}x^1 = \frac{1}{2}x^1 =$
 $\frac{1}{2}x^1 = \frac{1}{2}$ Infinitæ, qualis est Area Hyperbo-
læ ex utraque parte Lineæ BD.

*Compositarum Curvarum Quadratura ex Simplicibus.*

REGULA II.

*Si valor ipsius y ex pluribus istiusmodi Terminis componitur,
Area etiam componetur ex Areis quæ a singulis Terminis
emanant.*


Exempla Prima.

— Si $x^1 + x^1 = y$; Erit $\frac{1}{2}x^1 + \frac{1}{2}x^1 = ABD$.

Etenim si semper sit $x^1 = BF$, & $x^1 = FD$,
erit, ex præcedente Regula, $\frac{1}{2}x^1 =$ superficiæ
AFB descriptæ per Lineam BF, & $\frac{1}{2}x^1 =$
AFD descriptæ per DF; Quare $\frac{1}{2}x^1 + \frac{1}{2}x^1 =$
toti ABD.

Sic si $x^1 - x^1 = y$; Erit $\frac{1}{2}x^1 - \frac{1}{2}x^1 = ABD$.

Et si $3x^1 - (2x^1 + x^1) = 5x^1 = y$; Erit
 $\frac{3}{5}x^1 - \frac{2}{5}x^1 + \frac{1}{5}x^1 = ABD$.




Ex-


Exempla Secunda.

Si $x^{-1} + x^{-1} = y$; Erit $-x^{-1} - 2x^{-1} = aBD$. Vel si $x^{-1} - x^{-1} = y$; Erit $-x^{-1} + 2x^{-1} = aBD$.

Quarum signa si mutaveris habebis Affirmativum valorem ($x^{-1} + 2x^{-1}$ vel $x^{-1} - 2x^{-1}$) superficiæ aBD , modo tota cadat supra basim ABa .




Sin aliqua pars cadat infra (quod fit cum Curva decussat suam Basim inter B & a , ut hic vides in δ), ista parte a parte superiori subducta, habebis valorem Differentiæ: Earum vero Summam si cupis, quære utramque Superficiem seorsim, & adde. Quod idem in reliquis hujus Regulæ exemplis notandum volo.



Exempla Tertia.

Si $x^v + x^{-v} = y$; Erit $ix^v - x^{-v} =$ Superficiæ descriptæ. Sed hic notandum est, quod dictæ Superficiæ partes sic inventæ jacent ex diverso latere Lineæ BD.

Nempe, posito $x^v = BF$, & $x^{-v} = FD$; Erit $ix^v = ABF$ Superficiæ per BF descriptæ, & $-x^{-v} = DFa$ Superficiæ descriptæ per DF.



Et hoc semper accidit cum Indices ($\frac{m}{n}$) rationum Basis x in valore Superficiæ quæsitæ, sint variis Signis affecti. In hujusmodi Casibus;

fibis, pars aliqua $BD\delta\beta$ Superficie media (quæ sola dari poterit, cum Superficies sit utrinque infinita) sic invenitur.

Subtrahe Superficiem ad minorem Basin $A\beta$ pertinentem, a Superficie ad majorem Basin AB pertinente, & habebis $\beta BD\delta$ Superficiem differentiae Basium insistentem. Sic in hoc Exemplo. (Vide Fig. Precedentem.)

Si $AB = 2$, & $A\beta = 1$; Erit $\beta BD\delta = 1$.

Etenim Superficies ad AB pertinens (viz. $ABF - DF\alpha$) erit $\frac{1}{2}$; five $\frac{1}{2}$; & superficies ad $A\beta$ pertinens (viz. $A\phi\beta - \delta\phi\alpha$) erit $\frac{1}{2}$; five $\frac{1}{2}$; & earum differentia (viz. $ABF - DF\alpha - A\phi\beta + \delta\phi\alpha = \beta BD\delta$) erit $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ five 1 .


Eodem modo, si $A\beta = 1$, $AB = x$; Erit $\beta BD\delta = 1 + \frac{1}{x} - x$.

Sic si $2x^2 - 3x^3 - \frac{1}{x^2} + x^4 = y$, & $A\beta = 1$;

Erit $\beta BD\delta = 1x^2 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^5}$.

Denique notari poterit quod si quantitas x^{-1} in valore ipsius y reperiatur, iste Terminus (cum Hyperbolicam superficiem generat) seorsim a reliquis considerandus est.

Ut si $x^2 + x^{-1} + x^{-2} = y$; Sit $x^{-1} = BF$, & $x^2 + x^{-1} = FD$, ac $A\beta = 1$; Et erit $\delta\phi FD = \frac{1}{2} + \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^2}$, utpote quæ ex Terminis $x^2 + x^{-1}$ generatur.



Quare, si reliqua Superficies $\beta\phi FB$, quæ Hyperbolica est, ex Calculo aliquo sit data, dabitur tota $\beta BD\delta$.

Aliarum

Aliarum Omnium Quadratura.

REGULA III.

Sin valor ipsius y, vel aliquis ejus Terminus sit precedentibus magis compositus, in Terminos Simpliciores reducendus est; operando in Literis ad eundem Modum quo Arithmetici in Numeris Decimalibus dividunt, Radices extrahunt, vel affectas Æquationes solvunt; & ex istis Terminis questam Curvæ Superficiem. per præcedentes Regulas deinceps elicies.


Exempla Dividendo.

Sit $\frac{aa}{b+x} = y$; Curva nempe existente Hyperbola.

Jam ut Æquatio ista a Denominatore suo liberetur, Divisionem sic instituo.

$$b+x) aa + 0 \left(\frac{aa}{b} - \frac{aax}{b^2} + \frac{aa^2x}{b^3} - \frac{aa^3x^2}{b^4} \right. \&c.$$

$$\begin{array}{r} aa + \frac{aax}{b} \\ \hline 0 - \frac{aax}{b} + 0 \\ \hline - \frac{aax}{b} - \frac{aa^2x^2}{b^2} \\ \hline 0 + \frac{aa^2x^2}{b^2} + 0 \\ \hline + \frac{aa^2x^2}{b^2} + \frac{aa^3x^3}{b^3} \\ \hline 0 - \frac{aa^3x^3}{b^3} + 0 \\ \hline - \frac{aa^3x^3}{b^3} - \frac{aa^4x^4}{b^4} \\ \hline 0 + \frac{aa^4x^4}{b^4} \\ \hline \&c. \end{array}$$



Et sic vice hujus $y = \frac{aa}{b+x}$, nova prodit $y = \frac{aa}{b} - \frac{aax}{b^2} + \frac{aa^2x}{b^3} - \frac{aa^3x^2}{b^4}$, &c.
erie istac infinite continuata; Adeoque (per Regulam Secundam)
A₃ Area

Area quasita ABDC æqualis erit ipsi $\frac{ax}{b} - \frac{ax^2}{2b^2} + \frac{ax^3}{3b^3} - \frac{ax^4}{4b^4}$ &c. infinitæ etiam seriei; cujus tamen Termini pauci initiales sunt in usum quemvis satis exacti, si modo x sit aliquoties minor quam b .

Eodem modo, si sit $\frac{x}{1-x} = y$, Dividendo prodibit $y = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4$ &c. Unde (per Regulam Secundam) erit ABDC $= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5$ &c.

Vel si Terminus xx ponatur in divifore primus, hoc modo $xx + 1$, prodibit $x^{-2} - x^{-4} + x^{-6} - x^{-8}$ &c. pro valore ipsius y ; Unde (per Regulam Secundam) erit BDa $= -x^{-1} + \frac{1}{3}x^{-3} - \frac{1}{5}x^{-5} + \frac{1}{7}x^{-7}$ &c. Priori modo procedit cum x est satis parva, posteriori cum satis magna supponitur.

Denique si $\frac{2x^2 - x^3}{1 - x^2 - 3x} = y$; Dividendo prodit $2x^2 = 2x + 7x^2 - 13x^3 + 34x^4$ &c. unde erit ABDC $= \frac{2}{3}x^3 - x^2 + \frac{11}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^4$ &c.

Exempla Radicem Extrahendo.

Si sit $\sqrt{aa+xx} = y$, Radicem sic extraho,

$$aa + xx \left(a + \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} \right) \&c.$$

$$\frac{aa}{0} + \frac{xx}{xx}$$

$$\frac{xx + \frac{x^3}{2a}}{aa}$$

$$0 - \frac{x^3}{2a}$$


$$- \frac{x^4}{2a^2} - \frac{x^5}{2a^3} + \frac{x^6}{2a^4}$$

$$0 + \frac{x^4}{2a^2} - \frac{x^5}{2a^3} + \frac{x^6}{2a^4}$$

$$+ \frac{x^4}{2a^2} + \frac{x^5}{16a^4} - \frac{x^6}{64a^6} + \frac{x^7}{256a^8}$$

$$0 - \frac{x^4}{64a^4} + \frac{x^5}{64a^5} - \frac{x^6}{256a^6}$$

$$\&c.$$




Unde

Unde, pro Æquatione $\sqrt{ax+bx^2}=y$, nova producitur, viz.
 $y = a + \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{16a^3} + \frac{x^6}{128a^5} - \frac{5x^8}{1312a^7} \&c.$ Et (per Reg. 2.) Area quæsitæ
 ABDC erit $= ax + \frac{x^3}{6a} - \frac{x^5}{40a^3} + \frac{x^7}{1152a^5} - \frac{5x^9}{1312a^7} \&c.$ Et hæc est Quadratura
 Hyperbolæ.


Eodem modo, si fit $\sqrt{a-x}=y$, ejus Radix erit
 $a - \frac{x}{2a} - \frac{x^2}{8a^2} - \frac{x^3}{16a^3} - \frac{5x^4}{1312a^4} \&c.$

Adeoquæ Area quæsitæ ABDC erit
 æqualis $ax - \frac{x^2}{6a} - \frac{x^3}{40a^2} - \frac{x^4}{1152a^3} - \frac{5x^5}{1312a^4} \&c.$
 Et hæc est Quadratura Circuli.



Vel si ponas $\sqrt{x-x^2}=y$; erit Radix æqualis infinitæ seriei.

$x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}} + \frac{5}{128}x^{\frac{9}{2}} \&c.$
 Et Area quæsitæ ABD æqualis erit
 $\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{128}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{2048}x^{\frac{7}{2}} + \frac{5}{65536}x^{\frac{9}{2}} \&c.$
 five $x^{\frac{1}{2}}$ in $\frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{1}{128}x^4 + \frac{5}{2048}x^5 \&c.$
 Et hæc est Areæ Circuli Quadratura.



Si $\frac{\sqrt{1+ax^2}}{\sqrt{1-bx^2}}=y$, (Cujus Quadratura dat Longitudinem curvæ Ellipticæ;) Extrahendo radicem utramque prodit

$$\frac{1 + \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{8}a^2x^4 + \frac{1}{16}a^3x^6 - \frac{5}{128}a^4x^8}{1 - \frac{1}{2}bx^2 - \frac{1}{8}b^2x^4 - \frac{1}{16}b^3x^6 - \frac{5}{128}b^4x^8} \&c.$$

Et Dividendo, sicut fit in Fræctionibus Decimalibus, habes

$$\begin{aligned} &1 + \frac{1}{2}bx^2 + \frac{1}{8}b^2x^4 + \frac{1}{16}b^3x^6 + \frac{5}{128}b^4x^8 \&c. \\ &+ \frac{1}{2}ba + \frac{1}{8}ab + \frac{1}{16}ab^2 + \frac{5}{128}ab^3 \\ &- \frac{1}{8}a^2 - \frac{1}{16}a^2b - \frac{5}{128}a^2b^2 \\ &+ \frac{1}{16}a^3 + \frac{5}{128}a^3b \\ &- \frac{5}{128}a^4 \end{aligned}$$

Adeoquæ Aream quæsitam $x + \frac{1}{2}bx^3 + \frac{1}{8}b^2x^5 \&c.$
 $+ \frac{1}{2}a + \frac{1}{8}ab$
 $- \frac{1}{8}a^2$

Sed observandum est, quod Operatio non raro abbreviatur per de-
 bitam

bitam Æquationis præparationem, ut in allato Exemplo $\frac{\sqrt{1+ax}}{\sqrt{1-ax}} = y$,
 Si utramque partem fractionis per $\sqrt{1-ax}$ multiplices prodibit

$\frac{\sqrt{1+ax} \cdot \sqrt{1-ax}}{\sqrt{1-ax} \cdot \sqrt{1-ax}} = y$, & reliquum opus perficitur extrahendo Radicem
 Numeratoris tantum, & dividendo per Denominatorem.

Ex hisce, credo, satis patebit modus reducendi quemlibet valo-
 rem ipsius y (quibuscumque Radicibus vel Denominatoribus sit
 perplexus, ut hic videre est;

$$x^1 + \frac{\sqrt{x - \sqrt{1-x^2}}}{\sqrt{ax^2+bx}} - \frac{\sqrt{ax^2+bx} - x^1}{\sqrt{x^2 - \sqrt{1-x^2}}} = y) \text{ in series Infinitas}$$

simplicium Terminorum, ex quibus, per Regulam Secundam, quæ-
 sita Superficies cognoscetur.

Exempla per Resolutionem Æquationum.

NUMERALIS ÆQUATIONUM AFFECTARUM RESOLUTIO

Quia tota difficultas in Resolutione latet, modum quo ego u-
 tor in Æquatione Numerali primum illustrabo.

Sit $y^1 - 2y - 5 = 0$, resolvenda: Et sit 2, numerus qui minus
 quam decima sui parte distat a Radice quæsitâ. Tum pono $2 +$
 $p = y$, & substituo hunc ipsi valorem in Æquationem, & inde
 nova prodit $p^1 + 6p + 10p - 1 = 0$, cujus Radix p exquirenda
 est, ut quotienti addatur: Nempe (neglectis $p^1 + 6p$ ob parvi-
 tatem) $10p - 1 = 0$, sive $p = 0,1$ prope veritatem est; itaque scri-
 bo 0,1 in quotiente, & suppono 0,1 + $q = p$, & hunc ejus va-
 lorem, ut prius substituo, unde prodit $q^1 + 6,3q + 11,23q + 0,061$
 $= 0$.

Et cum $11,23q + 0,061$ veritati prope accedit, sive fere sit q æ-
 qualis $-0,0054$ (dividendo nempe donec tot eliciantur Figuræ
 quot locis primæ Figuræ hujus & principalis quotientis exclusive
 distant) scribo $-0,0054$ in inferiori parte quotientis, cum nega-
 tiva sit.

Et supponens $-0,0054 + r = q$, hunc ut prius substituo, & o-
 perationem sic produco quo usque placuerit. Verum si ad bis tot
 figuras

figuras tantum quot in Quotiente jam reperiuntur una dempta, operam continuare cupiam, pro q substituo $-0,0054+r$ in hanc $6,3q^3 + 11,23q + 0,061$, scilicet primo ejus termino (q^3) propter exilitatem

$y^3 - 2y - 5 = 0$		$+ 2,10000000$ $- 0,00544853$ $+ 2,09455147 = y$
$2 + p = y$	$+ y^3$	$+ 8 + 12p + 6p^2 + p^3$
	$+ 2y$	$- 4 - 2p$
	$- 5$	$- 5$
	Summa	$- 1 + 10p + 6p^2 + p^3$
$0,1 + q = p$	$+ p^3$	$+ 0,001 + 0,03q + 0,3q^2 + q^3$
	$+ 6p^2$	$+ 0,06 + 1,2 + 6,0$
	$+ 10p$	$+ 1, + 10,$
	$- 1$	$- 1,$
	Summa	$+ 0,061 + 11,23q + 6,3q^2 + q^3$
$-0,0054 + r = q$	$+ 6,3q^3$	$+ 0,000183708 - 0,06804r + 6,3r^2$
	$+ 11,23q$	$- 0,060642 + 11,23$
	$+ 0,061$	$+ 0,061$
	Summa	$+ 0,000541708 + 11,16196r + 6,3r^2$
$-0,00004854 + s = r$		

suam neglecto, & prodit $6,3r^2 + 11,16196r + 0,000541708 = 0$ fere, five (rejectione $6,3r^2$) $r = \frac{-0,000541708}{11,16196} = -0,00004853$ fere, quam scribo in negativa parte Quotientis. Denique negativam partem Quotientis ab Affirmativa subducens habeo $2,09455147$ Quotientem quasi-tam.

Æquationes plurium dimensionum nihilo secius resolvuntur, & operam sub fine, ut hic factum fuit, levabis, si primos ejus terminos gradatim omiseris.

Præterea notandum est quod in hoc exemplo, si dubitarem an $0,1 = p$ veritati satis accederet, pro $10p - 1 = 0$, hinxissem $6p^3 + 10p - 1 = 0$, & ejus radices primam figuram in Quotiente scripsissem, & secundam vel tertiam Quotientis figuram sic explorare convenit, ubi in Æquatione ista ultimo relultante quadratum coefficientis penultimi termini, non sit decies majus quam factus ex ultimo termino ducto in coefficientem termini antepenultimi.

bitam *Æquationis* præparationem, ut in allato Exemplo $\frac{\sqrt{1+ax}}{\sqrt{1-ax}} = y$,
Si utramque partem fractionis per $\sqrt{1-ax}$ multiplices prodebit

$\frac{\sqrt{1+ax+ax^2+ax^3}}{1-ax} = y$, & reliquum opus perficitur extrahendo Radicem
Numeratoris tantum, & dividendo per Denominatorem.

Ex hisce, credo, satis patebit modus reducendi quemlibet valorem ipsius y (quibuscumque Radicibus vel Denominatoribus sit perplexus, ut hic videre est;

$$x^1 + \frac{\sqrt{x-\sqrt{1-2x}}}{\sqrt{ax^2+1}} - \frac{\sqrt{x^2+2x-x^2}}{\sqrt{x+2x}} = y \text{ in series Infinitas}$$

simplicium Terminorum, ex quibus, per Regulam Secundam, quæ-
sita Superficies cognoscetur.

Exempla per Resolutionem Æquationum.

NUMERALIS ÆQUATIONUM AFFECTARUM RESOLUTIO

Quia tota difficultas in Resolutione latet, modum quo ego u-
tor in *Æquatione* Numerali primum illustrabo.

Sit $y^1 - 2y - 5 = 0$, resolvenda: Et sit z , numerus qui minus
quam decima sui parte differt a Radice quæsitâ. Tum pono $z +$
 $p = y$, & substituo hunc ipsi valorem in *Æquatione*, & inde
nova prodit $p^1 + 6p^2 + 10p - 1 = 0$, cujus Radix p exquirenda
est, ut quotienti addatur: Nempe (neglectis $p^1 + 6p^2$ ob parvi-
tatem) $10p - 1 = 0$, sive $p = 0,1$ prope veritatem est; itaque scri-
bo 0,1 in quotiente, & suppono 0,1 + $q = p$, & hunc ejus va-
lorem, ut prius substituo, unde prodit $q^1 + 6,3q^2 + 11,23q + 0,061$
 $= 0$.

Et cum $11,23q + 0,061$ veritati prope accedit, sive fere sit q æ-
qualis $-0,0054$ (dividendo nempe donec tot eliciantur Figuræ
quot locis primæ Figuræ hujus & principalis quotientis exclusive
distant) scribo $-0,0054$ in inferiori parte quotientis, cum nega-
tiva sit.

Et supponens $-0,0054 + r = q$, hunc ut prius substituo, & o-
perationem sic produco quo usque placuerit. Verum si ad bis tot
figuras

figuras tantum quot in Quotiente jam reperiuntur una dempta, operam continuare cupiam, pro q substituo $-0,0054 + r$ in hanc $6,3q^3 + 11,23q + 0,061$, scilicet primo ejus termino (q^3) propter exilitatem

$y' - 2y - 5 = 0$		$+ 2,10000000$
		$- 0,00544853$
		$+ 2,09455147 = y$
$2 + p = y$	$+ y^3$	$+ 8 + 12p + 6p^2 + p^3$
	$+ 2y$	$- 4 - 2p$
	$- 5$	$- 5$
	Summa	$- 1 + 10p + 6p^2 + p^3$
$0,1 + q = i$	$+ p^3$	$+ 0,001 + 0,03q + 0,3q^2 + q^3$
	$+ 6p^2$	$+ 0,06 + 1,2 + 6,0$
	$+ 10p$	$+ 1, + 10,$
	$- 1$	$- 1,$
	Summa	$+ 0,061 + 11,23q + 6,3q^2 + q^3$
$- 0,0054 + r = q$	$+ 6,3q^3$	$+ 0,000183708 - 0,06804r + 6,3r^3$
	$+ 11,23q$	$- 0,060642 + 11,23$
	$+ 0,061$	$+ 0,061$
	Summa	$+ 0,000541708 + 11,16196r + 6,3r^3$
$- 0,00004854 + s = r$		

suam neglecto, & prodit $6,3r^3 + 11,16196r + 0,000541708 = 0$ fere, sive (rejectione $6,3r^3$) $r = \frac{-0,000541708}{11,16196} = -0,00004853$ fere, quam scribo in negativa parte Quotientis. Denique negativam partem Quotientis ab Affirmativa subducens habeo $2,09455147$ Quotientem quaesitam.

Æquationes plurium dimensionum nihilo fecius resolvuntur, & operam sub fine, ut hic factum fuit, levabis, si primos ejus terminos gradatim omiseris.

Præterea notandum est quod in hoc exemplo, si dubitarem an $0,1 = p$ veritati satis accederet, pro $10p - 1 = 0$, finxissem $6p^3 + 10p - 1 = 0$, & ejus radices primam figuram in Quotiente scripsissem; & secundam vel tertiam Quotientis figuram sic explorare convenit, ubi in Æquatione ista ultimo resultantem quadratum coefficientis penultimi termini, non sit decies majus quam factus ex ultimo termino ducto in coefficientem termini antepenultimi.

B

Imo

Imo laborem plerumque minues præsertim in *Æquationibus* plurimarum dimensionum, si figuras omnes Quotienti addendas dicto modo (hoc est extrahendo minorem radicem, ex tribus ultimis terminis *Æquationis* novissime resultantis) exquiras: Isto enim modo figuras duplo plures qualibet vice Quotienti lucraberis.

Hæc Methodus resolvendi *Æquationes* pervulgata an sit nescio, certe mihi videtur præ reliquis simplex, & usui accommodata. Demonstratio ejus ex ipso modo operandi patet, unde cum opus sit, in memoriam facile revocatur.

Æquationes in quibus vel aliqui vel nulli Termini desint, eadem fere facilitate tractantur; & *Æquatio* semper relinquitur, cujus Radix una cum acquisita Quotiente adæquat Radicem *Æquationis* primo propositæ. Unde Examinatio Operis hic æque poterit institui ac in reliqua Arithmetica, auferendo nempe Quotientem a Radice primæ *Æquationis* (sicut Analystis notum est) ut *Æquatio* ultima vel Termini ejus duo tresve ultimi producantur inde. Quicquid laboris hic est, istud in Operatione substituendi quantitates unas pro aliis reperietur: Id quod varie perficias, at sequentem modum maxime expeditum puto, præsertim ubi Numeri Coefficientes constant ex pluribus Figuris.

Sit $p + 3$ substituenda pro y in hanc $y^4 - 4y^3 + 5y^2 - 12y + 17 = 0$. Et cum ista possit resolvi in hanc formam

$y - 4xy + 5xy - 12xy + 17 = 0$. *Æquatio* nova sic generabitur
 $p - 1 \times p + 3 = p^3 + 2p - 3$. & $p^3 + 2p + 2$ in $p + 3 = p^3 + 5p^2 + 8p + 6$.
 & $p^3 + 5p^2 + 8p - 6$ in $p + 3 = p^4 + 8p^3 + 23p^2 + 18p - 18$. & $p^4 + 8p^3 + 23p^2 + 18p - 18 = 0$, quæ quærebatur.

LITERALIS *ÆQUATIONUM* AFFECTARUM RESOLUTIO

His in numeris sic ostensis: Sit *Æquatio* literalis
 $y^3 + a'y - 2a' + axy - x^3 = 0$, resolvenda.

Primum inquiri valorem ipsius y cum x sit nulla, hoc est, elicio Radicem hujus *Æquationis* $y^3 + a'y - 2a' = 0$, & invenio esse $+a$. Itaque scribo $+a$ in Quotiente, & supponens $+a + p = y$, substituo pro y valorem ejus, & Terminos inde resultantis ($p^3 + 3ap^2 + 4a^2p$, &c.) margini appono; Ex quibus assumo $+4a^2p + a^3$ terminos utique ubi

PER ÆQUATIONES INFINITAS. 11.

ubi p & x seorsim sunt minimarum dimensionum, & eos nihilo fere æquales esse suppono, sive $p = -\frac{1}{2}x$ fere, vel $p = -\frac{1}{2}x + q$. Et scribens $-\frac{1}{2}x$ in Quotiente, substituo $-\frac{1}{2}x + q$ pro p ; Et terminos inde resultantis iterum in margine scribo, ut vides in annexo schemate, & inde assumo Quantitates $+4a^2q - \frac{1}{2}ax^2$, in quibus utique q & x seorsim sunt minimarum dimensionum, & fingo $q = \frac{x^2}{4a^2}$ fere, sive $q = +\frac{x^2}{4a^2} + r$; & adnectens $+\frac{x^2}{4a^2}$ Quotienti, substituo $\frac{x^2}{4a^2} + r$ pro q ; & sic procedo quo usque placuerit.

$y^3 + a^2y - 2a^2 + axy - x^3 = 0$		
$y = a - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4a^2} - \frac{131x^3}{512a^3} + \frac{1092x^4}{16384a^4} \&c.$		
$+a+p=y$	$+y^3$ $+a^2y$ $+axy$ $-2a^2$ $-x^3$	$+a^3 + 3a^2p + 3ap^2 + p^3$ $+a^3 + a^2p$ $+a^2x + axp$ $-2a^2$ $-x^3$
$-\frac{1}{2}x+q=p$	$+p^3$ $+3ap^2$ $+4a^2p$ $+axp$ $+a^2x$ $-x^3$	$-\frac{1}{8}x^3 + \frac{1}{4}x^2q - \frac{1}{2}xq^2 + q^3$ $+\frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{2}axq + 3aq^2$ $-a^2x + 4a^2q$ $-\frac{1}{2}ax^2 + axq$ $+a^2x$ $-x^3$
$+\frac{x^2}{4a^2}+r=q$	$+3aq^2$ $+4a^2q$ $-\frac{1}{2}axq$ $+\frac{1}{4}x^2q$ $-\frac{1}{2}ax^2$ $-\frac{1}{4}x^3$	$+\frac{3x^4}{4096a^4} + \frac{1}{16}x^2r + 3ar^2$ $+\frac{1}{16}ax^2 + 4a^2r$ $-\frac{1}{16}x^3 - \frac{1}{2}axr$ $-\frac{3x^4}{1024a^4} + \frac{1}{16}x^2r$ $-\frac{1}{2}ax^2$ $-\frac{1}{4}x^3$
$+4a^2 - \frac{1}{2}ax + \frac{1}{4}x^2) + \frac{1}{16}x^3 - \frac{131x^4}{4096a^4} (+ \frac{131x^3}{512a^3} + \frac{1092x^4}{16384a^4})$		

Sin duplo tantum plures Quotienti terminos, uno dempto, iungendos adhuc vellem: Primo termino (q^3) Æquationis novissime resultantis misso, & ista etiam parte ($-\frac{1}{2}q^2$) secundi, ubi x est tot dimensionum quot in penultimo Quotientis; In reliquis terminos ($3aq^2$

B 2

$+4a^2q$.

+ $4a^2q$, &c.) margini adscriptos ut vides, substituo $\frac{x^2}{4a} + r$ pro q ; & ex ultimis duobus terminis $(\frac{112a^3}{4096a} - \frac{1}{11}x^3 + \frac{1}{11}x^2r - \frac{1}{11}axr + 4a^2r)$ Aequationis inde resultantis, facta divisione $4a^2 - \frac{1}{11}ax + \frac{1}{11}x^2) + \frac{1}{11}x^3 - \frac{112a^3}{4096a}$ (elicio + $\frac{112a^3}{112a^4} + \frac{509a^3}{16194a}$) Quotienti adnectendos.

Denique Quotiens ista $(a - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{44a}, \&c.)$ per Regulam secundam, dabit $ax - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{32a} + \frac{1112a^3}{2048a^4} + \frac{509a^3}{8192a^5}, \&c.$ pro Area quaesita, quæ ad veritatem tanto magis accedit, quanto x sit minor.

Alius modus easdem Resolvendi.

Sin valor Areae tanto magis ad veritatem accedere debet quanto x sit major; Exemplum esto $y^3 + axy + x^2y - a^3 - 2x^3 = 0$. Itaque hanc resoluturus excerpō terminos $y^3 + x^2y - 2x^3$ in quibus x & y vel seorsim, vel simul multiplicatæ, sunt & plurimarum, & æqualium ubique dimensionum; & ex iis quasi nihilo æqualibus Radicem elicio. Hanc invenio esse x , & in Quotiente scribo. Vel quod eodem recidit, ex $y^3 + y - 2$ (unitate pro x substituta) Radicem extraho quæ hic prodit 1, & eam per x multiplico, & factum (x) in Quotiente scribo. Denique pono $x + p = y$, & sic procedo ut in priori Exemplo, donec habeam Quotientem $x - \frac{a}{4} + \frac{aa}{4a^2} + \frac{1112a^3}{112a^4} + \frac{509a^3}{16194a^5}, \&c.$ adeoque Aream $\frac{x^2}{4} + \left[\frac{aa}{4a^2}\right] - \frac{1112a^3}{112a^4} - \frac{509a^3}{16194a^5}$, de qua vide exempla tertia Regulæ secundæ. Lucis gratia dedi hoc exemplum in omnibus idem cum priori, modo x & a sibi invicem ibi substituantur, ut non opus esset aliud Resolutionis exemplum hic adjungere.

Area autem $(\frac{x^2}{4} - \frac{ax}{4} + \left[\frac{aa}{4a^2}\right] \&c.)$ terminatur ad Curvam quæ juxta Asymptoton aliquam in infinitum serpit; & Termini initiales $(x - \frac{1}{2}a)$ valoris extracti de y , in Asymptoton istam semper terminantur; unde portionem Asymptoti facile invenies. Idem semper notandum est cum Area designatur terminis plus plufque divis per x continue, præterquam quod vice Asymptoti rectæ quandoque habeatur Parabola Conica, vel alia magis composita.

Sed

Sed hunc modum missum faciens, utpote particularem, quia non applicabilem Curvis in orbem ad instar Ellipticum flexis; de altero modo per exemplum $y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$, supra ostenso (scilicet quo dimensiones ipsius x in numeratoribus quotientis perpetuo augeantur) annotabo sequentia.

1. Si quando accidit quod valor ipsius y , cum x nullum esse fingitur, sit quantitas, furda vel penitus ignota, licebit illam litera aliqua designare. Ut in exemplo, $y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$, si radix hujus $y^3 + a^2y - 2a^3$ fuisset furda vel ignota, finxissem quamlibet (b) pro ea ponendam; & resolutionem ut sequitur perfecissem. Scribens b in Quotiente, suppono $b + p = y$, & istum pro y substituo, ut vides; unde nova $p^3 + 3bp^2$, &c. resultat, rejectis terminis $b^3 + a^2b - 2a^3$, qui nihilo sunt æquales, propterea quod b supponitur Radix hujus $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$. Deinde termini $3b^2p + a^2p + abx$ dant $-\frac{abx}{3b^2 + a^2}$ quotienti apponendum, & $-\frac{abx}{3b^2 + a^2} + q$ substituendum pro p , &c.

$y^3 + aay + axy - 2a^3 - x^3 = 0$. Sit $cc = 3b^2 + a^2$.		
$y = b - \frac{abx}{c^3} + \frac{a^2x^2}{c^6} + \frac{x^3}{c^9} + \frac{a^2bx^2}{c^6} - \frac{a^3bx}{c^9} + \frac{a^4bx^2}{c^{12}} \&c.$		
$b + p = y$	y^3 $+ axy$ $+ aay$ $- x^3$ $- 2a^3$	$+ b^3 + 3b^2p + 3bp^2 + p^3$ $+ abx + axp$ $+ aab + aap$ $- x^3$ $- 2a^3$
$-\frac{abx}{cc} + q = p$	p^3 $+ 3bp^2$ $+ axp$ $+ ccp$ $- x^3$ $+ abx$	$-\frac{a^3bx}{c^6} \&c.$ $+\frac{3a^2bx^2}{c^9} - \frac{6a^3bx}{c^{12}} q \&c.$ $-\frac{a^2bx^2}{c^6} + axq$ $- abx + ccq$ $- x^3$ $+ abx$
$c^3 + ax - \frac{abx^2}{cc} + \frac{a^2x^2}{c^6} + x^3 + \frac{a^2bx^2}{c^6} \left(\frac{1}{c^3} + \frac{x}{c^6} + \frac{a^2bx^2}{c^9} \right) \&c.$		

Completo opere, sumo numerum aliquem pro a , & hanc $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$, sicut de numerali æquatione ostensum supra resolvo; & radicem ejus pro b substituo.

2. Si dictus valor sit nihil, hoc est si in æquatione resolvenda nul-

lus sit terminus nisi qui per x vel y sit multiplicatus, ut in hac $y^3 - axy + x^3 = 0$; tum terminos ($-axy + x^3$) seligo in quibus x seorsim & y etiam seorsim si fieri potest, alias per x multiplicata, sit minimarum dimensionum. Et illi dant $+\frac{a}{2}$ pro primo termino quotientis, & $\frac{a^2}{2}$ $+p$ pro y substituendum. In hac $y^3 - a^2y + axy - x^3 = 0$, licebit primum terminum quotientis vel ex $-a^2y - x^3$, vel ex $y^3 - a^2y$ elicere.

3. Si valor iste sit imaginarius, ut in hac $y^3 + y^2 - 2y + 6 - x^3y^2 - 2x + x^2 + x^4 = 0$, augco vel imminuo quantitatem x donec dictus valor evadit realis.

Sic in annexo schemate, cum AC (x) nulla est, tum CD (y) est imaginaria.


Sin minuatur AC per datam AB, ut BC fiat x ; tum posito quod BC (x) sit nulla, CD (y) erit valore quadruplici (CE, CF, CG, vel CH) realis; quarum radicum (CE, CF, CG, vel CH) quælibet potest esse primus terminus quotientis, prout superficies BEDC, BFDC, BGDC, vel BHDC desideratur. In aliis etiam casibus, si quando hæsit, te hoc modo extricabis.

Denique si index potestatis ipsius x vel y sit fractio, reduco ipsum ad integrum: ut in hoc exemplo $y^3 - xy^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}} = 0$. Posito $y^{\frac{1}{2}} = v$, & $x^{\frac{1}{2}} = z$, resultabit $v^6 - z^2v + z^3 = 0$, cujus radix est $v = z + z^{\frac{1}{2}}$, &c. sive (restituendo valores) $y^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} + x$, &c. & quadrando $y = x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}}$, &c.

Et hæc de arcibus curvarum investigandis dicta sufficiant. Imo cum Problemata omnia de curvarum Longitudine, de quantitate & superficie solidorum, deque Centro Gravitatis, possunt eo tandem reduci ut quærat quantitas Superficiæ planæ linea curva terminatæ, non opus est quicquam de iis adjungere. In istis autem quo ego operor modo dicam brevissime.

Applicatio prædictorum ad reliqua istiusmodi Problemata.

Sit ABD curva quævis, & AHKB rectangulum cujus latus AH vel BK est unitas. Et cogita rectam DBK uniformiter ab AH motam, areas ABD & AK describere; & quod BK (x) sit momentum quo AK (x) & BD (y) momentum quo ABD gradatim augetur; & quod ex momento BD perpetim dato, possis, per prædictas regulas, aream ABD ipso descriptam investigare, sive cum AK (x) momento 1 descripta conferre.




Jam

Jam qua ratione Superficies ABD ex momento suo perpetim dato, per præcedentes regulas elicitur, eadem quælibet alia quantitas ex momento suo sic dato elicitur. Exemplo res fiet clarior.

Longitudines Curvarum invenire.

Sit ADLE circulus cujus arcus AD longitudo est indaganda. Ducto tangente DHT, & completo indefinito parvo rectangulo HGBK, & posito $AE = 1 = 2AC$. Erit ut BK sive GH, momentum Basis AB (x), ad HD momentum Arcus AD :: BT : DT :: BD ($\sqrt{x-x^2}$) : DC ($\frac{1}{2}$) :: 1 (BK) :



$\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$ (DH). Adeoque $\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$ sive $\frac{\sqrt{x-x^2}}{2x-2x^2}$ est momentum Arcus AD.

Quod reductum fit $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{16}x^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{112}x^{\frac{7}{2}} + \frac{61}{112}x^{\frac{9}{2}}$ &c.

Quare, per regulam secundam, longitudo Arcus AD est

$x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{12}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}} + \frac{5}{112}x^{\frac{9}{2}} + \frac{61}{112}x^{\frac{11}{2}}$ &c.

sive $x^{\frac{1}{2}}$ in $1 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{12}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \frac{5}{112}x^4 + \frac{61}{112}x^5$, &c.

Non secus ponendo CB esse x , & radium CA esse 1, invenies Arcum LD esse $x + \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{12}x^5 + \frac{1}{16}x^7$, &c.

Sed notandum est quod unitas ista quæ pro momento ponitur est Superficies cum de Solidis, & linea cum de superficiebus, & punctum cum de lineis (ut in hoc exemplo) agitur.

Nec vereor loqui de unitate in punctis, sive lineis infinite parvis, si quidem proportionibus ibi jam contemplantur Geometræ, dum utuntur methodis Indivisibilium.

Ex his fiat conjectura de superficiebus & quantitatibus solidorum, ac de Centris Gravitatum:

Invenire prædictorum conversum.


Verum si e contra ex area vel longitudine &c. Curvæ alicujus data longitudo Basis AB desideratur, ex æquationibus per præcedentes regulas inventis extrahatur radix de x .

Inven-

Inventio Basis ex Area data.

Ut si ex area ABDC Hyperbolæ ($\frac{1}{x-y} = y$) data, cupiam basim AB investigare, area ista z nominata, extraho radicem hujus z (ABCD) $= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$, &c. neglectis illis terminis in quibus x est plurium dimensionum quam z in quotiente desideratur.

Ut si vellem quod z ad quinque tantum dimensiones in quotiente ascendat, negligo omnes $-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$, &c. & radicem hujus tantum $\sqrt{x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + x - z} = 0$ extraho.



$x = z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{4}z^4 + \frac{1}{5}z^5$ &c.		
$z + p = x$	$+$	$\frac{1}{2}z^2$ &c.
	$-$	$\frac{1}{2}z^2 - z^2p$, &c.
	$+$	$\frac{1}{3}z^3 + z^2p + zp^2$, &c.
	$-$	$\frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{2}z^2 - zp - \frac{1}{2}p^2$
	$+$	x
<hr/>		
$\frac{1}{2}z^2 + q = p$	$+$	zp^2 &c.
	$-$	$\frac{1}{2}p^2 - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{2}z^2q$, &c.
	$-$	$z^2p - \frac{1}{2}z^2$, &c.
	$+$	$z^2p + \frac{1}{2}z^2 + z^2q$
	$-$	$z^2p - \frac{1}{2}z^2 - zq$
	$+$	p
	$+$	$\frac{1}{2}z^2 + q$
	$+$	$\frac{1}{2}z^2$
	$-$	$\frac{1}{2}z^2$
	$+$	$\frac{1}{2}z^2$
<hr/>		
$x = z + \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{2}z^2 (\frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{10}z^2)$		

Analyfin ut vides exhibui propter adnotanda duo sequentia.

1. Quod ante substituendum, istos terminos semper omitto quos nulli deinceps usui fore prævideam. Cujus rei regula esto, quod post primum terminum ex qualibet quantitate sibi collaterali resultantem non


non addo plures terminos dextrorsum quam istius primi termini index dimensionis ab indice dimensionis maximæ unitatibus distat. Ut in hoc exemplo, ubi maxima dimensio est 5, omisi omnes terminos post z^5 , post z^5 posui unicum, & duos tantum post z^5 . Cum radix extrahenda (x) sit parium ubique, vel imparium dimensionum, hæc esto regula; Quod post primum terminum ex qualibet quantitate sibi collateraliter resultantem non addo plures terminos dextrorsum, quam istius primi termini index dimensionis ab indice dimensionis maximæ binis unitatibus distat; vel ternis unitatibus, si indices dimensionum ipsius x unitatibus ubique ternis a se invicem distant, & sic de reliquis.

2. Cum video p , q , vel r , &c. in æquatione novissime resultante esse unius tantum dimensionis, ejus valorem, hoc est, reliquos terminos quotienti addendos, per divisionem quæro. Ut hic vides factum.

Inventio Basis ex data Longitudine Curvæ.

Si ex dato arcu AD Sinus AB desideratur; æquationis $z = x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 + \frac{1}{720}x^7$, &c. supra inventæ, (posito nempe $AB = x$, $AD = z$, & $AA = 1$), radix extracta erit $x = z - \frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{24}z^5 - \frac{1}{720}z^7 + \frac{1}{30240}z^9$, &c.

Et præterea si Cosinum AB ex isto arcu dato cupis, fac $A\beta (= \sqrt{1-z^2}) = 1 - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{24}z^4 - \frac{1}{720}z^6 + \frac{1}{40320}z^8 - \frac{1}{34131840}z^{10}$, &c.



De Serie progressionum continuanda.

Hic obiter notetur, quod 5 vel 6 terminis istarum radicum cognitæ, eas plerumque ex analogia observata poteris ad arbitrium producere.

Sic hanc $x = z + \frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{24}z^5 + \frac{1}{720}z^7$, &c. produces dividendo ultimum terminum per hos ordine numeros 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c.

Et hanc $x = z - \frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{24}z^5 - \frac{1}{720}z^7$, &c. per hos 2x3, 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, &c.

Et hanc $x = 1 - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{24}z^4 - \frac{1}{720}z^6$, &c. per hos 1x2, 3x4, 5x6, 7x8, 9x10, &c.

Et hanc $z = x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 + \frac{1}{720}x^7$, &c. multiplicando per hos $\frac{1x1}{2x3}$, $\frac{1x1}{4x5}$, $\frac{1x1}{6x7}$, $\frac{1x1}{8x9}$, &c. Et sic in reliquis.

C

Ap.

*Applicatio prædictorum ad Curvas
Mechanicas.*

Et hæc de curvis Geometricis dicta sufficiant. Quinetiam curva
etiamſi Mechanica ſit, methodum tamen noſ-
tram nequaquam reſpuit.

Exemplo fit Trochoides, ADFG, cujus vertex A, & axis AH, & AKH rota qua describitur. Et quaratur Superficies ABD. Jam posito $AB=x$, $BD=y$, ut supra, & $AH=z$; primo quæro Longitudinem ipsius BD. Nempe ex natura Trochoidis est $KD = \text{arctus } AK$. Quare tota $BD = BK + \text{arc. } AK$. Sed est BK
 $(= \sqrt{z^2 - x^2}) - x^2 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^5 - \frac{1}{6}x^7$, &c. & (ex




prædictis) arcus $AK = x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{7}x^{\frac{7}{2}}$, &c. Ergo tota $BD = 2x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{7}x^{\frac{7}{2}}$, &c. Et (per Reg. 2.) area $ABD = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{15}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{35}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{63}x^{\frac{7}{2}}$, &c.

Vel brevius sic : Cum recta AK tangenti TD parallela sit, erit AB ad BK sicut momentum lineæ AB ad momentum lineæ BD, hoc est $x : \sqrt{x-xx} :: 1 : \frac{1}{2} \sqrt{x-xx} = x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{8} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{16} x^{\frac{9}{2}}, \&c.$ Quare (per Reg. 2.) $BD = 2 x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{4} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{8} x^{\frac{9}{2}}, \&c.$ Et superficies ABD $= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{15} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{35} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{63} x^{\frac{9}{2}}, \&c.$

Non dissimili modo (posito C centro circuli, & $CB=r$) obtinebis
aream CBDF, &c.

Sit area ABDV Quadratricis VDE (cujus vertex est V, & A centrum circuli interioris VK cui aptatur) invenienda. Ducta qualibet AKD, demitto perpendiculares DB, DC, KG. Eritque KG: AG:: AB (x): BD (y), five $\frac{x \cdot AG}{KG} = y$. Verum ex natura Quadratricis est BA (= DC) = arcui VK, five VK = x. Quare posito AV = 1, erit GK = x - $\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5$, &c. ex supra offensis, & GA = 1 - $\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 - \frac{1}{120}x^6$, &c.



Adeoque

Adeoquæ $y = \frac{x \times AG}{KG} = \frac{1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6}{1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6} \&c.$ five, divisio-

ne facta, $y = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6 \&c.$ & (per Reg. 2.) area AVDB

$= x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{6048}x^7 \&c.$

Sic longitudo Quadratricis VD, licet calculo difficiliori, determinabilis est.

Nec quicquam hujusmodi scio ad quod hæc methodus idque variis modis, sese non extendit. Imo tangentés ad curvas Mechanicas (si quando id non alias fiat) hujus ope ducantur. Et quicquid vulgaris Analysis per æquationes ex finito terminorum numero constantes (quando id sit possibile) perficit, hæc per æquationes infinitas semper perficiat: Ut nil dubitaverim nomen Analysis etiam huic tribuere. Ratiocinia nempe in hac non minus certa sunt quam in illa, nec æquationes minus exactæ; licet omnes earum terminos, nos homines & rationis finitæ nec designare neque ita concipere possimus, ut quantitates inde desideratas exacte cognoscamus: Sicut radices surdæ finitarum æquationum nec numeris nec quavis arte Analytica ita possunt exhiberi ut alicujus quantitas a reliquis distincta exacte cognoscatur.

Denique ad Analyticam merito pertinere censeatur cujus beneficio curvarum areæ & longitudines &c. (id modo fiat) exacte & Geometricè determinentur. Sed ista narrandi non est locus, respicienti duo præ reliquis demonstranda occurrunt.


1. Demonstratio quadraturæ curvarum simplicium in Regula prima.

Preparatio pro Regula prima demonstranda.

Sit itaque curvæ alicujus AD δ Basis AB = x , perpendiculariter applicata BD = y , & area ABD = z , ut prius. Item sit B β = o , BK = v , & rectangulum B β HK (ov) æquale spatio B β δ D.

Est ergo A β = $x + o$, & A δ β = $z + ov$. His præmissis, ex relatione inter x & z ad arbitrium assumpta quæro y isto, quem sequentem vides, modo.

Pro lubitu sumatur $\frac{1}{3}x^2 = z$, five $\frac{1}{3}x^2 = z$. Tum $x + o$ (A β) pro x , & $z + ov$ (A δ β) pro z substitutis, prodibit



bit $\frac{1}{2}$ in $x^3 + 3x^2o + 3xo^2 + o^3 = (\text{ex natura curvæ}) z^3 + 12xov + o^3v^2$.
 Et sublati ($\frac{1}{2}x^3$ & zx) æqualibus, reliquisque per o divis, restat $\frac{1}{2}$ in
 $3x^2 + 3xo + o^2 = 12xv + ov^2$. Si jam supponamus $x\beta$ in infinitum diminui
 & evanescere, sive o esse nihil, erunt v & y æquales, & termini per
 o multiplicati evanescunt, quare restabit $\frac{1}{2} \times 3xx = 12xv$, sive $\frac{1}{2}xx (=zy)$
 $= \frac{1}{2}x^2y$, sive $x^2 (\frac{y}{x}) = y$. Quare e contra si $x^2 = y$, erit $\frac{1}{2}x^2 = z$.

Demonstratio.

Vel generaliter, si $\frac{x}{m+n} \times ax^{\frac{m+n}{n}} = z$; sive, ponendo $\frac{m}{m+n} = c$, & m
 $+n=p$, si $cx^{\frac{p}{n}} = z$, sive $c^nx^p = z^n$: tum $x+o$ pro x , & $z+ov$ (sive;
 quod perinde est, $z+oy$) pro z , substitutis, prodit c^n in $x^p + pox^{p-1}$,
 &c. $= z^n + noyz^{n-1}$, &c. reliquis nempe terminis, qui tandem eva-
 nescent, omis. Jam sublati c^nx^p & z^n æqualibus, reliquisque per
 o divis, restat $c^np x^{p-1} = ny z^{n-1}$ ($= \frac{nyx^p}{cx^{\frac{p}{n}}} = \frac{ny}{cx^{\frac{p}{n}}}$ sive, dividendo per c^nx^p ,
 erit $p x^{p-1} = \frac{ny}{cx^{\frac{p}{n}}}$ sive $pcx^{\frac{p-1}{n}} = ny$; vel restituendo $\frac{m}{m+n}$ pro c , & $m+n$ pro
 p , hoc est, m pro $p-n$, & na pro pc , fiet $ax^{\frac{m}{n}} = y$. Quare e contra,
 si $ax^{\frac{m}{n}} = y$, erit $\frac{x}{m+n} \times ax^{\frac{m+n}{n}} = z$. Q. E. D.

Inventio curvarum quæ possunt quadrari.

Hinc in transitu notetur modus quo curvæ tot quot placuerit, qua-
 rum aræ sunt cognitæ, possunt inveniri; sumendo nempe quamlibet
 æquationem pro relatione inter aream z & basin x ut inde quærat
 applicata y . Ut si supponas $\sqrt{m+x} = z$, ex calculo invenies $\sqrt{\frac{m}{x}} = y$.
 Et sic de reliquis.

2. Demonstratio resolutionis æquationum affectarum.

Alterum demonstrandum est literalis æquationum affectarum reso-
 lutio. Nempe quod Quotiens, cum x sit satis parva, quo magis pro-
 duci-

ducitur eo magis ad veritatem accedit, ut defectus (p, q , vel r , &c.) quo distat ab exacto valore ipsius y , tandem evadat minor quavis data quantitate; & in infinitum producta sit ipsi y æqualis. Quod sic patebit.

1. Quoniam ex ultimo termino æquationum quarum p, q, r , &c. sunt radices, quantitas illa in qua x est minimæ dimensionis (hoc est, plusquam dimidium istius ultimi termini, si supponis x satis parvam esse) in qualibet operatione perpetuo tollitur: ille ultimusterminus (per 1. 10. *Elem.*) tandem evadet minor quavis data quantitate; & prorsus evanescet si opus infinite continuatur.

Nempe si $x = \frac{1}{2}$, erit x dimidium omnium $x + x^2 + x^3 + x^4$, &c. & x^2 dimidium omnium $x^2 + x^3 + x^4 + x^5$, &c. Itaque si $x = \frac{1}{2}$, erit x plusquam dimidium omnium $x + x^2 + x^3$, &c. & x^2 plusquam dimidium omnium $x^2 + x^3 + x^4$, &c. Sic si $\frac{x}{2} = \frac{1}{2}$, erit x plusquam dimidium omnium $x + \frac{x^2}{2}$



$+ \frac{x^2}{2}$, &c. Et sic de reliquis. Et numeros coefficientes quod attinet; illi plerumque decrescunt perpetuo, vel si quando increscant, tantum opus est ut x aliquoties adhuc minor supponatur.

2. Si ultimus terminus alicujus æquationis continuo diminuatut donec tandem evanescat, una ex ejus radicibus etiam diminuetur donec cum ultimo termino simul evanescat.

3. Quare quantitatum p, q, r , &c. unus valor continuo decrescit donec tandem, cum opus in infinitum producitur, penitus evanescat.

4. Sed valores istarum p, q , vel r , &c. una cum quotiente eatenus extracta adæquant radices æquationis propositæ (Sic in resolutione æquationis $y^3 + aay + axy - 2a^3 - x^3 = 0$, supra ostensa, percipies $y = a + p = a - \frac{1}{2}x + q = a - \frac{1}{2}x + \frac{x^2}{4a} + r$, &c.) Unde satis liquet propositum quod quotiens infinite producta est una ex valoribus de y .

Idem patebit substituendo quotientem pro y in æquationem propositam. Videbis enim terminos illos sese perpetuo destruire in quibus x est minimarum dimensionum.

CUM in Epistolis D. Newtoni, vel in lucem jam-
dudum editis, vel quæ in manus nostras inciderunt,
reperiantur aliqua quæ ad hanc Doctrinam pertinent, ea
excerpere & huic Tractatui adjungere visum est.

EXCERPTA

Ex Epistolis D. *NEWTONI*

Ad Methodum

FLUXIONUM,

E T

SERIERUM INFINITARUM

Spectantibus.

Fragmentum Epistolæ ad D. Oldenburgium 13 Junii 1676 missæ.*

Eractiones in Infinitas Series reducuntur per divisionem; & quantitates radicales per extractionem radicum, perinde instituendo operationes istas in speciebus ac institui solent in decimalibus numeris. Hæc sunt fundamenta harum reductionum; sed extractiones radicum, multum abbreviantur per hoc *Theorema.*

$$P + PQ^{\frac{1}{n}} = P^{\frac{n}{n-1}} + \frac{1}{n-1} AQ + \frac{1}{2(n-1)} BQ + \frac{1}{3(n-1)} CQ + \frac{1}{4(n-1)} DQ + \&c.$$

Ubi $P + PQ$ significat quantitatem cujus Radix, vel etiam dimensio quævis, vel radix dimensionis, investiganda est. P , primum terminum quantitatis ejus; Q , reliquos terminos divisos per primum. Et $\frac{1}{n}$, numeralem indicem dimensionis ipsius $P + PQ$: Sive dimensio illa integra sit; sive (ut ita loquar) fracta; sive affirmativa, sive negativa. Nam, sicut Analystæ, pro aa , aaa , &c. scribere solent a^2 , a^3 , &c. sic ego, pro \sqrt{a} , $\sqrt[3]{a}$, \sqrt{c} , a' , scribo $a^{\frac{1}{2}}$, $a^{\frac{1}{3}}$, $a^{\frac{1}{4}}$, & pro $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ scribo $a^{-\frac{1}{2}}$, $a^{-\frac{1}{3}}$, $a^{-\frac{1}{4}}$.

Et

* *Exat Epistola in Tom. 3. Operum Wallisii.*

Et sic pro $\sqrt[4]{c^4 + b^4 x}$ scribo $aa \times a^3 + b^4 x |^{-\frac{1}{4}}$, & pro $\sqrt[4]{c^4 + b^4 x + d^4 x^2}$ scribo $a^3 b \times a^3 + b^4 x |^{-\frac{1}{4}}$: In quo ultimo casu, si $a^3 + b^4 x |^{-\frac{1}{4}}$ concipiatur esse $P + PQ^{\frac{m}{n}}$ in Regula; erit $P = a^3$, $Q = \frac{b^4}{a^4}$, $m = -2$, & $n = 3$. Denique, pro terminis inter operandum inventis in quoto, usurpo Λ , B , C , D , &c. nempe Λ pro primo termino $P^{\frac{m}{n}}$, B pro secundo $\frac{m}{n}AQ$, & sic deinceps. Cæterum usus Regulæ patebit exemplis.

Exempl. 1. Est $\sqrt[4]{c^4 + x^4}$ (seu $c^4 + x^4 |^{-\frac{1}{4}}$) $= c + \frac{x^2}{2c} - \frac{x^4}{8c^3} + \frac{x^6}{16c^5} - \frac{x^8}{128c^7} + \frac{7x^{10}}{256c^9}$ &c. Nam, in hoc casu, est $P = c^4$, $Q = \frac{x^4}{c^4}$, $m = 1$, $n = 2$, $\Lambda (= P^{\frac{m}{n}} = c^2) = c$, $B (= \frac{m}{n}AQ) = \frac{x^2}{2c}$, $C (= \frac{m}{n}BQ) = -\frac{x^4}{8c^3}$, & sic deinceps.

Exempl. 2. Est $\sqrt[4]{c^4 + c^2 x + c^2 x^2}$ (i. e. $c^2 + c^2 x - x^2 |^{-\frac{1}{4}}$) $= c + \frac{c^2 x - x^2}{4c^3} - \frac{2c^2 x^2 + 4c^2 x^3 - 2x^4}{32c^5} + \&c.$ Ut patebit substituendo in allatam Regulam, x pro m , y pro n , c^2 pro P , & $\frac{c^2 x - x^2}{c^4}$ pro Q . Potest etiam $-x^2$ substitui pro P , & $\frac{c^2 x + c^2}{-x^2}$ pro Q , & tunc evadet $\sqrt[4]{c^4 + c^2 x + c^2 x^2} = -x + \frac{c^2 x + c^2}{3x^3} + \frac{2c^2 x^2 + 4c^2 x^3 - 2x^4}{432x^5} + \&c.$ Prior modus eligendus est, si x valde parvum sit; posterior, si valde magnum.

Exempl. 3. Est $\sqrt[4]{N \times y^3 - a^3 y}$ (hoc est, $N \times y^3 - a^3 y |^{-\frac{1}{4}}$) æqualis $N \times \frac{1}{y} + \frac{a^3}{3y^3} + \frac{3a^3}{8y^5} + \frac{15a^5}{64y^7} + \&c.$ Nam $P = y^3$, $Q = \frac{-a^3}{y^4}$, $m = -1$, $n = 3$. $\Lambda (= P^{\frac{m}{n}} = y^3 \times^{-\frac{1}{3}}) = y^{-1}$, hoc est $\frac{1}{y}$. $B (= \frac{m}{n}AQ = -\frac{1}{3} \times \frac{1}{y} \times \frac{-a^3}{y^4}) = \frac{a^3}{3y^3}$, &c.

Exempl. 4. Radix cubica ex quadrato-quadrato ipsius $d + e$, (hoc est, $\overline{d+e}^{\frac{2}{3}}$) est $d^{\frac{1}{3}} + \frac{e^{\frac{2}{3}}}{3d^{\frac{1}{3}}} + \frac{2e^{\frac{2}{3}}}{3d^{\frac{1}{3}}} - \frac{4e^{\frac{2}{3}}}{81d^{\frac{1}{3}}} + \&c.$

Nam $P = d$, $Q = \frac{e}{d}$, $m = 4$, $n = 3$, $\Lambda (= P^{\frac{m}{n}}) = d^{\frac{4}{3}}$, &c.

Exempl. 5. Eodem modo simplices etiam potestates eliciuntur. Ut si quadrato-cubus ipsius $d + e$, (hoc est, $\overline{d+e}^{\frac{3}{2}}$, seu $\overline{d+e}^{\frac{1}{2}}$) desideretur: erit, juxta Regulam, $P = d$, $Q = \frac{e}{d}$, $m = 5$, & $n = 1$; adeoque $\Lambda (= P^{\frac{m}{n}}) = d^5$, $B (= \frac{m}{n}AQ) = 5d^4e$, & sic $C = 10d^3e^2$, $D = 10d^2e^3$, $E = 5de^4$, $F = e^5$, & $G (= \frac{m-n}{2n}FQ) = 0$. Hoc est, $\overline{d+e}^{\frac{3}{2}} = d^{\frac{3}{2}} + 5d^{\frac{1}{2}}e + 10d^{\frac{1}{2}}e^2 + 10d^{\frac{1}{2}}e^3 + 5de^4 + e^5$.

Exem.

Exempl. 6. Quinetiam Divisio, five simplex sit, five repetita, per eandem Regulam perficitur. Ut si $\frac{1}{d+e}$ (hoc est $\overline{d+e}^{-1}$ five

$\overline{d+e}^{-1}$) in seriem simplicium terminorum resolvendum sit: Erit juxta Regulam $P = d$, $Q = e$, $m = -1$, $n = 1$, & $A (= P^{\frac{n}{m}} = d^{-1}) = d^{-1}$ seu $\frac{1}{d}$, $B (= \frac{n}{m} A Q = -1 \times \frac{1}{d} \times e = -\frac{e}{d}$, & sic $C = \frac{n(n-1)}{d^2}$, $D = -\frac{n(n-1)(n-2)}{d^3}$, &c. Hoc est $\frac{1}{d+e} = \frac{1}{d} - \frac{e}{d^2} + \frac{e^2}{d^3} - \frac{e^3}{d^4} + \&c.$

Exempl. 7. Sic & $\overline{d+e}^{-1}$ (hoc est unitas ter divisa per $d+e$, vel semel per cubum ejus,) evadit $\frac{1}{d^3} - \frac{e}{d^4} + \frac{e^2}{d^5} - \frac{e^3}{d^6} + \&c.$

Exempl. 8. Et $N \times \overline{d+e}^{-\frac{1}{3}}$, (hoc est N divisum per radicem cubicam ipsius $d+e$,) evadit $N \times \frac{1}{d^{\frac{1}{3}}} - \frac{e}{3d^{\frac{4}{3}}} + \frac{1e^2}{3d^{\frac{5}{3}}} - \frac{1e^3}{3d^{\frac{8}{3}}} + \&c.$

Exempl. 9. Et $N \times \overline{d+e}^{-\frac{1}{4}}$ (hoc est N divisum per radicem quadrato-cubicam ex cubo ipsius $d+e$, five $\sqrt[4]{1:d+e+3d^2e+3de^2+e^3}$) evadit

$$N \times \frac{1}{d^{\frac{1}{4}}} - \frac{1e}{4d^{\frac{5}{4}}} + \frac{1e^2}{25d^{\frac{9}{4}}} - \frac{1e^3}{125d^{\frac{13}{4}}} + \&c.$$

Per eandem Regulam Genesis Potestatum, Divisiones per Potestates aut per quantitates radicales, & Extractiones radicum altiorum in numeris etiam commode instituuntur.

Extractiones Radicum affectarum in speciebus imitantur earum extractiones in numeris, sed methodus *Vietae* & *Oughtredi* nostri huic negotio minus idonea est: Quapropter aliam excogitare adactus sum. [*Hujus specimen exhibetur in Tractatu precedente Pag. 8.*]

Quomodo ex æquationibus, sic ad infinitas series reductis, Areae & Longitudines curvarum, Contenta & Superficies solidorum, vel quorumlibet segmentorum figurarum quarumvis, eorumque Centra gravitatis determinantur; & quomodo etiam Curvæ omnes Mechanicæ ad ejusmodi æquationes infinitarum serierum reduci possint, indeque Problemata circa illas resolveri perinde ac si Geometricæ essent; nimis longum foret describere, sufficiat specimina quædam talium Problematum recensuisse: Inque iis, brevitatibus gratia, literas A , B , C , D , &c. pro terminis seriei, sicut sub initio, nonnunquam usurpabo.

1. Si ex dato sinu recto, vel sinu verso, Arcus desideretur: Sit radius

D

d

dus r , & sinus rectus x : Eritque Arcus $= x + \frac{x^3}{6r^2} + \frac{3x^5}{40r^4} + \frac{5x^7}{112r^6}$ &c. hoc est, $= x + \frac{1 \times 1 \times x^3}{2 \times 1 \times r^2} A + \frac{1 \times 1 \times x^5}{4 \times 1 \times r^4} B + \frac{1 \times 1 \times x^7}{6 \times 1 \times r^6} C + \frac{7 \times 7 \times x^9}{8 \times 9 \times r^8} D$ &c.

Vel, sit d diameter, ac x sinus versus; & erit Arcus æqualis

$$dx^{\frac{1}{2}} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{6d^{\frac{1}{2}}} + \frac{3x^{\frac{5}{2}}}{40d^{\frac{3}{2}}} + \frac{5x^{\frac{7}{2}}}{112d^{\frac{5}{2}}} + \&c. \text{ hoc est, } = \sqrt{d} x \text{ in}$$

$$1 + \frac{x^2}{6d} + \frac{3x^4}{40d^3} + \frac{5x^6}{112d^5} + \&c.$$

2. Si vicissim, ex dato Arcu desideretur sinus: Sit radius r , & arcus z . Eritque sinus rectus $= z - \frac{z^3}{6r^2} + \frac{z^5}{120r^4} - \frac{z^7}{5040r^6} + \frac{z^9}{362880r^8} - \&c.$

hoc est, $= z - \frac{z^3}{2 \times 3r^2} A - \frac{z^5}{4 \times 5r^4} B - \frac{z^7}{6 \times 7r^6} C - \&c.$ Et sinus versus $= \frac{z^2}{2r} - \frac{z^4}{24r^3} + \frac{z^6}{720r^5} - \frac{z^8}{40320r^7} + \&c.$ hoc est, $= \frac{z^2}{1 \times 2r} - \frac{z^4}{3 \times 4r^3} A - \frac{z^6}{5 \times 6r^5} B - \frac{z^8}{7 \times 8r^7} C - \&c.$

3. Si Arcus capiendus sit in ratione data ad alium Arcum: Est diameter $= d$, chorda arcus dati $= x$, & arcus quæsitus ad arcum illum datum ut n ad 1; Eritque arcus quæsitus Chorda $= nx + \frac{1-nn}{2 \times 3dd} xx A + \frac{9-nn}{4 \times 5dd} xx B + \frac{25-nn}{6 \times 7dd} xx C + \frac{49-nn}{8 \times 9dd} xx D + \frac{81-nn}{10 \times 11dd} xx E + \&c.$ Ubi nota, quod cum n est numerus impar, series definit esse infinita, & evadet eadem quæ prodit per Vulgarem Algebram ad multiplicandum datum angulum per istum numerum n .


4. Si in Axe alterutro AB, Ellipseos ABD (cujus centrum C, & axis alter DH) detur punctum aliquod E, circa quod recta EG occurrens Ellipsi in G, motu angulari feretur; & ex data area sectoris Elliptici BEG, quæratur recta GF, quæ a puncto G ad axem AB normaliter demittitur: Est BC $= q$, DC $= r$, EB $= f$, ac duplum areæ BEG $= z$; & erit GF $= \frac{1}{2}z - \frac{f^2}{6r^2} z^3 + \frac{7f^4 - 9ff^2}{120r^4} z^5$

$$- \frac{280f^6 - 1049f^4 + 225f^2}{3040r^6} z^7 + \&c. \text{ Sic itaque Astronomicum illud Kepleri}$$

Problema resolvitur potest.

5. In eadem Ellipsi, si statuatur CD $= r$, $\frac{CB}{CD} = c$, & CF $= x$:

Erit



$$\text{Erit arcus Ellipticus } DG = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{105}x^5 + \frac{1}{1470}x^7 + \frac{1}{1875}x^9 + \frac{1}{2275}x^{11} + \&c.$$

$$- \frac{1}{4^{1/2}} - \frac{1}{24^{1/2}} - \frac{1}{240^{1/2}} - \frac{1}{224^{1/2}} + \frac{1}{4320} + \frac{1}{4800} - \frac{1}{11200} - \frac{1}{15360} + \frac{1}{22400} + \frac{1}{28800}$$

Hic numerales Coefficientes supremorum terminorum ($\frac{1}{6}$, $\frac{1}{105}$, $\frac{1}{1470}$, &c.) sunt in Musica progressionem: Et numerales Coefficientes omnium inferiorum in unaquaque columna prodeunt multiplicando continuo numeralem Coefficientem supremi termini per terminos hujus progressionis $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{10}$, &c. Ubi n significat numerum dimensionum ipsius c in denominatore istius supremi termini. E.g. ut terminorum infra $\frac{1}{2275}$, numerales coefficientes inveniantur, pono $n=6$, ducoque $\frac{1}{2275}$ (numeralem coefficientem ipsius $\frac{1}{2275}$) in $\frac{1}{2}$, hoc est, in $\frac{1}{1137.5}$; & prodit $\frac{1}{1137.5}$, numeralis coefficientis termini proxime inferioris: dein duco hunc $\frac{1}{1137.5}$ in $\frac{1}{4}$, sive in $\frac{1}{4550}$, hoc est, in $\frac{1}{4550}$; & prodit $\frac{1}{4550}$ numeralis coefficientis tertii termini in ista columna. Atque ista $\frac{1}{4550} \times \frac{1}{6}$ facit $\frac{1}{27300}$ numeralem coefficientem quarti termini; & $\frac{1}{27300} \times \frac{1}{8}$ facit $\frac{1}{218400}$ numeralem coefficientem infimi termini. Idem in aliis ad infinitum usque columnis præstari potest: Adcoque valor ipsius DG per hanc Regulam pro lubitu produci.

Adhæc, si BF dicatur x , sitque r latus rectum Ellipseos, & $e = \frac{r}{AB}$; Erit Arcus Ellipticus

$$BG = \sqrt{rx} \text{ in } \left\{ 1 + \frac{2}{3r}e^2 \right\} x - \frac{2}{5r^2}e^4 \left\{ x^3 + \frac{4}{9r}e^2 \right\} x^5 - \frac{10}{7r^3}e^6 \left\{ x^7 + \frac{30e^2}{9r}e^4 \right\} x^9 + \&c.$$

Quare, si ambitus totius Ellipseos desideretur; Biseca CB in F , & quære Arcum DG , per prius Theorema, & Arcum BG per posterius.


6. Si, vice versa, ex dato arcu Elliptico DG, quaeratur Sinus ejus CF; tum dicto $CD = r$, $\frac{CB}{CD} = e$, & arcu illo $DG = z$; Erit

$$CF = z - \frac{1}{6e^4} z^3 - \frac{1}{10e^6} z^5 - \frac{1}{24e^8} z^7 - \&c.$$

$$+ \frac{19}{120e^4} + \frac{71}{420e^6} - \frac{491}{5040e^8}$$

Quæ autem de Ellipsi dicta sunt, omnia facile accommodantur ad Hyperbolam; mutatis tantum signis ipsorum e & e ubi sunt imparium dimensionum.

7. Præterea, si sit CE Hyperbola, cujus Asymptoti AD, AF rectum angulum FAD constituent; & ad AD erigantur utcumque perpendiculara BC, DE occurrentia Hyperbolæ in C & E: & AB dicatur a , BC b , & area BCED z ;



Erit $BD = \frac{z}{b} + \frac{z^2}{2ab^2} + \frac{z^3}{6a^2b^3} + \frac{z^4}{24a^3b^4} + \frac{z^5}{120a^4b^5} + \&c.$ Ubi coefficientes denominatorum prodeunt multiplicando terminos hujus Arithmetice progressionis, 1, 2, 3, 4, 5, &c. in se continuo. Et hinc ex Logarithmo dato potest numerus ei competens invenire.

8. Esto VDE Quadratrix, cujus vertex est V, exillente A centro & AE semi-diametro Circuli ad quem aptatur, & angulo VAE recto: Demissoque ad AE perpendiculo quovis DB, & acta Quadratricis Tangente DT occurrente axi ejus AV in T:


Dic AV = a , & AB = x ; Eritque $DB = a - \frac{x^2}{2a}$

$$- \frac{x^4}{45a^3} - \frac{2x^6}{945a^5} - \&c. \text{ Et } VT = \frac{x^2}{2a} + \frac{x^4}{945a^3} + \frac{2x^6}{18945a^5}$$

$$+ \&c. \text{ Et Area AVDB} = ax - \frac{x^3}{24} - \frac{x^5}{21540} - \frac{2x^7}{661540}$$

$$- \&c. \text{ Et Arcus VD} = x + \frac{2x^3}{27a^2} + \frac{14x^5}{2025a^4} + \frac{602x^7}{893025a^6}$$

+ &c. Unde vicissim, ex dato BD, vel VT, aut arca AVDB, arcuve VD, per resolutionem affectarum æquationum erui potest x seu AB.



9. Esto denique AEB Spheroides, revolutione Ellipseos AEB circa axem AB genita, & secta planis quatuor, AB per axem transeunte, DG parallelo AB, CDE perpendiculariter bifecante axem, & FG parallelo CE: sitque recta CB = a , CE = c , CF = x , & FG = y . Et

Et Sphæroideos segmentum CDGF dictis quatuor planis comprehensum, erit $+2cx y - \frac{x}{1c} y' - \frac{x}{20c} y' - \frac{x}{16c} y' - \frac{x}{176c} y' - \&c.$


$$- \frac{cx^3}{144} - \frac{xy}{180c} - \frac{x^3}{400c^3} - \frac{17x}{1152c^3} - \&c.$$

$$- \frac{cx^5}{2048} - \frac{x}{400c^5} - \frac{17x}{160000} - \&c.$$

$$- \frac{cx^7}{1600} - \frac{17x^2}{1152c^7} - \&c.$$

$$- \frac{17cx^9}{17088} - \&c.$$

$$- \&c.$$



Ubi numerales coefficientes supremorum terminorum ($2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \&c.$) in infinitum producuntur multiplicando primum coefficientem 2 continuo per terminos hujus progressionis

$$- \frac{17cx}{2048} - \frac{17x}{400c} - \frac{17x}{60000} - \frac{17x}{100000} - \frac{17x}{100000} - \&c. \text{ Et numerales coefficientes terminorum}$$

in unaquaque columna descendentium in infinitum producuntur multiplicando continuo coefficientem supremi termini in prima columna per eandem progressionem, in secunda autem per terminos hujus

$$\frac{17cx}{2048} - \frac{17x}{400c} - \frac{17x}{60000} - \frac{17x}{100000} - \&c. \text{ in tertia per terminos hujus } \frac{17cx}{2048} - \frac{17x}{400c} - \frac{17x}{60000} - \frac{17x}{100000} - \&c.$$

in quarta per terminos hujus $\frac{17cx}{2048} - \frac{17x}{400c} - \frac{17x}{60000} - \frac{17x}{100000} - \&c.$ in quinta per terminos hujus $\frac{17cx}{2048} - \frac{17x}{400c} - \frac{17x}{60000} - \frac{17x}{100000} - \&c.$ Et sic in infinitum.

Et eodem modo segmenta aliorum solidorum designari, & valores eorum aliquando commodè per series quasdam numerales in infinitum produci possunt.

Ex his videre est, quantum fines Analyticos per hujusmodi infinitas aequationes ampliantur: Quippe quæ, earum beneficio, ad omnia pene dixerim problemata (si numeralia *Diophanti* & similia excipias) sese extendit.

Non tamen omnino universalis evadit, nisi per ulteriores quasdam methodos eliciendi series infinitas. Sunt enim quædam Problemata in quibus non liceat ad series infinitas per divisionem vel extractionem radicum simplicium affectarumve, pervenire. Sed quomodo in istis casibus procedendum sit, jam non vacat dicere; ut neque alia quædam tradere quæ circa reductionem infinitarum serierum in finitas, ubi rei natura tulerit, excogitavi. Nam parcius scribo, quod hæc speculationes diu mihi fastidio esse cœperint, adeo ut ab iisdem jam per quinque fere annos abstinerim.

Unum tamen addam: quod postquam Problema aliquod ad infinitam æquationem deducitur, possint inde variæ approximationes


Gbe abscindet Tangentem Ee quam proxime æqualem arcui BAb; errore tantum existente $\frac{16x}{325d^3} \sqrt{dx} + \text{vel} - \&c.$ multo minore scilicet quam in Theoremate *Hugenii*. Quod si fiat $7AK:3AH::3DH:n$; & capiatur $KG=CH-n$, erit error adhuc multo minor.

Atque ita, si Circuli segmentum aliquod BAb per Mechanicam designandum esset: Primo reducerem Aream istam in Infinitam seriem, puta hanc $BbA = \frac{1}{2} d^2 x^2 - \frac{2x^3}{3d^3} - \frac{x^5}{14d^5} - \frac{x^7}{16d^7} - \&c.$ Dein quærerem

construtiones Mechanicas quibus hanc seriem proxime assequeretur; cujusmodi sunt hæ: Age rectam AB, & erit segmentum BbA $= \frac{1}{2} AB + BD \times \frac{1}{2} AD$ proxime; existente scilicet errore tantum $\frac{x^3}{70d^3} \sqrt{dx} + \&c.$ in defectu: Vel proximius, erit segmentum illud (bisecto AD in F, & acta recta BF) $= \frac{4BF+AB}{11} \times \frac{1}{2} AD$; existente errore solummodo $\frac{x^3}{140d^3} \sqrt{dx} + \&c.$ qui semper minor erit quam $\frac{1}{1100}$ totius segmenti, etiamsi segmentum illud ad usque semicirculum augeatur.


Sic & in Elliptici BAb, [Vid. Fig. Præcedent.] cujus vertex A, axis alteruter AK, & latus rectum AP; cape $PG = \frac{1}{2} AP + \frac{19AK-21AP}{10AK} \times AP$. In Hyperbola vero, cape $PG = \frac{1}{2} AP + \frac{19AK-11AP}{10AK} \times AP$. Et acta recta GBE abscindet tangentem AE quam proxime æqualem arcui Elliptico vel Hyperbolico AB, dummodo Arcus ille non sit nimis magnus.

Et pro Area segmenti Hyperbolici BbA; in DP cape $MD = \frac{1AD^2}{4AK}$, & ad D & M erige perpendicularia Dβ, MN occurrentia semicirculo super Diametro AP descripto: Eritque $\frac{4AN-1AB}{11} \times \frac{1}{2} AD = BbA$ proxime: Vel proximius, erit $\frac{21AN-1AB}{71} \times \frac{1}{2} AD = BbA$; si modo capiatur $DM = \frac{1AD^2}{7AK}$.



Fragmentum Epistola D. Newtoni, ad D. Oldenburgium 24 Octob. 1676 *missæ*.

Longitudo *Cissoïdis* sic construitur. Sit VD *Cissoïis*, AV Diameter Circuli ad quem aptatur, V vertex, AF Asymptota ejus, ac DB perpendicularē quodvis ad AV demissum. Cum semi-axe AF = AV, & semi-parametro AG = $\frac{1}{2}$ AV, describatur Hyperbola FkK; & inter AB & AV sumpta AC media proportionali, erigantur ad C & V perpendicularia Ck, VK Hyperbolæ occurrentia in k & K; Et agantur rectæ KT, k ϵ tangentēs Hyperbolam in eisdem K & k, & occurrentes AV in T & ϵ ; Et ad AV constituatur rectangulum AVNM æquale spatio TK ϵ . Ex *Cissoïdis* VD longitudo erit Sextupla altitudinis VN. Demonstratio perbrevis est.



[Quæ sequuntur scripta sunt in explicationem Epistolæ præcedentis.]

Quod vero attinet ad Inventionem terminorum *p*, *q*, *r*, (*vide* pag. 25 & 8:) in extractione Radicis affectæ, primum *p* sic cruo.


Descripto Angulo recto BAC, latera ejus BA, CA divido in partes æquales; & inde normales erigo distribuentes angulare spatium in æqualia parallelogramma vel quadrata, quæ concipio denominata esse a dimensionibus duarum indefinitarum specierum, puta *x* & *y*, regulariter ascendendum a termino A, prout vides in Fig. 1. inscriptas. Ubi *y* denotat Radicem extrahendam; & *x* alteram indefinitam quantitatem, ex cuius potestatibus series conficienda est. Deinde, cum Aequatio aliqua proponitur, parallelogramma singulis ejus terminis correspondentia insignio nota aliqua: Et Regula ad duo vel forte plura ex insignitis parallelogrammis applicata; quorum unum sit humillimum in columna sinistra juxta AB, & alia ad Regulam dextrorsum sita, cæteraque omnia non contingentia Regulam supra eam jaceant; Seligo

Fig. 1.

$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{y^4}{x^4}$	$\frac{y^3}{x^3}$	$\frac{y^2}{x^2}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x}$

terminos Aequationis per parallelogramma contingentia Regulam designatos, & inde quæro quantitatem Quotienti addendam.

Fig. 2.



Sic ad extrahendam Radicem y , ex y^5

$$-5xy' + \frac{1}{2}y^4 - 7a^2x'y' + 6a^2x' + b^2x' = 0;$$

parallelogramma hujus terminis respondentia signo nota aliqua *; ut vides in Fig. 2.

Dein applico Regulam DE ad inferiorem e locis signatis in sinistra columna; eamque ab inferioribus ad superiora dextrorsum gy-
rare facio, donec alium similiter vel forte

plura e reliquis signatis locis coeperit attingere. Videoque loca sic attacta esse x^2 , $x'y$, & y^2 . E terminis itaque, $y^5 - 7a^2x'y' + 6a^2x'$ tanquam nihilo æqualibus (& insuper si placet reductis ad $v^5 - 7v' + 6 = 0$, ponendo $y = vax$,) quæro valorem y , & invenio quadruplicem, $+Vax$, $-Vax$, $+V2ax$, & $-V2ax$, quorum quemlibet pro primo termino Quotientis accipere licet, prout e radicibus quam-
piam extrahere decretum est.

Sic Aequatio $y^4 + axy + aay - x^2 - 2a' = 0$, quam resolvbam in priori Epistola, dat $-2a' + aay + y^2 = 0$, & inde $y = a$ proxime: Cum itaque a sit primus terminus valoris y , pono p pro cæteris omnibus in infinitum, & substituo $a + p = y$. (Obvenient hic aliquando difficultates nonnullæ; sed ex iis, credo, lector se proprio Marte extrahabit.) Subsequentes vero termini q , r , s , &c. eodem modo ex æquationibus secundis, tertiis, cæterisque eruuntur, quo primus p e prima, sed cura leviori; quia cæteri valores y solent prodire dividendo terminum involventem infimam potestatem indefinitæ quantitatis x per Coefficientem radicis p , q , r , aut s .

Intellexi credo ex superioribus, regressionem ab Areis curvarum ad Lineas rectas, fieri per hanc extractionem Radicis affectæ. Sed duo alii sunt modi quibus idem perficio.

Eorum unus affinis est Computationibus quibus colligebam approximationes sub finem alterius Epistolæ, & intelligi potest per hoc exemplum. Proponatur Aequatio ad Aream Hyperbolæ $z = x + \frac{1}{2}xx + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{5}x^4$, &c. Et partibus ejus multiplicatis in se, emerget $z^2 = x^2 + x^3 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^5$, &c. $z^3 = x^3 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^5$, &c. $z^4 = x^4 + 2x^5$, &c. $z^5 = x^5$, &c. Jam de z aufero $\frac{1}{2}zz$, & restat $z - \frac{1}{2}zz = x - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}x^5$, &c. Huic addo $\frac{1}{2}z^2$, & fit $z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{2}z^2 = x + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{4}x^3$, &c. Aufero $\frac{1}{3}z^2$, & restat $z - \frac{1}{3}z^2 + \frac{1}{3}z^2 - \frac{1}{3}z^3 = x$
E
- $\frac{1}{12}x^4$,

THEOREMA II. Sit $z = ay + by^3 + cy^5 + dy^7 + ey^9 + \&c.$

Et vicissim erit $y =$

$$\begin{aligned} & -\frac{z}{a} \\ & + \frac{3b}{a^3} z^3 \\ & + \frac{5d}{a^5} z^5 \\ & + \frac{35d^2 - 10ab^2}{a^7} z^7 \\ & + \frac{315d^3 - 315ab^2d + 10a^2b^2d^2 + 3c^2 - 21e}{a^9} z^9 + \&c. \end{aligned}$$

Exempli gratia. Proponatur Aequatio ad Arcum circuli, $z = y + \frac{y^3}{6r} + \frac{3y^5}{40r^3} + \frac{3y^7}{112r^5} + \&c.$ Et substitutis in Regula 1 pro a , $\frac{1}{6r}$ pro b , $\frac{3}{40r^3}$ pro c , $\frac{3}{112r^5}$ pro d &c; oriatur $y = z - \frac{z^3}{6r} + \frac{z^5}{120r^3} - \frac{z^7}{3c40r^5} + \&c.$

*Fragmentum * Epistola D. Newtoni, ad D. Wallisium Anno 1692, missa.*

SUb finem Epistolæ anni 1676 [*Hæc sunt verba Wallisii*] scribit [*D. Newtonus*] etiam Problema determinandi Curvas per conditiones Tangentium in sua potestate esse, una cum aliis difficilioribus; ad quæ solvenda se usum esse dicit duplici methodo, una concinniore, altera generaliore; & utramque literis transpositis celat: quæ in ordinem redactæ hanc sententiam exhibent. *Una methodus consistit in Extractione fluentis quantitatis ex æquatione simul involvente fluxionem ejus. Altera tantum in assumptione seriei pro quantitate qualibet incognita ex qua cætera commodè derivari possunt; & in collatione terminorum homologorum æquationis resultantis ad eruendos terminos assumptæ Seriei.* Harum methodorum Secunda ex verbis jam recitatis absque ulteriore explicatione intelligi potest; priorem ab Authore jam accepi ut sequitur.

Hæc methodus, ait, ejusdem est generis cum ea pro extrahendo radices ex æquationibus affectis superius descripta. Pone quod Problema resolvendum reducat ad æquationem fluentes quantitates y & z una cum earum fluxionibus \dot{y} & \dot{z} involventem, & quod fluxio ipsius z uniformis sit. Ut hæc fluxio ex æquatione evanescat, pro ea ponatur unitas, & manebit æquatio solas y , z & \dot{y} involvens, quam *Resolvendam* vocat. Proponitur, inventio ipsius y in Serie infinita convergente, quæ solam z involvet. Hoc in aliquibus æquationibus impossibile est, in aliis præparationem æquationum requirit, ubi vero directe confici possit resolutio est hujusmodi.

E 2

PRO-

* Extat Epistola in Tom. 2. Operum Wallisii.

EPISTOLARUM P R O B L E M A.

Ex æquatione fluxionem radicis involvente radicem extrahere.

R E S O L U T I O.

TErmini omnes, ex eodem æquationis latere consistentes, æquantur nihilo, & ipsarum y & y dignitates (si opus sit) exaltentur vel deprimantur, sic ut earum indices nec alicubi negativi sint, nec tamen altiores quam ad hunc effectum requiritur; & sit kx^a terminus infimæ dignitatis eorum qui neque per y neque per ejus fluxionem \dot{y} neque per earum dignitatem quamvis multiplicantur. Sit lx^byy^c terminus alius quilibet, & omnes ordine terminos percurrento collige ex singulis seorsim numerum $\frac{lx^byy^c}{a+b}$ sic, ut tot habeas ejusmodi numeros quot sunt termini. Horum numerorum maximus vocetur v , & x' erit dignitas primi termini Seriei. Pro ejus coefficiente ponatur a , & in æquatione quæ *resolvenda* dicitur scribe ax' pro y , & vax'^{v-1} pro \dot{y} ; ac termini omnes resultantes in quibus x ejusdem est dignitatis ac in termino kx^a , sub propriis signis collecti, ponantur æquales nihilo. Nam hæc æquatio debite reducta dabit coefficientem a . Sic habes ax' terminum primum Seriei.

O P E R A T I O S E C U N D A.

Pro reliquis omnibus hujus Seriei terminis nondum inventis pone p , & habebis Æquationem $y = ax' + p$, & inde etiam Æquationem $\dot{y} = vax'^{v-1} + \dot{p}$. In resolvenda, pro y & \dot{y} scribe hos eorum valores & habebis Resolvendam novam, ubi p officium præstat ipsius y ; & ex hac Resolvenda primum extrahes terminum Seriei p eodem modo atque terminum primum Seriei totius $y = ax' + p$ ex Resolvenda prima extraxisti.

OPE-

OPERATIO TERTIA ET SEQUENTES.

Dein tertiam Refolvendam eadem ratione invenias atque secundam invenisti, & ex ea terminum tertium Seriei totius extrahes. Et similiter Refolvendam quartam invenies, & ex ea quartum Seriei terminum, & sic in infinitum. Series autem sic inventa erit radix Aequationis quam extrahere oportuit.

EXEMPLUM.

Ex Aequatione $y^2z^2 - z^2zy - d^2zz + dzz^2 = 0$, extrahenda sit radix y . Pone $z = 1$, & Aequatio evadet $y^2 - z^2y - dd + dz = 0$, quæ est Refolvenda. Jam vero terminus infimus in quo nec y neque y reperitur, est dd , qui ipsi kx^2 æquatus dat $\lambda = 0$. Terminis reliquis y^2 , $-z^2y$ pone $1z^2y^2$ æqualem successive, & inde in primo casu habebis $\mu = 0$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$, in secundo $\mu = 2$, $\alpha = 0$, & $\beta = 1$. Et hinc $\frac{\lambda - \mu + \beta}{\alpha + \beta}$ fit in primo casu 0, in secundo -1 . Unde v est 0, & az & $1az^{v-1}$ sunt a & 0; quarum ultimæ duæ a & 0 in Refolvenda pro y & y scriptæ, producunt $aa + 0z^2 - dd + dz$; & termini aa & $-dd$, in quibus index dignitatis z est λ seu 0, positi æquales nihilo dant $a = d$. Unde primus Seriei terminus az evadit d .

OPERATIO SECUNDA.

Pro terminis reliquis pone p , & habebis æquationem $y = d + p$, & inde $y = p$, qui valores in Refolvenda pro y & y substituti dant Refolvendam novam $2dp + pp - zxp + dz = 0$, ubi p & p vicesubeunt ipsarum y & y . Terminus unicus in quo nec p neque p reperitur est dz , qui cum termino kx^2 collatus dat $\lambda = 1$. Terminis reliquis $2dp$, pp & $-zxp$ pone $1z^2p^2$ æqualem successive; & inde in primo casu habebis $\mu = 0$, $\alpha = 1$, & $\beta = 0$; in secundo $\mu = 0$, $\alpha = 2$, & $\beta = 0$; & in tertio $\mu = 2$, $\alpha = 0$, & $\beta = 1$. Et hinc $\frac{\lambda - \mu + \beta}{\alpha + \beta}$ evadit primo casu 1, in secundo $\frac{1}{2}$, in tertio 0. Unde v est 1, & az & $1az^{v-1}$ sunt az & a . Termini duo ultimi az & a in Refolvenda pro p & p respective scripti, producunt $2daz + a^2z - az^2 + dz$. Et termini $2daz$
E 3 &

& dz in quibus index dignitatis z est λ seu 1, positi æquales nihilo, dant $a = -\frac{1}{2}$. Unde az terminus primus Seriei p fit $-\frac{1}{2}z$.

OPERATIO TERTIA.

Pro terminis reliquis nondum inventis pone q & habebis æquationem $p = -\frac{1}{2}z + q$, & inde $\dot{p} = -\frac{1}{2} + \dot{q}$: Qui valores pro p & \dot{p} in Resolvenda novissima substituti producunt Resolvendam novam $z dq - zq + qq + \frac{1}{2}zz - zzq = 0$. Ubi q & \dot{q} vices suppleant ipsorum y & \dot{y} . Terminus unicus in quo neque q nec \dot{q} reperitur est $\frac{1}{2}zz$, qui cum kz^2 collatus dat $\lambda = 2$. Terminis reliquis $z dq$, $-zq$, $+qq$, $-zzq$ pone $lz^\mu q^\nu q^\beta$ æqualem successive; & inde in primo casu habebis $\mu = 0$, $\alpha = 1$, & $\beta = 0$; in secundo, $\mu = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$; in tertio, $\mu = 0$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$; in quarto $\mu = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$: & inde $\frac{\mu+\alpha+\beta}{\alpha+\beta}$ evadit in primo casu 2, in secundo, tertio, & quarto 1. Et hinc p est 2, vel az & az^{2-1} sunt az^2 & $2az$: qui valores in Resolvenda pro q & \dot{q} substituti dant $2daz^2 - az^3 + aaz^2 + \frac{1}{2}zz - 2az$; & termini $2daz^2 + \frac{1}{2}zz$ in quibus index dignitatis z est λ seu 2, positi æquales nihilo, dant $a = -\frac{1}{12}$. Unde az terminus primus Seriei q evadit $-\frac{1}{12}z$.

OPERATIO QUARTA.

Pro reliquis Seriei terminis nondum inventis pone r , & habebis æquationes $q = -\frac{1}{12}z + r$, & $\dot{q} = -\frac{1}{12} + \dot{r}$; & inde resolvendam novam $z dr + \frac{r^2}{12} - zr + \frac{r^2}{6} - \frac{1}{12}zr + rr - zrz = 0$; & ex ea per Methodum superiorem habebis $-\frac{r^2}{12}$ terminum primum Seriei r . Et sic pergitur in infinitum.

Est igitur radix extrahenda $y = d + p = d - \frac{1}{2}z + q = d - \frac{1}{2}z - \frac{1}{12}z + r = d - \frac{1}{2}z - \frac{1}{12}z - \frac{r^2}{12} - \frac{r^2}{6} - \frac{1}{12}zr + \dots$ &c. Et operationem continuando producere licet radicem ad terminos plures.

Et eadem methodo, dicit *Newtonus*, radices æquationum, fluxiones secundas, tertias, quartas, (\ddot{y} , $\ddot{\dot{y}}$, $\ddot{\ddot{y}}$,) aliasque involventium, extrahi posse.

His utitur radicem extractionibus ubi aliæ Methodi nil profunt.

Nam

Nam in Epistola prædicta anni 1676 docet, quod in Solutione problematum de Tangentibus inversorum, casus aliqui dantur in quibus hæc Methodus generalis non requiritur: & particulariter, si in triangulo rectangulo quod ab ordinata, tangente, & interjacente parte abscissæ constituitur, relatio duorum quorumlibet e lateribus tribus per æquationem quamvis definiatur; Problema absque Methodo hæc generali solvi poterit.

Methodi autem hæc omnes tam particulares quam generales collectim sumptæ, solutionem exhibent secundæ partis problematis, quod *Newtonus* sub initio istius Epistolæ his verbis proposuit. *Data æquatione quocunque fluentes quantitates involvente fluxiones invenire, & vice versa.* Nam tota fluxionum Methodus in hujus directæ & inversæ solutione consistit.

Part of a Letter from Sir *Is. Newton*, to
Mr. *J. Collins*, Novemb. 8. 1676.

THere is no Curve-line express'd by any Equation of three terms, tho' the unknown quantities affect one another in it, or the Indices of their Dignities be surd quantities (suppose $ax^{\lambda} + bx^{\mu}y^{\sigma} + cy^{\tau} = 0$, where x signifies the Base, y the Ordinate, $\lambda, \mu, \sigma, \tau$ the Indices of the dignities of x and y , and a, b, c known quantities with their signs $+$ or $-$.) I say, there is no such Curve-line, but I can, in less than half a quarter of an hour, tell whether it may be Squar'd, or what are the simplest Figures it may be compar'd with, be those Figures Conic Sections, or others: And then by a direct and short way, (I dare say the shortest the nature of the thing admits of, for a general one,) I can compare them. And so if any two Figures express'd by such Equations be propounded, I can, by the same Rule, compare them if they may be compar'd. This may seem a bold assertion, because it's hard to say a Figure may, or may not, be Squar'd, or Compar'd with another; but it's plain to me by the fountain I draw it from, tho' I will not undertake to prove it to others. The same Method extends to Equations of four Terms, and others also, but not so generally.

Frag.

*Fragmentum Epistolæ D. Newtoni ad D. Collinsium,
Novemb. 8. 1676, Latine redditum.*

Nulla extat Curva cujus Æquatio ex tribus constat terminis, in qua, licet quantitates incognitæ se mutuo afficiant, vel Indices dignitatum sint surdæ quantitates (v. g. $ax^{\lambda} + bx^{\mu}y^{\sigma} + cy^{\tau} = 0$, ubi x designat Basim, y Ordinatem $\lambda, \mu, \sigma, \tau$ Indices dignitatum ipsius x & y , & a, b, c quantitates cognitæ una cum signis suis $+$ vel $-$) nulla inquam hujusmodi est Curva, de qua, an Quadrari possit, necne, vel quænam sint Figuræ simplicissimæ quibuscum comparari possit, sive sint Conicæ sectiones sive aliæ magis complicatæ, intra horæ octantem respondere non possum. Deinde * methodo directâ & brevi, imo methodorum omnium generalium brevissima eas comparare queo. Quinetiam si duæ quævis Figuræ per hujusmodi Æquationes expressæ proponantur, per eandem Regulam, eas, modo comparari possint, comparo.

Affirmatio quidem videri potest temeraria, propterea quod perdifficile sit dictu an Figura Quadrari vel cum alia comparari possit, necne; mihi autem manifestum est, ex eo unde deduxi fonte, quantum id aliis demonstrare in me suscipere nollem. Eadem methodus Æquationes quatuor terminorum aliasque complectitur, haud tamen adeo generaliter.



TRAC-

* Methodum habes in Coroll. 2. Prop. 10. Traç. sequentis.

41

TRACTATUS

D E

Quadratura Curvarum.

F

INTRODUCTIO

A D

Quadraturam Curvarum.




Quantitates Mathematicas non ut ex partibus quam minimis constantes, sed ut motu continuo descriptas hic considero. Lineæ describuntur ac describendo generantur non per appositionem partium sed per motum continuum punctorum, superficies per motum linearum, solida per motum superficierum, anguli per rotationem laterum, tempora per fluxum continuum, & sic in cæteris. Hæ Geneses in rerum natura locum vere habent & in motu corporum quotidie cernuntur. Et ad hunc modum Veteres ducendo rectas mobiles in longitudinem rectarum immobilium genesin docuerunt rectangulorum.

Considerando igitur quod quantitates æqualibus temporibus crescentes & crescendo genitæ, pro velocitate majori vel minori qua crescunt ac generantur, evadunt majores vel minores; methodum quærebam determinandi quantitates ex velocitatibus motuum vel incrementorum quibus generantur; & has motuum vel incrementorum velocitates nominando *Fluxiones* & quantitates genitas nominando *Fluentes*, incidi paulatim *Annis* 1665 & 1666 in Methodum Fluxionum qua hic usus sum in Quadratura Curvarum.

Fluxiones sunt quam proxime ut Fluentium augmenta æqualibus temporis particulis quam minimis genita, &, ut accurate loquar, sunt in prima ratione augmentorum nascentium; exponi autem possunt per lineas quascunque quæ sunt ipsis proportionales.

Ut si areæ ABC, ABDG Ordinatis BC, BD super basi AB uniformi cum motu progredientibus describantur, harum arearum fluxiones erunt inter se ut Ordinatæ describentes BC & BD, & per Ordina-

natas illas exponi possunt, propterea quod Ordinatæ illæ sunt ut arearum augmenta nascentia.



ratione prima sunt latera trianguli CET, ideoque fluxiones ipsarum AB, BC & AC sunt ut trianguli illius CET latera CE, ET & CT & per eadem latera exponi possunt, vel quod perinde est per latera trianguli confimilis VBC.

Eodem recidit si sumantur fluxiones in ultima ratione partium evanescentium. Agatur recta Cc & producat eadem ad K. Redeat Ordinata bc in locum suum priorem BC, & coeuntibus punctis C & c, recta CK coincidet cum tangente CH, & triangulum evanescens CEc in ultima sua forma evadet simile triangulo CET, & ejus latera evanescencia CE, Ec & Cc erunt ultimo inter se ut sunt trianguli alterius CET latera CE, ET & CT, & propterea in hac ratione sunt fluxiones linearum AB, BC & AC. Si puncta C & c parvo quovis intervallo ab invicem distant recta CK parvo intervallo a tangente CH distabit. Ut recta CK cum tangente CH coincidat & rationes ultimæ linearum CE, Ec & Cc inveniantur, debent puncta C & c coire & omnino coincidere. Errores quam minimi in rebus Mathematicis non sunt contemnendi.


Simili argumento si circulus centro B radio BC descriptus in longitudinem Abscissæ AB ad angulos rectos uniformi cum motu ducatur, fluxio solidi geniti ABC erit ut circulus ille generans, & fluxio superficiæ ejus erit ut perimenter Circuli illius & fluxio lineæ curvæ AC conjunctim. Nam quo tempore solidum ABC generatur ducendo circulum illum in longitudinem abscissæ AB, eodem superficies ejus generatur ducendo perimetrum circuli illius in longi-

AD QUADRATURAM CURVARUM. 45.

gitudinem Curvæ AC. Hujus methodi accipe etiam exempla quæ sequuntur.


Recta PB circa polum datum P revolvens secet aliam positione datam rectam AB: queritur proportio fluxionum rectarum illarum AB & PB.

Progrediatur recta PB de loco suo PB in locum novum Pb. In Pb capiatur PC ipsi PB æqualis, & ad AB ducatur PD sic, ut angulus bPD æqualis sit angulo bBC; & ob similitudinem triangulorum bBC, bPD erit augmentum Bb ad augmentum Cb ut Pb ad Db. Redeat jam Pb in locum suum priorem PB ut augmenta illa evanescant, & evanescentium ratio ultima, id est ratio ultima Pb ad Db, ea erit quæ est PB ad DB, existente angulo PDB recto, & propterea in hac ratione est fluxio ipsius AB ad fluxionem ipsius PB.



Recta PB circa datum Polum P revolvens secet alias duas positione datas rectas AB & AE in B & E: queritur proportio fluxionum rectarum illarum AB & AE.

Progrediatur recta revolvens PB de loco suo PB in locum novum Pb rectas AB, AE in punctis b & e secantem, & rectæ AE parallela BC ducatur ipsi Pb occurrens in C, & erit Bb ad BC ut Ab ad Ae, & BC ad Ee ut PB ad PE, & conjunctis rationibus Bb ad Ee ut Ab×PB ad Ae×PE. Redeat jam linea Pb in locum suum priorem PB, & augmentum evanescens Bb erit ad augmentum evanescens Ee ut AB×PB ad AE×PE, ideoque in hac ratione est fluxio rectæ AB ad fluxionem rectæ AE.



Hinc si recta revolvens PB lineas quasvis Curvas positione datas secet in punctis B & E, & rectæ jam mobiles AB, AE Curvas illas tangent in Sectionum punctis B & E: erit fluxio Curvæ quam recta AB tangit ad fluxionem Curvæ quam recta AE tangit ut AB×PB ad AE×PE. Id quod etiam eveniet si recta PB Curvam aliquam positione datam perpetuo tangat in mobili P.

Fluat quantitas x uniformiter & invenienda sit fluxio quantitatis x^n . Quo tempore quantitas x fluendo evadit $x+o$, quantitas x^n evadet x^n+o^n , id est per methodum serierum infinitarum, $x^n+no x^{n-1}+\frac{n(n-1)}{2}oox^{n-2}+\&c.$ Et augmenta o & $no x^{n-1}+\frac{n(n-1)}{2}oox^{n-2}+\&c.$ sunt ad invicem ut 1 & $nx^{n-1}+\frac{n(n-1)}{2}oox^{n-2}+\&c.$ Evanescent jam augmenta illa, & eorum ratio ultima erit 1 ad nx^{n-1} : ideoque fluxio quantitatis x est ad fluxionem quantitatis x^n ut 1 ad nx^{n-1} .

Similibus argumentis per methodum rationum primarum & ultimarum colligi possunt fluxiones linearum seu rectarum seu curvarum in calibus quibuscunque, ut & fluxiones superficierum, angulorum & aliarum quantitatum. In finitis autem quantitibus Analysin sic instituere, & finitarum nascentium vel evanescentium rationes primas vel ultimas investigare, consonum est Geometriæ Veterum: & volui ostendere quod in Methodo Fluxionum non opus sit figuras infinite parvas in Geometriam introducere. Peragi tamen potest Analysis in figuris quibuscunque seu finitis seu infinite parvis quæ figuris evanescentibus finguntur similes, ut & in figuris quæ per Methodos Indivisibilium pro infinite parvis haberi solent, modo caute procedas.

Ex Fluxionibus invenire Fluentes Problema difficilius est, & solutionis primus gradus aequipollet Quadraturæ Curvarum; de qua sequentia olim scripsi.



D E

Quadratura Curvarum.

Quantitates indeterminatas ut motu perpetuo crescentes vel decrecentes, id est ut fluentes vel defluentes in sequentibus considero; designoque literis z, y, x, v , & earum fluxiones seu celeritates crescendi noto iisdem literis punctatis $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{v}$. Sunt & harum fluxionum fluxiones seu mutationes magis aut minus celeres quas ipsarum z, y, x, v , fluxiones secundas nominare licet & sic designare $\ddot{z}, \ddot{y}, \ddot{x}, \ddot{v}$, & harum fluxiones primas seu ipsarum z, y, x, v fluxiones tertias sic $\ddot{\dot{z}}, \ddot{\dot{y}}, \ddot{\dot{x}}, \ddot{\dot{v}}$, & quartas sic $\ddot{\ddot{z}}, \ddot{\ddot{y}}, \ddot{\ddot{x}}, \ddot{\ddot{v}}$. Et quemadmodum $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{v}$ sunt fluxiones quantitatum z, y, x, v , & hæ sunt fluxiones quantitatum $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{v}$, & hæ sunt fluxiones quantitatum primarum z, y, x, v : sic hæ quantitates considerari possunt ut fluxiones aliarum quas sic designabo, $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{v}$, & hæ ut fluxiones aliarum, $\ddot{z}, \ddot{y}, \ddot{x}, \ddot{v}$, & hæ ut fluxiones aliarum $\ddot{\dot{z}}, \ddot{\dot{y}}, \ddot{\dot{x}}, \ddot{\dot{v}}$. Designant igitur $\dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}$, &c. seriem quantitatum quarum quælibet posterior est fluxio præcedentis & quælibet prior est fluens quantitas fluxionem habens subsequentem. Similis est series $\sqrt{z-z}, \sqrt{z-z}, \sqrt{z-z}, \sqrt{z-z}, \sqrt{z-z}, \sqrt{z-z}, \sqrt{z-z}$.
 ut & series $\frac{z+z}{z-z}, \frac{z+z}{z-z}, \frac{z+z}{z-z}, \frac{z+z}{z-z}, \frac{z+z}{z-z}, \frac{z+z}{z-z}, \frac{z+z}{z-z}$.

Et notandum est quod quantitas quælibet prior in his seriebus est ut area figuræ curvilinæ cujus ordinatim applicata rectangula est quantitas posterior & abscissa est z : uti $\sqrt{z-z}$ area curvæ cujus ordinata est $\sqrt{z-z}$ & abscissa z . Quo autem spectant hæc omnia patebit in Propositionibus quæ sequuntur.

PROP.

Data æquatione quocunque fluentes quantitates involvente, invenire fluxiones.

Solutio.

Multiplicetur omnis æquationis terminus per indicem dignitatis quantitatis cujusque fluentis quam involvit, & in singulis multiplicationibus mutetur dignitatis latus in fluxionem suam, & aggregatum factorum omnium sub propriis signis erit æquatio nova.

Explicatio.

Sunto a, b, c, d &c. quantitates determinatæ & immutabiles, & proponatur æquatio quævis quantitates fluentes z, y, x &c. involvens, uti $x^3 - xy^2 + a^2z - b^3 = 0$. Multiplicentur termini primo per indices dignitatum x , & in singulis multiplicationibus pro dignitatis latere, seu x unius dimensionis, scribatur \dot{x} , & summa factorum erit $3x^2\dot{x} - x\dot{y}^2$. Idem fiat in y & prodibit $-2xy\dot{y}$. Idem fiat in z & prodibit $aa\dot{z}$. Ponatur summa factorum æqualis nihilo, & habebitur æquatio $3x^2\dot{x} - x\dot{y}^2 - 2xy\dot{y} + a^2\dot{z} = 0$. Dico quod hac æquatione definitur ratio fluxionum.

Demonstratio.

Nam sit o quantitas admodum parva & sunt $o\dot{z}, o\dot{y}, o\dot{x}$, quantitatum z, y, x momenta id est incrementa momentanea synchrona. Et si quantitates fluentes jam sunt z, y & x hæc post momentum temporis incrementis suis $o\dot{z}, o\dot{y}, o\dot{x}$ auctæ, evadent $z + o\dot{z}, y + o\dot{y}, x + o\dot{x}$, quæ in æquatione prima pro $z, y,$ & x scrip-

Scriptæ dant æquationem $x^3 + 3x^2 \dot{o}x + 3x \dot{o}^2 \ddot{x}x + \dot{o}^3 \ddot{x}^3 - xy^3 - \dot{o}x\dot{y}^3$
 $- 2x\dot{o}y\dot{y} - 2x\dot{o}^2\ddot{y}y - x\dot{o}^3\ddot{y}^3 - x\dot{o}^2\ddot{y}^3 + a^2z + a\dot{o}z - b^3 = 0.$

Subducatur æquatio prior, & residuum divisum per \dot{o} erit $3x^2\dot{x}$
 $+ 3x\dot{x}\dot{o}x + x^3\dot{o}^2 - xy^2 - 2x\dot{y}y - 2x\dot{o}y\dot{y} - x\dot{o}y\dot{y} - x\dot{o}^2\ddot{y}y + a^2z = 0.$ Mi-
 nuatur quantitas \dot{o} in infinitum, & neglectis terminis evanescentibus
 restabit $3x^2\dot{x} - xy^2 - 2x\dot{y}y + a^2z = 0.$ Q. E. D.

Explicatio plenior.

Ad eundem modum si æquatio esset $x^3 - xy^3 + a^2\sqrt{ax-y} - b^3 = 0,$
 produceretur $3x^2\dot{x} - xy^2 - 2x\dot{y}y + a^2\sqrt{ax-y} = 0.$ Ubi si fluxionem
 $\sqrt{ax-y}$ tollere velis, pone $\sqrt{ax-y} = z,$ & erit $ax - y^2 = z^2,$ & (per
 hanc Propositionem) $\dot{a}x - 2y\dot{y} = 2z\dot{z}$ seu $\frac{\dot{a}x - 2y\dot{y}}{2z} = \dot{z},$ hoc est $\frac{\dot{a}x - 2y\dot{y}}{2\sqrt{ax-y}}$
 $= \sqrt{ax-y}.$ Et inde $3x^2\dot{x} - xy^2 - 2x\dot{y}y + \frac{\dot{a}x - 2y\dot{y}}{2\sqrt{ax-y}} = 0.$

Et per operationem repetitam pergitur ad fluxiones secundas, ter-
 tias & sequentes. Sit æquatio $xy^3 - z^3 + a^3 = 0,$ & fiet per opera-
 tionem primam $xy^3 + 3zy^2 - 4zz^2 = 0,$ per secundam $xy^3 + 6zy^2$
 $+ 3zy^2 + 6zy^2 - 4zz^2 - 12z^2\dot{z} = 0,$ per tertiam $xy^3 + 9zy^2 + 18zy^2$
 $+ 3zy^2 + 18zy^2 + 6zy^2 - 4zz^2 - 36zz^2 - 24z^2\dot{z} = 0.$

Ubi vero sic pergitur ad fluxiones secundas, tertias & sequentes,
 convenit quantitatem aliquam ut uniformiter fluentem considerare,
 & pro ejus fluxione prima unitatem scribere, pro secunda vero & se-
 quentibus nihil. Sit æquatio $xy^3 - z^3 + a^3 = 0,$ ut supra; & fluat x
 uniformiter, sitque ejus fluxio unitas, & fiet per operationem pri-
 mam $y^3 + 3zy^2 - 4z^3 = 0,$ per secundam $6yy^2 + 3zy^2 + 6zy^2 - 12z^2$
 $= 0,$ per tertiam $9yy^2 + 18y^2y + 3zy^2 + 18zy^2 + 6zy^2 - 24z^2 = 0.$

In hujus autem generis æquationibus concipiendum est quod fluxio-
 nes in singulis terminis sint ejusdem ordinis, id est vel omnes primi
 G or-


ordinis \dot{y} , \dot{z} , vel omnes secundi \ddot{y} , \dot{y}^2 , $\dot{y}\dot{z}$, \dot{z}^2 , vel omnes tertii $\ddot{\dot{y}}$, $\ddot{y}\dot{y}$, $\ddot{y}\dot{z}$, \dot{y}^3 , $\dot{y}^2\dot{z}$, $\dot{y}\dot{z}^2$, \dot{z}^3 , &c. Et ubi res aliter se habet complendus est ordo per subintellectas fluxiones quantitatis uniformiter fluentis.

Sic æquatio novissima complendo ordinem tertium fit $9\ddot{y}\dot{y}^2 + 18\dot{z}\dot{y}^2\dot{y} + 3\ddot{z}\dot{y}^2 + 18\ddot{y}\dot{y}\dot{y}\dot{y} + 6\ddot{z}\dot{y}^2 - 24\dot{z}\dot{z}^2 = 0$.

PROP. II. PROB. II.

Invenire Curvas quæ quadrari possunt.

Sit ABC figura invenienda, BC Ordinatum applicata rectangula, & AB abscissa. Producatur CB ad E ut sit BE = 1, & compleatur parallelogrammum ABED, & arearum ABC, ABED fluxiones erunt ut BC & BE. Assumatur igitur æquatio quævis qua ratio arearum definiatur, & inde dabitur ratio ordinarum BC & BE per Prop. I. Q. E. I.



Hujus rei exempla habentur in Propositionibus duabus sequentibus.

PROP. III. THEOR. I.

Si pro abscissa AB & area AE seu $AB \times 1$ promiscue scribatur z , & si pro $e + fz^2 + gz^3 + hz^4 + \&c.$ scribatur R: fit autem area Curvæ $z^2 R^2$, erit ordinatum applicata BC æqualis

$$\frac{6e + 6 \times fz^2 + 6 \times gz^3 + 6 \times hz^4 + \&c. \times z^{2-1} R^{2-1}}{+ \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \quad + 3 \lambda \eta}$$

Demonstratio.

Nam si fit $z^2 R^2 = v$, erit (per Prop. I) $6z\dot{z}R^{2-1} + \lambda z^2 \dot{R} R^{2-1} = \dot{v}$.
Pro R^2 in primo æquationis termino & z^2 in secundo scribe RR^{2-1} & $z\dot{z}R^{2-1}$, & fiet $6z\dot{z}R + \lambda z\dot{z}R$ in $z^{2-1} R^{2-1} = \dot{v}$. Erat autem $R = e + fz^2 + gz^3$

$$+gz^{12}+hz^{12}+\&c. \text{ \& inde (per Prop. 1) fit } \dot{R}= \eta f z z^{1-1} + 2 \eta g z z^{12-1} \\ + 3 \eta h z z^{12-1} + \&c. \text{ quibus substitutis \& scripta BE seu } x \text{ pro } z, \text{ fiet} \\ \frac{\theta e + \theta \times f z + \theta \times g z^{12} + \theta \times h z^{12} + \&c. \times z^{1-1} R^{1-1}}{+ \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \quad + 3 \lambda \eta} = \dot{v} = BC. \\ \text{Q. E. D.}$$

P R O P. IV. T H E O R. II.

Si Curvæ abscissa AB fit z , & si pro $e+fz+gz^{12}+\&c.$ scribatur R , & pro $k+lz+mz^{12}+\&c.$ scribatur S ; fit autem area Curvæ $zR \cdot S_{\mu}$: Erit ordinatim applicata BC æqualis

$$\left. \begin{array}{l} \theta ek + \theta \times fkz + \theta \times gkz^{12} \dots * \dots * \dots \\ + \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \\ + \theta \times elz + \theta \times flz^{12} + \theta \times glz^{12} \dots * \dots \\ + \mu \eta \quad + \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \\ \quad + \mu \eta \quad + \mu \eta \\ + \theta \times emz^{12} + \theta \times fmz^{12} + \theta \times gmz^{12} \\ + 2 \mu \eta \quad + \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \\ \quad + 2 \mu \eta \quad + 2 \mu \eta \end{array} \right\} \times z^{1-1} R^{1-1} S^{\mu-1}$$

Demonstratur ad modum Propositionis superioris.

P R O P. V. T H E O R. III.

Si Curvæ abscissa AB fit z , & pro $e+fz+gz^{12}+hz^{12}+\&c.$ scribatur R : fit autem Ordinatim applicata $z^{1-1} R^{1-1} \times a+bz+cz^{12}+dz^{12}+\&c.$ & ponatur $\frac{1}{r}=r$, $r+\lambda=s$, $s+\lambda=t$, $t+\lambda=v$, &c.

Erit Area $= z^1 R^1 \ln + \frac{1}{r}$

$$\begin{array}{l} + \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{r+\lambda}}{r+\lambda} z \eta \\ + \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{r+\lambda} + \frac{1}{r+\lambda} \times \frac{1}{r+\lambda} - \frac{1}{r+\lambda}}{r+\lambda} z^{12} \\ + \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{r+\lambda} + \frac{1}{r+\lambda} \times \frac{1}{r+\lambda} - \frac{1}{r+\lambda} \times \frac{1}{r+\lambda} - \frac{1}{r+\lambda} \times \frac{1}{r+\lambda}}{r+\lambda} z^{12} \\ + \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{r+\lambda} + \frac{1}{r+\lambda} \times \frac{1}{r+\lambda} - \frac{1}{r+\lambda} \times \frac{1}{r+\lambda} - \frac{1}{r+\lambda} \times \frac{1}{r+\lambda} - \frac{1}{r+\lambda} \times \frac{1}{r+\lambda}}{r+\lambda} z^{12} \\ + \&c. \end{array}$$

G 2

Ubi

Ubi A, B, C, \mathcal{D} , &c. denotant totas coefficientes datas terminorum singulorum in serie cum signis suis + & —, nempe

A primi termini coefficientem $\frac{1}{1}$

B secundi termini coefficientem $\frac{1-b \times f \cdot A}{1+1 \times e}$

C tertii termini coefficientem $\frac{1-b \times f \cdot A - 1 \times f \cdot B - e \cdot A}{1+2 \times e}$

Et sic deinceps.

Demonstratio.

Sunt juxta Propositionem tertiam.

CURVARUM ORDINATÆ	ARÆ
1. $b \cdot A + 1 \times f \cdot A z + 1 \times g \cdot A z^2 + 1 \times b \cdot A z^3, \&c.$	$\left\{ \begin{array}{l} A z^0 R_1 \\ B z^{1+1} R_1 \\ C z^{2+2} R_1 \\ D z^{3+3} R_1 \end{array} \right.$
2. $\dots + 1 + e \times e B z + 1 + e \times f B z^2 + 1 + e \times g B z^3, \&c.$	
3. $\dots + 1 + 2e \times e C z + 1 + 2e \times f C z^2, \&c.$	
4. $\dots + 1 + 3e \times e D z^3, \&c.$	

Et si summa Ordinarum ponatur æqualis Ordinatæ $a + bz + cz^2 + dz^3 + \&c.$ in $z^{1-1} R^{1-1}$, summa arearum $z^1 R^1$ in $A + Bz^2 + Cz^3 + D z^4 + \&c.$ æqualis erit areæ Curvæ cujus ista est Ordinata. Æquentur igitur Ordinarum termini correspondentes,

$$\begin{aligned} \& \text{ fiet } a &= b e A, \\ b &= \frac{b + \lambda e \times f A + \overline{b + e} \times e B}{\overline{b + e}}, \\ c &= \frac{b + 2 \lambda e \times g A + \overline{b + e} + \lambda e \times f B + \overline{b + 2e} \times e C}{\overline{b + 2e}}, \\ &\&c. \end{aligned}$$

$$\& \text{ inde } A = \frac{1}{b}$$

$$B = \frac{1 - \overline{b + 2e} \times f A}{\overline{b + e}}$$

$$C = \frac{1 - \overline{b + 2e} \times e C A - \overline{b + e} + \overline{b + 2e} \times f B}{\overline{b + 2e}}$$

Et sic deinceps in infinitum.

Pone

Pone jam $\frac{a}{r}=r$, $r+\lambda=s$, $s+\lambda=t$, &c. & in area z^R in A
 $+Bz^s+Cz^t+Dz^u$ &c. scribe ipsorum A, B, C , &c. valores in-
 ventos, & prodibit series propofita. Q. E. D.

Et notandum est quod Ordinata omnis duobus modis in feriem re-
 solvitur. Nam index η vel affirmativus esse potest vel negativus.

Proponatur Ordinata $\frac{1^{\lambda-k\lambda}}{c\lambda\sqrt{k\lambda-k\lambda-1+m\lambda}}$: Hæc vel sic scribi potest

$$z^{-\frac{1}{2}} \times 3k - l z^s \times k - l z^s + m z^t \Big|^{-1},$$

$$\text{vel sic } z^{-\frac{1}{2}} \times \frac{l + 3k z^{-1} \times m - l z^{-1} + k z^{-1}}{\Big|^{-1}}.$$

In casu priore est $a=3k$, $b=0$, $c=-l$, $e=k$, $f=0$, $g=-l$,
 $h=m$, $\lambda=\frac{1}{2}$, $\eta=1$, $\theta-1=-\frac{1}{2}$, $\theta=-\frac{1}{2}=r$, $s=-1$, $t=-\frac{1}{2}$,
 $v=0$.

In posteriore est $a=-l$, $b=0$, $c=3k$, $e=m$, $f=-l$, $g=0$,
 $h=k$, $\lambda=\frac{1}{2}$, $\eta=-1$, $\theta-1=-2$, $\theta=-1$, $r=1$, $s=1\frac{1}{2}$,
 $t=2$, $v=2\frac{1}{2}$. Tentandus est casus uterque. Et si serierum alterutra
 ob terminos tandem deficientes abrumptur ac terminatur habebitur
 area Curvæ in terminis finitis. Sic in exempli hujus priore casu scri-
 bendo in serie valores ipsorum $a, b, c, e, f, g, h, \lambda, \theta, r, s, t, v$,
 termini omnes post primum evanescunt in infinitum & area Curvæ
 prodit $-2\sqrt{\frac{k-k\lambda-1+m\lambda}{k\lambda}}$. Et hæc area ob signum negativum adjacet ab-

scissæ ultra ordinatam productæ. Nam area omnis affirmativa adjacet
 tam abscissæ quam ordinatæ, negativa vero cadit ad contrarias partes
 ordinatæ & adjacet abscissæ productæ, manente scilicet signo Ordina-
 tatæ. Hæc modo series alterutra & nonnunquam utraque semper
 terminatur & finita evadit si Curva geometricæ quadrari potest. At
 si Curva talem quadraturam non admittit, series utraque continuabitur
 in infinitum, & earum altera converget & aream dabit approxi-
 mando, præterquam ubi r (propter aream infinitam) vel nihil est vel
 numerus integer & negativus, vel ubi $\frac{m}{r}$ æqualis est unitati. Si $\frac{m}{r}$ mi-
 nor est unitate, converget series in qua index η affirmativus est:
 si $\frac{m}{r}$ unitate major est, converget series altera. Si in uno casu area
 adjacet abscissæ ad usque ordinatam ductæ, in altero adjacet abscissæ
 ultra ordinatam productæ.

Nota insuper quod si Ordinata contentum est sub factore rationall
 \mathcal{Q} & factore surdo irreducibili R^r & factoris surdi latus R non divi-
 dit factorem rationalem \mathcal{Q} , erit $\lambda=1$ & $R^{\lambda-1}=R^r$. Sin factoris sur-

di latus R dividit factorem rationalem semel, erit $\lambda - 1 = \pi + 1$ & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+1}$: si dividit bis, erit $\lambda - 1 = \pi + 2$ & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+2}$: si ter, erit $\lambda - 1 = \pi + 3$, & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+3}$: & sic deinceps.

Si Ordinata est fractio rationalis irreducibilis cum denominatore ex duobus vel pluribus terminis composito: resolvendus est denominator in divisores suos omnes primos. Et si divisor sit aliquis cui nullus alius est aequalis, Curva quadrari nequit: Sin duo vel plures sint divisores aequales, rejiciendus est eorum unus, & si adhuc alii duo vel plures sint sibi mutuo aequales & prioribus inæquales, rejiciendus est etiam eorum unus, & sic in aliis omnibus æqualibus si adhuc plures sint: deinde divisor qui relinquitur vel contentum sub divisoribus omnibus qui relinquuntur, si plures sunt, ponendum est pro R , & ejus quadrati reciprocum R^{-2} pro $R^{\lambda-1}$, præterquam ubi contentum illud est quadratum vel cubus vel quadrato quadratum, &c. quo casu ejus latus ponendum est pro R & potestatis index 2 vel 3 vel 4 negative sumptus pro λ . & Ordinata ad denominatorem R^1 vel R^1 vel R^1 &c. reducenda.

Ut si Ordinata sit $\frac{x^7 + x^4 + x^3}{x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}$; quoniam hæc fractio irreducibilis est & denominatoris divisores sunt pares, nempe $z - 1$, $z - 1$, $z - 1$ & $z + 2$, $z + 2$, rejicio magnitudinis utriusque diviforem unum, & reliquorum $z - 1$, $z - 1$, $z + 2$ contentum $z^3 - 3z + 2$ pono pro R & ejus quadrati reciprocum $\frac{1}{R^2}$ seu R^{-2} pro $R^{\lambda-1}$. Dein Ordinam ad denominatorem R^1 seu $R^{\lambda-1}$ reduco, & fit $\frac{x^4 + x^3 + x^2}{x^3 - 3x + 2}$, i. e. $z^1 \times 8 - 9z + z^3 \times 2 - 3z^4$. Et inde est $a=8$, $b=-9$, $c=0$, $d=1$, &c. $e=2$, $f=-3$, $g=0$, $h=1$, $\lambda-1=-2$, $\lambda=-1$, $\eta=1$, $\theta=1$, $\phi=3$, $\theta=4=r$, $s=3$, $t=2$, $v=1$. Et his in serie scriptis prodit area $\frac{x^4}{x^3 - 3x + 2}$, terminis omnibus in tota serie post primum evanescentibus.

Si denique Ordinata est fractio irreducibilis & ejus denominator contentum est sub factore rationali Q & factore surdo irreducibili R^r , inveniendi sunt lateris R divisores omnes primi, & rejiciendus est divisor unus magnitudinis cujusque & per divisores qui restant, siqui sint, multiplicandus est factor rationalis Q : & si factum æquale est lateri R vel lateris illius potestati alicuius cujus index est numerus integer, esto index ille m , & erit $\lambda - 1 = -\pi - m$, & $R^{\lambda-1} = R^{-\pi-m}$.

Ut

Ut si Ordinata sit $\frac{q^3 - q^2x + q^1x^2 - qx^3 - x^3}{q^3 - x^3 \times \frac{q^3 - q^2x + q^1x^2 - qx^3 - x^3}{q^3 - x^3}}$, quoniam factoris furdi latus

R feu $q^3 + q^2x - qx^2 - x^3$ divifores habet $q+x$, $q-x$, $q-x$ qui duarum sunt magnitudinum, rejicio diviforem unum magnitudinis utriusque & per diviforem $q+x$ qui relinquitur, multiplico factorem rationalem $q-x$. Et quoniam factum $q^3 + q^2x - qx^2 - x^3$ æquale est lateri R , pono $m=1$, & inde, cum π fit $\frac{1}{2}$, fit $\lambda-1=-\frac{1}{2}$. Ordinatum igitur reduco ad denominatorem $R^{-\frac{1}{2}}$, & fit

$x^0 \times 3q^0 + 2q^1x + 8q^2x^2 + 8q^3x^3 - 7q^4x^4 - 6q^5x^5 \times \frac{q^3 + q^2x - qx^2 - x^3}{R^{-\frac{1}{2}}}$

Unde est $a=3q^0$, $b=2q^1$ &c. $e=q^3$, $f=q^4$ &c. $\theta=0$, $\theta=1=\eta$, $\lambda=-\frac{1}{2}$, $r=1$, $s=\frac{1}{2}$, $t=1$, $v=0$. Et his in serie scriptis prodit area $\frac{3q^0x + 2q^1x^2 + 8q^2x^3 + 8q^3x^4 - 7q^4x^5 - 6q^5x^6}{q^3 + q^2x - qx^2 - x^3}$, terminis omnibus in serie tota post tertium evanefcentibus.

PROP. VI. THEOR. IV.

Si Curvæ absciffa AB fit z , & fcribantur R pro $e+fz^2+gz^3+bz^4+\&c.$ & S pro $k+lz^2+mz^3+nz^4+\&c.$ fit autem Ordinatum applicata $z^{3-1} R^{-1} S^{m-1}$ in $a+bz^2+cz^3+dz^4+\&c.$ & si terminorum, $e, f, g, b, \&c.$ & $k, l, m, n, \&c.$ rectangula fint

$$\begin{aligned} ek \quad fk \quad gk \quad hk \quad \&c. \\ el \quad fl \quad gl \quad hl \quad \&c. \\ em \quad fm \quad gm \quad hm \quad \&c. \\ en \quad fn \quad gn \quad hn \quad \&c. \end{aligned}$$

Et si rectangulorum illorum coefficientes numerales fint respective

$$\frac{1}{2}=r. \quad r+\lambda=s. \quad s+\lambda=t. \quad t+\lambda=v. \quad \&c.$$

$$r+\mu=s. \quad s+\mu=t. \quad t+\mu=v. \quad v+\mu=w. \quad \&c.$$

$$s+\mu=t. \quad t+\mu=v. \quad v+\mu=w. \quad w+\mu=x. \quad \&c.$$

$$t+\mu=v. \quad v+\mu=w. \quad w+\mu=x. \quad x+\mu=y. \quad \&c.$$

Area

Area Curvæ erit hæc

$$\begin{aligned}
 z^{\theta} R^{\lambda} S^{\eta} \text{ in } & + \frac{e^{\lambda} A}{r \lambda k} \\
 & + \frac{\frac{1}{2} B - \frac{1}{2} \theta \lambda A}{r - 1 \times \theta k} z^{\eta} \\
 & + \frac{\frac{1}{6} C - \frac{1}{6} \theta \lambda A - \frac{1}{6} \theta^2 \lambda^2 A}{r - 1 \times \theta k} z^{2\eta} \\
 & + \frac{\frac{1}{24} D - \frac{1}{24} \theta \lambda C - \frac{1}{24} \theta^2 \lambda^2 B - \frac{1}{24} \theta^3 \lambda^3 A}{r - 1 \times \theta k} z^{3\eta} \\
 & + \frac{\frac{1}{120} E - \frac{1}{120} \theta \lambda D - \frac{1}{120} \theta^2 \lambda^2 C - \frac{1}{120} \theta^3 \lambda^3 B - \frac{1}{120} \theta^4 \lambda^4 A}{r - 1 \times \theta k} z^{4\eta} \\
 & + \&c.
 \end{aligned}$$

Ubi A denotat termini primi coefficientem datam $\frac{a}{r \lambda k}$ cum signo suo $+$ vel $-$, B coefficientem datam secundi, C coefficientem datam tertii, & sic deinceps. Terminorum vero, a , b , c , &c. e , f , g , &c. k , l , m , &c. unus vel plures deesse possunt.

Demonstratur Propositio ad modum præcedentis, & quæ ibi notantur hic obtinent. Pergit autem series talium Propositionum in infinitum, & progressio seriei manifesta est.

PROP. VII. THEOR. V.

Si pro $e + f z^{\theta} + g z^{2\theta} + \&c.$ scribatur R ut supra, & in Curvæ aliqujus Ordinata $z^{\theta + \frac{1}{2} + \theta} R^{\lambda + \frac{1}{2} + \theta}$ maneant quantitates datæ θ , η , λ , e , f , g , &c. & pro σ ac τ scribantur successive numeri quicunque integri: & si detur Area unius ex Curvis quæ per Ordinatas innumeras sic prodeuntes designantur si Ordinatæ sunt duorum nominum in vinculo radices, vel si dentur Areae duarum ex Curvis si Ordinatæ sunt trium nominum in vinculo radices, vel Areae trium ex Curvis si Ordinatæ sunt quatuor nominum in vinculo radices, & sic deinceps in infinitum: dico quod dabuntur Areae curvarum omnium. Pro nominibus hic habeo terminos omnes in vinculo radices tam deficientes quam plenos quorum indices dignitatum sunt in progressionem arithmetica. Sic Ordinata $\sqrt[2\theta + 2\theta + 2\theta]{z^{\theta + \frac{1}{2} + \theta}}$ ob terminos duos inter a^{θ} & $-a^{\theta}$ deficientes pro quinquinomio haberi debet.

At

At $\sqrt{a+x}$ binomium est, & $\sqrt{a+x-\frac{x^2}{a}}$ trinomium, cum progref-
fio jam per majores differentias procedat. Propositio vero sic de-
monstratur.

C A S. I.

Sunto Curvarum duarum Ordinatæ $pz^{b-1} R^{a-1}$ & $qz^{b-1-1} R^{a-1}$,
& Areæ pA & qB , existente R quantitate trium nominum $e+fz+gz^2$.
Et cum per Prop. 3. sit $z^b R^a$ area Curvæ cujus Ordinata est $\theta e + \theta + \lambda \eta$
 $\times fz + \theta + 2\lambda \eta \times gz^2$ in $z^{b-1} R^{a-1}$, subduc Ordinatas & Areas priores de
Area & Ordinata posteriori, & manebit $\theta e - p + \theta \times f - q \times z + \theta \times gz^2$
 $+ \lambda \eta + 2\lambda \eta$
 $\times z^{b-1} R^{a-1}$ Ordinata nova Curvæ, & $z^b R^a - pA - qB$ ejusdem Area.

Pone $\theta e = p$, & $\theta f + \lambda \eta f = q$, & Ordinata evadet $\theta + 2\lambda \eta \times gz^2 \times z^{b-1}$
 R^{a-1} , & Area $z^b R^a - \theta e A - \theta f B - \lambda \eta f B$. Divide utramque per θg
 $+ 2\lambda \eta g$, & Aream prodeuntem dic C , & assumpta utcunque r , erit
 rC Area Curvæ cujus Ordinata est $rz^{b-1-1} R^{a-1}$. Et qua ratione ex
Areis pA & qB Aream rC Ordinatæ $rz^{b-1-1} R^{a-1}$ congruentem in-
venimus, licebit ex Areis qB & rC Aream quartam puta sD , Ordina-
tæ $sz^{b-1-1} R^{a-1}$ congruentem invenire, & sic deinceps in infinitum.
Et par est ratio progressionis ab Areis B & A in partem contra-
rariam pergentis. Si terminorum θ , $\theta + \lambda \eta$, & $\theta + 2\lambda \eta$ aliquis defi-
cit & seriem abruptit, assumatur Area pA in principio progressio-
nis unius & Area qB in principio alterius, & ex his duabus Areis
dabuntur Areæ omnes in progressionem utraque. Et contra, ex
aliis duabus Areis assumptis fit regressus per Analysin ad Areas A &
 B , adeo ut ex duabus datis cæteræ omnes dentur. Q. E. O.

Hic est casus Curvarum ubi ipsius z index θ augetur vel diminui-
tur perpetua additione vel subtractione quantitatis η . Casus alter est
Curvarum ubi index λ augetur vel diminuitur unitatibus.

C A S. II.

Ordinatæ $pz^{b-1} R^a$ & $qz^{b-1-1} R^a$, quibus Areæ pA & qB jam
respondeant, si in R seu $e+fz+gz^2$ ducantur ac deinde ad
 R vicissim applicentur, evadunt $pe + pfz + pgz^2 \times z^{b-1} R^{a-1}$, &
 $qe + qfz + qgz^2 \times z^{b-1} R^{a-1}$.

H

Et

subductione unitatis, utcumque augeatur vel minuatur, dabuntur
 Areae singulis prodeuntibus Ordinatis respondentes. Q. E. O.

C A S. IV.

Et simili argumento si Ordinata constet ex quatuor nominibus in
 vinculo radicali & dantur tres Arearum, vel si constet ex quinque no-
 minibus & dantur quatuor Arearum, & sic deinceps: dabuntur Areae
 omnes quae addendo vel subducendo numerum η indici θ vel unitatem
 indici λ generari possunt. Et par est ratio Curvarum ubi Ordinatae
 ex binomiis constantur, & Area una earum quae non sunt Geome-
 trice quadrabiles datur. Q. E. O.

P R O P. VIII. T H E O R. VI.

Si pro $e + fz' + gz'' + \&c.$ & $k + lx' + mx'' + \&c.$ scribantur R & S
 ut supra, & in Curvae alicujus Ordinata $x^{i+\nu}$ $R^{i+\nu}$ $S^{i+\nu}$ maneant
 quantitates datae $\theta, \eta, \lambda, \mu, e, f, g, k, l, m, \&c.$ & pro $\sigma, \tau, \& \nu$,
 scribantur successive numeri quicumque integri: & si dentur Areae
 duarum ex curvis quae per Ordinatas sic prodeunt designantur si
 quantitates R & S sunt binomia, vel si dentur Areae trium ex curvis
 si R & S conjunctim ex quinque nominibus constant, vel Areae
 quatuor ex curvis si R & S conjunctim ex sex nominibus constant,
 & sic deinceps in infinitum: dico quod dabuntur Areae curvarum
 omnium.

Demonstratur ad modum propositionis superioris.

P R O P. IX. T H E O R. VII.

*Aequantur Curvarum Areae inter se quarum Ordinatae
 sunt reciproce ut fluxiones Abscissarum.*

Nam contenta sub Ordinatis & fluxionibus Abscissarum erunt aequa-
 lia, & fluxiones Arearum sunt ut haec contenta.

C O R O L. I.

Si assumatur relatio quaevis inter Abscissas duarum Curvarum,
 & inde per Prop. 1. quaratur relatio fluxionum Abscissarum, &
 po-

ponantur Ordinatæ reciproce proportionales fluxionibus, inveniri possunt innumeræ Curvæ quarum Areæ sibi mutuo æquales erunt.

COROL. II.

Si enim Curva omnis cujus hæc est Ordinata $z^{b-1} \times e + f z^a + g z^{2a} + \&c.$, assumendo quantitatem quamvis pro v , & ponendo $\frac{z}{v} = s$, & $z' = v$, migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{1}{v} \times \frac{v^{b-a}}{s} \times e + f x' + g x'^{2a} + \&c.$

COROL. III.

Et Curva omnis cujus Ordinata est $z^{b-1} \times a + b z^a + c z^{2a} + \&c. \times e + f z^a + g z^{2a} + \&c.$, assumendo quantitatem quamvis pro v & ponendo $\frac{z}{v} = s$, & $z' = v$, migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{1}{v} \times \frac{v^{b-a}}{s} \times a + b x' + c x'^{2a} + \&c. \times e + f x^a + g x'^{2a} + \&c.$

COROL. IV.

Et Curva omnis cujus Ordinata est $z^{b-1} \times a + b z^a + c z^{2a} + \&c. \times e + f z^a + g z^{2a} + \&c.$, $\times k + l z^a + m z^{2a} + \&c.$, assumendo quantitatem quamvis pro v , & ponendo $\frac{z}{v} = s$, & $z' = v$, migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{1}{v} \times \frac{v^{b-a}}{s} \times a + b x' + c x'^{2a} + \&c. \times e + f x' + g x'^{2a} + \&c.$, $\times k + l x' + m x'^{2a} + \&c.$

COROL. V.

Et Curva omnis cujus Ordinata est $z^{b-1} \times e + f z^a + g z^{2a} + \&c.$, ponendo $\frac{z}{x^{i+1}} = x$, migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{1}{x^{i+1}} \times e + f x^{-a} + g x^{-2a} + \&c.$ id est $\frac{1}{x^{i+1-i-a}} \times f + e x^i$ si duo sunt nomina in vinculo radices, vel $\frac{1}{x^{i+1-i-2a}} \times g + f x^a + e x^{2a}$ si tria sunt nomina; & sic deinceps.

CO₂

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

in aliam sibi æqualem cujus Abscissa x ex data Ordinata v determinatur per æquationem minus affectam $v^{ax} e + f v^{bx} + g v^{cx} + \&c.$

$$= s^a x^a \times k + l v^a + m v^{2a} + \&c. \\ + s^b x^b \times p + q v^b + r v^{2b} + \&c.$$

COROL. IX.

Curva omnis cujus Ordinata est

$$\pi z^{b-1} \times v e + v + \eta f z^{c-1} + v + 2 \eta g z^{2c-1} + \&c. \times e + f z^a + g z^{2a} + \&c. |^{a-1} \text{ in} \\ a + b \times e z^a + f z^{2a} + g z^{4a} + \&c. |^{a-1}, \text{ si sit } \theta = \lambda v, \text{ \& assumentur} \\ x = e z^a + f z^{2a} + g z^{4a} + \&c. |^{a-1}, \sigma = \frac{v}{v}, \text{ \& } \vartheta = \frac{1-v}{v}, \text{ migrat in aliam}$$

sibi æqualem cujus Ordinata est $x^b \times a + b x^c |^{c-1}$. Et nota quod Ordinata prior in hoc Corollario evadit simplicior ponendo $\lambda = 1$, vel ponendo $\tau = 1$, & efficiendo ut radix dignitatis extrahi possit cujus index est ω , vel etiam ponendo $\omega = -1$, & $\lambda = 1 = \tau = \sigma = \pi$, ut alios casus præteream.

COROL. X.

Pro $e z^a + f z^{2a} + g z^{4a} + \&c. \times e z^{b-1} + v + \eta f z^{c-1} + v + 2 \eta g z^{2c-1} + \&c. \\ k + l z^b + m z^{2b} + \&c. \& \eta | z^{c-1} + 2 \eta m z^{2c-1} + \&c. \text{ scribantur } R, r, S \& s \\ \text{respective, \& Curva omnis cujus Ordinata est } \pi S r + \phi R s \times R^{a-1} S^{a-1} \\ \times a S^r + b R^r |^{a-1}, \text{ si sit } \frac{a-v}{\lambda} = \frac{v}{\tau} = \frac{\sigma}{\pi}, \frac{\tau}{\pi} = \tau, \frac{1-v}{\tau} = \vartheta, \text{ \& } R^a S^a = x, \\ \text{migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est } x^b \times a + b x^c |^{c-1}. \text{ Et nota quod Ordinata prior evadit simplicior, ponendo unitates pro } \tau, v, \\ \text{\& } \lambda \text{ vel } \mu, \text{ \& faciendo ut radix dignitatis extrahi possit cujus index est } \omega, \text{ vel ponendo } \omega = -1 \text{ vel } \mu = 0.$

PROP.

P R O P. X. P R O B. III.

Invenire Figuras simplicissimas cum quibus Curva quævis Geometrice comparari potest, cujus Ordinatum applicata y per equationem non affectam ex data Abscissa z determinatur.

C A S. I.

Sit Ordinata az^{l-1} , & Area erit $\frac{1}{l} az^l$, ut ex Prop. 5. ponendo $b=0=c=d=f=g=h$, & $e=1$, facile colligitur.

C A S. II.

Sit Ordinata $az^{l-1} \times e + f z^m + g z^{n-1} + \&c.]^{l-1}$, & si Curva cum Figuris rectilincis Geometrice comparari potest, quadrabitur per Prop. 5. ponendo $b=0=c=d$. Sin minus convertetur in aliam Curvam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{e}{l} \times z^{\frac{l-m}{l}} \times e + f z^m + g z^{n-1} + \&c.]^{l-1}$ per Corol. 2.

Prop. 9. Deinde si de dignitatum indicibus $\frac{l-m}{l}$ & $l-1$ per Prop. 7. rejiciantur unitates donec dignitates illæ fiant quam minimæ, devenietur ad Figuras simplicissimas quæ hac ratione colligi possunt. Dein harum unaquæque per Corol. 5. Prop. 9. dat aliam quæ nonnunquam simplicior est. Et ex his per Prop. 3. & Corol. 9. & 10. Prop. 9. inter se collatis, Figuræ adhuc simpliciores quandoque prodeunt. Denique ex Figuris simplicissimis assumptis facto regressu computabitur Area quæsita.

C A S. III.

Sit Ordinata $z^{l-1} \times a + b z^m + c z^{n-1} + \&c. \times e + f z^m + g z^{n-1} + \&c.]^{l-1}$, & hæc Figura si quadrari potest, quadrabitur per Prop. 5. Sin minus, dif-

distinguenda est Ordinata in partes $z^{n-1} \times a \times e + f z^n + g z^{n+1} + \&c.$ $^{n-1}$, $z^{n-2} \times b z \times e + f z^2 + g z^3 + \&c.$ $^{n-2}$, &c. & per Caf. 2. inveniendæ sunt Figuræ simplicissimæ cum quibus Figuræ partibus illis respondentibus comparari possunt.

Nam Area figurarum partibus illis respondentium sub signis suis + & — conjunctæ component Aream totam quæsitam.

C A S. IV.

Sit Ordinata $z^{n-1} \times a + b z^n + c z^{n+1} + \&c. \times e + f z^n + g z^{n+1} + \&c.$ $^{n-1}$ in $k + l z^n + m z^{n+1} + \&c.$ $^{n-1}$, & si Curva quadrari potest, quadrabitur per Prop. 6. Sin minus, convertetur in simpliciore per Corol. 4. Prop. 9. ac inde comparabitur cum Figuris simplicissimis per Prop. 8. & Corol. 6, 9 & 10. Prop. 9. ut fit in Casu 2 & 3.

C A S. V.

Si Ordinata ex variis partibus constat, partes singulæ pro Ordinatis curvarum totidem habendæ sunt, & Curvæ illæ quotquot quadrari possunt, sigillatim quadrandæ sunt, earumque Ordinatæ de Ordinata tota demendæ. Dein Curva quam Ordinatæ pars residua designat seorsim (ut in Casu 2, 3 & 4.) cum Figuris simplicissimis comparanda est cum quibus comparari potest. Et summa Area-rum omnium pro Area Curvæ propositæ habenda est.

C O R O L. I.

Hinc etiam Curva omnis cujus Ordinata est radix quadratica affecta æquationis suæ, cum Figuris simplicissimis seu rectilineis seu curvilineis comparari potest. Nam radix illa ex duabus partibus semper constat quæ seorsim spectatæ non sunt æquationum radices affectæ.

PRO

Proponatur æquatio $a'y' + z'y' = 1a'y + 2z'y - z'$, & extracta radix erit $y = \frac{a' + z' + \sqrt{a'^2 + 2a'z' - z'^2}}{a' + z'}$, cujus pars rationalis $\frac{a' + z'}{a' + z'}$ & pars irrationalis $\frac{\sqrt{a'^2 + 2a'z' - z'^2}}{a' + z'}$ sunt Ordinatæ curvarum quæ per hanc Propositionem vel quadrari possunt vel cum Figuris simplicissimis comparari cum quibus collationem Geometricam admittunt.

C O R O L. II.

Et Curva omnis cujus Ordinata per æquationem quamvis affectam definitur quæ per Corol. 7. Prop. 9. in æquationem non affectam migrat, vel quadratur per hanc Propositionem si quadrari potest, vel comparatur cum Figuris simplicissimis cum quibus comparari potest. Et hac ratione Curva omnis quadratur cujus æquatio est trium terminorum. Nam æquatio illa si affecta sit, transmutatur in non affectam per Corol. 7. Prop. 9. ac deinde per Corol. 2. & 5. Prop. 9. in simplicissimam migrando, dat vel quadraturam Figuræ si quadrari potest, vel Curvam simplicissimam quacum comparatur.

C O R O L. III.

Et Curva omnis cujus Ordinata per æquationem quamvis affectam definitur quæ per Corol. 8. Prop. 9. in æquationem quadraticam affectam migrat; vel quadratur per hanc Propositionem & hujus Corol. 1. si quadrari potest, vel comparatur cum Figuris simplicissimis cum quibus collationem Geometricam admittit.

S C H O L I U M.

Ubi quadrandæ sunt Figuræ; ad Regulas hæc generales semper recurrere nimis molestum esset: præstat Figuras quæ simpliciores sunt & magis usui esse possunt semel quadrare & quadraturas in Ta-

bulam referre, deinde Tabulam consulere quoties ejusmodi Curvam aliquam quadrare oportet. Hujus autem generis sunt Tabulæ duæ sequentes, in quibus x denotat Abscissam, y Ordinatum rectangulam, & t Arcum Curvæ quadrandæ, & d, e, f, g, h, i sunt quantitates datæ cum signis suis + & —.

TABULA		
CURVARUM SIMPLICIORUM QUÆ QUADRARI POSSUNT		
CURVARUM FORMÆ		CURVARUM AREÆ
I	$dx^{n-1} = y$	$\frac{d}{n} x^n = t$
II	$\frac{dx^{n-1}}{x^2 + \frac{1}{2}f x^2 + f^2 x^2} = y$	$\frac{dx^n}{x^2 + \frac{1}{2}f x^2 + f^2 x^2} = t$ vel $\frac{d}{x^2 + \frac{1}{2}f x^2 + f^2 x^2} = t$
III	1 $dx^{n-1} \sqrt{e + f x^n} = y$	$\int \frac{dx^n}{\sqrt{e + f x^n}} = t$, existente $R = \sqrt{e + f x^n}$
	2 $dx^{n-1} \sqrt{e + f x^n} = y$	$\frac{dx^n}{\sqrt{e + f x^n}} = t$
	3 $dx^{n-1} \sqrt{e + f x^n} = y$	$\frac{dx^n}{\sqrt{e + f x^n}} = t$
	4 $dx^{n-1} \sqrt{e + f x^n} = y$	$\frac{dx^n}{\sqrt{e + f x^n}} = t$
IV	1 $\frac{dx^{n-1}}{\sqrt{e + f x^n}} = y$	$\frac{dx^n}{\sqrt{e + f x^n}} = t$
	2 $\frac{dx^{n-1}}{\sqrt{e + f x^n}} = y$	$\frac{dx^n}{\sqrt{e + f x^n}} = t$
	3 $\frac{dx^{n-1}}{\sqrt{e + f x^n}} = y$	$\frac{dx^n}{\sqrt{e + f x^n}} = t$
	4 $\frac{dx^{n-1}}{\sqrt{e + f x^n}} = y$	$\frac{dx^n}{\sqrt{e + f x^n}} = t$

In Tabulis hisce, series Curvarum cujusque formæ utrinque in infinitum continuari potest. Scilicet in Tabula prima, in numeratoribus Arearum formæ tertię & quartæ, numeri coefficientes initialium terminorum (2, —4, 16, —96, 864, &c.) generantur multiplicando numeros —2, —4, —6, —8, —10, &c. in se continuo, & subsequentium terminorum, coefficientes ex initialibus derivantur multipli-

plicando ipsos gradatim, in Forma quidem tertia, per $-1, -1, -1, -1, -1, \&c.$ in quarta vero per $-1, -1, -1, -1, -1, -1, \&c.$ Et Denominatorum coefficientes 3, 15, 105, &c. prodeunt multiplicando numeros 1, 3, 5, 7, 9, &c. in se continue.

In secunda vero Tabula, series Curvarum formæ primæ, secundæ, quintæ, sextæ, nonæ, & decimæ ope solius divisionis, & formæ reliquæ ope Propositionis tertiæ & quartæ, utrinque producuntur in infinitum.

Quinetiam hæ series mutando signum numeri n variari solent. Sic enim e. g. Curva $\frac{1}{2} \sqrt{e+fz^2} = y$, evadit $\frac{d}{z^{2n}+1} \sqrt{f+ez^2} = y$.

PROP. XI. THEOR. VIII.

Sit ADIC Curva quævis Abscissam habens $AB = z$, & Ordinatum $BD = y$, & sit AEKC Curva alia cujus Ordinata BE æqualis est prioris areæ ADB ad unitatem applicatæ, & AFLC Curva tertia cujus Ordinata BF æqualis est secundæ Areæ AEB ad unitatem applicatæ, & AGMC Curva quarta cujus Ordinata BG æqualis est tertiæ areæ AFB ad unitatem applicatæ, & AFNC Curva quinta cujus Ordinata BH æqualis est quartæ Areæ AGB ad unitatem applicatæ, & sic deinceps in infinitum. Et sunt $A, B, C, D, E, \&c.$ Areæ Curvarum Ordinatas habentium $y, zy, z^2y, z^3y, z^4y, \&c.$ & Abscissam communem z .

Detur Abcissa quævis $AC = t$, sitque $BC = t - z = x$, & sunt P, Q, R, S, T Areæ Curvarum Ordinatas habentium $y, xy, x^2y, x^3y, x^4y \&c.$ & Abscissam communem x .

Terminentur autem hæ Areæ omnes ad Abscissam totam datam AC , nec non ad Ordinatum positione datam & infinite productam Cl :


Et erit Arearum sub initio positarum

Prima ADIC = $A = P$.

Secunda AEKC = $tA - B = Q$.

1 2

Ter-



$$\text{Tertia AFLC} = \frac{11A - 22B + C}{1} = 11R.$$

$$\text{Quarta AGMC} = \frac{12A - 32B + 21C - D}{6} = 11S.$$

$$\text{Quinta AHNC} = \frac{11A - 42B + 61C - 42D + E}{24} = 11T.$$

C O R O L.

Unde si Curvæ quarum Ordinatæ sunt y , zy , $z'y$, $z''y$, &c. vel xy , $x'y$, $x''y$, &c. quadrari possunt, quadrabuntur etiam Curvæ ADIC, AEKC, AFLC, AGMC, &c. & habebuntur Ordinatæ BE, BF, BG, BH, Arcis Curvarum proportionales.

S C H O L I U M.

Quantitatum fluentium Fluxiones esse primas, secundas, tertias, quartas, aliasque diximus supra. Hæ Fluxiones sunt ut termini serierum infinitarum convergentium.

Ut si z sit quantitas fluens & fluendo evadat $z + o$, deinde resolvetur in seriem convergentem $z + noz^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}ooz^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{6}o^2z^{n-3} + \&c.$ terminus primus hujus seriei z erit quantitas illa fluens, secundus noz^{n-1} erit ejus incrementum primum seu differentia prima cui nascenti proportionalis est ejus Fluxio prima, tertius $\frac{n(n-1)}{2}ooz^{n-2}$ erit ejus incrementum secundum seu differentia secunda cui nascenti proportionalis est ejus Fluxio secunda, quartus $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}o^2z^{n-3}$ erit ejus incrementum tertium seu differentia tertia cui nascenti Fluxio tertia proportionalis est, & sic deinceps in infinitum.

Exponi autem possunt hæ Fluxiones per Curvarum Ordinatas BD, BE, BF, BG, BH, &c.

Ut si Ordinata BE ($= \frac{ADB}{1}$) sit quantitas fluens, erit ejus Fluxio prima ut Ordinata BD.

Si BF ($= \frac{AEB}{1}$) sit quantitas fluens, erit ejus Fluxio prima ut Ordinata BE, & Fluxio secunda ut Ordinata BD.

Si BH ($= \frac{AGB}{1}$) sit quantitas fluens, erunt ejus Fluxiones prima, secunda, tertia & quarta, ut Ordinatæ BG, BF, BE, BD respective.

Et hinc in æquationibus quæ quantitates tantum duas incognitas involvunt, quarum una est quantitas uniformiter fluens & altera est Fluxio qualibet quantitatis alterius fluentis, inveniri potest fluens illa

al-


altera per quadraturam Curvarum. Exponatur enim Fluxio ejus per Ordinatum BD, & si hæc sit Fluxio prima, quærat Area ADB = BE × 1, si Fluxio secunda, quærat Area AEB = BF × 1, si Fluxio tertia, quærat Area AFB = BG × 1, &c. & Area inventa erit exponens fluentis quæsitæ.

Sed & in æquationibus quæ fluentem & ejus fluxionem primam sine altera fluente, vel duas ejusdem fluentis fluxiones, primam & secundam, vel secundam & tertiam, vel tertiam & quartam, &c. sine alterutra fluente involvunt: inveniri possunt fluentes per quadraturam Curvarum. Sit æquatio $avv = av + vv$; existente $v = BE$, $\dot{v} = BD$, $z = AB$, & $\dot{z} = 1$, & æquatio illa complendo dimensiones Fluxionum, evadet $avv = avz + vvz$, seu $\frac{avv}{av + vv} = z$.

Jam fluat v uniformiter, & sit ejus Fluxio $\dot{v} = 1$, & erit $\frac{av}{av + vv} = z$, & quadrando Curvam cujus Ordinata est $\frac{av}{av + vv}$ & Abscissa v , habebitur fluens z . Adhæc sit æquatio $avv = av + vv$, existente $v = BF$, $\dot{v} = BE$, $\dot{v} = BD$, & $z = AB$, & per relationem inter \dot{v} & v seu BD & BE invenietur relatio inter AB & BE, ut in exemplo superiore. Deinde per hanc relationem invenietur relatio inter AB & BF quadrando Curvam AEB.

Æquationes quæ tres incognitas quantitates involvunt aliquando reduci possunt ad æquationes quæ duas tantum involvunt, & in his casibus fluentes invenientur ex fluxionibus ut supra. Sit æquatio $a - bx^m = cxy^p + dy^qy^r$, ponatur $y^p = v$, & erit $a - bx^m = cxv + dvv$. Hæc æquatio quadrando Curvam cujus Abscissa est x & Ordinata v dat Aream v , & æquatio altera $y^p = v$, regrediendo ad fluentes, dat $\frac{1}{p+1}y^{p+1} = v$: Unde habetur fluens y .

Quinetiam in æquationibus, quæ tres incognitas involvunt, & ad æquationes quæ duas tantum involvunt, reduci non possunt, fluentes quandoque prodeunt per quadraturam Curvarum. Sit æquatio $ax^m + bx^n = rex^{m-1}y^p + sex^n y^{p-1} - fy^q$, existente $\dot{x} = 1$; Et pars posterior



rior $rex^{m-1}y' + sex^{m-1}yy'^{m-1} - fyy'$, regrediendo ad fluentes, fit $exy^m - \frac{f}{m-1}y^{m+1}$, quæ proinde est ut Area Curvæ cujus Abscissa est x & Ordinata $\sqrt{ax^m + bx^n}$, & inde datur fluens y .

Sit æquatio $x \sqrt{ax^m + bx^n} = \frac{dy y^{m-1}}{\sqrt{e+fy}}$, Et fluens cujus Fluxio est $x \sqrt{ax^m + bx^n}$ erit ut Area Curvæ cujus Abscissa est x & Ordinata est $\sqrt{ax^m + bx^n}$. Item fluens cujus Fluxio est $\frac{dy y^{m-1}}{\sqrt{e+fy}}$ erit ut Area Curvæ cujus Abscissa est y & Ordinata $\frac{dy^{m-1}}{\sqrt{e+fy}}$, id est (per Casum 1. Formæ quartæ

Tab. I.) ut Area $\frac{x^d}{d} \sqrt{e+fy}$. Pono ergo $\frac{x^d}{d} \sqrt{e+fy}$ æqualem Areae Curvæ cujus Abscissa est x & Ordinata $\sqrt{ax^m + bx^n}$, & habebitur fluens y .

Et nota quod fluens omnis, quæ ex Fluxione prima colligitur, augeri potest vel minui quantitate quavis non fluente. Quæ ex Fluxione secunda colligitur, augeri potest vel minui quantitate quavis cujus Fluxio secunda nulla est. Quæ ex fluxione tertia colligitur, augeri potest vel minui quantitate quavis cujus fluxio tertia nulla est. Et sic deinceps in infinitum.

Postquam fluentes ex fluxionibus collectæ sunt, si de veritate Conclusionis dubitatur, fluxiones fluentium inventarum vicissim colligendæ sunt, & cum Fluxionibus sub initio propositis comparandæ. Nam si prodeunt æquales, Conclusio recte se habet: sin minus, corrigendæ sunt fluentes sic, ut earum Fluxiones fluxionibus sub initio propositis æquantur. Nam & fluens pro lubitu assumi potest, & assumptio corrigi, ponendo fluxionem fluentis assumptæ æqualem Fluxioni propositæ, & terminos homologos inter se comparando.

Et his principiis via ad majora sternitur.

41.

ENUMERATIO
LINEARUM
TERTII ORDINIS.

E N U M E R A T I O L I N E A R U M T E R T I I O R D I N I S .

I. *Linearum Ordines.*



Lineæ Geometricæ secundum numerum dimensionum æquationis qua relatio inter Ordinatæ & Abscissas definitur, vel (quod perinde est) secundum numerum punctorum in quibus a linea recta secari possunt, optime distinguuntur in Ordines. Qua ratione linea primi Ordinis erit Recta sola, eæ secundi sive quadratici Ordinis erunt sectiones Conicæ & Circulus, & eæ tertii sive cubici Ordinis Parabola Cubica, Parabola *Neiliana*, Cissois veterum, & reliquæ quas hic enumerare suscepimus. Curva autem primi Generis, (siquidem recta inter Curvas non est numeranda) eadem est cum Linea secundi Ordinis, & Curva secundi Generis eadem cum Linea Ordinis tertii. Et Linea Ordinis infinitesimi ea est quam recta in punctis infinitis secare potest, qualis est Spiralis, Cyclois, Quadratrix, & linea omnis quæ per radii vel rotæ revolutiones infinitas generatur.

II. *Proprietates Sectionum Conicarum competunt Curvis superiorum Generum.*

Sectionum Conicarum proprietates præcipuæ a Geometris passim traduntur. Et consimiles sunt proprietates Curvarum secundi Generis, & reliquarum, ut ex sequenti proprietatum præcipuarum enumeratione constabit.

1. *De Curvarum secundi generis Ordinatis, Diametris, Verticibus, Centris, Axis.*

Si rectæ plures parallelæ & ad Conicam sectionem utrinque terminatæ ducantur, recta duas earum bifecans bifecabit alias omnes, ideoque dicitur *Diameter* figuræ & rectæ bifectæ dicuntur *Ordinatim applicatæ* ad Diametrum, & concursus omnium Diametrorum est *Centrum* figuræ, & intersectio Curvæ & diametri *Vertex* nominatur, & diameter illa *Axis* est cui Ordinatim applicatæ insistant ad angulos rectos. Et ad eundem modum in Curvis secundi Generis, si rectæ duæ quævis parallelæ ducantur occurrentes Curvæ in tribus punctis: recta quæ ita secat has parallelas ut summa duarum partium ex uno secantis latere ad Curvam terminatarum æquetur parti tertiæ ex altero latere ad curvam terminatæ, eodem modo secabit omnes alias his parallelas curvæque in tribus punctis occurrentes rectas, hoc est, ita ut summa partium duarum ex uno ipsius latere semper æquetur parti tertiæ ex altero latere. Has itaque tres partes quæ hinc inde æquantur, *Ordinatim applicatas*, & rectam secantem cui Ordinatim applicantur *Diametrum*, & intersectionem diametri & Curvæ *Verticem*, & concursum duarum Diametrorum *Centrum* nominare licet. Diameter autem ad Ordinatas reſtangula si modo aliqua sit, etiam *Axis* dici potest, & ubi omnes Diametri in eodem puncto concurrunt, istud erit *Centrum generale*.

2. *De Asymptotis & earum proprietatibus.*

Hyperbola primi generis duas *Asymptotas*, ea secundi tres, e tertii quatuor & non plures habere potest, & sic in reliquis. Et quemadmodum partes lineæ cujuscvis rectæ inter Hyperbolam Conicam & duas ejus Asymptotas sunt hinc inde æquales: sic in Hyperbolis secundi Generis si ducatur recta quævis secans tam Curvam quam tres ejus Asymptotas in tribus punctis, summa duarum partium istius rectæ quæ a duobus quibusvis Asymptotis in eandem plagam ad duo puncta Curvæ extenduntur, æqualis erit parti tertiæ quæ a tertia Asymptoto in plagam contrariam ad tertium Curvæ punctum extenditur.

3. *De Lateribus rectis & transversis.*

Et quemadmodum in Conicis sectionibus non Parabolicis quadratum Ordinatum applicatæ, hoc est, rectangulum Ordinarum quæ ad contrarias partes Diametri ducuntur, est ad rectangulum partium Diametri quæ ad Vertices Ellipseos vel Hyperbolæ terminantur, ut data quædam linea quæ dicitur *Latus rectum*, ad partem Diametri quæ inter Vertices jacet & dicitur *Latus transversum*: sic in Curvis non Parabolicis secundi Generis parallelepipedum sub tribus Ordinatis applicatis est ad parallelepipedum sub partibus Diametri ad Ordinatas & tres Vertices figuræ abscissis, in ratione quadam data: in qua ratione si sumantur tres rectæ ad tres partes diametri inter vertices figuræ sitas, singulæ ad singulas, tunc illæ tres rectæ dici possunt *Latera recta* figuræ, & illæ partes Diametri inter Vertices *Latera transversa*. Et sicut in Parabola Conica quæ ad unam & eandem diametrum unicum tantum habet Verticem, rectangulum sub Ordinatis æquatur rectangulo sub parte Diametri quæ ad Ordinatas & Verticem abscinditur & recta quadam data quæ *Latus rectum* dicitur: sic in Curvis secundi Generis quæ non nisi duos habent Vertices ad eandem Diametrum, parallelepipedum sub Ordinatis tribus æquatur parallelepipedo sub duabus partibus Diametri ad Ordinatas & Vertices illos duos abscissis & recta quadam data quæ proinde *Latus rectum* dici potest.

4. *De Ratione contentorum sub Parallelarum segmentis.*

Denique sicut in Conicis sectionibus ubi duæ parallelæ ad Curvam utrinque terminatæ secantur a duabus parallelis ad Curvam utrinque terminatis, prima a tertia, & secunda a quarta, rectangulum partium primæ est ad rectangulum partium tertiæ ut rectangulum partium secundæ ad rectangulum partium quartæ: sic ubi quatuor tales rectæ occurrunt Curvæ secundi Generis, singulæ in tribus punctis, parallelepipedum partium primæ rectæ erit ad parallelepipedum partium tertiæ, ut parallelepipedum partium secundæ ad parallelepipedum partium quartæ.

5. *De Cruribus Hyperbolicis & Parabolicis & eorum plagis.*

Curvarum secundi & superiorum Generum æque atque primi cru-

ra omnia in infinitum progredientia vel *Hyperbolici* sunt generis vel *Parabolici*. Crus *Hyperbolicum* voco quod ad Asymptoton aliquam in infinitum appropinquat; *Parabolicam* quod Asymptoto destituitur. Hæc crura ex Tangentibus optime dignoscuntur. Nam si punctum contactus in infinitum abeat, Tangens cruris Hyperbolici cum Asymptoto coincidat, & Tangens cruris Parabolici in infinitum recedat, evanescet & nullibi reperietur. Invenitur igitur Asymptotos cruris cujusvis quærendo Tangentem cruris illius ad punctum infinite distans. Plaga autem cruris infiniti invenitur quærendo positionem rectæ cujusvis quæ Tangenti parallela est ubi punctum contactus in infinitum abit. Nam hæc recta in eandem plagam cum crure infinito dirigitur.

III. *Reductio Curvarum omnium Generis Secundi ad æquationum casus quatuor.*


Lineæ omnes Ordinis primi, tertii, quinti, septimi & imparis cujusque duo habent ad minimum crura in infinitum versus plagas oppositas progredientia. Et lineæ omnes tertii Ordinis duo habent ejusmodi crura in plagas oppositas progredientia in quas nulla alia earum crura infinita (præterquam in Parabola *Cartesiana*) tendunt.

C A S. I.

Si crura illa sint Hyperbolici generis, sit GAS eorum Asymptotos, & huic parallela agatur recta quævis CBe ad Curvam utrinque (si fieri potest) terminata, eademque bifecetur in puncto X, & locus puncti illius X erit Hyperbola Conica (puta X ϕ) cujus una Asymptotos est AG. Sit ejus altera Asymptotos AB, & æquatio qua relatio inter Ordinatam BC & Abscissam AB definitur, si AB dicatur x , & BC y , semper induet hanc formam $xy + ey = ax^2 + bxx + cx + d$. Ubi termini, e, a, b, c, d , designant quantitates datas signis suis + & - affectas, quarum qualibet deesse possunt

modo ex earum defectu figura in sectionem Conicam non vertatur. Potest autem Hyperbola illa Conica cum Asymptotis suis coincidere, id est punctum X in recta AB locari: & tunc terminus $+ey$ deest.


CAS.



CAS. II.

At si recta illa CBc non potest utrinque ad Curvam terminari, sed Curvæ in unico tantum puncto occurrit: age quamvis positione datam rectam AB Asymptoto AS occurrentem in A, ut & aliam quamvis BC Asymptoto illi parallelam Curvæque occurrentem in puncto C, & æquatio qua relatio inter Ordinatam BC & Abscissam AB definitur, semper induet hanc formam,


$$xy = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$



CAS. III.

Quod si crura illa opposita Parabolici sint generis, recta CBc ad Curvam utrinque, si fieri potest, terminata in plagam crurum ducatur & biseccetur in B, & locus puncti B erit Linea recta. Sit ista AB, terminata ad datum quodvis punctum A, & æquatio qua relatio inter Ordinatam BC & Abscissam AB definitur, semper induet hanc formam,


$$yy = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$



CAS. IV.

At vero si recta illa CBc in unico tantum puncto occurrat Curvæ, ideoque ad Curvam utrinque terminari non possit: sit punctum illud C, & incidat recta illa ad punctum B in rectam quamvis aliam positione datam & ad datum quodvis punctum A terminatam AB: & æquatio qua relatio inter Ordinatam BC & Abscissam AC definitur, semper induet hanc formam,

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$



Nomina formarum.

Enumerando Curvas horum casuum, Hyperbolam vocabimus, *Inscriptam*, quæ tota jacet in Asymptoton angulo ad instar Hyperbolæ conicæ; *Circumscriptam*, quæ Asymptotos secat & partes Abscissas in sinu suo amplectitur; *Ambigenam*, quæ uno crure infinito inscribitur & altero circumscribitur; *Convergentem*, cujus crura concavitate sua se invicem respiciunt & in plagam eandem diriguntur; *Divergentem*, cujus crura convexitate sua se invicem respiciunt & in plagas contrarias diriguntur; *Cruribus Contrariis præditam*, cujus crura in partes contrarias convexa sunt & in plagas contrarias infinita; *Conchoidalem*, quæ vertice concavo & cruribus divergentibus ad Asymptoton applicatur; *Angineam*, quæ flexibus contrariis Asymptoton secat & utrinque in crura contraria producit; *Cruciformem*, quæ conjugatam decussat; *Nodatam*, quæ seipsam decussat in orbem redeundo; *Cuspidatam*, cujus partes duæ in angulo contactus concurrunt & ibi terminantur; *Punctatam*, quæ conjugatam habet Ovale infinite parvam id est punctum; & *Puram*, quæ per impossibilitatem duarum radicum Ovali, Nodo, Cuspide & Puncto conjugato privatur. Eodem sensu Parabolam quoque *convergentem*, *divergentem*, *cruribus contrariis præditam*, *cruciformem*, *nodatam*, *cuspidatam*, *punctatam* & *puram* nominabimus.

In casu primo si terminus ax affirmativus est, Figura erit Hyperbola triplex cum sex cruribus Hyperbolicis quæ juxta tres Asymptotos quarum nullæ sunt parallelæ, in infinitum progrediuntur, binæ juxta unamquamque in plagas contrarias. Et hæ Asymptoti si terminus bx non deest, se mutuo secabunt in tribus punctis triangulum (Dd) inter se continentes, sin terminus bx deest, convergent omnes ad idem punctum. In priori casu cape $AD = \frac{b}{a}$, & $Ad = A\delta = \frac{b}{a}$, ac junge Dd, Dδ, & erunt Ad, Dd, Dδ tres Asymptoti. In posteriori duc Ordinatam quamvis BC, Ordinatæ principali AG parallelam, & in ea utrinque producta cape hinc inde BF & Bf sibi mutuo æquales & in ea ratione ad AB quam habet \sqrt{a} ad 1, jungeque AF, Af & erunt AG, AF, Af tres Asymptoti. Hanc Hyperbolam vocamus *Redundantem*, quia numero crurum Hyperbolicorum Sectiones Conicas superat.

In Hyperbola omni Redundante, si neque terminus cy desit, neque sit $bb - 4ac$ æquale $+ aey$, Curva nullam habebit Diametrum,


4in

fin eorum alterutrum accidit Curva habebit unicam Diametrum, & tres si utrumque. Diameter autem semper transit per intersectionem duarum Asymptoton, & bisecat rectas omnes quæ ad Asymptotos illas utrinque terminantur & parallelæ sunt Asymptoto tertiæ. Estque Abscissa AB diameter Figuræ quoties terminus c deest. *Diameter* vero absolute dictam hic & in sequentibus in vulgari significato usurpo, nempe pro Abscissa quæ pallim habet Ordinatæ binas æquales ad idem punctum hinc inde insistentes.

IV. Enumeratio Curvarum.

1. De Hyperbolis novem redundantibus quæ diametro destituuntur & tres habent Asymptotos triangulum capientes.


Si Hyperbola redundans nullam habet diametrum, quærantur Equationis hujus $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ radices quatuor seu valores ipsius x . Eæ sunt AP, A π , A π , Ap. Erigantur Ordinatæ PT, $\pi\tau$, πj , pt, & hæ tangent Curvam in punctis totidem T, τ , j , t, & tangendo dabunt limites Curvæ per quos Species ejus innotescet.



Nam si radices omnes AP, A π , Ap, (Fig. 1, 2.) sunt reales, ejusdem signi & inæquales, Curva constat ex tribus Hyperbolis, (inscripta, circumscripta & ambigena) cum Ovali. Hyperbolarum una jacet versus D, altera versus d, tertia versus δ , & Ovalis semper jacet intra Triangulum Ddd, atque etiam inter medios limites

tes


tes γ & τ , in quibus utique tangitur ab Ordinatis $\pi\gamma$ & $\pi\tau$. Et hæc est *Species prima*.



Si e radicibus duæ maximæ $A\pi$, Ap , (Fig. 2.) vel duæ minimæ AP , $A\pi$ (Fig. 4.) æquantur inter se, & ejusdem sunt signi cum alteris duobus, Ovalis & Hyperbola circumscripta sibi invicem junguntur coeuntibus earum punctis contactus γ & t vel T & τ , & crura Hyperbolæ sese decussando in Ovalem continentur, figuram *Nodatam* efficiunt. Quæ *Species est secunda*.

Si e radicibus tres maximæ Ap , $A\pi$, $A\pi$, (Fig. 5.) vel tres minimæ $A\pi$, $A\pi$, AP (Fig. 6.) æquantur inter se, Nodus in *Cuspidem* acutissimum convertetur. Nam crura duo Hyperbolæ circumscriptæ ibi in angulo contactus concurrent & non ultra producentur. Et hæc est *Species tertia*.


Si e radicibus duæ mediæ $A\pi$ & $A\pi$ (Fig. 7.) æquantur inter se, puncta contactus τ & γ coincidunt, & propterea Ovalis interjecta in punctum evanuit, & constat figura ex tribus Hyperbolis, inscripta, circumscripta & ambigena cum *Puncto* conjugato. Quæ est *Species quarta*.



Si duæ ex radicibus sunt impossibiles & reliquæ duæ inæquales & ejusdem signi (nam signa contraria habere nequeunt,) *Pura* habebuntur


tur Hyperbolæ tres sine Ovali vel Nodo vel Cuspide vel Puncto conjugato, & hæ Hyperbolæ vel ad latera trianguli ab Asymptotis comprehensi vel ad angulos ejus jacebunt; & perinde *Speciem* vel *quintam* (Fig. 7. 8.) vel *sextam* (Fig. 9, 10.) confluent.

Si e radicibus duæ sunt æquales & alteræ duæ vel impossibiles sunt (Fig. 11. 13.) vel reales (Fig. 12. 14.) cum signis quæ a signis æqualium radicum diversa sunt, figura *Cruciformis* habebitur, nempe duæ ex Hyperbolis se invicem decussabunt idque vel ad verticem trianguli ab Asymptotis comprehensi (Fig. 13, 14) vel ad ejus basem (Fig. 11, 12.) Quæ duæ *Species* sunt *septima* & *octava*.



Si denique radices omnes sunt impossibiles (Fig. 15.) vel si omnes sunt reales & inæquales (Fig. 16.) & earum duæ sunt affirmativæ & alteræ duæ negativæ, tunc duæ habebuntur Hyperbolæ ad angulos oppositos duarum Asymptoton cum Hyperbola *Anguinea* circa Asymptoton tertiam. Quæ *Species* est *nona*.


Et hi sunt omnes radicum casus possibiles. Nam si duæ radices sunt æquales inter se, & aliæ duæ sunt etiam inter se æquales, Figura evadet Sectio Conica cum Linea recta.



2. De Hyperbolis duodecim redundantibus unicum tantum Diametrum habentibus.

Si Hyperbola redundans habet unicum tantum Diametrum, sit ejus Diameter Abscissa AB, & æquationis hujus $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ quære tres radices seu valores x .

Si radices illæ sunt omnes reales & ejusdem signi, Figura constabit ex Ovali intra triangulum Ddδ (Fig. 17.) jacente & tribus Hyperbolicis ad angulos ejus, nempe Circumscripta ad angulum D & Inscriptis duabus ad angulos d & δ. Et hæc est Species decima.




Si radices duæ majores sunt æquales & tertia ejusdem signi, crura Hyperbolæ jacentis versus D (Fig. 18.) sese decussabunt in forma Nodi propter contactum Ovalis. Quæ Species est undecima.

Si tres radices sunt æquales, Hyperbola ista fit Cuspidata sine Ovali, (Fig. 19.) Quæ Species est duodecima.

Si radices duæ minores sunt æquales & tertia ejusdem signi, Ovalis in Punctum evanuit, (Fig. 20.) Quæ Species est decima tertia.


In speciebus quatuor novissimis Hyperbola quæ jacet versus D, Asymptotos in sinu suo amplectitur, reliquæ duæ in sinu Asymptoton jacent.

Si duæ ex radicibus sunt impossibiles habebuntur tres Hyperbolæ




Pure sine Ovali decussatione vel cuspidate. Et hujus casus Species sunt quæ-


quatuor : nempe *decima quarta* si Hyperbola Circumscripta jacet versus D, (Fig. 20.) & *decima quinta* si Hyperbola Inscripta jacet versus D, (Fig. 21.) *decima sexta* si Hyperbola Circumscripta jacet sub basi dd trianguli Ddd, (Fig. 22.) & *decima septima* (Fig. 23.) si Hyperbola inscripta jacet sub eadem basi.



Si duæ radices sunt æquales & tertia signi diversi figura erit *Cruciformis*. Nempe duæ ex tribus Hyperbolis se invicem decussabunt idque vel ad verticem trianguli ab Asymptotis comprehensi (Fig. 24.) vel ad ejus basem, (Fig. 25.) Quæ duæ Species sunt *decima octava*, & *decima nona*.




Si duæ radices sunt inæquales & ejusdem signi & tertia est signi diversi, duæ habebuntur Hyperbolæ in oppositis angulis duarum Asymptoton cum *Conchoidali* intermedia. *Conchoidalis* autem vel jacebit ad easdem partes Asymptoti suæ cum triangulo ab Asymptotis constituto, (Fig. 26.) vel ad partes contrarias, (Fig. 27.) Et hi duo casus constituunt *Speciem vigesimam* & *vigesimam primam*.



3. De Hyperbolis duabus redundantibus cum tribus Diametris.

Hyperbola redundans quæ habet tres diametros, constat ex tribus Hyperbolis in sinibus Asymptoton jacentibus, idque vel ad angulos trianguli ab Asymptotis comprehensi (Fig. 28.) vel ad ejus latera (Fig. 29.) Casus prior dat Speciem vigesimam secundam, & posterior Speciem vigesimam tertiam.




4. De Hyperbolis novem redundantibus cum Asymptotis tribus ad commune punctum convergentibus.

Si tres Asymptoti in puncto communi se mutuo decussant, vertuntur species quinta & sexta in vigesimam quartam, (Fig. 30.) septima & octava in vigesimam quintam, (Fig. 31.) & nona in vigesimam sextam (Fig. 32.) ubi Anguinea non transit per concursum Asymptoton, & in vigesimam septimam ubi transit per concursum illum, (Fig. 33.) quo casu termini b ac d desunt, & concursus Asymptoton est Centrum figuræ ab omnibus ejus partibus oppositis æqualiter distans. Et hæc quatuor species diametrum non habent.


Vertuntur etiam Species decima quarta ac decima sexta in vigesimam octavam, (Fig. 34.) decima quinta ac decima septima in vigesimam

nam nonam, (Fig. 35.) decima octava & decima nona in *tricesima*, (Fig. 36.) & vigesima cum vigesima prima in *tricesima primam*, (Fig. 37.) Et hæ species unicam habent Diametrum.



Ac denique species vigesima secunda & vigesima tertia vertuntur in *Speciem tricesimam secundam* cujus tres sunt Diametri per concursum Asymptoton transeuntes. (Fig. 38.)

Quæ omnes conversiones facillime intelliguntur faciendo ut triangulum ab Asymptotis comprehensum diminuatur donec in punctum evanescat.



5. De Hyperbolis sex defectivis diametrum non habentibus.

Si in primo æquationum casu terminus ax^3 negativus est, Figura erit Hyperbola defectiva unicam habens Asymptoton & duo tantum crura Hyperbolica juxta Asymptoton illam in plagas contrarias infinite progredientia. Et Asymptotos illa est Ordinata prima & principalis AG. Si terminus ey non deest figura nullam habebit Diametrum, si deest habebit unicam. In priori casu species sic enumerantur.

Si æquationis hujus $ax^4 = bx^3 + cx^2 + dx + ee$ radices omnes $A\pi$, AP , Ap , $A\pi$, (Fig. 9.) sunt reales & inæquales, Figura erit Hyperbola Anguinea asymptoton flexu contrario amplexa, cum Ovali conjugata. Quæ Species est *tricesima tertia*.


L 3

Si


Si radices duæ mediæ AP & Ap (Fig. 40.) æquantur inter se, Ovalis & Anguinea junguntur sese decussantes in forma *Nodi*. Quæ est *Species tricesima quarta*.

Si tres radices sunt æquales, Nodus vertetur in *Cuspidem* acutissimum in vertice Anguineæ, (Fig. 41.) Et hæc est *Species tricesima quinta*.

Si e tribus radicibus ejusdem signi duæ maximæ Ap & $A\pi$ (Fig. 43.) sibi mutuo æquantur, Ovalis in *Punctum* evanuit. Quæ *Species* est *tricesima sexta*.



Si radices duæ quævis imaginariæ sunt, sola manebit Anguinea *Pura* sine Ovali, Decussatione, Cuspide vel Puncto conjugato. Si Anguinea illa non transit per punctum A (Fig. 42.) *Species* est *tricesima septima*; sin transit per punctum illud A (id quod contingit ubi termini b ac d defunt,) punctum illud A erit centrum figuræ rectas omnes per ipsum ductas & ad Curvam utrinque terminatas bifecans, (Fig. 43.) Et hæc est *Species tricesima octava*.



6. De Hyperbolis septem defectivis diametrum habentibus.

In altero casu ubi terminus cy deest & propterea figura Diametrum habet, si æquationis hujus $ax^2 = bx^2 + cx + d$ radices omnes AT , At , Ar , (Fig. 44.) sunt reales, inæquales & ejusdem signi, figura erit Hyperbola Conchoidalis cum Ovali ad convexitatem. Quæ est *Species tricesima nona*. Si

Si duæ radices sunt inæquales & ejusdem signi & tertia est signi contrarii, *Ovalis* jacebit ad concavitatem *Conchoidalis*, (Fig. 45.) Estque *Species quadragesima*.


Si radices duæ minores AT , At , (Fig. 46.) sunt æquales, & tertia $A\pi$ est ejusdem signi, *Ovalis* & *Conchoidalis* jungentur sese decussando in modum *Nodi*. Quæ *Species* est *quadragesima prima*.

Si tres radices sunt æquales, *Nodus* mutabitur in *Cuspidem*, & figura erit *Cissois Veterum*, (Fig. 47.) Et hæc est *Species quadragesima secunda*.

Si radices duæ majores sunt æquales, & tertia est ejusdem signi, *Conchoidalis* habebit *Punctum* conjugatum ad convexitatem suam, (Fig. 49.) Estque *Species quadragesima tertia*.

Si radices duæ sunt æquales, & tertia est signi contrarii *Conchoidalis* habebit *Punctum* conjugatum ad concavitatem suam, (Fig. 49.) Estque *Species quadragesima quarta*.

Si radices duæ sunt impossibiles habebitur *Conchoidalis Pura* sine *Ovali*, *Nodo*, *Cuspide* vel *Puncto* conjugato (Fig. 48. 49.) Quæ *Species* est *quadragesima quinta*.



7. De Hyperbolis septem Parabolicis Diametrum non habentibus.

Si quando in primo æquationum casu terminus ax^3 deest & terminus bx^2 non deest, Figura erit Hyperbola Parabolica duo habens crura Hyperbolica ad unam Asymptoton SAG & duo Parabolica in plagam unam & eandem convergentia. Si terminus cy non deest figura nullam habebit diametrum, sin deest habebit unicam. In priori casu *Species* sunt hæc.

Si tres radices AP , $A\pi$, $A\pi$ (Fig. 50.) æquationis hujus $bx^3 + cx^2 + dx + ee = 0$ sunt inæquales & ejusdem signi, figura constabit ex *Ovali* & aliis duabus Curvis quæ partim Hyperbolicae sunt & partim Parabolicae. Nempe crura Parabolica continuo ductu junguntur cru-

88 ENUMERATIO LINEARUM


cruribus Hyperbolicis sibi proximis. Et hæc est *Species quadragesima sexta*.

Si radices duæ minores sunt æquales, & tertia est ejusdem signi, Ovalis & una Curvarum illarum Hyperbolo-Parabolicarum junguntur & se decussant in formam *Nodi* (Fig. 51.) Quæ *Species* est *quadragesima septima*.

Si tres radices sunt æquales, Nodus ille in Cuspide vertitur (Fig. 52.) Estque *Species quadragesima octava*.


Si radices duæ majores sunt æquales & tertia est ejusdem signi, Ovalis in *Punctum* conjugatum evanuit (Fig. 53.) Quæ *Species* est *quadragesima nona*.

Si duæ radices sunt impossibiles, manebunt *Pura* illæ duæ curvæ Hyperbolo-parabolicæ sine Ovali, Decussatione, Cuspide vel *Puncto* conjugato; & *Speciem quinquagesimam* constituent. (Fig. 53. 54.)



Si radices duæ sunt æquales & tertia est signi contrarii, Curvæ illæ Hyperbolo-parabolicæ junguntur sese decussando in morem crucis (Fig. 55.) Estque *Species quinquagesima prima*.

Si radices duæ sunt inæquales & ejusdem signi & tertia est signi contrarii, figura evadet Hyperbola Anguinea circa Asymptoton AG, (Fig. 56.) cum Parabola conjugata. Et hæc est *Species quinquagesima secunda*.



8. De Hyperbolis quatuor Parabolicis Diametrum habentibus.

In altero casu ubi terminus ey deest & figura Diametrum habet, si duæ radices æquationis hujus $bx^2 + cx + d = 0$ sunt impossibiles, duæ habentur figuræ Hyperbolo-parabolicæ a Diametro AB (Fig. 57.) hinc inde æqualiter distantes. Quæ Species est *quingagesima tertia*.

Si æquationis illius radices duæ sunt impossibiles, Figuræ Hyperbolo-parabolicæ junguntur sese decussantes in morem crucis; & Species *quingagesimam quartam* constituunt. (Fig. 58.)

Si radices illæ sunt inæquales & ejusdem signi, habetur Hyperbola Conchoidalis cum Parabola ex eodem latere Asymptoti (Fig. 59.) Estque Species *quingagesima quinta*.

Si radices illæ sunt signi contrarii, habetur Conchoidalis cum Parabola ad alteras partes Asymptoti (Fig. 60.) Quæ Species est *quingagesima sexta*.

9. De Quatuor Hyperbolismis Hyperbolæ.

Si quando in primo æquationum casu terminus uterque ax^2 & bx^2 deest, figura erit Hyperbolismus sectionis alicujus Conicæ. Hyperbolismus figuræ voco cujus Ordinata prodit applicando contentum sub Ordinata figuræ illius & recta data ad Abscissam communem. Hac ratione linea recta vertitur in Hyperbolam Conicam, & sectio omnis Conica vertitur in aliquam figurarum quas hic Hyperbolismos sectionum Conicarum voco. Nam æquatio ad figuras


de quibus agimus, nempe $xy^2 + ey = cx + d$, dat $y = \frac{\pm \sqrt{cx + d} \pm \sqrt{cx + d + \frac{e^2}{4x}}}{2x}$

quæ generatur applicando contentum sub Ordinata sectionis Conicæ $\frac{\pm \sqrt{cx + d} \pm \sqrt{cx + d + \frac{e^2}{4x}}}{2x}$ & recta data m , ad curvarum Abscissam commu-

nem x . Unde liquet quod figura genita Hyperbolismus erit Hyperbolæ, Ellipseos vel Parabolæ, perinde ut terminus cx affirmativus est vel negativus vel nullus.

M


Hy-



Hyperbolismus Hyperbolæ tres habet Asymptotos, quarum una est Ordinata prima & principalis Ad, alteræ duæ sunt parallelæ Abscissæ AB, ab eadem hinc inde æqualiter distant. In Ordinata principali Ad, cape Ad, Ad hinc inde æquales quantitati vc ; & per puncta d ac d age dg, $\delta\gamma$ Asymptotos Abscissæ AB parallelas.


Ubi terminus cy non deest figura nullam habet diametrum. In hoc casu, si æquationis hujus $cx^2 + dx + ee = 0$ radices duæ AP, Ap (Fig. 61.) sunt reales & inæquales (nam æquales esse nequeunt nisi figura sit Conica sectio) figura conflabit ex tribus Hyperbolis sibi oppositis quarum una jacet inter Asymptotos parallelas & alteræ duæ jacent extra. Et hæc est Species quinquagesima septima.

Si radices illæ duæ sunt impossibiles, habentur Hyperbolæ duæ oppositæ extra Asymptotos parallelas & Anginea Hyperbolica intra easdem. Hæc figura duarum est specierum. Nam centrum non habet ubi terminus d non deest (Fig. 62.) sed si terminus ille deest punctum A est ejus centrum (Fig. 63.) Prior Species est quinquagesima octava, posterior quinquagesima nona.



Quod si terminus cy deest, figura conflabit ex tribus Hyperbolis oppositis, quarum una jacet inter Asymptotos parallelas & alteræ duæ jacent extra ut in specie quinquagesima quarta, & præterea

terea diametrum habet quæ est Abscissa AB (Fig. 64.) Et hæc est *Species sexagesima*.



10. De tribus Hyperbolifmis Ellipseos.


Hyperbolifmus Ellipseos per hanc æquationem definitur $xy' + ey = cx + d$, & unicam habet Afymptoton quæ est Ordinata principalis Ad (Fig. 65.) Si terminus ey non deest, figura est Hyperbola Anginea line diametro, atque etiam sine centro si terminus d non deest. Quæ *Species* est *sexagesima prima*.

At si terminus d deest, figura habet centrum sine diametro, & centrum ejus est punctum A (Fig. 66.) *Species* vero est *sexagesima secunda*.

Et si terminus ey deest, & terminus d non deest, figura est Conchoidalis ad Afymptoton AG (Fig. 67.) habetque diametrum sine centro, & diameter ejus est Abicissa AB. Quæ *Species* est *sexagesima tertia*.


11. De duobus Hyperbolifmis Parabolæ.

Hyperbolifmus Parabolæ per hanc æquationem definitur $xy' + ey = d$, & duas habet Afymptotos, Abscissam AB & Ordinatat primam & principalem AG. Hyperbolæ vero in hac figura sunt duæ, non in Afymptoton angulis oppositis sed in angulis qui sunt deinceps jacentes, idque ad utrumque latus abscissæ AB, & vel sine diametro si terminus ey habetur, (Fig. 68.) vel cum diametro si terminus ille deest (Fig. 69.) Quæ duæ *Species* sunt *sexagesima quarta* & *sexagesima quinta*.



12. De Tridente.

In Secundo æquationum casu habebatur æquatio $xy = ax' + bx' + cx + d$. Et figura in hoc casu habet quatuor crura infinita quorum duo sunt Hyperbolica circa Asymptoton AG (Fig. 72.) in contrarias partes tendentia & duo Parabolica convergentia & cum prioribus speciem Tridentis fere efformantia. Estque hæc Figura Parabola illa per quam Cartesius æquationes sex dimensionum construxit. Hæc est igitur Species sexagesima sexta.



13. De Parabolis quinque divergentibus.

In Tertio casu æquatio erat $y' = ax' + bx' + cx + d$, & Parabolam designat cujus crura divergunt ab invicem & in contrarias partes infinite progrediuntur. Abscissa AB est ejus diameter & Species ejus sunt quinque sequentes.


Si æquationis $ax' + bx' + cx + d = 0$, radices omnes Ar, AT, At sunt reales & inæquales, figura est Parabola divergens Campaniformis cum Ovali ad verticem (Fig. 70. 71.) Et Species est sexagesima septima.

Si radices duæ sunt æquales, Parabola prodit vel Nodata contingendo Ovalem (Fig. 73.) vel Punctata ob Ovalem infinite parvam

vam (Fig. 74.) Quæ duæ Species sunt *sexagesima octava* & *sexagesima nona*.

Si tres radices sunt æquales Parabola erit *Cuspidata* in vertice (Fig. 76.) Et hæc est Parabola *Neiliana* quæ vulgo *Semicubica* dicitur. Et est Species *septuagesima*.

Si radices duæ sunt impossibiles, habetur Parabola *Pura* campaniformis (Fig. 74-75.) Speciem *septuagesimam primam* constituens.



14. De Parabola Cubica.

In Quarto casu æquatio erat $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, & hæc æquatio Parabolam designat quæ crura habet contraria & *Cubica* dici solet (Fig. 77.) Et sic Species omnino sunt *septuaginta duæ*.

V. Genesis Curvarum per Umbras.

Si in planum infinitum a puncto lucido illuminatum umbræ figurarum projiciantur, umbræ Sectionum Conicarum semper erunt Sectiones Conicæ, eæ Curvarum secundi Generis semper erunt Curvæ secundi Generis, eæ Curvarum tertii Generis semper erunt Curvæ tertii Generis, & sic deinceps in infinitum.

Et quemadmodum Circulus umbram projiciendo generat Sectiones omnes Conicæ, sic Parabolæ quinque divergentes umbris suis generant & exhibent alias omnes secundi Generis Curvas; & sic Curvæ quædam simpliciores aliorum Generum inveniri possunt quæ alias omnes eorundem Generum Curvas umbris suis a puncto lucido in planum projectis formabunt.


De Curvarum Punctis duplicibus.

Diximus Curvas secundi Generis a Linea recta in punctis tribus secari posse. Horum duo nonnunquam coincidunt. Ut cum Recta per Ovalem infinite parvam transit vel per concursum duarum partium Curvæ se mutuo secantium vel in cuspidem coeuntium ducitur. Et si quando Rectæ omnes in plagam cruris alicujus infiniti tendentes Curvam in unico tantum puncto secant, (ut fit in ordinatis Parabolæ Cartesianæ & Parabolæ cubicæ, nec non in rectis Abscissæ Hyperboliformorum Hyperbolæ & Parabolæ parallelis) concipiendum est quod Rectæ illæ per alia duo Curvæ puncta ad infinitam distantiam sita (ut ita dicam) transeunt. Hujusmodi intersectiones duas coincidentes sive ad finitam sint distantiam sive ad infinitam, vocabimus *Punctum Duplex*. Curvæ autem quæ habent Punctum Duplex describi possunt per sequentia Theoremata.

VI. *De Curvarum descriptione Organica.*

THEOR. I.

Si Anguli duo magnitudine dati PAD, PBD circa polos positione



datos A, B rotentur, & eorum crura AP, BP concursu suo P percurrant Lineam rectam; crura duo reliqua AD, BD concursu suo D describent Sectionem Conicam per polos A, B transeuntem: præterquam ubi Linca illa recta transit per polorum alterutrum A vel B, vel anguli BAD, ABD

simul evanescent, quibus in casibus punctum D describet Lineam rectam.

THEOR. II.

Si crura prima AP, BP concursu suo P percurrant Sectionem Conicam per polum alterutrum A transeuntem, crura duo reliqua AD, BD

BD concursu suo D describent Curvam secundi Generis per polum alterum B transeuntem & Punctum duplex habentem in polo primo A, per quem sectio Conica transit: praterquam ubi anguli BAD, ABD simul evanescunt, quo casu punctum D describet aliam sectionem Conicam per polum A transeuntem.




THEOR. III.

At si sectio Conica quam punctum P percurrit transeat per neutrum polorum A, B, punctum D describet Curvam secundi vel tertii generis Punctum duplex habentem. Et Punctum illud duplex in concursu crurum describentium, AD, BD invenietur ubi anguli BAP, ABP simul evanescunt. Curva autem descripta secundi erit Generis si anguli BAD, ABD simul evanescunt, alias erit tertii Generis & alia duo habebit Puncta duplicia in polis A & B.

*Sectionum Conicarum descriptio per data quinque puncta.*

Jam sectio Conica determinatur ex datis ejus punctis quinque & per eadem sic describi potest. Dantur ejus puncta quinque A, B, C, D, E. Jungantur eorum tria quævis A, B, C, & trianguli ABC rotentur anguli duo quivis CAB, CBA circa vertexes suos A & B, & ubi crurum AC, BC intersectio C successive applicatur ad puncta duo reliqua D, E, incidat intersectio crurum reliquorum AB & BA in puncta P & Q. Agatur & infinite producat recta PQ, & anguli mobiles ita rotentur ut intersectio crurum AB, BA percurrat rectam PQ, & crurum reliquorum intersectio C describet propositam sectionem Conicam per *Theorema* primum.



Cur-

*Curvarum secundæ generis Punctum duplex habentium
descriptio per data septem puncta.*

Curvæ omnes secundæ generis Punctum Duplex habentes determinantur ex datis earum punctis septem quorum unum est Punctum illud duplex, & per eadem puncta sic describi possunt. Dantur Curvæ describendæ puncta quælibet septem A, B, C, D, E, F, G, quorum A est Punctum Duplex. Jungantur punctum A & alia duo quævis e punctis puta B & C; & trianguli ABC rotetur tum angulus CAB circa verticem suum A, tum angulorum reliquorum aliter ABC circa verticem suum B. Et ubi crurum AC, BC concursus C successive applicatur ad puncta quatuor reliqua D, E, F, G incidat concursus crurum reliquorum AB & BA in puncta quatuor P, Q, R, S. Per puncta illa quatuor & quintum A describatur sectio Conica, & anguli præfati CAB, CBA ita rotentur ut crurum AB, BA concursus percurrat sectionem illam Conicam, & concursus reliquorum crurum AC, BC describet Curvam propositam per *Theorema* secundum.

Si vice puncti C datur positio recta BC quæ Curvam describendam tangit in B, lineæ AD, AP coincident, & vice anguli DAP habebitur linea recta circa polum A rotanda.

Si Punctum duplex A infinite distat debet Recta ad plagam puncti illius perpetuo dirigi & motu parallelo ferri interea dum angulus ABC circa polum B rotatur.

Describi etiam possunt hæ Curvæ paulo aliter per *Theorema* tertium, sed descriptionem simpliciorum posuisse sufficit.

Eadem methodo Curvas tertii, quarti & superiorum Generum describere licet; non omnes quidem sed quotquot ratione aliqua commoda per motum localem describi possunt. Nam Curvam aliquam secundæ vel superioris generis Punctum duplex non habentem commode describere Problema est inter difficiliora numerandum.

VII. Con-

VII. Constructio æquationum per descriptionem Curvarum.

Curvarum usus in Geometria est ut per earum intersectiones Problemata solvantur. Proponatur æquatio construenda dimensionum novem

$$ax^9 + bx^8 + cx^7 + dx^6 + ex^5 + fx^4 + gx^3 + hx^2 + k = 0.$$

Ubi $b, c, d, \&c.$ significant quantitates quasvis datas signis suis + & — affectas. Assumatur æquatio ad Parabolam cubicam $x^3 = y$, & æquatio prior, scribendo y pro x^3 , evadet

$y^3 + by^2 + cy + dx^2y + exy + my + fx^3 + gx^2 + hx + k = 0$, æquatio ad Curvam aliam secundi Generis. Ubi m vel f deesse potest vel pro lubitu assumi. Et per harum Curvarum descriptiones & intersectiones dabuntur radices æquationis construendæ. Parabolam cubicam semel describere sufficit.

Si æquatio construenda per defectum duorum terminorum ultimorum bx & k reducatur ad septem dimensiones, Curva altera delendo m , habebit Punctum Duplex in principio Abscissæ, & inde facile describi potest ut supra.

Si æquatio construenda per defectum terminorum trium ultimorum $gx^3 + bx + k$ reducatur ad sex dimensiones, Curva altera delendo f evadet sectio Conica.

Et si per defectum sex ultimorum terminorum æquatio construenda reducatur ad tres dimensiones, incidetur in constructionem *Wal-lisianam* per Parabolam cubicam & Lineam rectam.

Construi etiam possunt æquationes per Hyperbolismum Parabolæ cum diametro. Ut si construenda sit hæc æquatio dimensionum novem termino penultimo carens,

$$a + cx^3 + dx^3ex^4 + fx^3 + gx^6 + bx^7 + kx^8 + lx^9 = 0;$$

Assumatur æquatio ad Hyperbolismum illum $x^3y = 1$, & scribendo y pro $\frac{1}{x^3}$, æquatio construenda vertetur in hanc

$ay^3 + cy^2 + dx^3y + ey + fxy + m y + g + bx + kx^3 + lx^9 = 0$, quæ curvam secundi Generis designat cujus descriptione Problema sol-

N

fol-

solvetur. Et quantitatum m ac g alterutra hic deesse potest, vel pro lubitu assumi.

Per Parabolam cubicam & Curvas tertii Generis construuntur etiam æquationes omnes dimensionum non plusquam duodecim, & per eandem Parabolam & Curvas quarti Generis construuntur omnes dimensionum non plusquam quindecim; Et sic deinceps in infinitum. Et Curvæ illæ tertii, quarti & superiorum Generum describi semper possunt inveniendæ eorum puncta per Geometriam planam. Ut si construenda sit æquatio

$$x^{12} + ax^{10} + bx^9 + cx^8 + dx^7 + ex^6 + fx^5 + gx^4 + hx^3 + ix^2 + kx + l = 0,$$

& descripta habeatur Parabola Cubica; sit æquatio ad Parabolam illam Cubicam $a' = y$, & scribendo y pro x^3 , æquatio construenda vertetur in hanc

$$\begin{array}{ccccccc} y^4 + axy^3 + cx^2y^2 + fx^3y + ix^4 = 0, \\ +b & +dx & +g^x & +kx \\ +e & +h & +l \end{array}$$

quæ est æquatio ad Curvam tertii Generis cujus descriptione Problema solvetur. Describi autem potest hæc Curva inveniendæ ejus puncta per Geometriam planam, propterea quod indeterminata quantitas x non nisi ad duas dimensiones ascendit.



METHODUS DIFFERENTIALIS.

PROP. I.

SI figura curvilinea Abscissa componatur ex quantitate quavis data A , & quantitate indeterminata x , & Ordinata constet ex datis quocunque quantitatibus b, c, d, e , &c. in totidem terminos hujus progressionis Geometricæ $x, x', x'', x''',$ &c. respective ductis, & ad Abscissæ puncta totidem data erigantur Ordinatum applicatæ: dico quod Ordinarum differentia primæ dividi possint per earum intervalla, & differentiarum sic divisarum differentia dividi possint per Ordinarum binarum intervalla, & harum differentiarum sic divisarum differentia dividi possint per Ordinarum ternarum intervalla, & sic deinceps in infinitum.

Etenim si pro Abscissæ parte indeterminata x ponantur quantitates quævis datæ p, q, r, s, t , &c. successive, & ad Abscissarum sic datarum terminos erigantur Ordinatæ $a, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$, &c. Hæ Abscissæ & Ordinatæ & Ordinarum differentia divisæ per Abscissarum differentias (quæ utique sunt Ordinarum intervalla) & quo-

torum differentiae divisa per Ordinarum alternarum differentias, & sic deinceps, exhibentur per Tabulam sequentem.

Abfcissæ	Ordinatæ
$A+p$	$A+bp+cp^2+dp^3+ep^4=a$
$A+q$	$A+bq+cq^2+dq^3+eq^4=\beta$
$A+r$	$A+br+cr^2+dr^3+er^4=\gamma$
$A+s$	$A+bs+cs^2+ds^3+es^4=\delta$
$A+t$	$A+bt+ct^2+dt^3+et^4=\epsilon$
Divisor. Diff. Ord.	Quoti per divisionem prodeuntes
$p-q) a-\beta$	$b+c \times p+q+d \times pp+pq+qq+e \times p^2+p^2q+pq^2+q^3=\zeta$
$q-r) \beta-\gamma$	$b+c \times q+r+d \times qq+qr+rr+e \times q^2+q^2r+qr^2+r^3=\eta$
$r-s) \gamma-\delta$	$b+c \times r+s+d \times rr+rs+ss+e \times r^2+r^2s+rs^2+s^3=\theta$
$s-t) \delta-\epsilon$	$b+c \times s+t+d \times ss+st+tt+e \times s^2+s^2t+st^2+t^3=\kappa$
$p-r) \zeta-\eta$	$c+d \times p+q+r+e \times pp+pq+qq+pr+qr+rr=\lambda$
$q-s) \eta-\theta$	$c+d \times q+r+s+e \times qq+qr+rr+qs+rs+ss=\mu$
$r-t) \theta-\kappa$	$c+d \times r+s+t+e \times rr+rs+ss+rt+st+tt=\nu$
$p-s) \lambda-\mu$	$d+e \times p+q+r+s=\xi$
$q-t) \mu-\nu$	$d+e \times q+r+s+t=\pi$
$p-t) \xi-\pi$	$e=\sigma$

P R O P. II.

Isdem positis, & quod numerus terminorum b, c, d, e, &c. sit finitus, dico quod Quotorum ultimus æqualis erit ultimo terminorum b, c, d, e, &c. & quod per Quotos reliquos dabuntur termini reliqui b, c, d, e, &c. & his datis dabitur Linea Curva generis Parabolici quæ per Ordinarum omnium terminos transibit.

Etenim in Tabula superiore Quotus ultimus σ æqualis erat termino ultimo e . Et hic terminus ductus in summam datam $p+q+r+s$, & ablatus de Quoto ξ relinquit terminum penultimum d . Et quantitates


tates jam datæ $d \times p + q + r + e \times pp + pq + qq + pr + qr + rr$, si auferantur de Quoto λ , relinquunt terminorum antepenultimum c . Et quantitates jam datæ $e \times p + q + d \times pp + pq + qq + e \times p' + ppq + pqq + q'$, si auferantur de Quoto ζ , relinquunt terminum b . Et simili computo si plures essent termini, colligerentur omnes per Quotorum Ordines totidem. Deinde quantitates datæ $bp' + cpp + dp' + ep'$, si subducantur de Ordinata prima a , relinquunt Abscissæ terminum primum A . Et quantitas $A + bx + cx' + dx' + ex' + \&c.$ est Ordinata Curvæ generis Parabolici quæ per Ordinatarum omnium datarum terminos transibit, existente Abscissâ $A + x$.

Ex his Propositionibus quæ sequuntur facile colligi possunt.

P R O P. III.

Si recta aliqua AA9 in æquales quotcunque partes AA2, A2A3, A3A4, A4A5, &c. dividatur, & ad puncta divisionum erigantur parallele AB, A2B2, A3B3, &c. Invenire curvam Geometricam generis Parabolici quæ per omnium erectarum terminos B, B2, B3, &c. transibit.

Erectarum AB, A2B2, A3B3, &c. quære differentias Primas, b, b_2, b_3 , &c. Secundas c, c_2, c_3 , &c. Tertias d, d_2, d_3 , &c. & sic deinceps usque dum veneris ad ultimam differentiam, quæ hic fit i .



Tunc incipiendo ab ultima differentia excerpe medias differentias in alternis Columnis vel Ordinibus differentiarum, & Arithmetica media inter duas medias reliquarum, Ordine pergendo usque ad Seriem primorum terminorum AB, A2B2, A3B3, &c. sint hæc $k, l, m, n, o, p, q, r, s$, &c. quorum ultimus significet ultimam differentiam; penultimus medium Arithmeticum inter duas penultimas differentias; antepenultimus mediam trium antepenultimarum

N 3

dif-

de A_1B_1 , b_1 de b , &c. & faciendo ut sint $AB - A_1B_1 = b$, $A_1B_1 - A_2B_2 = b_1$, $b - b_1 = c$, &c. adeoque quando differentiæ illæ hoc modo prodeunt negativæ signa earum mutanda sunt.

P R O P. IV.

Si recta aliqua in partes quoscunque inæquales AA_1 , A_1A_2 , A_2A_3 , A_3A_4 , A_4A_5 , &c. dividatur, & ad puncta divisionum erigantur parallele AB , A_1B_1 , A_2B_2 , A_3B_3 , &c. Invenire Curvam Geometricam generis Parabolici quæ per omnium erectarum terminos B , B_1 , B_2 , B_3 , &c. transibit.

Sunto puncta data B , B_1 , B_2 , B_3 , B_4 , B_5 , B_6 , B_7 , &c. & ad Abscissam quamvis AA_1 demitte Ordinatæ perpendiculariter BA , B_1A_1 , &c.

$$\text{Et fac } \frac{AB - A_1B_1}{AA_1} = b, \quad \frac{A_1B_1 - A_2B_2}{A_1A_2} = b_1,$$

$$\frac{A_1B_1 - A_2B_2}{A_1A_2} = b_1, \quad \frac{A_2B_2 - A_3B_3}{A_2A_3} = b_2,$$


$$\frac{A_2B_2 - A_3B_3}{A_2A_3} = b_2, \quad \frac{A_3B_3 - A_4B_4}{A_3A_4} = b_3,$$

$$\frac{A_4B_4 - A_5B_5}{A_4A_5} = b_4,$$

$$\text{Deinde } \frac{b - b_1}{AA_1} = c, \quad \frac{b_1 - b_2}{A_1A_2} = c_1, \quad \frac{b_2 - b_3}{A_2A_3} = c_2, \quad \&c.$$

$$\text{Tunc } \frac{c - c_1}{AA_1} = d, \quad \frac{c_1 - c_2}{A_1A_2} = d_1, \quad \frac{c_2 - c_3}{A_2A_3} = d_2, \quad \&c.$$

$$\text{Et } \frac{d - d_1}{AA_1} = e, \quad \frac{d_1 - d_2}{A_1A_2} = e_1, \quad \frac{d_2 - d_3}{A_2A_3} = e_2, \quad \&c.$$



Sic pergendum est ad ultimam differentiam.

Differentiis sic collectis & divis per intervalla Ordinatum applicatarum; in alternis earum Columnis sive Seriebus vel Ordinibus excerptæ medias, incipiendo ab ultima, & in reliquis Columnis excerptæ media Arithmetica inter duas medias, pergendo usque ad seriem primorum terminorum, AB , A_1B_1 , &c. Sunto hæc k , l , m , n , o , p , q , r , &c. quorum ultimus terminus significet ultimam differentiam; penultimus medium Arithmeticum inter duas penultimas; antepenultimus mediam trium antepenultimarum, &c. Et primus k erit media Ordinatum applicata, si numerus datorum punctorum est im-

impar; vel medium Arithmeticum inter duas medias, si numerus eorum est par.

C A S. I.

In Casu priori, sit A_4B_4 ista media Ordinatum applicata, hoc est, sit $A_4B_4 = k$, $\frac{b_1+b_4}{2} = l$, $c_3 = m$, $\frac{d_1+d_4}{2} = n$, $e_2 = o$, $\frac{f_1+f_4}{2} = p$, $g = q$. Et erecta Ordinatum applicata PQ, & in Basi AA_5 sumpto quovis puncto O, dic $OP = x$, & duc in se gradatim terminos hujus Progressionis

$$1 \times x - OA_4 \times x - \frac{OA_1 + OA_5}{2} \times \frac{x - OA_1 \times x - OA_5}{x - \frac{1}{2}(OA_1 + OA_5)} \times x - \frac{OA_1 + OA_6}{2} \times x \&c.$$

& ortam Progressionem asserva; vel quod perinde est duc terminos hujus Progressionis

$$1 \times x - OA_4 \times x - OA_3 \times x - OA_5 \times x - OA_2 \times x - OA_6 \times x - OA \times x - OA_7 \times \&c.$$

in se gradatim, & terminos exinde ortos duc respective in terminos hujus Progressionis

$$1 \times x - \frac{OA_1 + OA_5}{2} \times x - \frac{OA_1 + OA_6}{2} \times x - \frac{OA_1 + OA_7}{2} \times \&c. \& \text{orientur termini intermedii tota Progressione existente}$$

$$1 \times x - OA_4 \times x - \frac{OA_1 + \frac{1}{2}(OA_5 + OA_6)}{2} \times x + \frac{OA_2 + OA_3}{2} \times OA_4 \times \&c.$$

Vel dic $OA = a$, $OA_2 = \beta$, $OA_3 = \gamma$, $OA_4 = \delta$, $OA_5 = \epsilon$, $OA_6 = \zeta$, $OA_7 = \eta$: $\frac{OA_1 + OA_5}{2} = \theta$, $\frac{OA_2 + OA_6}{2} = \chi$, $\frac{OA_3 + OA_7}{2} = \lambda$. Et ex Progressione

$$1 \times x - \delta \times x - \gamma \times x - \epsilon \times x - \beta \times x - \zeta \times x - a \times x - \eta \times \&c. \text{ collige terminos quibus multiplicatis per } 1 \times x - \theta, x - \chi, x - \lambda, \&c. \text{ collige alios terminos intermedios, tota serie prodeunte}$$

$1, x - \delta, x^2 - \delta \times \theta x + \delta \theta, x^3 - \delta + 2\theta x^2 + \gamma \epsilon + 2\delta \theta x - \gamma \delta \epsilon, \&c.$
per cujus terminos multiplica series $k, l, m, n, o, \&c.$ Et aggregatum productorum $k + x - \delta \times l + x^2 - \delta \times \theta x + \delta \theta \times m + \&c.$ erit longitudo Ordinatum applicatae PQ.

C A S. II.

In Casu posteriori, sint A_4B_4, A_5B_5 duæ mediae Ordinatum applicatae.

plicatæ, hoc est, $\frac{A_2B_1+A_1B_2}{2} = k$, $b_4 = l$, $\frac{c_1+c_4}{2} = m$, $d_3 = n$, $\frac{e_1+e_4}{2} = o$,
 $f_2 = p$, &c. Et alternorum k, m, o, q , &c. Coefficientes orientur
 ex multiplicatione terminorum hujus Progreſſionis in te

$1 \times x - OA_4 \times x - OA_5 \times x - OA_3 \times x - OA_6 \times x - OA_2 \times x - OA_7 \times x - OA \times x - OA_8$ &c.
 Et reliquorum Coefficientes ex multiplicatione horum per terminos
 hujus Progreſſionis

$$x - \frac{+OA_4+OA_5}{2}, x - \frac{+OA_3+OA_6}{2}, x - \frac{+OA_1+OA_7}{2}, x - \frac{+OA+OA_8}{2}, \&c.$$

Hoc est, erit $k + x - \frac{+OA_4+OA_5}{2} \times l + x - OA_4 + OA_5 x + OA_4 \times OA_5$

$\times m$, &c. Ordinatum applicata PQ,

$$\text{vel } PQ = k + \frac{x \times l}{-1OA_4} + \frac{x \times x}{-OA_4} + \frac{x \times m}{-OA_5} + \frac{x \times x}{-OA_4} + \frac{x \times x}{-OA_5} + \frac{x \times n}{-1OA_3} + \frac{x \times x}{-1OA_6} \&c.$$

$$\text{Sive dic } x - \frac{+OA_4+OA_5}{2} = \pi, \quad x - OA_4 \times x - OA_5 = \rho,$$

$$\rho \times x - \frac{+OA_3+OA_6}{2} = \sigma, \quad \rho \times x - OA_3 \times x - OA_6 = \tau,$$

$$\tau \times x - \frac{+OA_1+OA_7}{2} = \upsilon, \quad \tau \times x - OA_1 \times x - OA_7 = \phi,$$

$$\phi \times x - \frac{+OA+OA_8}{2} = \chi, \quad \phi \times x - OA \times x - OA_8 = \psi,$$

Et erit $k + \pi l + \rho m + \sigma n + \tau o + \upsilon p + \phi q + \chi r + \psi s = PQ$.

P R O P. V.

*Datis aliquot terminis seriei cujuscunque ad data inter-
 valla dispositis, invenire terminum quemvis intermedium
 quamproxime.*

Ad rectam positione datam erigantur termini dati in dato angulo,
 interpositis datis intervallis, & per eorum puncta extrema, per Propo-
 sitiones præcedentes, ducatur linea Curva generis Parabolici. Hæc
 enim continget terminos omnes intermedios per seriem totam.

O

PROP.

P R O P. VI.

Figuram quamcunque Curvilineam quadrare quamproxime, cujus Ordinata aliquot inveniri possunt.

Per terminos Ordinarum ducatur linea Curva generis Parabolici ope Propositionum præcedentium. Hæc enim figuram terminabit quæ semper quadrari potest, & cujus Area æquabitur Area figuræ propositæ quamproxime.

S C H O L I U M.


Utiles sunt hæ Propositiones ad Tabulas construendas per interpolationem Serierum, ut & ad solutiones Problematum quæ a quadraturis Curvarum dependent, præsertim si Ordinarum intervalla & parva sint & æqualia inter se, & Regulæ computentur, & in usum reserventur pro datò quocunque numero Ordinarum. Ut si quatuor sint Ordinata ad æqualia intervalla sitæ, sit A summa primæ & quartæ, B summa secundæ & tertiæ, & R intervallum inter primam & quartam, & Ordinata nova in medio omnium erit $\frac{B+A}{3}$, & Area tota inter primam & quartam erit $\frac{A+B}{4}R$.

Et nota quod ubi Ordinata stant ad æquales ab invicem distantias, sumendo summas Ordinarum quæ ab Ordinata media hinc inde æqualiter distant, & duplum Ordinata mediæ, componitur Curva nova cujus Area per pauciores Ordinatas determinatur, & æqualis est Area Curvæ prioris quam invenire oportuit. Quinetiam si pro Ordinatis novis sumantur summa Ordinata primæ & secundæ, & summa tertiæ & quartæ, & summa quintæ & sextæ, & sic deinceps; vel si sumantur summa trium primarum Ordinarum, & summa trium proximarum, & summa trium quæ sunt deinceps; vel si sumantur summa quaternarum Ordinarum, vel summa quinarum: Area Curvæ novæ æqualis erit Area Curvæ primo propositæ. Et sic habitis Curvæ quadrandæ Ordinatis quocunque quadratura ejus ad quadraturam Curvæ alterius per pauciores Ordinatas reducetur.

Per data vero puncta quocunque non solum Curvæ lineæ generis

neris *Parabolici*, sed etiam Curvæ aliæ innumeræ diversorum generum duci possunt.

Sunto CDE, FGH Curvæ duæ Abscissam habentes communem AB, & Ordinatas in eadem recta jacentes BD, BG; & relatio inter has Ordinatas definiatur per æquationem quamcunque. Dentur puncta quotcunque per quæ Curva CDE transire debet, & per æquationem illam dabuntur puncta totidem nova per quæ Curva FGH transibit. Per propositiones superiores describatur Curva FGH generis *Parabolici* quæ per puncta illa omnia nova transeat, & per æquationem eandem dabitur Curva CDE quæ per puncta omnia primo data transibit.



F I N I S.



h. e. e.

Glaucus newtoni. equus curvatus;
 qui animi vi proprio divina
 plantarum motus, figuras,
 Comutarum semitas, caeca vique aestus,
 sua Mathesi haec in praesente,
 primus deus constravit.
 Quorum lucis distincti hinc
 utrumque. inde nascentium proprietatis,
 quas nemo ante suspicatus, erat
 pervestigavit.
 Natura, Antiquitatis, sacra scriptura,
 fiducius, saepius, quibus interpres,
 Qui Caeli mysteria philosophia aperuit,
 Evangelij simplicitatem verbis expressit.
 Tibi gratulantur mortales
 tale tantumque celsitissimum
 humani generis decus.

Nat. XXV. Decemb. A.D. MDCLII.

Obiit Mart. MDCCXXVI.



